



PRESS *Geol.*
SHELF *13.*
N° *22*



DIE
KARNISCHEN ALPEN.

EIN BEITRAG
ZUR VERGLEICHENDEN GEBIRGS-TEKTONIK

VON

Dr. FRITZ FRECH,

PROFESSOR DER GEOLOGIE UND PALAEOZOOLOGIE
A. D. UNIVERSITÄT Breslau.

HERAUSGEGEBEN MIT UNTERSTÜTZUNG DES KÖN. PREUSS. MINISTERIUMS
DER GEISTLICHEN, UNTERRICHTS- UND MEDICINAL-ANGELEGENHEITEN.

MIT EINEM PETROGRAPHISCHEN ANHANG VON
DR. L. MILCH.

Mit einer geologischen Karte in 1 : 75000,
einer tektonischen Specialkarte, einer tektonischen Uebersichtskarte der südlichen
Ostalpen, 16 Lichtkupferdrucken, 8 Profiltafeln und 96 Zinkdrucken.

HALLE.
MAX NIEMEYER.

1894.

Der Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Halle
XVIII. Band.

Vorwort.

Das vorliegende Buch beruht auf geologischen Aufnahmen, welche ich in der Karnischen Hauptkette und den angrenzenden Gebirgen während der Sommer 1886—91 ausgeführt habe. Zur Einzeichnung mussten die Generalstabskarten (1:75000) benutzt werden, da die Originalmesstischblätter (1:25000) nur für den österreichischen Antheil des Gebietes ausgeführt sind und die italienischen Tavolette (1:50000) erst neuerdings zur Ausgabe gelangen. Die Herstellung der geologischen Karte, welche nur der Buchausgabe des vorliegenden Werkes beiliegt, übernahm das k. u. k. militärgeographische Institut auf Grund der Befürwortung der k. k. Akademie der Wissenschaften zu Wien. Bei der Ausführung der Buntdruckplatten dürfte die unter Leitung des Herrn HÖDLMOSEK stehende kartographische Abtheilung des genannten Instituts alles geleistet haben, was auf der ungünstigen schraffirten Terraingrundlage technisch erreichbar ist.

Die photographischen Aufnahmen (ca. 120), welche als Vorlagen für die Lichtkupferdrucke (Heliogravuren) und die Zeichnungen gedient haben, wurden in den ersten Jahren von den Herren Professor MÜLLER (Teplitz) und Dr. VON DEM BORNE, später von mir ausgeführt.

Durch verschiedene, die Geologie und Palaeontologie der Karnischen Alpen betreffende Mittheilungen wurde ich von

den Herren Dr. A. BITTNER, Dr. C. DIENER, Dr. F. TELLER, Professor TOULA und Oberbergath VON MOJISOVICS unterstützt. Herr Professor Ednard SUESS in Wien hat mir mit seltener Liberalität seine Tagebücher sowie die einen Theil der östlichen Karnischen Alpen betreffenden, mit bekannter Meisterschaft ausgeführten Zeichnungen zur Verfügung gestellt. Bei der Herstellung des Registers haben mich die Herren Dr. LOESCHMANN und Dr. MICHAEL in der liebenswürdigsten Weise unterstützt. Allen genannten Herren spreche ich hierdurch meinen verbindlichsten Dank aus.

Die Herausgabe des vorliegenden Werkes wurde ermöglicht durch eine Subvention des k. preussischen Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten, die mich zu ehrerbietigstem Danke verpflichtet.

Inhalt.

	Seite
Einleitung	1
Tabellarische Uebersicht der Formationen	4
A. Einzelschilderungen.	
Die Eintheilung des Gebirges	6
I. Kap. Die Westkarawanken und die östlichen Karnischen Alpen bis zum Garnitzengrahen (Silur, Devon, Trias)	9
1. Der Hochwipfelbruch	9
2. Die nördliche Silurscholle	10
3. Der mitteldevonische Kalkzug des Osternigg und Poludnigg	17
4. Der Kok	21
5. Die Einklemmungen älterer Schichten zwischen dem Silur und der abgesunkenen Triasscholle	23
6. Die Aufpressungen älterer Gesteine im Schlierndolomit von Malborget	27
7. Die Tektonik der Trias in den Westkarawanken ¹⁾	36
II. Kap. Das Gebiet der Querbrüche; Gartnerkofel bis Promosjoch (Silur, Carbon, Trias)	39
1. Der Gartnerkofel und die Triasberge bei Pontafel	40
2. Das Obercarbon der Gegend von Pontafel	46
3. Das altcarbonische Eruptivgebiet des Monte Dimon	60
4. Das Westende des Hochwipfelbruches und die Quer- verwerfungen des Incarajothales	65
Zusammenfassung von Kapitel I und II	73
III. Kap. Das Hochgebirgsland der devonischen Riffe (Silur, Devon, Culm)	75
1. Der Pollnigg	75
2. Der Plöckener Querbruch und die im Osten ab- gesunkene Scholle	79
3. Die Kellerwand	84

¹⁾ Ein sinnstörender Druckfehler Ostkarawanken statt Westkarawanken hat sich leider hier eingeschlichen.

	Seite
4. Der Gamskofel und die Plenge	94
5. Die Steinwand	102
6. Das Wolayer Gebirge und die Croda Bianca	104
7. Der Hochweisstein (Paralba)	109
IV. Kap. Die westlichen Karnischen Alpen (Quarzphyllit, Silur, Devon)	118
1. Allgemeines	118
2. Die Gruppe der Porze	120
3. Die Gruppe der Königswand	125
4. Das westliche Ende der Hauptkette	130
V. Kap. Der Gailbruch und die palaeozoische Scholle am Dohratsch (Phyllit, Untercarbon, Grödener Sandstein, Trias)	134
1. Allgemeines	134
2. Das Gebirge zwischen Sillian und dem Gailberg	138
3. Die Triasberge östlich vom Gailbergssattel	143
4. Das Ostende des Gailbruchs und die palaeozoische Scholle am Dohratsch	152
VI. Kap. Die Triasgebirge im Süden der Karnischen Hauptkette (Venetianer und Julische Alpen)	162
1. Allgemeines	162
2. Die südwestlichen Triasberge (Sexten, Comelico, westliche Carnia)	165
3. Die östliche Carnia	168
4. Die Julischen Alpen	171
Petrographischer Anhang von Dr. L. Milch	176
1. Eruptivgesteine des Nötschgrabens (Untercarbon)	176
A. Südlicher Eruptivzug	176
B. Nördlicher Eruptivzug	179
2. Eruptivgesteine des Culm von der Südseite der Karnischen Alpen	181
A. Spillitische Mandelsteine	181
B. Dynamometamorphe Gesteine der Diabasfamilie	183
C. Porphyritische Gesteine	185
D. Sedimentgesteine des Culm	186
3. Gesteine von Forst zwischen Reissach und Kirchbach im Gailthal	187
A. Quarzphyllit	187
B. Ganggestein im Phyllit von Forst zwischen Reissach und Kirchbach	188
B. Beschreibung der Schichtenreihe.	
VII. Kap. Der Quarzphyllit	191
1. Petrographische Merkmale und geologisches Alter	191
2. Das dioritische Ganggestein von Reissach und die geologische Vertheilung der Karnischen Eruptivgesteine	194

	Seite
3. Ueber die Verbreitung des Quarzphyllits in den Ostalpen und sein Verhältniss zu anderen krystallinen Gesteinen (mit Tabelle S. 207)	198
VIII. Kap. Das Silur	208
A. Das Untersilur	208
1. Die untersilurischen Mauthener Schichten	208
2. Die petrographische Beschaffenheit der Mauthener Schichten	209
a) Normale klastische Gesteine	210
b) Die grünen Gesteine (Schiefer und Quarzite) und die Eruptivgesteine	212
c) Die Kalkbildungen der Mauthener Schichten und die Entwicklung der Faciesbezirke	216
3. Die Versteinerungen der Mauthener Schichten	218
B. Das Obersilur	220
1. Allgemeines (nebst tabellarischer Uebersicht S. 223)	220
2. Das Profil des Wolayer Thürls	224
3. Die Fauna der Orthocerenkalke und ihre Verbreitung	229
a) Zwischen Wolayer See und Oharnach-Alp	229
b) Die silurischen Korallen am Findenigkofel	232
c) Die Orthocerenkalke des Kok	234
3. Vergleichungen mit dem Obersilur anderer Länder	236
IX. Kap. Das Devon	244
Faciesentwicklung und Gesteine in den Karuischen Alpen und Karawanken	244
1. Das tiefste Unterdevon	247
2. Das mittlere Unterdevon	249
3. Das höhere Unterdevon	257
4. Das Mitteldevon	260
5. Der Brachiopodenkalk des unteren Oberdevon	266
6. Der Clymenienkalk	268
Anhang: Ueber die oberdevonischen Arten der Untergattung <i>Trimeroccephalus</i>	270
Das alpine Devon im Vergleich mit dem anderer Gebiete	272
1. Allgemeines	272
2. Die „Greifensteiner Facies“ und die Koralleukalke des Unterdevon	274
3. Uebersicht der devonischen Faciesbildungen	281
I. Korallenkalke	282
a) Ungeschichtete, reine Korallenkalke u. Dolomite	282
b) Geschichtete Korallenkalke	282
II. Brachiopodenschichten	282
a) Brachiopodenkalke	282
b) Brachiopodenmergel und -Schiefer	283
c) Spiriferensandstein	283

	Seite
III. Zweischalerialfacies	284
IV. Hunsrückeschiefer und verwandte Bildungen	285
V. Die Greifensteiner Facies	287
VI. Die Cephalopodenschichten	287
VIII. Die Old Red Sandstone-Facies	288
4. Stratigraphische Vergleiche	289
a) Das Grazer Devon	289
b) Vergleich mit Böhmen	293
c) Nordfrankreich	293
d) Vergleich mit den Wiederschiefern des Harzes	296
e) Vergleich mit dem Unterdevon des Ural	299
X. Kap. Das Carbon	301
1. Das Untercarbon	302
a) Die Nützeber Schichten mit <i>Productus giganteus</i>	302
b) Der Culm	308
2. Das Obercarbon (mit zwei Tabellen: Profil von Krono und Auernigg S. 326; die obercarbonischen Brachiopoden S. 328)	309
Ueber die Bildungsweise d. obercarbonischen Schichten	328
3. Ueber die Verbreitung des Carbon in den Ostalpen	332
XI. Kap. Das Perm (Dyas)	336
1. Der Grödener Sandstein und der sogenannte Verrucano	336
2. Der Bellerophonkalk	341
3. Die Stellung der sogenannten Uggowitzer Breccie	344
Die Stellung des Karnischen Carbon und Perm in der allgemeinen Schichtenfolge	349
1. Das Untercarbon und seine Verbreitung	350
a) Mittel- und Westeuropa	350
2. Das Obercarbon und seine Verbreitung	359
3. Das Perm (Dyas) und seine Abgrenzung vom Carbon	367
Anhang: Ueber d. Vorkommen v. untercarbonischen Nützeber Schichten im Veitschthal (Mürzgebiet, Steiermark)	375
XII. Kap. Die Trias	378
1. Die obere Trias und ihre Gliederung	379
a) Die neueren Ansichten über die Benennung der Hauptstufen (mit Tabelle)	379
b) Ueber die geologische Entwicklung der Trias- korallen	383
c) Vergleich der Hallstätter u. Greifensteiner Facies- entwicklung	385
d) Kurze Uebersicht der alpinen Triasbildungen	387
2. Die Werfener Schichten	391
3. Der Muschelkalk	394
4. Ueber die pelagischen Aequivalente der unteren Trias und die rothen Perm-Triasschichten	399

5. Der Schlierndolomit und seine Äquivalente	404
a) Die Buchenateler Schichten	410
b) Die Wengener Schichten	411
6. Die Raibler Schichten	414
7. Der Hauptdolomit und das Rhæt	419
a) Die nördliche Entwicklung	419
b) Die südliche Entwicklung	422

C. Der Gebirgsbau der Karnischen Alpen in seiner Bedeutung für die Tektonik.

XIII. Kap. Tektonische Einzelfragen	426
1. Grabenspalten	426
2. Die „Aufpressungen“ von älteren plastischen Gesteinen in starren jüngeren Massen	427
3. Tektonische Klippen	430
4. Blattverschlebung	433
5. Complicirte Faltungs- und Interferenzerscheinungen	134
a) Answalzung an Brüchen (Hochwipfelbruch)	434
b) Beeinflussung des Streichens der Schieferungsflächen durch Kalkmassen	436
c) Nachbrechen eingefalteter Kalkmassen bei erneuter Gebirgsbildung	437
d) Interferenzerscheinungen von verschiedenen Bruchrichtungen	437
e) Blattverwerfung mit Ablenkung des Streichens	438
XIV. Kap. Die Phasen der Gebirgsbildung in den Karnischen Alpen	440
1. Die paläozoische Faltung	440
a) Die mittelcarbonische Faltung in den Ostalpen	440
b) Die carbonisch-permische Faltung im westlichen Theile der Alpen	447
2. Die jüngeren (cretaceischen und tertiären) Faltungen	449
a) Cretaceische Gebirgsbildung	449
b) Tertiäre Gebirgsbildung	453
Uebersicht der tektonischen Geschichte der Karnischen Alpen	454
Uebersicht der tektonischen Entwicklung der Westalpen	457
XV. Kap. Die Karnischen Alpen in ihrer Bedeutung für den Bau des Gebirges	459
1. Das Bruchnetz der Karnischen Alpen in seinem Zusammenhang mit den tektonischen Linien der Ostalpen	460
2. Einfluss der Brüche auf die Thalbildung	471
3. Zur Tektonik der Ostalpen	479
4. Kommen an Bruchlinien „Hebungen“ vor?	486

Verzeichniss der Illustrationen.

Die Illustrationen bestehen aus:

1. **Abbildungen** (86). Dieselben stellen dar kleine Profile oder Skizzen nach der Natur, Zeichnungen nach Photographien¹⁾ sowie Reproduktionen von Photographien.

2. **Grösseren Profiltafeln** (VIII). Dieselben enthalten schematische Durchschnitte durch die ganze Kette und sind im natürlichen **Maassstabe** von Höhen und Längen²⁾ auf Grund der kartographischen Aufnahmen entworfen.

3. **Lichtkupferdrucken** (Heliogravuren; XVI). Dieselben sind unmittelbar nach den Originalnegativen von der Firma Meisenbach, Riffarth & Co. in mustergiltiger Weise ausgeführt.

4. **Zwei tektonischen Kartenskizzen** (S. 459 und S. 470).

	Ab- bildung	Profil- tafel	Kupfer- tafel
Zu S. 12. Der Faaker See mit dem Mittagskogel	1		
„ „ 15. Profil durch Osternigg und Uggwabach		1	
„ „ 17. Der Poludnigg von Süden	2		
„ „ 18. Der devonische Kalkzug des Sagrau	3		
„ „ 20. Schematisches Längeprofil des Kalkzuges Schönwipfel-Sagrau-Goçman	4		
„ „ 21. Querprofil durch Kok und Schönwipfel	5		
„ „ 23. Aussicht von der Krone nach Osten (von Eduard Suess)	6		
„ „ 24. Die Einklemmung von Fetzen permo-tria- discher Gesteine an Achomitzer Berg	7		
„ „ 24. Die Berge östlich vom Kok (von Eduard Suess)	8		

¹⁾ Die von Herrn O. Berner gut ausgeführten Vorlagen sahen in den Probedrucken wesentlich besser aus, als in der endgültigen Ausführung durch das Schnellpressverfahren.

²⁾ Mit Ausnahme von Profiltafel I.

	Ab- bildung	Profil- tafel	Kupfer- tafel
Zu S. 26. Die Bruchgrenze von Trias und Silur bei Thörl (Profil)	9		
" " 28. Der Guggberg bei Malhorget			I
" " 28. Schematische Zeichnung zur Erläuterung von Tafel I	10		
" " 31. Aufquetschung von Muschelkalk im Schlerndolomit des Malborgeter Gröhens	11		
" " 36. Die Bruchgrenze von Silurachiefer und Trias in den Karawanken (Profil)	12		
" " 39. Die Brüche zwischen Obercarbon und Trias bei Pontafel: Der Gartnerkofel von Süd und Aussicht vom Gartnerkofel (von Eduard Suess)	13, 14		
" " 41. Das Profil des Kreuzbaches südl. Hermagor	15		
" " 42. Schematisches Profil des Gartnerkofels (ca. 1/34000)		II	
" " 44. Weg zur Thörlscharte (von Eduard Suess).	16		
" " 44. Gartnerkofel und Thörlhöhe von N. (von Eduard Suess)	17		
" " 46. Die Bruchgrenze im Dukagraben (von Eduard Suess)	18		
" " 47. Bruch zwischen kalkigem ¹⁾ Schlerndolomit und Obercarbon (von Eduard Suess)	19		
" " 49. Der Rosskofelbruch (von Eduard Suess)	20		
" " 51. Die Erosionsschlucht des Garnitzengrabens (von Eduard Suess)	21		
" " 51. Lagerung der Carbonschichten zwischen Krone und Garnitzen	22		
" " 52. Die Zirkelspitzen von WSW.	23		
" " 52. Die Zirkelspitzen	24		
" " 55. Der Rudniker Sattel (mit Erklärungshlatt)			II
" " 56. Die Bruchgrenze am Hochwipfel (zwei Aufnahmen mit erklärender Umrisskizze)			III
" " 56. Schematisches Querprofil durch die Karnische Hauptkette zwischen Tressdorf und Paularo (1/37500)		III	
" " 70. Der Findenigkofel	25		
" " 72. Monte Dimon und Hoher Trieb von O.	26		
" " 72. Einquetschung von Culm in Silur	27		
" " 75. Das Gailthal und die Karnische Hauptkette von den Vorhöben des Reisskofels	28		
" " 76. Zwei schematische Profile durch den Polli-			

¹⁾ Non kalkigen.

	Ab- bildung	Profil- tafel	Kupfer- tafel
	nigg und die Kellerwand (1/50000 bzw. 1/75000)		IV
Zu S.	77. Würmlacher Alp von O.	29	
" "	78. Das Hochland der Devonischen Riffe von N.	30	
" "	82. Der Tischwanger Kofel	31	
" "	83. Unregelmässige Aufwölbung der Devonkette im Culmschiefer des Palgrabens	32	
" "	84. Der Cellonkofel vom Valenthinthal (mit erläuternder Umrisszeichnung)		IV
" "	85. Der Cellonkofel von Süden	33	
" "	85. Der Cellonkofel von Norden	34	
" "	86. Das Ostgehänge des Kollinkofels (mit erläuternder Umrisszeichnung)		V
" "	87. Der Kollinkofel von Osten (mit erläuternder Umrisszeichnung)		VI
" "	88. Schichtenstanchungen in der Wand des Eiskars (vergrösserte Partie des linken unteren Theiles von Abhld. 35)		VII
" "	89. Die Wand des Eiskars vom oberen Valenthinthal gesehen	35	
" "	91. Der Südabfall der Kellerwand	36	
" "	92. Das Ineinandergreifen von Culmschiefer und devonischem Rifskalk auf dem Südabhang des Kollinkofels	37	
" "	93. Kelförmiges Eingreifen des Devonkalkes in die Culmschiefer oberhalb der Casa Moreretto	38	
" "	99. Plenge und Grubenspitz von der Mauthener Alp	39	
" "	99. Das Ostgehänge des Wolayer Thales	40	
" "	100. Ein silurischer Schieferzug im Devonkalk	41	
" "	103. Die eingefalteten Devonkalke im Silur des Niedergailthales	42, 43	
" "	104. Tiefenspitz von W.	44	
" "	105. Die Grabenversenkung der Bordaglia-Alp von der Spitze der Croda Bianca	45	
" "	106. Schematische Skizze der Umgebung der Bordaglia-Alp (1/12500)	46	
" "	107. Das Hochland der devonischen Kalkriffe von Westen	47	
" "	107. Schieferzüge auf dem Südabhang des Wolayer Gehirges	48	
" "	108. Die Croda Bianca von Osten	49	
" "	108. Der Kalkkeil der Croda Bianca von Frasse- netto	50	

	Ab- bildung	Profil- tafel	Kupfer- tafel
Zu 8. 108. Die Croda Bianca von Westen	51		
" " 108. Die Croda Bianca von Norden (mit er- läuternder Umrisszeichnung)	52		VIII
" " 110. Der Bladener Jochkofel			
" " 111. Schematischer Durchschnitt durch Rau- denspitz und Monte Avanza (1/50000)		V	
" " 112. Das Oregione-Joch von Westen (mit Er- klärungsblatt)			IX
" " 113. Profiansichten der Hochalpspitz	53, 54		
" " 114. Der in den Silurschiefer eingefaltete Kalk- zug der Hartkarspitz	55		
" " 114. Hochwelsstein und Hartkarspitz von SO.	56		
" " 115. Ein devonischer Kalkkell in dem Silur- schiefer des Ofener Joches	57		
" " 115. Hochweisstein von W.	58		
" " 118. Königswand und Roskarspitz von Silden (mit Erklärungsblatt)			X
" " 121. Monte Palumbina und Porze von Osten	59		
" " 123. Die triadischen und palaeozoischen Berge des Valle Visdende von Osten			XI
" " 124. Vergrösserte Umrisszeichnung zu Taf. XI	60		
" " 125. Die westlichen Karnischen Alpen von dem Gipfel der Porze	61		
" " 126. Porze und Palumbina-Joch von Westen	62		
" " 126. Die Königswand von SO.	63		
" " 127. Die Liköflwand (mit erläuternder Umriss- zeichnung)			XII
" " 128. Die Königswand von Westen (mit er- läuternder Umrisszeichnung; Taf. XII u. XIII schliessen unmittelbar an einander an)			XIII
" " 128. Der Tscharknollen	64		
" " 129. Die Gatterspitz von Osten	65		
" " 130. Der Nordabhang der Pfannspitz von Osten gesehen	66		
" " 130. Der Nordabhang der Pfannspitz von Westen gesehen	67		
" " 132. Profile durch die Königswand und Porze (1/50000)		VI	
" " 134. Das Lienzner Gebirge (Unholde) von der Mussen-Alp (1945 m)	68		
" " 136. Der Gallbruch im Mocnikgraben bei Weiss- hriach	69		
" " 139. Das nördliche Gailthaler Gebirge von Silden	70		
" " 140. Die nordwestlichen Gailthaler Berge (mit erläuternder Umrisszeichnung)			XIV

	Ab- bildung	Profil- tafel	Kupfer- tafel
Zu S. 144. Der nördliche Theil des Gailbergsattels (von der Strasse gesehen)	71		
„ „ 147. Der Nordabfall des Jauken	72		
„ „ 149. Der Reisskofel von Säden	73		
„ „ 150. Durchschnitt durch die Triaskette zwischen Drau- und Gitschthal (von Eduard Sness)		VII	
„ „ 155. Der Nütsehgraben (Windische Graben) unterhalb Bleiberg	74		
„ „ 160. Aussicht vom Dobratsch nach NW.	75		
„ „ 164. Pontebba von Säden	76		
„ „ 166. Croda Bianca und Monte Vas	77		
„ „ 170. Der Monte Avariana bei Stazione per la Carnia (Provinz Udine)	78		
„ „ 172. Der Montasch von Luschari	79		
„ „ 192. Profil des Obergailberges		VIII	
„ „ 195. Das Profil von Forst zwischen Reissach und Kirchbach	80		
„ „ 217. Profil durch die tieferen Mauthener Schlechten nördlich von Hermagor	81		
„ „ 225. Das Profil des Wolayer Thörl	82		
„ „ 228. Seekopf und Wolayer See (mit erläuternder Umrisszeichnung)			XV
„ „ 264. Die Aussicht vom Osternigg nach Osten	83		
„ „ 318. Der Auernigg (1845 m) bei Pontafel von Westen (mit Erklärungsblatt)			XVI
„ „ 343. Profil der Thörlhöhe (Reppwand d. G. St. K.) vom Guggenberg (N) gesehen	84		
„ „ 366. <i>Productus semireticulatus</i> var. <i>bathycolpus</i> Schellwien (<i>Pr. boliviensis</i> auct.)	85		
„ „ 405. Der Schlnuz (Schlerndolomit)	86		

Einleitung.

Die Karnischen Alpen sind in doppelter Hinsicht für die Geschichte des gesamten Gebirges von Bedeutung: sie enthalten die vollständigste und versteinungsreichste Vertretung der palaeozoischen Schichtenfolge im Gebiete der Alpen und erweisen durch die Eigentümlichkeiten ihres tektonischen Aufbaues das Vorhandensein eines carbonischen Hochgebirges aneh in diesem Teile Europas.

Eine geologische Einzelbeschreibung des langgestreckten, in orographischer Hinsicht wohl begrenzten Gebirgszuges¹⁾ zwischen Innichen (Tirol) und Villach (Kärnten) erscheint somit in sachlicher Hinsicht wohl begründet.

Die geologische Litteratur über unser Gebiet geht bis auf LEOPOLD VON BUCH zurück, der das höhere Alter der Karnischen Hauptkette („Transitionsgebirge“) gegenüber den umgebenden jüngeren Kalken mit scharfem Blicke erkannte.

In den fünfziger Jahren wurde die erste Übersichtsaufnahme der Ostalpen seitens der k. k. geologischen Reichsanstalt ausgeführt; die palaeozoischen Teile des Gebietes fielen LIPOLD, PERKES und STUR zu, von denen der letztere die Karnischen Alpen aufgenommen hat. Die in verschiedener Hinsicht unvollkommenen Ergebnisse dieser ersten Untersuchung erklären sich im wesentlichen aus der ungewöhnlich kurzen Zeit, in der die Kartirung eines grossen Gebietes abgeschlossen

¹⁾ Die Grenzen der Karnischen Hauptkette sind nach Böhm: Kreuzberg (1632 m), Sextenthal, Innichen, Pusterthal bis Sillian, Kartischthal, Thalsattel von Kartisch (1518 m), Lessachthal (Gall), Ober und Unter-Gailthal bis Thörl, Kanalthal [Gailitz, Tarvis, Thalschwelle von Saifnitz (797 m) Fella bis Pontafel], Rio Pontebbana, R. Pradulina, Sattel von Pradulina, Torrente Torrier (auf der G.-St.-K. steht der unrichtige Name Trnio), Panlaro, Sattel von Ligosullo (1032 m), T. Pontalba, Palazza, T. Gladegna, Sattel von Ravascletto (954 m), T. Margo, Comeglians, Canal di Gorto (Degano) bis Forn Avoltri, T. Degano, R. Avanza, Colle di Canova, Val dell' Oregione (T. Piave), R. Rindelondo, Val di Londo, Foren di Palumbina, T. Digone, Caudde, Padola, Kreuzberg.

werden musste. Es ist bekannt, dass man auf Grund der bei Bleiberg and Pöntafel aufgefundenen Carbonversteinerungen die ganze palaeozoische Schichtenfolge der Karnischen Alpen und Karawanken unter der Bezeichnung „Gailthaler Schichten“ der Steinkohlenformation zuwies; allerdings hat schon LIPOLD während des Verlaufes der ersten Aufnahmen das Vorkommen älterer Bildungen vermutet.

Die palaeozoischen „Gailthaler Schichten“, ein Name, der in mancher Hinsicht dem mesozoischen „Alpenkalk“ vergleichbar ist, wurden von STACHE in ihre Bestandteile aufgelöst; derselbe konnte durch glückliche Versteinerungsfunde das Vorkommen von Unter- und Obersilur sowie von älterem Devon feststellen.

Für die Auffassung des Gebirgsbaues der östlichen Karnischen Alpen sind die allerdings nur in abgekürzter Form veröffentlichten Untersuchungen von SUSS massgebend geworden, dessen Scharfblick die gewaltigen Senkungsbrüche zwischen Trias und Ober-Carbon erkannte.

Auf die Einzelheiten der geologischen Erforschung unseres Gebirges näher einzugehen, liegt keine Veranlassung vor, da dieselben in der Schilderung der einzelnen Gebiete Berücksichtigung finden werden. Zudem enthalten die Arbeiten STRACUS (1872—90), vor allem die Abhandlung über die palaeozoischen Gebiete der Ostalpen), eine ausführliche Übersicht der älteren Litteratur. Ebenso glaube ich die sogenannte „oro-hydrographische“ Übersicht oder besser die in Worten wiedergegebene Karte dem Leser ersparen zu dürfen, da dieselbe sich wohl leichter von dem Kartenblatte selbst abliest.

Die Karnischen Alpen habe ich zum ersten Male im Sommer 1886 auf einer Studienreise besucht, welche die vergleichende Untersuchung des älteren Devon zum Zweck hatte. Die in diesem und im folgenden Jahre beobachteten Thatsachen über die Ausdehnung des jüngeren Devon, über das Ineinanderverfließen der silurischen und devonischen Fauna²⁾ waren zum Teil so unerwarteter Art, dass ich mich zu weiteren Forschungen veranlasst sah. Die palaeontologisch-stratigraphischen Ergebnisse derselben entsprechen allerdings nicht ganz den Anfängen, um so eigenartiger und anziehender waren

¹⁾ Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 1874.

²⁾ Man vergleiche unten die Beschreibung des Wolayer Profils.

dagegen die tektonischen Probleme, deren Lösung mich während der drei folgenden Sommer (1888—90) im wesentlichen beschäftigt hat. Diese verschiedenartigen Richtungen der Forschung haben bereits 1887 ihren Ausdruck in zwei kleinen Aufsätzen „über das Devon der Ostalpen“ etc. und „über Bau und Entstehung der Karnischen Alpen“¹⁾ gefunden, deren weiterer Ausbau im folgenden unternommen werden soll. Trotz der geringen Ausdehnung des damals untersuchten Gebietes und trotz der Unfertigkeit, welche jedem ersten Versuche naturgemäss anhaftet, erwiesen sich die 1887 ausgesprochenen Grundideen bei der Weiterführung der geologischen Aufnahmen als richtig. Im einzelnen musste hingegen manches verbessert und berichtigt werden.²⁾

Eine in der Zeitschrift des deutsch-österreichischen Alpenvereins (1890) veröffentlichte Studie über die Karnischen Alpen ist für weitere Kreise bestimmt und behandelt in erster Linie die Oberflächen-Geologie unseres Gebietes.

Die Anordnung der ganzen Arbeit entspricht dem zweifachen Ziel der Forschung: Der erste Teil enthält die Schilderung der einzelnen Abschnitte der Karnischen Alpen und ihrer südlichen und nördlichen Vorlagen; im Anschluss daran werden die tektonischen Grundzüge der Karnischen Hauptkette unter Rücksichtnahme auf den gesammten Ban der Ostalpen übersichtlich dargestellt werden. In einem weiteren Teile erfahren die Formationen unseres Gebietes eine gesonderte Behandlung; eine etwas ausführlichere Darstellung der Oberflächen-Geologie (alte Gletscher, Thalbildung, Seenbildung, Bergfürze) bildet den Schluss. Endlich soll dann noch eine Besprechung und Abbildung der wichtigsten palaeozoischen Versteinerungen des Gebietes folgen, so weit der Raum dies gestattet.

Ein petrographischer Anhang bringt die mikroskopische Beschreibung der wichtigsten Gesteine, welche Herr Dr. MILCH in zuvorkommendster Weise angeführt hat.

¹⁾ Zeitschrift d. deutschen geologischen Gesellschaft p. 659 bezw. 730.

²⁾ Ich habe nicht bei jeder Kleinigkeit auf die vorgenommene Änderung hingewiesen, sondern begnüge mich, hier hervorzuheben, dass wo nichts besonderes bemerkt wurde, die spätere Darstellung selbstredend die massgebende ist.

Tabellarische Uebersicht der Formationen.

Da die Beschreibung der einzelnen Formationen einem späteren Abschnitte vorbehalten bleibt, so muss dem topographischen Theile eine tabellarische Uebersicht den verschiedenen Horizonte vorangeschickt werden, welche dem Farbenschema der geologischen Karte entspricht. In der Karnischen Hauptkette und ihren Vorlagen sind die folgenden stratigraphischen Abtheilungen unterscheidbar:

- I. **Quarzphyllit**, ? cambrischen Alters, mit eingelagerten Glimmerschiefern und Diorit-Gängen.
- II. **Silur**, vornehmlich aus verschiedenen Schiefer- und Granwackengesteinen bestehend, den Quarzphyllit concordant überlagernd.
 1. An der unteren Grenze finden sich local chloritische Schiefer. Feldspathführende Schiefer sowie grüne Quarzite und Schiefer bilden unregelmässige Einlagerungen im Westen der Kette. Lagen von dichtem oder krystallinem Kalke sind allgemein verbreitet. Die Gesamtheit der nur nach petrographischen Gesichtspunkten zu gliedernden Untersilurbildungen wird unter dem Begriff der Manthener Schichten zusammengefasst.
 2. Obersilurische Orthooceren-Kalke (E₂).
- III. **Devon**.
 1. Tiefstes Unterdevon (Zonen des *Tornoceras inspectatum* und der *Rhynchonella Megaura*).
 2. Unterdevonischer Riffkalk (F₂).
 3. Mitteldevonischer Riffkalk (mit unterem Oberdevon).
 4. Clymenienkalk.

IV. Carbon.

1. Culm (Thonschiefer, Kieselschiefer, Grauwacke mit Archaeocalamiten).
2. Nötscher Schichten. Quarzeonglomerate und kalkige Schiefer mit *Productus giganteus*.
3. Diabase, Porphyrite, spilitische Mandelsteine und Schalsteine (Tuffe) des Unterearbon.

Discordanz.

4. Oberearbon.

Discordanz.

V. Perm.

1. Grüdener Conglomerat („Verrucano“) und Sandstein mit Decken von
2. Bozener Quarzporphyr.
3. Bellerophonkalk.

VI. Trias.

1. Werfener Schichten.
2. Muschelkalk; das bunnte Kalkcongomerat des unteren Muschelkalkes („Uggowitzer Breccie“) wird durch eine besondere Farbe auf der Karte bezeichnet
3. Raibler Quarzporphyr (deckenbildend).
4. Buchensteiner Schichten und grüne Tuffe („Pietra Verde“), letztere z. Th. = oberer Muschelkalk.
5. Wengener Schichten. (Die Mergelentwicklung der Cassianer Schichten fehlt fast ganz.)
6. Schlerndolomit und Kalk; Riffentwicklung der Buchensteiner, Wengener und Cassianer Schichten.
7. Raibler Schichten.
8. Rhaet (nebst der oberen karnischen Stufe): Hauptdolomit, Plattenkalk und Rauhawacke im Norden; Dachsteinkalk und Hauptdolomit im Süden.

VII. Diluvium.

1. Glacialbreccien.
2. Glacialsehötter mit Schieferkohlen.
3. Moränen.

VIII. Jüngere Bildungen.

1. Flussterrassen.
2. Schnttkegel (Recent und Diluvial).
3. Bergstürze.
4. Hochmoore.
5. Alluvium der Thalböden.

A.

Einzel schilderungen.

Die Eintheilung des Gebirges.

Die Hauptkette der Karnischen Alpen birgt eine Reihe verschiedenartiger Landschaftstypen, in denen die Mannigfaltigkeit der geologischen Formationen zum Ausdruck gelangt. Die einförmigen, grünbewachsenen Schiefer- und Phyllithöhen des Westens gleichen vollkommen den Vorbergen der Tauern, deren Fortsetzung sie sind. Die wildzerrissenen schmalen Kalkkämme in der Mitte des Gebirges, welche orographisch den Schieferhöhen scheinbar aufgesetzt sind, gemahnen an die Ketten der nordwestlichen Tiroler Kalkalpen; nur die Masse der Kellerwand ähnelt den bastionsartigen Plateauformen, welche z. B. die Gegend von Ampezzo kennzeichnen. Auch dem Bergsteiger stellen die, z. Th. noch merstiegenen Spitzen und Wände des Devonischen Riffkalkes „Prohleme“, welche denen der Dolomiten vergleichbar sind.

Der Westen der Karnischen Alpen, etwa vom Findenigkofel an, trägt dagegen mehr den Charakter des Mittelgebirges, obwohl einzelne Schieferhöhen wie der Hochwipfel fast 2200 m erreichen. Nur die Dolomitherge wie Trogkofel, Schinonz und Gartnerkofel zeigen schon oberhalb der Baumgrenze, also von 1800 m ab kühnere Formen.

In rein orographischer Hinsicht würde eine Eintheilung in drei Hauptgruppen, die der Königswand, der Kellerwand und des Gartnerkofels am meisten dem Bedürfniss einer einfachen Gliederung entsprechen: Es sind dies die höheren

Erhebungen des Kalkes bzw. Dolomites, welche durch niedrigere Schiefergebiete von einander getrennt sind.

Auch die geologischen Eintheilungsgründe, welche in erster Linie den Gebirgsbau und das Vorherrschende der einen oder anderen Formation berücksichtigen, bedingen eine ungefähr übereinstimmende Gruppierung. Bei dieser Betrachtungsweise ist von der Thatsache auszugehen, dass in unserem Gebiete durch gewaltige Dislocationen die Erdrinde in eine Anzahl verschiedenartiger Schollen zerschnitten ist. Jeder der 4, bei einer geologischen Eintheilung zu unterscheidenden Abschnitte ist durch abweichende Lagerungsformen und das Auftreten verschiedener Formationen gekennzeichnet. Nur das Silur begleitet in langem, nirgends unterbrochenem Zuge den Nordabfall der Hauptkette und setzt stellenweise den Kamm des Gebirges zusammen.

I. Der Westabschnitt entspricht genau der oroplastischen Gruppe der Königswand und reicht von Innichen bis zum Winkler Joeh, bezw. bis zur Mitte des Valle Visdende. Die denselben zusammensetzenden alten Formationen, Quarzphyllit (? Cambrium), Silur und eingefaltetes Devon sind durchweg gefaltet und im wesentlichen synclinal angeordnet.

II. Der Mittelabschnitt des Hochweissteins und der Kellerwand reicht bis zum Promosjoeh und zeichnet sich durch monoclinalen Aufbau und bedeutende Dislocationen, sowie durch die grosse Ausdehnung des Culmschiefers aus, welche nur mit einem Ausläufer in den nächsten Abschnitt hinüberreicht. Fast ebenso ausgedehnt sind Silur und der mächtig entwickelte devonische Riffkalk, während der Quarzphyllit auf einen schmalen Streifen am Nordfusse des Gebirges beschränkt ist.

Die östliche oroplastische Gruppe des Gartnerkofels zeichnet sich geologisch gegenüber den beiden westlichen Abschnitten dadurch aus, dass ungefaltete Bildungen, Obercarbon und Trias (nebst untergeordnetem Perm) an der Bildung der Hauptkette theilnehmen:

III. Die geologische Gruppe des Gartnerkofels im engeren Sinne (bis zum Garnitzen- und Vogelbachgraben) wird im nachfolgenden nach ihrer hervorstechenden tektonischen Eigentümlichkeit als die Zone der Querbrüche bezeichnet werden.

Diese Störungen treten sonst hinter den längs verlaufenden Dislocationen zurück oder fehlen (wie im Westen) gänzlich. Man beobachtet in der Zone der Querbrüche Silur, Ober-carbon, Trias (nebst Perm) sowie im Südwesten Culm.

IV. Der Osten der Karnisehen Alpen sowie der Westen der Karawanken ist gekennzeichnet durch den scharfen Gegensatz der im ganzen flachgelagerten Trias des Südens und der gefalteten Silur- und Devonbildungen im Norden; dieselben sind durch einen gewaltigen Bruch von einander getrennt.

V, VI. Die nördlichen und südlichen Vorlagen der palaeozoischen Hauptkette werden in einem fünften und sechsten Kapitel darzustellen sein: im Norden ist das alte Gebirge durch eine tiefeingreifende Verwerfung abgeschnitten, und auch die Transgressionsgrenze der südlichen Triasplatte (VI.) zeigt tektonische Unregelmäßigkeiten mannigfachster Art.

I. KAPITEL.

Die Westkarawanken und die östlichen Karnischen Alpen bis zum Garnitzengraben.

(Silur, Devon, Trias.)

Die Hauptkette der Karnischen Alpen und die Karawanken sind zwar durch den tief eingerissenen Cañon des Gailitzbaches orographisch von einander getrennt, bilden jedoch in tektonischer und stratigraphischer Beziehung ein Ganzes. Die Furehe des Gailitzbaches, dessen Bildung im wesentlichen in postglacialer Zeit erfolgte, ist ein echtes Querthal, dessen beiderseitige Gehänge einen im allgemeinen übereinstimmenden Bau besitzen.

I. Der Hochwipfelbruch.

Das massgebende Element im Bau unseres Gebirges ist eine gewaltige Längsstörung, die im Osten und Westen über den in der Überschrift bezeichneten Gebirgsabschnitt hinübergreift und nach dem Berge, auf welchem sie am schönsten zu beobachten ist, als Hochwipfelbruch bezeichnet wird. (Vgl. das betr. Lichtbild in Kap. II.) Dieser Bruch, der der jüngeren, mioceanen Periode der Gebirgsbildung angehört, verläuft, abgesehen von einigen kleinen Unregelmässigkeiten, der Hauptrichtung der Kette parallel und trennt die abgesunkene Trias- tafel von der stehengebliebenen bezw. aufgewölbten Silur- Devon- Masse des Nordens. Das tektonische Verhältniss der Gebirgslieder prägt sich noch in den hentigen Höhenverhältnissen aus: Die grössten Erhebungen sind durchgehends auf die nördliche Scholle beschränkt. Der Bruch verläuft auf der Südabdachung bis südlich von Villach, wo er am Mittagkofel auf die Nordseite hinüberbiegt (vergl. das Bild des Faaker Sees). Die tektonische Verschiedenheit der steil auf-

gerichteten Silurschichten des Nordens und der flach gelagerten Triashildungen des Südens ist auf dem Generalprofil Osternigg-L'ggowitz (Taf. 1) zur Darstellung gebracht. Dasselbe trifft die Kette an einer Stelle, wo die tektonischen und stratigraphischen Schwierigkeiten in einer geradezu raffinierten Weise gehäuft sind. Unglücklicherweise ist gerade dieser Durchschnitt, der nur durch die Vergleichung mit den einfacher gebauten, angrenzenden Gebirgstheilen verständlich wird, von früheren Beobachtern, vor allem von STACHE zum Ausgangspunkt der Forschung genommen worden.

Abweichungen von der östlichen bzw. ost-südöstlichen Richtung des Bruches finden sich bei Thörl und am Komberge. Oberhalb von Thörl springt der Silurschiefer in Form eines rechtwinkligen, ungleichseitigen Dreiecks in die Trias vor. Nördlich vom Kok ragt ein spitzer, auf den ersten Blick paradox erscheinender Sporn von Triasdolomit in den Silurschiefer hinein. Bei näherer Betrachtung der Karte verliert dieser eigentümliche, bajonnetförmige Verlauf des Bruches etwas von seinem Wunderbaren: der Hauptbruch verläuft von Kersnitz bis zum Kok in einer fast genau südöstlichen Richtung. Die steilen Sättel und Mulden des Silurschiefers und vor allem die theils eingefaltete, theils nachträglich eingebrochene Masse des Devonkalkes streicht dagegen genau O.-W.: Der Sporn der Trias, dessen Beobachtung durch den scharfen Farbgegensatz des schneeweissen Dolomits und des dunklen Schiefers sehr erleichtert wird, bildet gewissermassen eine Interferenzerscheinung zwischen den beiden vorherrschenden tektonischen Spannungs-Richtungen.

2. Die nördliche Silurscholle.

Die nördliche Scholle besteht im wesentlichen aus Silurbildungen und besitzt einen regelmässigen Faltenbau — eine Erscheinung, die für den gesammten nördlichen Abhang der Karnischen Hauptkette bezeichnend ist und im scharfen Gegensatze zu den mannigfachen und eigenartigen Brüchen des südlichen Theiles steht. Den vorherrschenden Schiefergesteinen sind Kalke in wechselnder Mächtigkeit eingelagert und zwar sind im Osten die halbkristallinen Kalke auf die älteren Horizonte des Silur beschränkt, während dieselben weiter westlich,

besonders am Abhang des Osteruigg zum Gailthal, das vorherrschende Gestein des gesammten Silur bilden. Ganz im Osten, zwischen Riegersdorf und dem Faaker-See (also schon jenseits der Kartengrenze), erscheint am Nordrande des Gebirges eine ziemlich breite Zone von grauem, halbkrySTALLINEM, von Spathadern durchsetztem Kalk, vielfach unterbrochen von Schuttkegeln und Moränen, welche letztere der alte julische Hauptgletscher hier zurückgelassen hat. Am Neuwirth, bei Kopainig, Hirsch und am Zwanziger stehen diese hellen Kalke, an ihrer Farbe meist weithin sichtbar an; nordöstlich folgt ein Parallelzug von ähnlichen, durch Schuttkegel getrennten Felsbildungen: St. Canzian (weisser, z. Th. röthlicher Kalk; Fallen nach SO.; vergl. das Bild „Faaker See“), die Ruine Finkenstein und Grenth. Die eigenartige Form dieser Höhen bildet einen malerischen Vordergrund für die höheren Gipfel der Westkarawanken. Die letzteren bestehen von Grajsen (1959 m) an, wo der Hochwipfelbruch auf die Nordseite hinübersehwenkt, aus Triasdolomit und gipfeln in der schönen, weithin sichtbaren Pyramide des Mittagkogels (2144 m; vergleiche das gegenüberstehende Bild). Unter den Triasgesteinen sind die im Rohizagraben häufigen Geschiebe von buntem Kalkconglomerat (unt. Muschelkalk) bemerkenswerth.

Im Norden grenzen silurische Thonschiefer an den Bruch, in welche bei der Alphütte Truppe (1440 m G. St. K.) noch ein Kalkzug eingelagert ist. Trias und Silur stossen nicht unmittelbar an einander, vielmehr weisen die Geschiebe von Grödener Sandstein im Goritschacher und Rauschen-Bach darauf hin, dass diese Formation (wie weiter westlich, vergl. unten) in den Bruch eingeklemmt ist.¹⁾

Besondere Beachtung verdient das Vorkommen eines silurischen Eruptivgesteins, das allseitig von Moränen umgeben, im Goritschacher Bache bei der Höhengöte (674 m) anstehend gefunden wurde. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die durch jüngeres Alluvium ausgefüllte, dem allgemeinen Streichen folgende

¹⁾ Ich kenne, diesen, jenseits des genauer aufgenommenen Gebietes liegenden Theil der Westkarawanken nur durch einen, den Nordabhang und das Hügelland berührenden Auslug von Filzitz nach St. Canzian und Finkenstein.



Abbildung 1.

Nach einer Photographie von A. Beer ges. von O. Berner.

Der Fanker See mit dem Mittagkogel.

Der Mittagkogel ist Schlierenschiefer (Tr.). Die Berge rechts Silurschiefer (S8). Die Höhen im Mittelgrund Siluralkalk (SK). Die Höhen oberhalb des Sees Glacialchotter.

Depression zwischen den nördlichen Kalkhöhen und dem Abfalle des Gebirges einem Schieferzuge entspricht, dem das Eruptivgestein eingelagert ist. Das letztere ist an dem einzigen, bisher beobachteten Aufschluss vollkommen vermorscht. Doch kann man wahrnehmen, dass die Struktur im allgemeinen massig, hier und da auch geschiefert ist. Etwas besser scheinen die in den Moränen z. B. bei Teehanting vorkommenden Geschiebe erhalten zu sein.

Leider sind die gesammelten Stücke aus der Kiste während der Bahnbeförderung abhanden gekommen. Das Gestein ähnelte einem Diorit und bestand aus grossen, wohl ausgebildeten Krystallen von dunkelgrüner (? Hornblende) und weisser Farbe (? Feldspath).

Auch weiter östlich, etwa von Krainegg an bis Gailitz besteht der Soekel des Nordgehänges der Karawanken aus halbkrySTALLINEM Silurkalk, der bei Pökan und unterhalb des Schlosses Arnoldstein in schroffen weissen Wänden aus dem dunklen Tannenwald hervortritt. Doch schiebt sich bei Krainegg ein dem allgemeinen WNW — OSO Streichen folgender Schieferzug in die Kalke ein. Derselbe tritt auch im Gailthale bei Lind inselartig aus dem Allnvinm und Glacielsehotter hervor; man beobachtet hier einen grauen, quarzitäsen, glimmerreichen Thonschiefer.

Der Kalk von Arnoldstein führt unbestimmbare Orthoeren, die sich am bequemsten in den Quadern der Gailitzbrücke beobachten lassen. Der Kalk ist besonders in der Umgebung des Ortes ziemlich rein, splittrig und anseheinend meist schichtungslös; doch zeigen einige rotbe Schiefereinlagerungen am Wege nach Seltseach das allgemeine Streichen bei flachem nach SSW gerichteten Fallen. Weiter westlich treten meist reinere Bänderkalke auf; im östlichen Fortstreichen beobachtet man an der Wnzenstrasse regelmässig gelagerten Kalkphyllit, der meist hellgraue, seltener dunkle oder röthliche Färbung zeigt und ebenso wie westlich bei Grenth durch Übergänge mit dem hangenden Thonschiefer verbunden ist. Der letztere ist also verschieden von dem nördlicher liegenden Schieferzug und besitzt eine Breite von circa 3 km. Untergeordnet finden sich Kieselschiefer-Einlagerungen in dem, die Masse des Gebirges bildenden bläulichen Thon-

schiefer, während Grauwackenzüge grössere Bedeutung besitzen. Der Ofen (1511 m) und der Kamenberg (1658 m) bestehen aus diesen widerstandsfähigen Gesteinen, die meist eine scheinbar dichte Beschaffenheit besitzen und dann alten Eruptivgesteinen täuschend ähneln. (Dasselbe „pseudo-eruptive“ Aussehen besitzen manche Culmgrauwacken, z. B. diejenigen von S. Daniele bei Paluzza, deren klastische Natur sich erst aus der mikroskopischen Untersuchung ergab.) Local finden sich in dem Schiefer Pyritwürfelchen (zwischen Krainburg und Polaneg); auf ähnlichen Ursprung dürften braune Eisenerzbeschläge hinweisen, welche an der Schiefergrenze bei Krainburg die Klüfte eines dunklen Kalkes überziehen und Veranlassung zu einem, natürlich verunglückten Bergbauversuch gegeben haben.


Der Nordabhang der Westkarawanken und auch die Karnischen Alpen bis zum Achomitzer Bach erinnern in Bezug auf die Gesteinsbeschaffenheit und die Form der bis zum Gipfel hinauf bewaldeten Berge vollkommen an manche Gegenden des Harzes oder des rheinischen Gebirges; die Schiefer und Grauwacken des Unterdevon sind ebenso gefaltet und meist ebenso versteinungsleer wie die alpinen Silurgesteine. Sogar die Form der Flussläufe ist dieselbe; die Gailitz beschreibt bei Thörl unmittelbar nach dem Verlassen des im Dolomit liegenden, geradlinigen Cañons sofort die für das Schiefergebirge bezeichnenden Biegungen und Windungen.

Der Kalkzug von Arnoldstein lässt sich in ziemlich gleichbleibender petrographischer Beschaffenheit nach Feistritz, Vorderberg und über die Grenzen des engeren Gebietes hinaus bis Trüpelach verfolgen und zeigt somit eine für die silurischen Kalklagen ungewöhnliche Ausdauer. Auch die sanftere Schichtenstellung und das westnordwestliche bis westliche Streichen hält an; nur zwischen Stossau und Maglern lässt sich eine zweimalige stumpfwinkelige Umknickung deutlich beobachten, welche ungefähr parallel zu dem bajonettförmigen Vorsprung des Hochwipfelbruchs bei Thörl verläuft. Zwischen Maglern und Draschitz ist der aus Bänderkalk und Kalkphyllit bestehende Zug durch eine Längsfurche vom Nordabhang des Gebirges getrennt und bildet die Unterlage der, im wesent-

Zu Seite 15.

Nampolach, Gailthal
(538 m.)

Gürtschacher
(1454 m.)



Orthocerenkalk

N

ndstein, bez
ch von Ugg

lichen von Moränen bedeckten Hochflächen von Hohenthurm und Aehomitz.

Die Hauptmasse des Silur besteht weiter südlich aus Thonschiefer; doch schieben sich schon in der Gegend von Göriaeh und beim „Sommerwirth“ (oberer Aehomitzer Graben) schmale Züge von Kalkphyllit bezw. von rothem Orthocerenkalk ein, die nach W zu an Mächtigkeit zunehmen. Am Nordabhang des Osternigg und von hier über den Garnitzengraben hinans bildet der Kalk das vorherrschende Gestein. Erst bei Trüpeleah beginnt wieder die Herrschaft des Schiefers. Die Wiedergabe all der einzelnen Kalkzüge in dem eben begrenzten Gebiet könnte in vollkommen correcter Weise nur auf einer in grösserem Maassstabe angelegten Karte erfolgen; doch glaube ich behaupten zu dürfen, dass die zum kartographischen Ausdruck gebrauchte Auffassung den natürlichen Verhältnissen entspricht. In praktischer Hinsicht ist die Aufgabe, die zahlreichen saiger stehenden und in einander übergehenden Gesteinszüge innerhalb eines schlecht aufgeschlossenen Waldgebietes anzuseheiden, ebenso anstrengend wie eintönig. Die Aufnahme wird allerdings dadurch erleichtert, dass innerhalb des gleichmässig geneigten Nordabhangs die Kalkzüge zuweilen — aber nicht immer — als weisse, weithin sichtbare Wände hervortreten. Diese letzteren können vom Thal aus im allgemeinen sicherer in die Karte eingetragen werden, als dies während des Anstiegs möglich ist. Eine kurze Übersicht von einigen der acht Durchquerungen, welche ich zwischen dem Aehomitzer- und Oselitzengraben angeführt habe, gibt ein hinreichendes Bild von der petrographischen Beschaffenheit des Silur: Wenn man von Vorderberg auf dem gut unterhaltenen Alpweg zum Osternigg emporsteigt, so beobachtet man (vergl. die Karte): 1. HalbkrySTALLINEN splitt-rigen, weissen Kalk, 2. Thonschiefer, 3. Kalk (wie 1), 4. Schiefer, 5. Kalkphyllit (bei der Höheneote 1205 schwarzen Plattenkalk mit Kieselschieferlagen), 6. Schwarzen Thonschiefer (bei der unteren Vorderberger Alp), 7. Zweimaliger Wechsel von schwarzem Kalk und Thonschiefer auf der kurzen Strecke bis zur oberen Vorderberger Hütte, 8. An der letzteren Thonschiefer, 9. Von der Unterfeistritzer Alp bis zum Absturz des Devonkalkes: halbkrySTALLINEN Kramenzelkalk, roth, grau und

weiss mit Glimmerschüppchen; enthält Durchschnitte grosser unbestimmbarer Orthoceren sowie Crinoidenreste und entspricht ohne Zweifel dem Obersilur. Das Streichen ist WNW—OSO, das Einfallen unter verschiedenen, meist sehr steilen Winkeln nach SSW gerichtet oder saiger.

Beim Abstieg vom Achomitzer Berge nach dem gleichnamigen Dorfe beobachtet man von dem Grödener Sandstein ausgehend:

1. Silurischen Thonschiefer.
2. Kramenzelkalk und
3. grauen Kalk NO fallend (bald nachdem der Achomitzer Alpweg die rechte Seite des rechten Bistriza-Armes erreicht hat) ca. 250 m breit.
4. Schiefer (bis zur Vereinigung der beiden Quellbäche).
5. Grauen Kalk (die Fortsetzung des vorwiegend aus Kramenzelkalken bestehenden Zuges der unteren Feistritzer Alp.)
6. Dann folgt bis abwärts zu dem Uoka-Hügel Thon- und Kieselschiefer in überaus wechselnder Streich- und Fallrichtung, der in dem tief eingeschnittenen Bachbette gut zu beobachten ist. Der Schiefer streicht bis zur zweiten Sägemühle NNW—SSO und steht saiger, dann O—W saiger und verflacht später für eine kurze Strecke. Darauf beobachtet man WNW—OSO saiger, dann NNW—SSO mit steilem WSW Fallen, dann wieder NW—SO fast saiger. Kieselschiefer mit Granwaeken Einlagerungen, der darauf folgt, fällt steil nach NO.
7. Beim Uoka-Hügel steht NW—SO streichender, saiger gestellter Kalkphyllit an. Dann folgt
8. Noch einmal eine schmale Zone von Thonschiefer.
9. Der krystalline Bänderkalk des Arnoldstein-Vorderberger Zuges. NW (bis NNW)—SO streichend und saiger stehend.

Den Grund, warum grade hier diese mannigfachen und im übrigen Silur nicht vorkommenden Unregelmässigkeiten der Lagerung auftreten, ist nicht ganz leicht zu verstehen. Man könnte auf den Gedanken kommen, dass die Umbiegung des Gailbruches nach Süden am westlichen Abhang des Dobratsch

3

11

.

1

Zu Seite 17.



Abbildung 2.

Nach einer photogr. Aufnahme des Verf. gen. von O. Berner.

Der Poludung von Süden.

T. Trias (Schlerndolomith). D. Devon. N. K. Silurkalk. S. See Silurshiefer. Die eigentümliche Verteilung der Formationen wird durch den ungefähr O.—W. verlaufenden Hochwipfelbruch bedingt.

auch die Lagerung des alten Gebirges in störender Weise beeinflusst hätte.

Im allgemeinen ist, wie schon hervorgehoben wurde, die Lagerung des Silur am Nordabhang ungewöhnlich regelnässig, wie z. B. die Schichten am Wege zwischen Dellach (bei Egg) und der Dellacher Alp beweisen. Auf der Hochfläche von Egg bei Mellweg beobachtet man quarzitischen, regelmässig zerklüfteten Phyllit, der ausnahmsweise nach Norden (mit ca. 50°) einfällt und auch in einem schmalen Streifen auf den Nordabhang der Karnischen Alpen (bei Nampolach) übergreift. Man steigt über die Flussterrasse von Dellach in das Gailthal hinab und trifft auf dem anderen Ufer zunächst Thonschiefer mit Quarzfasern, die normal mit 30—40° nach S fällt. Darüber lagert halbkristalliner Kalkphyllit mit gleichem Streichen. Nach oben zu wird der Kalk reiner und ähnelt stellenweise triadischen Gesteinen. Dann stellt sich ein schwarz und weiss gebänderter Kalkphyllit ein, der zwischen 1200 und 1300 m von Thonschiefer mit Quarzfasern und quarzitischen Bänken überlagert wird. Der Thonschiefer setzt den flachen Rücken der Latschauer Alp zusammen und wird seinerseits in der Nähe der Dellacher Alp von gelblichem, steil SSW fallendem Kalkphyllit bedeckt. Jenseits einer mit Alluvium und Moränen erfüllten Längsfurche steigt etwas steiler der devonische Riffkalk des Poludnigg empor.

3. Der mitteldevonische Kalkzug des Osternigg und Poludnigg.

Das mitteldevonische Alter des langgestreckten, aus weissen oder blaugrauem, halbkristallinem Kalke bestehenden Zuges Osternigg—Poludnigg—Kersnitz (vergl. die Landschaftsskizze Poludnigg-Schimz S. 23) habe ich bereits 1888 durch einen glücklichen Korallenfund an der Oberfeistritzer Alp feststellen können. Einige Jahre später wurden am Poludnigg und zwar an mehreren Stellen des West- und Südostabhangs die gleichen Arten wiedergefunden:

Cyathophyllum vermiculare var. *praecursor* FRECH

Heliolites vesiculosus PENECKE

Favosites sp.

Auch am Lonsattel kommen undentliche Durchschnitte von Korallen und Crinoiden vor. Die Zusammengehörigkeit des

Kalkzuges ist somit palaontologisch sichergestellt; über die petrographische und tektonische Einheitlichkeit des Ganzen kann ohnehin ein Zweifel nicht bestehen. Jedoch wurde die frühere Anschauung über die Lagerungsverhältnisse (Discordante Auflagerung des Mitteldevon) durch vermehrte Beobachtungen richtiggestellt.

Es liess sich an verschiedenen Stellen, z. B. am Lomsattel und deutlicher noch in dem parallelen Kalkzuge des Sagram nachweisen, dass das Mitteldevon und die verschiedenen Silurgesteine in Wahrheit nebeneinander stehen, oder mit anderen Worten, dass die geologische Grenze von Kalk und Schiefer senkrecht über den Abhang streicht. (Vergleiche die Ansicht des Sagram und Abb. 8.) Mein früherer Irrtum erklärt sich daraus, dass auf dem steilen Abhang des O—W verlaufenden oberen Eggwnggrabens bei der Betrachtung en face der Kalk über dem Schiefer zu liegen scheint.

Obwohl die Grenzbestimmung zwischen dem graublauen splittrigen, meist halbkristallinen Devonkalk, dem weissen Triasdolomit und den Silurgesteinen fast nirgends irgendwelche Schwierigkeiten macht, so fehlen doch andererseits deutliche Profile, da die Vegetationsdecke bis auf die Gipfel hinauf reicht. Man ist also für die Beurteilung der Lagerung auf die allgemeinen, durch die Karte zum Ausdruck gebrachten geologischen Verhältnisse angewiesen. Der etwa dem unteren Mitteldevon (vergl. den stratigraphischen Teil) gleichzustellende Rifkalk grenzt an der Unterfeistritzter Alp an obersilurischen Orthocerenkalk, im Norden an die Kalkphyllite des Untersilur, im Süden an die Thonschiefer, Kieselschiefer und Grnwacken welche an der Görttschauer Alp, dem Kesselwald und im Eggwnggraben anstehen. Die Ansicht des Pohdnigg veranschaulicht die Verschiedenheit der nebeneinander auftretenden Formationen.

Im Eggwnggraben befinden sich die von STACUM und STUSS aufgefundenen Fundorte der Leitformen des oberen und obersten Untersilur in unmittelbarer Nähe des dislocierten mitteldevonischen Kalkzuges. Wie das auf Tafel I dargestellte Generalprofil erkennen lässt, beobachtet man im Süden des mitteldevonischen Kalkes des Gogman die folgenden, WNW streichenden und meist seniger stehenden Schichten:

Zu Seite 28.

Starhand
(Devon)

Sagran
(1912 m, Devon)

Osternigg
(2035 m, Devon)

Ober-Feistritzer Alp
(Silurschiefer)

Gopman
(1791 m)

Orthocerenkalk



NW

Uggwa-Thal

SO

Abbildung 3.

Aufgese. von Varr.

Der devonische Kalkzug des Sagran (vom Koksattel).

Die Grenze des Devonkalkes ist durch ein Eisal ausgetrieben. In der Fortsetzung liegt der Orthocerenkalk des Gopman. Der nördliche Parallelzug des Starhand und Osteruige ist durch Silurschiefer (links oben sichtbar) getrennt. (Vergl. Abb. 8, S. 24.)

1. Thonschiefer ohne Versteinerungen.
2. Ein schmales Band von Orthoocerenkalk.
3. Braunen Orthoocerschiefer (oberes Untersilur = Caradoc) mit zahlreichen Brachiopoden (*Orthis Actoniac*, *Strophomena*, *Parambonytes*) und kleinen baumförmigen Monticuliporiden; der Schiefer ist zum Teil von herabgestürzten Kalkblöcken bedeckt.
4. Schwarzen Graptolithonschiefer mit *Diplograptus folium*, *Rastrites triangulatus*, *Monograptus* und anderen Arten der oberen Grenze des Untersilur.
5. Orthoocerenkalk mit schlecht erhaltenen Orthooceren, steil SSW fallend.
6. Thonschiefer.

Der allgemeine Verlauf des Devonzuges verweist auf das Vorhandensein einer alten Einfaltung, das Angrenzen des Gesteines an verschiedenartige ältere Gebilde hingegen auf einen Bruch. Man dürfte somit der Wahrheit am nächsten kommen, wenn man den Osternigzug als durch beide Vorgänge gebildet ansieht. Durch die carbonische Gebirgsbildung wurde der Devonkalk in das ältere Silur eingefaltet, und bei den späteren tektonischen Bewegungen brach die kompakte Kalkmasse weiter in das ohnehin gelockerte weichere Nebengestein hinab. Durch Überschiebungen, die weiter westlich eine so wichtige Rolle spielen, kann die anormale Schichtfolge in dem vorliegenden Fall nicht erklärt werden, da die Grenze von Silur und Devon überall senkrecht verläuft. (Vergl. die Ansicht des Sagrau und Abb. 8, S. 24.)

Die Richtigkeit dieser Auffassung erhellt auch aus der Untersuchung der dem Osternigg im Süden vorgelagerten Kalkmasse. Hier sind auf einer dem Osterniggzuge parallelen, durch Querverwerfungen unterbrochenen Längsstörung Triasdolomit, weiter östlich Obersilur, Devon und noch einmal Obersilur (am Goçman mit Orthoocerdurchschnitten) in die aus älteren Silurschiefern bestehende Unterlage eingebrochen. Der Dolomit des Gaisrücken hängt mit der Masse des südlichen Trias zusammen, und der rothe obersilurische Orthoocerenkalk des Schönwipfels ist durch einen Querbruch von jener getrennt. Der versteinungsleere, halbkristalline Riffkalk des Sagrau, welcher eventuell dem Unterdevon entsprechen könnte, ist

hingegen von den, die östliche und westliche Fortsetzung bildenden Obersilurzügen durch Brücken untersilurischen Schiefers geschieden. Den soeben geschilderten, höchst eigentümlichen Bau habe ich durch zahlreiche Ausflüge kennen gelernt und hebe noch besonders hervor, dass die Beschaffenheit der Gesteine eine absolut bezeichnende ist: die Schiefer, Dolomite und die verschiedenen Kalke sind aneh trotz der Rasendecke ziemlich gut von einander zu trennen. Das Ober- und Untersilur ist an den kritischen Punkten (Goçman und Yggwagraben) reich an bezeichnenden Versteinerungen. (Vergl. den stratigraphischen Teil.) Befände man sich in einem einfachen Schollengebirge, so könnte dieser eigentümliche Kalkzug als



Abbildung 4.

Schematisches Längsprofil des von Schiefer unterbrochenen Kalkzuges Schönwipfel - Sagra - Goçman.

ein, durch mannigfache Quersprünge und horstartige Querbrücken „zerhackter“ Grabenbruch bezeichnet werden. Jedoch liegen in einem gefalteten Gebiete mit saiger gestellten oder steil N fallenden Schichten die Verhältnisse noch etwas verwickelter. Man wird davon ausgehen müssen, dass die Kalkmassen des Obersilur und Devon parallel zu der Längsrichtung des alten Gebirges in den biegsameren Silurschiefer eingefaltet wurden und dass das Devon der Mitte — vielleicht schon in Folge älterer Querbrüche — tiefer einbrach als die Flügel. Später, während der tertiären Gebirgsbildung, sank der ganze Zug noch weiter ein (vergl. das nebenstehende, schematische gehaltene Diagramm), und insbesondere brach eine Triasscholle in der Fortsetzung der alten Störungsrichtung nach. (Vergl. Abb. 6.)

4. Der Kok.

Äußerst verwickelt sind die geologischen Verhältnisse am Kokberg, wo ansserdem der Umstand störend wirkt, dass der untere Teil des Ostabhanges infolge des fluppigen Wiesenwuchses nur spärliche Aufschlüsse zeigt. Der Gebirgsbau des Kok ist bereits durch die Nähe des Hauptbruches, der im Süden um den Berg herumzieht, wesentlich beeinflusst.

Beim Aufstieg vom Eggwagraben zum Kok beobachtet man zunächst am rechten Ufer des Patameranbaches¹⁾ wo der Weg zum letzten Male den Bach überschreitet, eine helle quar-




Abbildung 5.

Querprofil durch Kok und Schönwipfel.

(Mit Benutzung einer Skizze von E. Suess.)

zitische, wohlgeschichtete Granwacke (Untersilur), die unter ca. 45° nach SSW einfällt. Dieser untersilurische, aus Thonschiefer, Kiesel-schiefer und Granwacke bestehende Zug streicht über den Sattel zwischen Kok und Schönwipfel (Streichen NW—SO, Stellung saiger) durch den Tschurtsehele Graben bis hinab zur Tschurtsehele Alp, trennt also die obersilurischen Orthocerrenkalke des Schönwipfel von den gleichartigen Schichten des Kok. Die letzteren sind nicht als das normale Hangende des Untersilur aufzufassen, da sie WSW—ONO streichen und unter

¹⁾ Der Name gehört offenbar zu den zahlreichen corrupten Worten der G. St. K.

flachem Winkel (am Gipfel 30—40°, abwärts noch weniger) nach SSW einfallen. Es ist wahrscheinlicher, dass auch die Kalke des Kok in ihre Schieferunterlage eingesunken sind, und dass der jetzt vorhandene Höhenunterschied lediglich auf die stärkere Abtragung der Schiefer zurückzuführen ist. (Vergl. das Profil.) Unklar bleibt hierbei der Zusammenhang der Kalke des Kok mit den östlich im Eggwathal vorkommenden gleichartigen Gesteinen; die Grenzlinien mussten hier in Folge des Fehlens von Aufschlüssen konstruiert werden.

Die erheblichere Breite der Orthocerenkalke des Kok erklärt sich aus der flachen Lagerung. Derselbe Umstand ermöglicht auch die Unterscheidung zweier Horizonte, von denen der untere, wie im stratigraphischen Teile auseinandergesetzt werden wird, der Zone des *Orthoceras potens* entspricht, so dass der obere, versteinungsärmere mit der höheren Zone des *Orthoceras alticola* zu vergleichen wäre. Der tieferen Zone gehört das an zwei Punkten ausgebeutete Roteisenstein-Vorkommen an. Der verlassene Stolln. (2000 m), unterhalb dessen eine kleine, in Verfall begriffene Knappenhütte (1920 m) steht, liegt nördlich des Kokgipfels und stammt aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts; die von diesem Betriebe herrührenden Kalkstein-Halden bildeten den jetzt ziemlich erschöpften Fundort der reichen, mit dem böhmischem Obersilur (E_2) in allen wesentlichen Punkten übereinstimmenden Fauna. Ausführlichere Angaben und Versteinungslisten finden sich im stratigraphischen Teile sowie in einer neueren Mitteilung STACHES. Vom Schönwipfel aus erkennt man deutlich, dass das eigentliche, an sich versteinungsleere, aus Roteisenstein und Brauneisen bestehende Erzlager zwischen eine höhere und tiefere, eisengraue Kalkbank eingeschaltet ist. Weiter oben am Gipfel stehen dann typische rote, ziemlich leicht verwitternde Kramenzelkalke an (= Zone des *Orthoceras alticola*), welche jedoch nur spärlich Orthoceren enthalten.

Der andere Stolln, welcher im Sommer 1890 wieder in Betrieb gesetzt worden war, liegt auf der Westseite des Kok weiter abwärts im Tschurtschelegaben an der Bergrippe, welche das eben genannte von dem südlich folgenden Seitenthälchen trennt (ungefähr bei dem oberen SK auf der Ansicht des Poludnigg p. 23). Der Stolln setzt in grauen (hie und da roth gefärbten)




Abbildung 6

Ges. von E. Suess.

Aussicht von der Krone nach O.

Übersicht der mannigfachen, im Osten der Karnischen Alpen auftretenden Formationen. Die Grenzen werden fast durchweg von Brüchen abgeleitet. Nördlich der devonischen Kalksteine (D) Poludnijski-Schiefer (D) am Schwarzwälder und Koh-Osternijski (D), darunter silurische Schiefer (S) im Vordergrund etwas Obercarbon (C). Die weiteste Ausdehnung besitzt der Schirnerlimestone (Tr).

Kalken auf, welche NNW—SSO streichen und WSW unter 40—52° einfallen. Aus dem Vergleich mit dem am Gipfel beobachteten südwestlichen Einfallen ergibt sich, dass die Lagerung in der Nähe des grossen Hochwipfel-Bruches bedeutende Unregelmässigkeiten zeigt. Die grauen Kalke, welche vornehmlich das Liegende des Eisensteines bilden, sind fossilleer, im Hangenden folgen zunächst rote Schiefer und dann rote Kränzelkalke mit Orthoereren.

Nach den Angaben von F. SEELAND (Verhandl. d. geolog. Reichsanstalt 1878 p. 36) wurde bei einem älteren Bergwerksbetrieb ein Lager entblöst, das im Liegenden aus 0,9—1,3 m mächtigen Roteisenstein, im Hangenden aus 0,9 m mächtigen Braunstein besteht. Die l. c. mitgeteilten Analysen ergaben für den Roteisenstein 50,67 Proc. Eisen, 0,66 Proc. Mangan, 0,97 Proc. Phosphor; 4 Proben des Braunsteins enthielten 51,78 Proc., 59,1 Proc., 71,4 Proc., 81,7 Proc. Mangansuperoxyd.

5. Die Einklemmungen älterer Schichten zwischen dem Silur und der abgesunkenen Triasscholle.

Der verschiedenen Unregelmässigkeiten, welche der Verlauf des Hochwipfelbruches zeigt, wurde schon gedacht. Weitere Eigentümlichkeiten ergeben sich daraus, dass zwischen dem alten Gehirge und der abgesunkenen Scholle des Selherndolomits einzelne Fetzen von den, die letzteren unterteufenden Formationen eingeklemmt sind. (Vergl. Abbildung 7 u. 8 S. 24.) Weite Verbreitung besitzt vor allem der Grödener Sandstein, dessen Auftreten in den Westkarawanken schon oben erwähnt wurde. Bis zur Görtshacher Alp verläuft der Hauptbruch zwischen Silur und dem Selherndolomit (bezw. lokal Muschelkalk). Ein wenig westlich von den Hütten stellt sich jedoch wieder Grödener Sandstein und Mergel in typischer Entwicklung ein, der von hier aus in geringer, durch „Auswäzung“ in den Bruchblippen stark reduzierter Mächtigkeit bis zum Südrand des Kok (oberer Tschurtschelegraben) hindurehstreicht. Die Wiederkehr der meist stark gestörten Sandsteinschichten konnte am Achomitzer Berg (hier mit vereinzelten Conglomeratbänken), im Ugwagraben und an verschiedenen Stellen des Kokgehanges mit aller Sicherheit festgestellt werden.

Die Zone der Grödenner Schichten verbreitert sich am Achomitzer Berg durch das Hinzutreten der grauen wohlgeschichteten Kalke und Rauchwacken des Bellerophonhorizonts, denen im Süden die rothen, versteinungsreichen Glimmersandsteine, Gastropodenoolithe und rothen Kalke der Werfener Schichten, sowie endlich am Mulei das bunte Muschelkalk-Conglomerat folgt. Ich habe mich an der betreffenden Stelle nicht mit Suchen aufhalten können und nur einige Myaciteusteinkerne mitgebracht. Eine von Herrn Professor TOULA gesammelte und mir gütigst zur Verfügung gestellte Suite enthält, wie die




Abbildung 7

Die Einklemmung von Fetzen permotriadischer Gesteine am Achomitzer Berg.

genauere Bestimmung lehrte, die sämtlichen bezeichnenden Formen der Werfener Schichten so *Tivolites cassianus*, *Natiria costata*, *Myophoria costata* und *Pecten venetianus*. (Die ausführliche Liste folgt im stratigraphischen Teile.) Das Vorkommen der Werfener Schichten ist auch früheren Beobachtern nicht entgangen, das Auftreten einer fast vollständigen permotriadischen Serie war jedoch bisher noch unbekannt. (Vergl. das Profil).

Die lokale Erhaltung all dieser Formationen erklärt sich, wie ein Blick auf die Karte zeigt, durch den Umstand, dass die jüngere Scholle mit einem stumpfen Winkel in das ältere

Zu Seite 24.



Aufgen. unterhalb des Kokgipfels von E. Suess.

a) Sandstein. b) Bellerophonkalk. w) Werfener Schichten.

dem im Vordergrund stehenden Bergknappenhäuschen liegt der
hängt mit dem Kalkauge des Sagrau zusammen. An letzterem
in S sind die Julischen Alpen (Trias).

Gebiet vorspringt. Gleichzeitig ergibt sich aus dieser Anordnung, dass die älteren Triasbildungen nur geringe Ausdehnung besitzen können. Die starren, wenig biegsamen Conglomerate des Muschelkalkes treten nur auf einer ganz kurzen Strecke an die Oberfläche, die Werfener Schichten reichen vielleicht bis zu den Bartolo-Wiesen hinunter; doch ist eine sichere Feststellung des Thatbestandes durch den dichten Pflanzenwuchs unmöglich gemacht. Die Bellerophon-schichten streichen in einem schmalen Streifen, (der in etwas übertriebener Breite gezeichnet werden musste), bis in den Uggwagraben hinab. Die plastischen und an und für sich mächtigen Grödenener Sandsteine besitzen die weiteste Verbreitung.

Ähnlich ist das Auftreten von eingeklemmten Muschelkalken und Werfener Schichten an der Möderndorfer Alp, deren tektonische Eigentümlichkeiten im nächsten Abschnitte geschildert werden sollen.

Eine in mancher Beziehung mit der obigen vergleichbare Erscheinung zeigen die Einklemmungen, welche den Verlauf des Hauptbruchs in dem ausspringenden Winkel südlich von Thörl auszeichnen. Man beobachtet an der Chaussee unmittelbar südwestlich von dem silurischen Thonschiefer einen NW—SO streichenden, fast saiger stehenden Zug von bläulichem, weissgeaderten Plattenkalk, der wohl sicher als Muschelkalk anzusehen ist. Derselbe ist stark zerrittet und springt in unregelmässigen Winkeln in den Schiefer vor. SW von dem Muschelkalk folgt noch eine schmale Zone silurischer Thonschiefer und dann Triasdolomit, der stark gestört und von zahlreichen Spathadern durehsetzt ist. In denselben finden sich weiter noch zwei schmale Fetzen von Silurschiefer, die offenbar intrusiv in Spalten des absinkenden Dolomits eingequetscht worden sind.

Es dürfte bekannt sein, dass Brüche kaum jemals nach der beliebigen Schuldarstellung mit dem Messer geschnitten sind. Doch kann man selten in so deutlicher und bequemer Weise wie hier die mannigfachen, einen bedeutenden Bruch begleitenden Verquetschungen und Verschiebungen beobachten.

Eine anders geartete Unregelmässigkeit im Verlauf des Hochwipfelbruchs findet sich innerhalb des unteren Uggwagebietes, das überhaupt ein wahres Cabinetstück tektonischer Merkwürdigkeiten ist. Es wurde schon oben bemerkt, dass

der Verlauf des Bruches zwischen der ostwestlichen und WNW—OSO Richtung schwankt und zwar derart, dass es zur Bildung unregelmässiger ein- und ausspringender Winkel kommt. Ein Blick auf die Karte zeigt die grosse Ausdehnung der bunten Muschelkalkeconglomerate im unteren Eggwathal, welche mit der „permischen Eggowitzer Breccie“ STACHES ident sind. Ueber die Deutung dieses Gebildes wird im stratigraphischen Theile das Nöthige bemerkt werden.

In tektonischer Hinsicht ist vor allem der Umstand wichtig, dass die Muschelkalkeconglomerate allseitig von Verwerfungen eingefasst werden, welche, abgesehen von einer lokalen Ablenkung im Eggwagraben, WNW—OSO oder O—W streichen. Im Norden wird die Scholle des meist flach gelagerten Conglo-




Abbildung 9.

Die Bruchgrenze von Trias und Silur bei Thörl.

1 ist Triasdolomit, 2 Silurschiefer, 3 ein in die Silurschiefer eingemetzter Fetzen von Muschelkalk.

merates von einem langgestreckten Bande zerknitterten und zerquetschten Muschelkalkes begrenzt. (Vergl. Taf. 1). Derselbe ist theils als thoniger Mergel, theils als dunkeler Plattenkalk mit Kalkspathadern und Hornsteinen (Gartensteiner Kalk) entwickelt und enthält nördlich vom Dürren Wipfel Crinoidenstiele und *Spiriferina Peacocki* BERTNER. Der deutlichste Anschluss des zerknitterten Gesteins neben dem flach gelagerten Dolomit findet sich nördlich von der Holzklause im Eggwabach (vergl. das Profil Osternigg-Eggowitz); doch konnte ich die sehr bezeichnenden Gesteine vom oberen Tschurtschelegraben bis zum Fella-Bach verfolgen.

Das Vorhandensein eines Bruches ist ferner in dem Durchschnitte des Eggwagrabens halbwegs zwischen dem letzten

Marterl und dem Dorfe Uggowitz deutlich zu beobachten. Das lokal etwas ausgebleichte Kalkeonglomerat wird von dem weissen Dolomit durch eine wohl unterscheidbare, 1,90—2 m breite Masse von zerquetschtem und wieder verfestigtem Gangkalk getrennt. Die gleichartige Farbe der beiden Gesteine macht die Unterscheidung schwierig; doch lässt eine genauere Untersuchung keinen Zweifel über das Vorhandensein der Störung. STACHE hat diese Stelle als normale Überlagerung gedeutet und auf Grund des Vorkommens abgerollter Fusulinen in dem Conglomerat dasselbe für permisch erklärt; das gleiche Alter ergab sich für die Dolomite durch die unrichtige Deutung der disloirten Carbonfetzen. (Vergl. unten.) Eine Verwerfung konnte auch am Stabet, wo Conglomerat und Dolomit neben einander lagern, nachgewiesen werden. Das hier beobachtete Vorkommen einer Lause von Raibler Quarzporphyr, dessen Alter bekanntlich etwa dem oberen Muschelkalk entspricht, hat ebenfalls nichts Befremdliches.

Man gewinnt somit den Eindruck, dass ein aus Muschelkalkgesteinen bestehender „Horst“ rings von untergeordneteren Sprüngen eingefasst sei, welche von dem Hauptbruche gewissermassen abgesplittert sind.

6. Die Aufpressungen älterer Gesteine im Schlierndolomit von Malborget.


Die ausgedehnte und meist in regelmässiger Lagerung befindliche Conglomeratscholle des unteren Uggwagrabens ist tektonisch von den isolirten Vorkommen älterer Gesteine verschieden, welche den Schlierndolomit der Gegend nördlich von Tarvis und Malborget durchsetzen. Bevor eine Deutung dieser eigentümlichen Vorkommen versucht wird, mögen die geologischen Beobachtungen kurz dargelegt werden.

Die deutlichsten Anfschlüsse finden sich in der Gegend von Malborget und zwar ist in erster Linie das Muschelkalkvorkommen des Guggberges zu nennen. Schon von der gegenüberliegenden Thalseite aus (der beste Standpunkt ist der Schwefelgraben bei Lassnitz) bemerkt man in einem umfangreichen Anfschluss unterhalb des Guggberges (1482 m) graubraune, dünne, stark gefaltete Schichten, die jederseits von dem massigen schneeweissen Dolomit umgeben werden. Der ganze

Anschluss ist von dunklem Tannen- und Föhrenwald eingeraht und auch für den landschaftlichen Charakter der niedrigeren Dolomitherge bezeichnend. (Lichtb. Taf. I u. Abb. 10.)

Einen genaueren Einblick in das merkwürdige Gefüge dieses Berges gewährt der kleine Alpelspitz (Δ 1304 m), ein weit in das Thal vorspringender Aussichtspunkt, den man auf dem „Alpelweg“ von St. Kathrein aus in etwa einer Stunde erreicht. Der Weg führt ausschliesslich über den zerklüfteten bröckligen, hier und da Gyroporellen führenden Dolomit, der meist massig erscheint und nur ausnahmsweise, so an der Kathreiner Sägemühle, deutliche Schichtung erkennen lässt. (Einfallen mit 50° nach SW). Der Dolomit baut in dem Aufschlusse die Wände zur Rechten und Linken auf und setzt in unregelmässig verlaufenden Brüchen an den Muschelkalkschichten ab. Besonders bemerkenswerth ist ein, in die dünnen thonigen Platten vorspringender Dolomitzaeken im westlichen Theile der Wand. Der Muschelkalk besteht aus dunklen Plattenkalcken, die bald mehr mergelig, bald kalkreicher sind, und die bezeichnenden weissen Spathadern und dunklen Hornsteine enthalten. Versteinerungen wurden zwar nicht gefunden, doch kann bei der vollkommenen petrographischen Übereinstimmung mit den, im Profile des Bombaschgrabens zwischen Werfener Schichten und Dolomit liegenden Gesteinen ein Zweifel über die Altersdeutung nicht bestehen. Die Muschelkalkschichten sind, wie das Lichtbild erkennen lässt, in der mannigfachsten Weise zerquetscht und verbogen und nehmen den breiten bewaldeten Rücken des Guggberges ein. Das Auskeilen nach unten zu dürfte nur scheinbar sein; es handelt sich wahrscheinlich, — wenn man die auf den Beobachter zufallende Neigung des Gehänges berücksichtigt, — um ein Auskeilen im horizontalen Sinne.

Das beschriebene Vorkommen könnte immerhin noch als dislocirte und zerquetschte Einlagerung im Dolomit erklärt und etwa mit den Verhältnissen des Torer Grabens und der Raibler Scharte verglichen werden; man müsste hierbei jedoch die ziemlich unwahrscheinliche Voraussetzung machen, dass die Cassianer Mergel zufällig vollkommen versteinungsleer seien und die petrographische Beschaffenheit des Muschelkalkes angenommen hätten. Jedoch erscheint diese, an sich etwas



1907: post

Der Guggberg bei Malborget.

Die zerklüfteten a. Gesteinsten Schichten des dunklen Matzeilales (Mier) sind indersicht von weissen massigen Schierdelomit umgeben

Thomassen u. Drus. E. S. (Fark. B. in Berlin)



Abbildung 10.

Der Guggberg bei Malbörger.

Schematische Zeichnung zur Erläuterung von Taf. I.

(Der Standpunkt des Beobachters ist etwas verschieden). M, Muschelkalk. S, Schieferdolomit.

gezwungene Deutung angesichts des Vorkommens von Werfener, Grödener und oberearbonischen Gesteinssetzen inmitten des Dolomites gänzlich unhaltbar.

Verschiedene Carbonvorkommen von geringer Ausdehnung finden sich in der Gegend von Malborget innerhalb des Dolomitgebietes, und man kann sich wohl vorstellen, dass ein Fusulinenkalk in solcher Umgebung als Beweis für das permische Alter des Schlerndolomits angesehen wurde. Zudem sind an den palaeontologisch unzweifelhaften Vorkommen oberhalb des Malborgeter Sperrforts die geologischen Aufschlüsse nicht sonderlich deutlich. Auf dem westlich von den Festungswerken in einem kleinen Graben emporführenden Fußweg findet man über dem anstehenden Triasdolomit typische Carbongesteine als lose Gerölle: glimmerhaltigen Grauwackenschiefer von grauer oder bräunlicher Farbe, sowie schwarzen, kalkigen, stark zerquetschten Thonschiefer mit deutlichen Durchschnitten von Fusulinen. Unmittelbar vor der Stelle des alten Blockhauses „Tschalavai“ (cia la via), z. Th. noch innerhalb des unzugänglichen Festungsbereiches finden sich diese Schichten anstehend. Hier erscheinen auch die bezeichnenden weissen Quarzeonglomerate des Oberearbon sowie lose Blöcke des bunten Muschelkalkkonglomerates. Das letztere steht deutlich und an seiner Farbe weithin sichtbar auf der Ostseite des Forts an einem Punkte an, der ebenfalls nicht betreten werden darf.

Diese dislocierten Vorkommen liegen in der streichenden Fortsetzung der Muschelkalk- und Carbongesteine des Malborgeter Grabens, an deren Deutung als Aufquetschungen infolge der Klarheit der Aufschlüsse nicht zu zweifeln ist.

Bei der Wichtigkeit der Beobachtungen erscheint eine eingehendere Schilderung nothwendig. Die Mündung des von jäh abstürzenden Wänden begrenzten Grabens liegt im Dolomit, der das vorherrschende, nur von einzelnen Aufquetschungen durchbrochene Gestein bildet. An dem Krenz (G. St. K.), welches den Vereinigungspunkt zweier von oben und unten kommender Wege bildet, beobachtet man das erste Vorkommen grauer mergeliger, hornsteinführender Plattenkalke (Str. WXW—OSO, saiger). Dann wieder Dolomit; im Rostagraben erscheinen graue Muschelkalkkonglomerate von geringerer Mächtigkeit und noch

einmal die obigen stark zerquetschten Plattenkalke, welche verkieselte Crinoidenstiele und *Spiriferina Penckei* BRUG. führen. Die petrographische Beschaffenheit der, in gleicher Ausbildung im Normalprofil des Bombaschgrabens wiederkehrenden Schichten hebt jeden Zweifel über die Altersdeutung auf. (Leider giebt die einzige sicher bestimmbare Versteinernng keinen Aufschluss über das Alter der Schichten; *Spiriferina Penckei* ist bisher nur in Dislocationsschollen gefunden worden und besitzt kaum irgend welche Ähnlichkeit mit anderen Muschelkalkformen, was jedoch angesichts der Ähnlichkeit der Brachiopodenfauna ohne Bedeutung ist. Die einzigen entfernter verwandten Formen sind einige Cassianer Spiriferen, welche ebenfalls im Äussern an *Retzia* erinnern.).

Nach einer längeren, durch ungeschichteten Dolomit eingenommenen Strecke beobachtet man im Wuzergraben (unterhalb des Stabet):

1. Oberearbonischen, glimmerreichen Granwackenschiefer, Schieferthon mit *Spirophyton Suessi* STR. und schwarzen Kalk mit Crinoiden, der in suigerer Stellung NW—SO streicht oder unregelmässig verquetscht ist. Hinter der ersten etwas mächtigeren Scholle sind noch zwei kleinere je 1—1,5 m breite Aufschlüsse von Carbon sichtbar; jedoch bleibt es unsicher, ob dieselben durch Dolomit von einander getrennt sind. An dem nördlichen dieser Vorkommen, das aus thonigem Sandstein mit Kohlenresten besteht, kann man die Verknüftung mit dem Triasdolomit besonders deutlich beobachten; der letztere ist unmittelbar am Contact zu einem grauen, vollkommen krystallinen Gestein umgewandelt, das Pyritwürfeln und auf einer kleinen Spalte Rhomboëder von Dolomitspath enthält.

2. Auf die drei Carbonvorkommen, (welche in der kartographischen Darstellung zusammengefasst wurden), folgt ein verhältnissmässig breiter Zng von den rothen Conglomeraten des Muschelkalks.

3. Nördlich von diesem steht noch einmal am Wege Kohlensandstein und carbonischer Granwackenschiefer an, ist jedoch ziemlich schlecht angeschlossen.

4. Dann folgt eine nicht sonderlich breite Zone von Triasdolomit, der vollkommen zertrümmert und von zahlreichen glänzenden Hornsteinen durchsetzt ist.




Abbildung 11. Nach einer fotogr. Aufnahme des Verf. gez. von O. Berner.

**Aufquetschung von Muschelkalk im Schlerndolomit des
Malborgoter Grabens.**

Die dunkel gehaltenen thonigen Schichten des Muschelkalkes (im südlichen und mittleren Theile des Bildes) sind steil aufgerichtet und allseitig von dem wenig gestörten, ungeschichteten, schneeweißen Dolomit umgeben.

5. Die letzte Aufquetschung besteht aus verschiedenartigen Gesteinen; man beobachtet rothes Triaseonglomerat, sowie vollkommen zerrütteten Carbonschiefer mit ebensolchem rüthlichen Kalk, der wahrscheinlich als rüthlicher Finsulienkalk zu deuten ist. Fetzen von rothem Sandstein dürften auf den rothen Sandstein des unteren Muschelkalkes zu beziehen sein. Das Vorhandensein energischer Dislocationen wird endlich noch durch die massenhaft auftretenden Gangquarze bzw. die Kalkspathaderu des Kalkes erwiesen. Auch das Vorhandensein von Quellen ist für die verschiedenen Aufquetschungen bezeichnend.

6. Der Dolomit, welcher nördlich an diese letzte und am meisten verworrene Aufquetschung angrenzt, ist vollkommen krystallin, nimmt jedoch weiterhin wieder seine normale Beschaffenheit an. Am Lerhriegel (dort, wo der Fussweg aufwärts führt) findet sich noch ein kleines, auf der Karte nicht angegebenes Vorkommen von grauem, vollständig mit Spathaderu erfülltem Kalk.

Das Streichen des Dolomit ist, wo derselbe Schichtung zeigt, parallel zu den Aufpressungen WNW—OSO.

Die Aufquetschungen sind nicht auf das linke Bachufer beschränkt. Von dem Punkte aus, wo das Muschelkalkconglo-merat ansteht, beobachtet man unten im Graben eine theils saiger stehende, theis in der wunderlichsten Weise zerquetschte Masse von wohlgeschichtetem grauem Muschelkalk, rings von schneeweissem Dolomit umgehen. Der Muschelkalk wird zwar, wie die beistehende Skizze zeigt, zunächst von einer Schutthalde bedeckt, keilt aber, da keine Fortsetzung an der gut aufgeschlossenen Wand sichtbar ist, in der That nach oben zu aus. An keiner Stelle ist der intrusive Charakter der den Dolomit durchsetzenden fremdartigen Massen so deutlich zu beobachten wie hier. (Vergl. Abb. 11.) Zwei weitere Vorkommen von Muschelkalk liegen nördlich und südlich vom Trügelkopf auf dem Guggtrleken; das südlichere derselben befindet sich in unmittelbarer Nähe des vom Alpelspitz aus aufgenommenen Aufschlusses (vergl. oben).

Zwischen Malborget und der horstartig in das Dolomit-gebiet vorspringenden Muschelkalkscholle des Uggwagrabens tritt östlich vom Stabet ein Zug von Porphyrgesteinen auf,

der rings von Dolomit umgeben ist. Man beobachtet zwischen dem Stabè (1630) und der östlich bei der Höheneote 1415 in gelegenen Masessnikhütte die folgenden Gesteine:

1. Quarzporphyr. meist durch Chloritlagen grünlich gefärbt, zuweilen mit der ursprünglichen rothen Farbe.
2. In Wechsellagerung mit demselben rothen, zum Theil grünlich gefärbten, glimmerhaltigen, brüchlichen Sandstein.
3. Grünlichen Porphyrtuff (Pietra verde) in massigen Bänken (1—3 wurden auf der Karte unter der rothen Eruptivfarbe zusammengefasst).
4. Dunkle Platten des unteren Muschelkalkes in typischer Entwicklung.
5. Dann folgt weisser Dolomit.

In den gegenüberliegenden Julischen Alpen sind der Quarzporphyr und die grünen „doleritischen Tuffe“ von Kaltwasser als Lagergestein in die Triasserie eingeschaltet und vertreten den oberen Muschelkalk; der untere Muschelkalk zeigt hier wie dort die gleiche Entwicklung; somit kann es keinem Zweifel unterliegen, dass das anormale Vorkommen von Porphyren am Stabè als Aufquetschung zu deuten ist. Es liegt dann hier der eigentümliche Fall vor, dass ein deckenartiges, zu dem normalen Schichtenverhalte gehörendes Eruptivgestein nachträglich durch tektonische Bewegungen intrusiv in jüngere auflagernde Gesteine hineingepresst worden ist.

Gewissermassen die Verbindung mit den Aufquetschungsschollen der Gegend von Tarvis vermitteln die Muschelkalkvorkommen, welche auf der Kalischnikwiese südlich des Mulci und auf dem Kamm zwischen Kapin und Schwarzem Berg zu beobachten sind. An dem ersteren Punkte, wo wie überall, das Vorhandensein von Quellen auf einen Gesteinswechsel hinweist, steht schwärzlicher Plattenkalk mit Kalkspathadern sowie dunklem Mergel mit *Posidonia wengensis* WISSM. an. Die Möglichkeit ist nicht anzuschliessen, dass hier eine, durch die genannte Wengener Muschel gekennzeichnete Einlagerung von Wengener Mergeln im Dolomit anzunehmen wäre. Jedoch sind die Aufschlüsse zu mangelhaft, um eine sichere Entscheidung zu gestatten. Das ausgedehntere Vorkommen am

Kapin, das ich verschiedentlich gekreuzt habe, besteht nur aus Plattenkalk, der zahlreiche Hornsteinknollen enthält und WNW—OSO streicht.

An der Eisenbahnstation Tarvis und nördlich derselben durchsetzen verschiedene schmale, WNW—OSO streichende Aufquerschnitte älterer Gesteine den weissen Triasdolomit. Gegenüber dem Bahnhof selbst findet sich ein, auch von DIENER¹⁾ erwähntes Vorkommen der Werfener Schichten. Man beobachtet gelbliche oder graue, kalkige, wohlgeschichtete Mergel, die Glimmerblättchen auf den Schichtflächen zeigen und eine Bank von dichterem grauen Kalk einschliessen. Die Schichtstellung ist saiger oder steil nach S geneigt. Entsprechend dem WNW—OSO gerichteten Streichen trifft man diesen schmalen Zug von Werfener Schichten auf dem gegenüberliegenden Fella-Ufer nordöstlich vom alten Bahnhof Tarvis an der Chaussee noch einmal anstehend. Der Aufschluss liegt genau an der Stelle wo Eisenbahn und Chaussee eine scharfe Biegung nach SO machen. Unter den alten Moränen des Weissenbachgletschers beobachtet man hier zunächst die gelblichen, grauen oder rothen Werfener Kalkmergel, die weiterhin in dunkelgraue, weissgedaderte Kalke übergehen. Dann folgen verschiedene, deutlich ausgeprägte Brüche, Verquetschungen und Verschiebungen, welche die Grenze gegen den weissen Triasdolomit bilden. Derselbe nimmt den südlichen Theil der Chausseeböschung und fast die ganze Länge des Bahneinschnittes ein. Übrigens ist die Dislocationsgrenze wegen der schärfer ausgeprägten Farbenverschiedenheit der Gesteine am neuen Bahnhofs Tarvis leichter zu beobachten, als hier.

Folgt man vom neuen Bahnhofs der Strasse in nordöstlicher Richtung, so erscheint zunächst Gehäuseschutt, weiter oberhalb steht an beiden Thalseiten Dolomit an. Das erste an der Chaussee aufgeschlossene Gestein ist tiefrother, brüchiger Mergel mit Lagen von weissem Mergelkalk, der infolge der weit ausholenden Biegungen der Strasse zweimal erscheint (zuerst an einem einspringenden, dann an einem ausspringenden

¹⁾ Derselbe folgte der Deutung STACHES, welcher den Schlerndolomit für paläozoisch hielt und sah demgemäss auch die Werfener Schiefer als eine unregelmässig abgesunkene Scholle an.

Winkel), Streichen WNW—OSO, Fallen flach SSW (vergleiche Tafel I).

Unmittelbar an die bunten Mergel grenzen die ausserordentlich verworfenen und gestörten rothen Kalkconglomerate des Muschelkalkes, welche ebenfalls SSW einfallen und an zwei Stellen von der Strasse geschnitten werden. Der beste Aufschluss findet sich am Mundloch des Gogganer Tunnels. In der WNW-Richtung keilen die Conglomerate bald aus, denn bei einer Excursion durch das Thal des Wagenbaches konnte keine Spur von ihnen mehr entdeckt werden.

Die bunten Mergel wurden in Anbetracht der vollkommenen petrographischen Uebereinstimmung mit dem Grödenen Sandstein auf diesen bezogen, obwohl die Möglichkeit nicht bestritten werden kann, dass unterer Muschelkalk vorliegt. (Auch in der letztgenannten Abtheilung kommen in den angrenzenden Julischen und Venetianer Alpen rothe Sandsteine und Mergel vor. Doch ist angesichts der grossen Mannigfaltigkeit der bereits beschriebenen eingequetschten Gesteine die Entscheidung über diese Frage von untergeordneter Bedeutung.) Die Nordgrenze des bunten Conglomerates ist an der Strasse vorzüglich aufgeschlossen; die Westecke eines hier liegenden Steinbruches besteht noch aus dem Conglomerat, der ganze östliche Theil aus Dolomit.

Ein zweiter schmalerer Zug desselben Conglomerates streicht an der Mündung des Wagenbaches bei dem Orte Goggan durch und ist auf seiner Südgrenze an einer Felswand entblüsst. Auch an die Nordseite dieser Conglomerataufquetschung legt sich ein schmaler Streifen rother Mergel, der jedoch nur in der Tiefe der Felschlucht sichtbar ist.

Die ost-südöstliche Fortsetzung der eben beschriebenen Aufquetschungen ist für eine längere Strecke durch die Moränen des Weissenbachgletschers verdeckt, tritt jedoch in der Nähe des Schlosses Weissenfels wieder an die Oberfläche. Südlich des Schlossberges beobachtet man eine schmale Zone bunter Conglomerate, nördlich desselben einen Zug von grauem mergeligem Plattenkalk, welche beide dem unteren Muschelkalk angehören dürften und rings von dem Dolomit umgeben werden. Die Spalten, auf denen die Unterlage des Dolomits emporgepresst worden ist, setzen sich auf 4—5 km Entfernung fort und zeigen nur einen Wechsel in der Beschaffenheit der

emporgequetschten Sedimente. Es ist an sich nicht auffallend, dass diese schmalen Mergelzonen ziemlich rasch anskeilen.

In geringer Entfernung von dem, die Trias abschneidenden Bruch scheint im Canalgraben noch ein Zug von hartem Mergel oder Conglomerat die Dolomite zu durchsetzen; wenigstens deutet ein, allerdings nicht näher untersuchter grollrother Streifen am Gehänge des Kapin darauf hin.

An der Thatsache, dass im Gebiete von Malborget und Tarvis zahlreiche Fetzen und Schollen der weicheren Unterlage in die hangende, von Sprüngen durchsetzte Dolomittafel hineingespreßt wurden, dürfte angesichts der eingehenden, im vorstehenden wiedergegebenen Beobachtungen ein Zweifel kaum möglich sein. Die theoretische Bedeutung der Erscheinung soll in dem allgemeinen tektonischen Theile erörtert werden; hier genüge der Hinweis, dass der ganze Vorgang viel von seinem Auffallenden verliert, sobald man den gesammten Aufbau der Gegend berücksichtigt. Das Triasgebiet auf dem Südabfall der Karnischen Hauptkette ist als ein gewaltiger Längsgraben aufzufassen. Die Nordgrenze bildet der Hochwipfelbruch, an dem eine vertikale, mehrere tausend Meter betragende Verschiebung stattgefunden hat. Die Versenkung auf der Südseite, die ich von Leopoldskirchen bis in das obere Savethal verfolgt habe, ist zwar deutlich ausgeprägt, besitzt aber viel geringere Sprunghöhe; der Seherndolomit ist hier etwa in die Höhenlage des Muschelkalks oder der Werfener Schichten abgesunken. Die Aufquetschungen sind auf den Längsgraben selbst beschränkt und fehlen im Westen, wo der südliche Bruch sich in eine unregelmässige antikinale Wölbung umwandelt.

Man braucht zur Erklärung der Aufquetschungen nicht einmal auf tieferliegende tektonische Ursachen zurückzugehen: Wo über einer plastischen Unterlage eine starre, von Rissen durchsetzte Decke liegt, werden schon infolge des Druckes der letzteren die weicheren Massen in die Spalten eindringen. In der Gegend von Pontafel waltet zwar dasselbe Verhältniss ob, aber infolge der geringeren Zerrüttung des Gebirges fehlen in dem Dolomit die durchsetzenden Spalten und daher auch die Aufsprüngen.

Ganz analoge tektonische Erscheinungen sind von DIEXER aus den benachbarten Julischen Alpen und von BRITNER aus der Hochschwabgruppe sowie vom Torenner Joeh beschrieben worden.

7. Die Tektonik der Trias in den Ostkarawanken.

Infolge der allgemeinen Vegetationsbedeckung sind die Aufschlüsse in der Trias der Ostkarawanken so schlecht, dass ein Verständniß der verwickelten Lagerungsformen nur aus der Untersuchung des Grenzgebietes der Karnischen Kette gewonnen werden kann.




Abbildung 12.

Die Bruchgrenze von Silurschiefer (1) und Trias in den Karawanken.

In die Bruchspalte ist eine Scholle von Muschelkalk (3) eingebracht. 2 Werfer Schichten, 4 Schlern-Loamit.

Auf dem rechten Fella-Ufer gegenüber von Thörl kann man ausnahmsweise mitten im Walde den Einfluss von Gebirgsstörungen auf die Oberflächenformen beobachten. Im untersten Theile des Kolmwaldes findet sich hier im Gebiete des Kalkes, aber unmittelbar an der Bruchgrenze gegen den Schiefer und parallel zu dieser eine Anzahl tiefer Risse und Einbrüche, die zweifellos durch den Einsturz unterirdischer Hohlräume entstanden sind. Die Tagewässer eirkulirten offenbar besonders häufig auf der Grenze der klüftigen Kalke und der undurch-

lässigen Schiefer, lösten den Kalk unterirdisch aus und bewirkten so den Nachsturz der auflagernden Massen.

Östlich von dem oben geschilderten Vorsprung der Silurschiefer bei Thörl dringt die Trias in das Silurgebiet vor und bedingt hierdurch, wie es scheint, weitere tektonische Unregelmässigkeiten. In dem ausspringenden Winkel erscheinen nämlich unter dem Triasdolomit Muschelkalk (graue Plattenkalke) und Werfener Schichten (rothe Glimmersandsteine, rother Oolith und grauer Kalk), während im Osten und Westen der Bruch zwischen Schiefer und Dolomit liegt. Zwischen Werfener Schichten und Silurschiefer tritt noch einmal ein schmaler Streifen von Muschelkalk auf; derselbe ist als eine grabenartig in die Bruchspalte eingesunkene Scholle aufzufassen. (Vergl. das Profil.)

Diese stark dislocirte Scholle ist durch das mehrfach beobachtete Vorkommen von Bleiglanz ausgezeichnet. Dasselbe ist schon seit längerer Zeit bekannt und im Sommer 1890 durch neuere Versuchsstollen der Bleiberger „Union“ aufgeschlossen worden. Am NW Abhang des Cibiinberges wurde in einem dichten rauehgrauen Kalke mit wenig Spathadern, der stellenweise Rhizocorallen ähnliche Bildungen enthält, ein solcher Stollen getrieben. (Vergl. das Profil.) In dem flachgelagerten Kalke findet sich zweimal eine 2—3 m mächtige Lage von schwarzem Schieferletten; im Liegenden der oberen Lettenschicht kommen die Bleiglanzpartikel im Kalk eingesprengt vor.

Auch an dem zweiten Versuchsstollen (oberhalb des Maurerhofes) zieht eine Lettenkluft ziemlich horizontal in das Innere des Berges und entspricht einer unbedeutenderen Dislokation. Beim Abteufen eines kleinen Schachtes fand man noch 4 solcher Lettenklüfte übereinander. Die Erzführung ist an die Thonlager gebunden, welche die eirenlirenden Wasser aufgehalten haben.

Ein dritter älterer Schurf liegt weiter westlich im Kohnwalde oberhalb der Greuther Holzschleiferei. Man hat dort eine bituminöse Reibungsbreccie gefunden, die aus dunklem Kalk, Hornstein und eingesprengtem Bleiglanz besteht. Ein unmittelbar von der Bruchgrenze stammendes Stück zeigt auf

der einen Seite krystallinen Kalk mit Spathadern, auf der anderen einen Beschlag von Glimmer und Schiefermaterial.

Am Kopa und Trebischagraben verläuft der Hochwipfelbruch zwischen Dolomit und Silurshiefer; weiterhin an der Wurzener Strasse bilden wieder die stark zerrütteten grauen Plattenkalke des Muschelkalks die Grenze. Letztere umschliessen oberhalb von Ratschach eine unregelmässige antiklinale Aufwölbung von Werfener Schichten. Dass noch weiter im Osten Grödener Sandstein in die Bruchspalte eingequetscht ist, wurde bereits erwähnt.

Thurl Höhe

Thurl St.
(Pietra verde)

Aarmagg

W.

O.



Abbildung 13.

Prchal Höhe
1027 m

Alpen Kofel
1033 m

S.

N.



Abbildung 14.

Die I

Oden: Der Gartnerkofel von S. Die nördliche Triascholle ist die
 Muschelkalkes (Thurlhöhe), Muschelkalk, Pietra verde der Buchen-
 und Madritschung zwischen zwei Trias-

erät des
 Aarmagg

II. KAPITEL.

Das Gebiet der Querbrüche: Gartnerkofel bis Promosjoch.

(Silur, Carbon, Trias.)

In oroplastischer und landschaftlicher Hinsicht bildet das zu schildernde Gebiet die wenig veränderte Fortsetzung der östlichen Karnischen Alpen. Jedoch erheischt das Auftreten neuer stratigraphischer und tektonischer Elemente eine gesonderte Behandlung. Das flach gelagerte, durch Landpflanzen und Fusulinenkalken gekennzeichnete Oberearbon tritt, abgesehen von den oben beschriebenen kleinen Aufwölbungen, nur in diesem Gebirgsabschnitt auf, während das vornehmlich im Westen entwickelte Unterearbon auf die Gruppe des Monte Dimon beschränkt ist. Ferner beherrschen Querbrüche, die allerdings auch dem folgenden Abschnitte nicht fehlen, den Gebirgsbau — trotz des Durchstreichens von Längsstörungen — vielfach in massgebender Weise.

Der Nordabfall besteht, wie überall, aus silurischen Schichten, deren Lagerung im allgemeinen ziemlich regelmässig vertikal ist, deren Breite jedoch infolge der Querbrüche mannigfachen Schwankungen unterliegt. Die Extreme betragen 1,1 und 8,5 km. In der Längsaxe und auf der Südseite des Gebirges besitzen die wildzerklüfteten, meist in schroffen Wänden aufstrebenden Massen des Schlierdolomits grosse Verbreitung und sind theils durch tektonische Störungen, theils durch die Wirkungen der Erosion in 5 Berggruppen gesondert, welche meist die Höhe von 2000 m übersteigen. Es sind dies der Gartnerkofel, der Schinouz, der Rosskofel, der Trogkofel und der Monte Gémula. Die stärkere Zerklüftung des Dolomits und die hierdurch bedingte Ausbildung von Steilwänden erklären die auf den ersten Blick paradox erscheinende Thatsache, dass die genannten Berge den Charakter des Hochgebirges tragen,

während die gleichhohen, aus kompaktem, wenig zerklüfteten Devonkalk bestehenden Erhebungen des Osternigg und Poldnigg gerundete Mittelgebirgsformen zeigen und bis zum Gipfel von einer kaum unterbrochenen Rasenhülle bedeckt sind.

1. Der Gartnerkofel und die Triasberge bei Pontafel.

Die Haupterhebung des Gartnerkofels besteht aus Schlerndolomit und hängt im Osten mit der ausgedehnten, in den vorhergehenden Abschnitten geschilderten Dolomittafel zusammen. Im Süden stellt das Obercarbon der Kronalp einen scharf ausgeprägten Senkungsbruch dar; die Grenze gegen denselben biegt an der Reppwand vor und bildet mit dem durchstreichenden Hochwipfelbruch in der Gegend des Garnitzengrabens ein höchst verwickeltes System von Längsstörungen, die meist unter spitzen Winkeln von einander abspalten.

Es ist nicht unbedingt sicher, dass die auf der Karte zum Ausdruck gebrachte Darstellung der tektonischen Verhältnisse in allen Einzelheiten der Wirklichkeit entspricht. Die Schichten sind fast durchweg versteinungslos und z. Th. petrographisch einander überaus ähnlich. In zwei Horizonten, dem Untersilur und dem Mitteldevon kommen weisse halb- oder ganz krystalline Kalke, in zwei anderen (Bellerophon- und Muschelkalk) dichte graue Plattenkalke vor. Rothe, glimmerige Mergel und Sandsteine finden sich gar in drei Horizonten, den Grödenen, den Werfener Schichten und im Liegenden der bunten Muschelkalkeonglomerate. Diese bunten Schichten sind nur in deutlichen Aufschlüssen petrographisch unterscheidbar, während die in vielen anderen Fällen ausreichende rothe Färbung des Waldbodens hier dem Geologen nur neue Räthsel aufgibt.

Die richtige Auffassung der Sachlage wird weiter erschwert durch einen ziemlich raschen Facieswechsel innerhalb der tieferen Triasschichten. Die grünen Pietra verde-Tuffe der Scharte zwischen Thörlhöhe (Reppwand) und Gartnerkofel keilen nach Osten zu ziemlich bald, die bunten Conglomerate des Muschelkalkes vor der Mäderndorfer Alp aus; bei der letzteren könnte allerdings auch ein Verschwinden durch tektonische Bewegungen in Frage kommen.

Zu Seite 41.



Abbildung 15.

Das Profil des Kreuzbaches süd. Hermagor.

Zwischen dem Devonkalk und der normal lagernden Triasfolge erscheint ein aufgeprospter Feins von zerstücktem Südrhätzelkalk. Die Pfeile geben die Richtung der Dislokation an.

Der Hoehwipfelbruch verläuft, wie oben gezeigt wurde, östlich vom Kok zwischen Schlerndolomit im Süden und dem Silur bzw. Devon des Polndniggzuges im Norden. In der Gegend von Klein-Studena erscheinen im Liegenden des Schlerndolomits tiefere Triasbildungen in geringerer Mächtigkeit; man beobachtet die dunklen Plattenkalke mit weissen Kalkspathadern und Hornsteinen, welche den alpinen Muschelkalk kennzeichnen, sowie die Werfener Schichten. Wie das nebenstehende Profil zeigt, sind diese unteren Triasschichten nicht, wie in ähnlichen Fällen, gequetscht und von Harnischen durchsetzt, sondern bilden das normale Liegende des Schlerndolomits.

Von der Egger Alp führt ein auf der Karte angegebener, aufangs schwer zu findender Fnssteig durch die weissen, hier und da bläulich erscheinenden Devonmarmore in die von schroffen Wänden begrenzte Schneht des Krenzbaches. Die verschiedenen Gesteine sind an dem, auch landschaftlich grossartigen (aber nur Schwindelfreien zu empfehlenden) Steige vortrefflich aufgeschlossen; jedoch ist ein Standpunkt für den Entwurf einer, die natürlichen Verhältnisse im richtigen Maassstabe wiedergebenden Skizze oder Photographie nicht vorhanden. Ich musste mich daher während des Durchwanderns der Schneht auf die Entwerfung des Profils beschränken, das mit Absicht etwas schematisch gehalten ist. Die bemerkenswertheste Erscheinung ist unstreitig der zwischen Devon und Trias emporgepresste, total zerrüttete und zerknitterte, von zahlreichen Quarzadern durchsetzte schwarze silurische Thonschiefer. Man könnte denselben als den „ausgewalzten“ Gegenflügel einer Synklinale betrachten, deren Kern der Devonkalk der Kersnitzen und deren Nordflügel das Silur nördlich der Eggeralp (der Oberndorfer Berg) bilden würde. Jedoch erscheint angesichts der sehr geringen Breite des Schiefers (der auf der Karte in vergrössertem Maassstabe wiedergegeben werden musste), die Annahme einer Aufquetschung wahrscheinlicher. Häufiger sind diese tektonischen Erscheinungen in der Gegend von Malhörget (vergl. unten). Die horizontale Ansdehnung des Schieferstreifens über den Nordhang der Möderndorfer Alp hin scheint nicht erheblich zu sein.

Einen guten Einblick in den Aufbau des Gebirges gewinnt man auf dem Wege, der von Möderndorf über die Urbani-

kapelle und den Schwarzwipfel zu der am Fusse des Gartnerkofels liegenden Kühweger Alp führt. Für die nachfolgende Darstellung ist ansser den eigenen Aufzeichnungen auch das Tagebuch von Herrn Professor SUSS benützt worden.

Oberhalb des Schuttkegel des Garnitzenbaehes quert man zunächst einen schmalen Zug von


1. Thonschiefer mit Quarzfasern, z. Th. quarzitisch entwickelt. Darauf folgt

2. Silurischer Kalkphyllit nebst grauem oder weissem Marmor, saiger oder mit 70—80° nach N—NO fallend. Deutliche, N—S streichende Klüfte könnten leicht für Schichtung angesehen werden, wenn die Bänder des Kalkes nicht die wahre Lagerung verriethen; auch rother Marmor folgt weiter nach oben. Mehr aufwärts bildet weisser Marmor die senkrecht zum Garnitzenbaeh abstürzende Wand, auf deren Rand die Urbanikapelle steht; ein Theil der Wand wird von einer hohen NNÖ streichenden Kluffläche gebildet. Der (gut unterhaltene aber auf der G. St. K. nicht mehr angegebene) Weg wendet sich nach W und führt bis nahe an den Schwarzwipfel durch silurischen Kalkphyllit. Der ost-westlich gerichtete Theil des Garnitzengrabens bildet hier die Grenze zwischen Kalkphyllit und dem wenig verschiedenen, etwas reineren, halbkrySTALLINEN Devonkalk des Kersnitzenguges.

3. Am Schwarzwipfel beginnt der Bellerophonkalk; man beobachtet unter der Halterhütte einen grösseren Ansehluss von Rauhwaacke, bunte Schiefer vom Aussehen der Werfener Schiefer, dann etwas Gyps, wenig Rauhwaacke, eine Lage von blutrothen Schiefer mit Glanzflächen, dann folgt der hellgrane dichte geschichtete Bellerophonkalk der Trägerhöhe. Die schlecht aufgeschlossenen bunten Schiefer stellen das verquetschte Anslaufende einer Zone von typischen Grädener Schichten dar, die ich weiter östlich, am Fusse der Trägerhöhe, zwischen Bellerophonkalk und Silur auffand.

4. Man findet weiterhin am Wege anstehend dunkelen Oberearbonschiefer mit eingelagerten Fusulinenkalken. SUSS führt von dort Trilobiten, Fenestellen, *Euomphalus* und *Spirifer* an. (Hier ist der Hauptstandort der wunderbaren *Wulfenia carinthiana*.)

Ausläufer der Trägerhöhe (ca. 1600 m.) Kühweger Alp Ausläufer des Gartnerkofels (ca. 1800 m.) Krone →
 Duhagraben



Schematisches Profil des Gartnerkofels. Ca. 134000. Höhen und Längen im natürlichen Verhältnis.
 (Der Durchschnitt liegt etwas östlich von dem auf S. 42 u. 43 beschriebenen.)

1. Kalkhyllit, 1a Tronschiefer des Unterallgäu, 2. Obercarbon, 3. Grödenmer Sandstein und Conglomerat, 4. Kellerophonkalk (mit 4a Zellendolomit), 5. Werfener Schichten (des O und W anstehend, im Profil durch eine unterseizende Störung oder durch Gehängeschutt verdeckt), 6. Muschelkalk und 6a Bunte Kalkconglomerat desselben, 7. Weiser Schlierendolomit mit Gyroporellen.

5. Unterhalb des Weges beobachtete ich noch einen Aufschluss von Grödener Mergeln, die aber nicht besonders deutlich entblösst sind; darauf folgt

6. Bellerophonkalk zum zweiten Male. Dies eigentümliche Verhalten glaube ich folgendermassen erklären zu können (vergl. die Karte): Zwei spitzwinkelig in der Nähe des Schwarzwipfel convergirende Brüche begrenzen einen Keillhorst von Oberearbon (4), an dem im Norden und Süden der Bellerophonkalk abgesunken ist. Der Betrag der nördlichen Verwerfung war ziemlich erheblich (weungleich nicht mit dem kolossalen, weiter im Norden folgenden Hoehwipfelbruch vergleichbar), die Sprunghöhe der südlichen Dislocation verhältnissmässig gering, da hier in dem Bruch nur der zwischen Carbon und Bellerophonkalk liegende Grödner Mergel theilweise (mit Ausnahme des schmalen Streifens 5) verschwunden ist. Der nördliche, bei mehreren Gelegenheiten untersuchte Nordabhang der Trägerhöhe ist stark bewaldet, schlecht aufgeschlossen und mit all den verschiedenartigen in Frage kommenden Gesteinen übersät, so dass die obige, mühsam errungene Auffassung nicht als vollkommen zweifellos zu bezeichnen ist.

7. Der im Osten und Westen der Kühweger Alp versteinerungsführenden (*Pseudomonotis*, *Myacites fusacensis*, Gastropodenoolithe mit *Holopella*) Werfener Schichten nebst dem grauen Muschelkalk sind in der Nähe der Alphütte durch das massenhafte Gerölle verdeckt. Der Muschelkalk entspricht in dem Profile der Thörlhöhe den Schichten 2) und 3).

8. Jenseits des Kühweger Baches beobachtet man rothen Schiefer und buntes Kalkeonglomerat (4 und 5 im Profil der Trägerhöhe) und darüber geschichtete röthlichgelbe Kalke, welche ebenfalls zum Muschelkalke gehören und die Unterlage der schichtunglosen schneeweissen Dolomitwände des Gartnerkofels bilden. Die Lage, welche diese Conglomerate am Gehänge einnehmen, ist auf den von Herrn Professor Süss durch entworfenen Skizzen des Gartnerkofels (von N) und des Garnitzengrabens (p. 51) zu sehen.

Die Aufeinanderfolge einzelner Schichtgruppen des grossen eben geschilderten Durchschnittes wird durch die beiden folgenden Profile verdentlicht. Die Ansicht der Thörlhöhe von N erläutert die Schichten vom Bellerophonkalk bis zu den

bunten Conglomeraten. Man vergleiche auch die weiter unten folgende Skizze desselben Berges von der andern Seite.

Die von Herrn Professor STRESS meisterhaft dargestellte Nordseite des Gartnerkofels zeigt auf der Thörlhöhe die Conglomerate und im Liegenden derselben die rothen Schiefer.



Abbildung 16.

Gez. von E. Stress.

Weg zur Thörlscharte.

Ergänzung zur Ansicht des Gartnerkofels von Nord (S. 45.). Der Schieferdolomit (17) des Gartnerkofels wird unterlagert von grünem Porphyrit (p, Pietra verde) und jüngem Kalkconglomerat (co). Inunterer Krollenkalk des oberen Muschelkaltes. Die Ansicht ist von unten aufgenommen, so dass der graue Porphyrit über dem Kalk emporzuarsteigen scheint.

Im Liegenden der weit am Abhang verfolgbaren Conglomerate erscheinen die oberen meist grau gefärbten geschichteten Kalke, die keine Versteinerungen führen und dem oberen Muschelkalk oder den Buchensteiner Schichten entsprechen. Darüber türmen sich die schroffen Wände des Gartnerkofels auf.



Abbildung 17.

Gez. von E. Sucks.

Der Gartnerkofel und Thörlhöhe von N.

Der massige in steilen Wänden abfallende Schlierdolomit wird unterteilt a) von grauem geschichteten Kalk (10b, Kalk, O. K. = Buchensteinler Schichten), b) von Fietz, verde (Thürscharte, kelt nach Osten an), c) von Muschelkalk; letzterer besteht aus 1. rohem Kalk und buntem Kalkcongglomerat, 2. rothem Schiefer- und Glimmerschiefer, 3. mt. Muschelkalk (grauem, wohlgeschichteten Plattenkalk; 1-3 sind = 3-5 im Profil des stratigr. Thörls. (Vergl. unten.)

Zwischen die oberen geschichteten Kalke und die von einer rothen Kalkbank gekrönten Conglomerate schiebt sich an der Thörlscharte ein bald auskeilendes Lager von Pietra verde (S) ein. Aus der nebenstehenden Ansicht ergiebt sich die verhältnissmässig unbedeutende Mächtigkeit des Tufflagers; in demselben sammelte Herr Professor Süss ein interessantes Stüek, ein von rothem Quarzporphyr mitflossenes Kalkgerölle.

Die Tuffe der Thörlscharte entsprechen in ihrer stratigraphischen Stellung vollkommen den Tuffen von Kaltwasser bei Raibl, wie überhaupt die Trias des Gartnerkofels grosse Ähnlichkeit mit den tieferen Theilen des berühmten Raibler Profils besitzt.

Wesentlich verschieden ist dagegen der südlich liegende Durchschnitt des Bombaschgrabens, wo im Muschelkalk alle bunten Gesteine, Schiefer, Kalke und Conglomerate vollkommen fehlen — ein neues Beispiel für den häufig in der alpinen Trias beobachteten schroffen Facieswechsel innerhalb kleiner Gebiete.

Die Südabdachung des Gartnerkofels ist flach und die Besteigung des Gipfels auf dieser Seite ohne die geringsten Schwierigkeiten möglich, während die Foreirung der Wände des Nordabhanges ein bisher wohl noch ungelöstes alpinistisches „Problem“ darstellt. Die geringe Neigung des Südgehänges beruht vor allem darauf, dass die Wetterseite in der Karnischen Kette nach Norden zu liegt; dazu kommt, dass der carbonische Horst des Auernigggebietes (vergl. unten) die triadische Grabenscholle des Gartnerkofels in früheren Zeiten überragte, aber von der Denudation stärker angegriffen wurde.

Die Aussicht von der allseitig freiliegenden Spitze des Gartnerkofels ist für den Naturfreund ebenso anziehend wie für den Geologen. Mit besonderer Schärfe prägt sich der Gegensatz zwischen den grünbewachsenen gerundeten Carlonhergen Garnitzen, Krone und Auernigg und den bleichen, in abschreckender Pflanzenarmuth emporstarrenden Kalkschroffen des Ross- und Trogkofels aus. (Vergl. die Abb. 14 auf S. 39.) Der Unterschied der Landschaftsformen tritt auf der unten wiedergegebenen Süss'schen Zeichnung (Aussicht vom Gartnerkofel nach W) in sehr bezeichnender Weise hervor. Es hat den Anschein, als ob die Trias des Ross- und Trogkofels durch einen im allgemeinen gradlinigen Bruch abgeschnitten sei, der

am Rudniker Sattel durch einen ausspringenden Winkel unterbrochen ist. Das wahre Verhältniss, dass weiter unten beschrieben werden soll, ist noch verwickelter.

Der Dolomit auf der Spitze des Gartnerkofels gehört, wie der Korallenkalk des gegenüberliegenden Rosskofels zu den in paläontologischer Hinsicht einigermaßen ergiebigen Gesteinen in der versteinungsarmen Karnischen Trias. Man beobachtet hier Gyroporellen in ziemlicher Häufigkeit; ferner sammelte SUESS eine, von MOJASISOVIC als *Daonella cf. tirolensis* MOJ. bestimmte Muschel. Dieselbe würde etwa auf Buchen-



Abbildung 18.

Gez. von E. Suess

Die Bruchgrenze im Duckagraben.

steinen Schichten hinweisen. Weiter westlich am Sehlterköferle (Bild des Garnitzengrabens) fand SUESS Spiriferinen und Terebrateln aus der Gruppe der *T. vulgaris*.

Die tektonische Grenze auf der Südseite des Gartnerkofels ist in Folge des Farbengegensatzes schwarz (Carbon) — weiss (Dolomit) oberhalb der Watschiger Alp im Duckagraben (nicht auf den G. St. K. angegeben) sehr deutlich wahrnehmbar. Ueherall schiessen die von der absinkenden Triasscholle mitgeschleppten, meist zerknitterten und zerrütteten Carbonschichten steil oder saiger nach dem Bruche zu ein. Auch die vor-

Zu Seite 47.



Gen. von E. Suess.

Abb. 19, Skizze 1.

Bruch zwischen kalkigen Schlierdolomit und Obercarbon (dunkel).

Oberer Teil des Innsarrahlens, Waschinger Alp, Südsäule des Gartnerkofels. Beide Formationen sind stark aufgerichtet. Bänke sind alle eingeknickten Carbonatkalchen gesondert dargestellt. Vergl. Suess, Antlitz der Erde I. S. 312

wiegend flach gelagerte Trias, (die am Südabhang verschiedentlich Andeutungen von Schichtung zeigt) ist ueben dem Bruche steil gestellt (Skizze 1) oder local auf die Carbon-schichten aufgeschoben (Skizze 2). Die beiden von Herrn Professor SUESS im östlichen Quellgebiet des Trügelhaches, im Dukagraben oberhalb der Watschiger Alp aufgenommenen Ansichten veranschaulichen diese tektonischen Merkwürdigkeiten in unnachahmlich klarer Weise.

Die mit dem Gartnerkofel durch den Lonaswipfel und Schinonz zusammenhängenden Triasberge der Pontafeler Gegend bieten in tektonischer Hinsicht wenig Bemerkenswerthes. Dass bei Pontafel selbst das Fellathal einer antiklinalen Aufwölbung der Werfener Schichten und des Muschelkalkes inmitten der höheren Trias entspricht, wurde bereits von HAUER vor Jahren in klarer und unzweideutiger Weise ausgesprochen. Die Auffassung STACHES, der den Schlerndolomit zum Peru ziehen will, bezeichnet einen Rückschritt gegenüber der älteren Anschauung. Ein antiklinaler Aufbau des Gebirges ist jedoch nur in der von HAUER näher untersuchten unmittelbaren Umgegend von Pontafel zu beobachten; hier lässt sich der Muschelkalk (meist in der Facies fossilereer Guttensteiner Schichten; nördlich von Costa an der Pontebbana mit Ranchwaeken) von der Mündung des Vogelbachgrabens etwa bis zum Prihatbach verfolgen. Oestlich und westlich fehlt derselbe, so dass hier die Werfener Schichten des Südgehanges an den Schlerndolomit des Nordabhanges unmittelbar angrenzen: Die antiklinale Aufpressung von Pontafel hat demnach mit einer eigentlichen Falte wenig zu thun, sondern geht beiderseits in einen Bruch über, der, wie bei Tarvis ein Absinken der nördlichen Scholle bedingt. Man darf sonach auch hier die Triastafel von Schinonz, Trogkofel und Salin-chietto als einen ungleichmässigen Grahen auffassen, der auf der Nordseite stärker gesenkt ist als im Süden. Der Uebergang eines Bruches in eine antiklinale Wölbung ist keineswegs ungewöhnlich und wurde z. B. von MOJISOVICS im Vilnöss beobachtet.

Weiter im Westen spaltet sich die Zone des Rosskofels durch den diagonalen Bruch des oberen Pontebbanathales in zwei schmale Längsgraben, deren nördlicher (Monte

Germula) zwischen Obercarbon und Obersilur eingesunken ist. Der südlich in der Nähe der Casa Varleet ansteigende Zug des Monte Salinchiotto zeigt den für die Hauptscholle bezeichnenden Ban, er ist ungleichförmig zwischen dem obercarbonischen Horst des Monte Pizzul im Norden und dem aus zerquetschten Werfener und Bellerophonschichten bestehenden Gebiet des Monte Cullar im Süden eingebrochen.


Das Triasprofil des Bombaschgrabens, durch welchen von Pontafel aus der einzige Zugang zu dem, im folgenden Abschnitt zu schildernden Carbongebiet der Krone führt, mag zum Schluss noch kurz besprochen werden. Die ganze Schichtenfolge ist infolge des Aussetzens der südlichen Verwerfung und der überaus grossen Sprunghöhe des nördlichen Bruches vollkommen überkippt und fällt SW—SSW, so dass die ältesten, am Eingange des Grabens anstehenden Werfener Schichten thatsächlich das Hangende bilden. Dieselben führen stellenweise *Pseudomonotis* in grosser Menge und zeigen im Bette des Grabens Wellenfurchen in besonders schöner Entwicklung.

Der südliche Theil der Werfener Schichten ist mehr glimmerig-sandig, der nördliche mehr mergelig-kalkig, so dass der Uebergang zu dem Muschelkalk ein allmählicher ist. Letzterer besteht vor allem aus dunklen, dickhankigen, von Spathadern durchsetzten Kalken und geht ebenfalls ohne scharfe Grenze in den dolomitischen Triaskalk über, der nur stellenweise Andeutungen von Schichtung zeigt. (Man vergl. das Profil des Malureh). Die geologische und landschaftliche Grenze des Obercarbon ist auch hier überaus scharf.

2. Das Obercarbon der Gegend von Pontafel.

Das Oberearbongebiet nördlich von Pontafel ist die einzige Gegend in der gesammten Karnischen Kette, die mehrfach von Geologen besucht und geschildert worden ist. Hier wurden die ersten bestimmbar Carbonfossilien gefunden, welche — zusammen mit dem Vorkommen von Bleiberg — das carbonische Alter der gesammten „Gailthaler Schichten“ beweisen sollten. Später haben TIETZE und besonders STACHE¹⁾ die Gegend häufiger

¹⁾ TIETZE, Kohlenformation bei Pontafel Verh. d. k. k. geol. R. A. 1872. S. 142. STACHE, Fusullnenkalke der Ostalpen ebd. 1873. S. 291. STACHE,



Geol. v. E. Suess.

Abb. 20.

Der Roskofelbruch.

An dem, durch Schnitt überdeckten, Bruch grenzen die flachliegenden Obercarbonatsteinen des Auernigg und der überkippte Schlierenkomplex des Maltrech; links der Bombaschgraben.

besucht. Die Auffassung des letzteren lässt sich kurz folgendermassen zusammenfassen: Das Carbon der Krone und des Auer-nigg enthält Vertreter der gesamten Carbonhorizonte vom Kohlenkalk¹⁾ bis zum höchsten Carbon und geht nach oben zu allmählig in die „permocarbonischen“ Fusulinidenschichten der Krone und die weissen Dolomite und Kalke des Rosskofels und Gartnerkofels über, die als heterope Vertreter der Permformation anzufassen sind.

Zu ganz abweichenden Ergebnissen gelangte STÜESS durch wiederholte Untersuchung desselben Gebietes²⁾: „es ist leicht erklärlich, dass man die mächtigen lichten Triaskalksteine im Norden und im Süden für normal aufgelagert, ja sogar für eine Vertretung der permischen Zeit gehalten hat. Es sind dies aber im Norden wie im Süden an Längsbrüchen eingesunkene Massen (Abb. 20), und es ist nun entlich die den Botanikern als Standort der wunderbaren *Halpina cucithiana* bekannte Masse des Gartnerkofels reich an Triasversteinerungen und durch sehr scharfen Senkungsbruch gegen das Carbon abgegrenzt.“

Ueber die stratigraphisch-palaeontologische Seite der Frage ist zunächst zu bemerken, dass die Schiefer, Grauwacken, Conglomerate und Fusulinienkalke des fraglichen Gebiets einen einheitlichen, dem oberen Carbon zuzurechnenden Complex darstellen und dass wahrscheinlich nur Aequivalente der oberen Ottweiler Schichten vorliegen. Gegen das Vorhandensein von Vertretern des Untercarbon spricht die eingehende palaeontologische Untersuchung der Molluskenfauna durch Herrn SCHELLWIEN. Die Bestimmung des *Prod. giganteus* durch STACHE wurde auf keine Weise bestätigt: Wie die Exemplare der Wiener Universität und die Aufsammlungen an Ort und Stelle beweisen, handelt es sich wahrscheinlich um *Productus scaberrimalatus*. Ausserdem fanden sich in den Schichten des sogenannten *Prod. giganteus*²⁾: *Productus canescinifocais* TSCHERN., eine Leitform des

über eine Vertretung der Permformation (Dyas) von Nebraska in den Südalpen *ibid.* 1874 p. 87. STACHE, die palaeozoischen Gebiete der Ostalpen. Jahrbuch der k. k. geol. R. A. 1874. STACHE, Zeitschr. d. deutschen geol. Gesellschaft 36. p. 361 und 375.

¹⁾ STACHE, Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt 1874. p. 207.


²⁾ SUSS, Antlitz der Erde I p. 343 und SCHELLWIEN, Fauna des Karnischen Fusulinienkalkes, Diss. Halle, 1892, p. 6.

russischen Oberearbon sowie *Marginifera*, eine auf Oberearbon und Permocarbon beschränkte Gattung. Gegen die Annahme von Unterearbon ist weiter anzuführen, dass die angebliche, von STACHE an der Ofenalp beobachtete Discordanz auf einer untergeordneten Dislocation beruht. (Vergleiche den stratigraphischen Theil und die eingehendere Beschreibung dieser Stelle weiter unten.)

Sollte ferner trotz des Vorkommens zahlreicher Triasversteinungen (wie *Megalodon*, *Thecosmia*, *Duonella*, *Terebratula* aff. *culgari*; Gyroporellen) noch Jemand an das permische Alter der weissen Schlierndolomite glauben, so sei vorgreifend bemerkt, dass am Gartnerkofel und am Monte Gemula, die Grödnere Sandsteine, die Vertreter des normalen Perm, in einer Entfernung von 1 km bezw. 200 m von dem Dolomite in dislocirter Stellung vorkommen. Leider ist die unrichtige Anschauung STACHES — trotz der obigen Bemerkung von STRESS — in die meisten neueren Lehrbücher, u. a. auch in die Formationslehre KAYSERS übergegangen.

Die überaus zahlreichen Begehungen, welche ich und auf meine Veranlassung die Herren von dem BORSE und SCHELLWIEN zwischen Auerugg und Oharnaehalp anführten, haben die Richtigkeit der SVESSSchen Auffassung in nachdrücklichster Weise dargethan. Angesichts der Kartendarstellung und der zahlreichen hier wiedergegebenen Ansichten und Profile dürfte auch wohl für den Leser ein Zweifel über das Vorhandensein von Dislocationen kaum mehr bestehen. Man könnte nur darüber noch im unklaren sein, ob das Carbon in seiner Lage verhlieb und die Trias absank oder ob die Trias stehen blieb und das Carbon emporgewölbt wurde. Für die letztere Auffassung wäre vor allem die Thatsache anzuführen, dass die höchsten Carbonspitzen um 200—300 m hinter den benachbarten Triasbergen zurückbleiben. Angesichts der flachen Schichtenstellung, welche der bei weitem grösste Theil des Carbonebiets besitzt, und angesichts der an Umbiegung, nicht aber an Falzung gemahrenden Lagerungsformen, welche die gestörten Theile des Carbon (Garnitzen) zeigen, erscheint jedoch die zweite Annahme a priori wenig wahrscheinlich. Ihre Unhaltbarkeit ergibt sich aus der Betrachtung der Erosionsformen unserer Gegend. Der tief ausgefurchte Ein-

Zu Seite 51.



Gez. von K. Succs.

Die Erosionsschlucht des Garnitzengrabens.

Im Vordergrund der Schlierdolomit, unterlagert von Muschelkalkonglomerat, im Hintergrunde das Obercarion (dunkel). Die orographisch tiefere Lage des horstartig aufragenden Carion erklärt sich durch spätere Denudation.

Abbildung 21.

schnitt, in dem der Bombaschgraben die Mauer des Kalkgebirges durchbricht, wird durch die heutige Oberflächengestaltung ebensowenig erklärt, wie der Erosionsriss des oberen Garnitzengrabens zwischen Gartner- und Zielerkofel. Die Schieferhöhen des Aernigg und der Krone sind im Osten, Norden und Süden von höheren Kalkbergen umgeben und stehen nur nach Westen mit einem niedrigeren, nach dem Gailthal zu abfallenden Schiefergebiet im Zusammenhang. Trotzdem fließt nur ein geringer Theil der Gewässer auf diesem Wege ab. Man könnte, um diese paradoxen Oberflächenformen zu erklären, die rückschreitende Erosion zu Hilfe rufen; da jedoch die Bäche nur auf der Wetterseite erodiren und die heiden in Frage kommenden Querthäler nach Norden



Abbildung 22.

Lagerung der Carbonschichten

zwischen Krone und Garnitz, gesehen vom Madritscheng.

und Süden gerichtet sind, erscheint dieser Erklärungsversuch wenig annehmbar.

Man wird demnach auch durch diese Erwägungen zu der Voraussetzung geführt, dass die früheren Höhenverhältnisse von den heutigen gänzlich verschieden waren. Einstmals ragte das Niederungsgebiet der Krone und des Nassfelds über den Gartnerkofel und den südlichen Kalkkamm empor und entsand seine Gewässer über jene hinweg nach Nordost, Nordwest und Süd. Die Verwitterung trug die Schieferhöhen rascher ab als die Kalkgebirge, aber die Thätigkeit der fließenden Gewässer hielt mit der Verwitterung gleichen Schritt und schnitt tiefer und tiefer, der ursprünglichen Richtung folgend, in die Kalkmassen ein. Die Thäler sind also auch hier älter als die Berge.

Der zwischen Krone und Zirkelspitzen durchschneidende Querbruch bedingt das Absinken der Trias im Osten und ist in der Gegend des Louaswipfels zwar an dem erheblichen Farbenunterschied der Gesteine gut kenntlich, aber nicht besonders deutlich aufgeschlossen. Dagegen findet sich südlich von den Zirkelspitzen an der Alp im Loeh der prächtige, von SUSS im Antlitz der Erde erwähnte und hier nach Photographien noch einmal dargestellte Aufschluss. Die aus Grauwackenschiefer, Thonschiefer, schwarzen Fusulinenkalken und Quarzconglomeraten bestehenden Carbonbildungen setzen an dem unendlich geschichteten, schneeweissen, dolomitischen Triaskalke haarscharf ab. Die Carbonschichten sind unmittelbar am Bruch unter steilem Winkel geneigt und ziemlich stark zerquetscht, jedoch immer noch weniger gestört als z. B. die Aufquetschungen des Malborgeter Grabens. Jedoch ist auch hier ein an der Farbe leicht kenntlicher Streifen dunkelen Carbonschiefer intrusiv in eine Kalkspalte hineingequetscht. (Mitte des Bildes.) Die Carbonschichten nehmen ziemlich bald ihre flache Lagerung wieder an, was ja auch mit der obigen Annahme gut übereinstimmt, dass dieselben den bei den Dislocationen *in situ* verbliebenen Theil darstellen. Hingegen sind die Triaskalke von kolossalen Rutsch- und Gleitflächen durchsetzt, die sich unter spitzen Winkeln schneiden. Indem die Verwitterung und der Spaltenfrost an diesen Rissen ihre Thätigkeit vereinigen, kam die auch für unsere „verworfenen Gegend“ beispiellose Zertrümmerung zu Stande, welche die Zirkelspitzen kennzeichnet. (Abb. 24.)

Die tertiären Erdkrustenbewegungen, welche den NNO bis SSW verlaufenden Abbruch des Obercarbon bedingten, sind noch nicht zum Abschluss gelangt. Vergleicht man die von HOEFFER entworfene Erdbebenkarte Kärntens¹⁾ mit unserer geologischen Karte, so fällt die vollkommene Übereinstimmung der von St. Michael im Murthal über Hermagor nach Pontebba verlaufenden Tagliamentolinie mit dem Zirkelbruch sofort ins Auge.

Dem Querbruche der Zirkelspitzen sind diejenigen Quer-

¹⁾ Denkschriften der kais. Akademie d. Wissenschaften. Wien. Math. naturw. Klasse 42 Bd. II. Abth. Taf. I.




Abbildung 21.

Nach photogr. Aufnahmen von Dr. v. d. Borne mit Benutzung des Profils von E. Suess, gez. von O. Berner,

Die Zirkelpitzen von WSW.

Zerkürrteries und serquiescites Obercarbon (dunkel) neben dem abgelenkten Triaskalk, in dessen Spalten daselbe zum Thoil einbringt.




Abb. 44

Nach einer photogr. Aufnahme von Dr. v. d. Horne gez. von E. Ohmann.

Die Zirkelspitzen nördlich von Pontafel,

Der Trifaskalk ist in der unmittelbaren Nähe des Querbruchs von zahlreichen Verwerfungen und Hartschieben durchsetzt.

störungen ähnlich, welche das westliche Ende des Obercarbonzuges bilden. Nur ist am Lanzenboden und der Oharnachalp der Querbruch durch die Interferenz einer längs verlaufenden Dislocation winkelig gebrochen, und das Carbon stellt dem Sillur gegenüber die abgesunkene Scholle dar.

Nordwestlich von der Höhencote 1635 biegt der Zirkelbruch in einem abgestumpften rechten Winkel um und verläuft in WNW (bis W)-Richtung unter den Wänden des Skalzer Kopfs und des Malurrehs bis zum Rosskofel und weiter. Ich bezeichne diese für den Gebirgsbau und die Thalformen gleich bedeutungsvolle Verwerfung als den Rosskofelbruch. (S. 49.)

Unter den Wänden des Skalzer Kopfs sieht man das dunkle Carbon scharf an den weissen Triaswänden absetzen. Zwischen Malurreh und Aernigg (Vergl. die Abb. 20) ist hingegen das dem Bruch (bezw. der Gesteinsgrenze) entsprechende Thal vollkommen mit Gehängeschutt und Moränenablagerungen erfüllt.

In geringer Entfernung westlich vom Zirkelbruch trifft man massige Conglomerathänke an, welche in Folge der flachen Lagerung der Carbonscholle bis zur Krone (Fallen 20—30° NO) und weiter bis zum Aernigg durchstreichen. Die Krone hat offenbar ihren Namen von den die Hochfläche krönenden Conglomerathänken erhalten. Das regelmässige, auf der Höhe zu beobachtende Kronenprofil wird im stratigraphischen Theile eingehende Berücksichtigung finden. Weiter südlich beobachtet man bei der Annäherung an den Rosskofelbruch mannigfache Unregelmässigkeiten, so die angebliche „Discordanz“ STACHES. Auch die Schichten, welche weiter abwärts unterhalb der Ofenalp stehen, sind zum Theil ebenfalls aufgerichtet, zum Theil jedoch flach gelagert und vielleicht als die untere Fortsetzung des Kronenprofils anzusehen. Ich entlehne den Aufzeichnungen des Herrn Dr. SCHELLWIEB, der diese Gegend genauer untersucht hat, das nachfolgende: Unterhalb der Schluffmassen, welche den Anschluss an das Kronenprofil verdecken, beobachtet man die folgenden sählig gelagerten Schichten von oben nach unten.

„10. Weisses Quarzeconglomerat mit Anthracit.

9. Grauwackenschiefer ca. 15 m.

8. Dunkelgrüne und violette, sehr fein spaltende Thonschiefer mit *Spirophyton Suessi*.
7. Sehr dünnbankige Fusulinenkalke ca. 25 m.
6. Quarzeonglomerat weiss gefärbt.

Weiter abwärts Schuttbedeckung; die Schichten fallen auf der westlichen Seite des Baches, in dessen Bette eine Störung verläuft, mit ca. 45° nach NNÖ. Man beobachtet weiter unten:

5. Grauwaackenschiefer sehr mächtig.
4. Quarzeonglomerat dunkelgrün ca. 2 m.
3. Grauwaackenschiefer ca. 30 m.
2. Quarzeonglomerat, dunkelgrün ca. 5 m.
1. Thonschiefer, meist etwas grünlich gefärbt, sehr mächtig.*

Kehren wir auf die Höhe des Bergzuges Krone-Auernigg zurück. Das im stratigraphischen Theile widergegebene Profil des Auernigg (Taf. XVI) endet etwas nördlich von der Spitze des Berges an einem an sich untergeordneten senkrechten Längsbruch, welcher die *Pecopteris oreopteridis* führenden Thonschiefer des Auernigg unmittelbar neben Conglomeratbänke gebracht hat. Jenseits dieser nach Ost durchstreichenden Störung sind die Carbonschichten des Garnitzenberges unter mehr oder weniger steilen Winkeln nach Süd geneigt. Möglicherweise ist diese anomale Schichtenstellung nur als eine Stauchungsersehung im grossen aufzufassen; denn in geringer Entfernung verläuft nördlich der oben geschilderte Längsbruch des Dukagrabens, der die Trias des Gartnerkofels abschneidet.

Die flache Lagerung des Auernigg hält im allgemeinen am Madritscheng und Madritschen Schober an; beim Anstieg zu dem letztgenannten Berge beobachtet man flaches südwestliches Einfallen, und auf der Höhe lagern die Conglomeratbänke (im Vordergrund des Lichtbildes Rudniker Sattel) fast horizontal. Oberhalb der Rudniker Alp stehen blossrosa Kalke mit sehr zahlreichen Crinoiden und Fusulinen an. Weiter nördlich scheint auch die Störung der Garnitzenhöhe am Madritscheng durchzustreichen; denn hier beobachtet man steiles SSO. Fallen. An der Nordgrenze des Carbon, zwischen Domritsch und Tröppelacher Alp, fallen die Grauwaackenschiefer und Fusulinenkalke nach N.

Roskofel

Rudniker Sattel

Trogkofel

Alpenkofel



Der Rudniker Sattel.

Obercarbon und Triaskalk (von Alter des Schlierdolomits) durch Brüche getrennt. Im Süden der Rosenkofelbruch.

Die kesselartig eingesunkene Triasscholle des Trogkofels besitzt den Umriss eines gleichschenkeligen, mit der Spitze nach Norden gerichteten Dreiecks, ist rings von Obercarbon umgeben und aus dieser leicht verwitternden Umhüllung durch die Erosion gleichsam herauspräpariert. Innerhalb der Triasscholle selbst nehmen ungeschichtete Bildungen die Höhe und den Südnbfall des Trogkofels ein, während geschichtete, oft rötlich gefärbte Kalke in den tieferen Horizonten am Zolagkofel und besonders in dem Kämme des Alpenkofels vorwiegen. Auch untergeordnete Störungen fehlen nicht. So beobachtet man von der Rattendorfer Alp aus am Alpenkofel ein dreimaliges, staffelförmiges Absetzen der geschichteten Triaskalke von S. nach N.

Am Rudniker Sattel nähert sich der Rosskofelbruch der im Süden abgesunkenen Trias der Trogkofelscholle auf eine Entfernung von kaum $\frac{1}{2}$ km. Trotzdem sind die Carbonsehichten im Norden des Rudniker „Grabenhorstes“ (oroplastisch = Graben, tektonisch = Horst) nur flach nach Nord geneigt, im Süden allerdings in fast saigere Stellung umgebogen und zerklüftet. Hier beobachtet man eine ca. 8 m. mächtige, aus vollkommen zerrütteten Carbongesteinen bestehende quarzitishe Gangmasse und daneben Harnische, die bis 25 m Höhe besitzen; dieselben finden sich in beiden Formationen, besonders entwickelt jedoch im Carbon. Die wohlgeschichteten Triaskalke des Rosskofels (mit *Megalodon* und *Thecosmilia cf. confusus* m'xsr.) zeichnen sich weiterhin durch regelmässige horizontale Lagerung aus (Lichtbild Taf. II und Abb. 14, S. 39).

Am Rudniker Sattel fesselt — abgesehen von den tektonischen Eigentümlichkeiten — der grosse Versteinerungsreichtum der Carbonbildungen die Aufmerksamkeit des Geologen. Man beobachtet beim Anstieg von O Schiefer mit Steinkernen von *Productus semircircularatus*, auf dem Joeh, unterhalb der schwer ersteigbaren Wände des Trogkofels die in Gesehieben und im Grödener Conglomerat häufiger, im Anstehenden selten gefundenen blasseroten Fusulinenkalke, endlich beim Abstieg zum Trog tiefschwarze Kalke mit *Hellerophon* (s. str.).

Jenseits der stark distorirten Gegend des Troges, welche durch die Ausbildung eines echten Kesseltalles mit unterirdischem Abfluss in einer Höhe von ca. 1600 m ausge-

zeichnet ist (vergleiche die unten folgende Abbildung), wird die Lagerung des Carbon wieder flach und bleibt im wesentlichen bis zur Oharmehalp ungestört. In der Gegend des Waschbühl, wo Silur und Obercarbon als versteinungsleere Thonschiefer entwickelt sind, beruht die kartographische Unterscheidung im wesentlichen auf den Lagerungsverhältnissen; das Silur steht hier, wie gewöhnlich auf dem Kopf, das Obercarbon liegt söglich. Die Berge zwischen der Maldatschen-Hütte und Rattendorfer Alp, der Rattendorfer Riegel, Ringmaner (2027 m) und Schulterkofel sind durch mächtiges Anschwellen der Fusulinenkalke gekennzeichnet. Dieselben bilden hier, wie überall, das Hangende des Obercarbon, enthalten aber nur unbedeutende schieferige Zwischenmittel, während z. B. am Aernigg und der Krone die Schiefer aneh in der hangenden Abtheilung der Masse nach überwiegen. Am Rattendorfer Riegel (Höheneote 1854 westlich vom Zolagkofel) besitzen die Fusulinenkalke noch dunkle dichte Beschaffenheit und enthalten zahlreiche, schön herauswitternde Durchschnitte verkieselter Fusulinen; weiter westlich am Schulterkofel werden dieselben grobkörnig und enthalten kohlenanere Magnesia in nicht unerheblicher Menge. Die grauen Fusulindolomite und die dunkleren Kalke wechseln mit einander ab.

Südlich von der Spitze des Schulterkofels verläuft parallel zu dem gewaltigen Hochwipfelbruch eine kleinere Störung innerhalb des Obercarbon, welche das Absetzen der südlichen Fusulinenkalke der Ringmaner (um 150 bis 200 m) bedingt und somit den Gebirgsbau im gleichen Sinne wie der Hauptbruch beeinflusst. (Vergl. Lichtbild Taf. III und das Profil Taf. I.)


Das Carbon südlich vom Hochwipfel enthält am Lanzenboden und der kleinen Kordinalp versenkte und eingeketschte Schollen von Grödener Sandstein, welche also — trotz der erheblichen orographischen Verschiedenheit — mit der Grabenscholle des Trogkofels in tektonischer Hinsicht vergleichbar sind. Man beobachtet vom Gipfel des Monte Pizzul am Nordgehänge des Lanzenbodes einen langen rothen Streifen, der sich durch Untersuchung an Ort und Stelle als ein schmaler eingebrochener Zng von Grödener Sandstein und Mergel herausstellt.

Taf III



Photographie v. Dr. med. et phil. H. C. Bach

Platte 100



S Silurschiefer. O Obercarbon mit F Fusulinenkalk G Grögner Sandstein. B Bellerophonkalk. Tr Trias (Schiendolomit).
Roskofelbruch

Die Bruchgrenze am Hochwipfel.

(Von verschiedenen Standpunkten aus aufgenommen.)

Hochwipfelbruch und Roskofelbruch verlaufen parallel zu einander.

Die Schichtenfolge beim Anstieg durch den Rivo Cordin, einen der Quergräben des Lanzenbachs, ist von S nach N die folgende:

1. Obercarbon: Grauwackenschiefer mit Conglomerat.
2. Grödener Schichten: rothe Glimmersandsteine, steil nach Nord fallend, an der Basis mit weissen Mergelschichten, oben mit Lagen von weissen Mergelknollen.
3. Oberearbon: Schwarze Thonschiefer und Conglomerate, steil geneigt, am Schulterkofel mit Spirophyton-Sandsteinen.
4. Die mächtigen, flachgelagerten Fnsulinendolomite und -Kalke des Schulterkofels.
5. Thonschiefer auf der Spitze des Schulterkofels.

Die im Lanzenenthal von der Maldatschen-Hütte bis zur Alp Pittstall ziehende „Grabenspalte“ mit Grödner Sandstein ist als gradlinige Fortsetzung des Hauptbruches anzusehen, der seinerseits dem Lanzenbache folgt und dann im rechten Winkel zweimal scharf umbiegt. Jenseits des nördlichen Knicks liegt westlich von der Pittstall-Hütte ein schmaler Fetzen rother Schichten in der Spalte, welche hier auf eine kurze Strecke den Rosskofelbruch bildet.

Eine zweite kürzere Grabenspalte liegt etwas nördlich von der Pittstall-Alp und tritt in der Mitte des Lichtbildes Hochwipfel-Rosskofel deutlich hervor. Die dritte ausgedehntere Scholle von permischen Bildungen ist an der Alphütte Klein Kordin (welche auf rothen Mergeln steht) sowie westlich von derselben aufgeschlossen und grenzt im Norden unmittelbar an den, das Silur abschneidenden Hochwipfelbruch. Die rothen wohlgeschichteten Mergel mit ihren weissen Knollen sind, wie auf der linken Seite des erwähnten Lichtbildes deutlich zu beobachten ist, zu einer S-förmigen Falte zusammengesehoben. Die rothen Glimmersandsteine treten hier hinter den Mergeln zurück, und die rothen Conglomerate der Grödener Schichten finden sich nur in vereinzelt Blöcken. Ausserdem beobachtet man am südlichen Rande der Scholle von Klein-Kordin hellgrüne Rauewacken, vollkommen zerknittert und zerquetscht; dieselben entsprechen einem Fetzen von Bellerophon-schichten und sind ebenfalls auf dem Lichtbilde sichtbar.

In tektonischer Hinsicht ist der Umstand von besonderer Wichtigkeit, dass die bedeutenderen Vorkommen von eingebrochenem Perm in unmittelbarer Verbindung mit den beiden grossen Längsbrüchen stehen, welche das Oberearbon im Norden und Süden begrenzen.

Auch der Einfluss der Querbrüche ist unverkennbar. Die Fortsetzung derselben Querverwerfung, welche im Lauenzgraben das Oberearbon abschneidet, bedingt weiter nördlich das Abbrechen der Permsholle von Klein-Kordin. In den zwischenliegenden Carbonbildungen macht sich diese Dislocation nicht weiter bemerklich.

Die westliche, jenseits dieser Querstörung liegende schmale Scholle des Oberearbon zwischen Straminger- und Oharnach-Alp zeigt im wesentlichen flache Lagerung und ist durch das Vorwiegen der verschiedenartigen Schiefer, Grauwacken und Conglomerate (letztere u. a. auf der Spitze des Waschbühel) ausgezeichnet. Die ersteren enthalten östlich und westlich von der Straminger Alp Versteinerungen: *Bellerophon* (*Stachella*) *Eduardia* aff. *toruacrusi* Ryckh. und *Derbyia* aff. *sevili*; Fusulinenkalke sind weniger verbreitet. Doch finden sich noch ganz im Westen an dem Querbruch der Oharnachalp die schwarzen Kalkbänke mit bezeichnenden Versteinerungen (*Bellerophon* [*Stachella*] sp. und Fusulinen) in steil aufgerichteter Stellung unmittelbar neben dem Silur.

Durch die in tektonischem Sinne als Längsgraben aufzufassende Triasscholle des Monte Germola wird der auch im Süden meist von Trias begrenzte Horst des Monte Pizzul von dem nördlichen Carbongebiet getrennt.

Das Oberearbon zeigt auch hier flache Lagerung und die gewöhnliche petrographische Beschaffenheit; Grauwackenschiefer herrschen vor, seltener sind Fusulinenkalke mit Versteinerungen. Thonschiefer mit *Spicophyton Suessi* und Quarzconglomeraten; die letzteren zeigen an der Foren di Pizzul ausnahmsweise schwarze Farbe und steile Schichtstellung. Auch die Brauneiseneisensteinschalen, welche an der Garnitzenhöhe und dem Radniker Sattel in Menge vorkommen, finden sich hier wieder. Eigenthümlich sind dem Oberearbon des Pizzul rothe thonige Nierenkalke, welche den Orthocerongesteinen des Silur ähneln.

ingraben

anze, 1500 u



o zwischen

rödener Sandst

hen Verhältnis

zu lesen ist. r

Im Westen überlagert das Oberearbon die grünen splitischen Mandelsteine des Culm, welche sich bis in die Nähe der Casa Pizzul erstrecken. Den sonst beobachteten Verhältnissen entsprechend dürfte die Überlagerung eine discordante sein; doch haben weder Herr von dem Borne noch ich bei der Untersuchungsung des westlichen Pizzulgehanges ein einigermaßen deutliches Profil entdecken können.

Besser sind die Anfschlüsse des Confingrabens. Man beobachtet in dem oberen wilden Theile des Baches, unterhalb von Casarotta ein Profil, in dem die schwarzen, vollständig zerrütteten Schiefer und verquetschten dunkelen Kalke des Oberearbon von weissem Triaskalk scheinbar überlagert werden. In Wirklichkeit sind beide durch den Bruch getrennt und stehen nebeneinander. Auch die Südgrenze des Carbon, die Verwerfung gegen die Trias des Monte Salinchiotto ist durch die Erosion gut aufgeschlossen. Man sieht vom linken Pontebana-Ufer, dass zwischen das nördlich liegende, dunkle Carbon und den weissen Schlierndolomit im Süden Fetzen und Schollen des Muschelkalks und (?) Grödner Sandsteins an unregelmässigen Rutschflächen und kleineren Brüchen eingekquetscht sind. Es sind dies also genau dieselben Erscheinungen, welche in grossartigerem Massstabe an der Möderndorfer und Achomitzer Alp beobachtet wurden.

Das Oberearbon des Monte Pizzul bricht im Confingraben an einem schräg und unregelmässig verlaufenden Querbruch ab, dessen Richtung grossentheils diejenige des Thales bedingt. Weiter oben durchbricht der Bach theils in sehrägem, theils in nordsüdlichem Laufe die vom Roskofel zum Monte Gernula hinüberstreichende Mauer des Triaskalks.

Auch diese eigenthümliche Thalbildung ist wohl kaum durch rückschreitende Erosion zu erklären; hier sowohl, wie im Bombaselgraben dürften die Thäler älter sein, als die jetzigen Oberflächenformen der Berge. Nach der neueren Nomenclatur ist das Thal als ein epigenetisches zu bezeichnen.

*) Es könnten auch Werfener Schichten sein; ich habe die Stelle nur vom anderen Ufer gesehen und konnte dieselbe infolge des Regens und der Höhe des Baches nicht in situ untersuchen.

3. Das ultracarbonische Eruptivgebiet des Monte Dimon.

Südlich von dem durch den Pollinigg-Bruch abgesehnutenen Obersilar breitet sich ein ausgedehntes Gebiet aus, das theils aus normalen, theils aus eruptiven Culmgesteinen besteht. Im Süden desselben bilden die, auf den abradirten älteren Falten flachlagernden Grüdener Sandsteine die geologische und oroplastische Grenze der Karnischen Hauptkette. Einige Reste von Grüdener Mergeln finden sich auf dem Monte Panlaro und Monte Dimon; dieselben sind hier durch spätere Gebirgsbewegungen in die Culmgesteine eingefaltet, folgen dem Streichen derselben und haben in Folge des Druckes eine vollkommen schiefrige Beschaffenheit angenommen.

Die Aufnahme des Gebiets wurde durch den raschen Gesteinswechsel von eruptiven Bildungen, verschiedenartigen Tuffen und normalen Sedimenten ebenso erschwert wie durch die Ungenauigkeit der Karten (Fehlen der Isohypsen, Höhenangaben und Wege) auf italienischem Gebiet. Ausserdem wurde ich fast bei sämmtlichen in dem vorliegenden Gebiete gemachten Excursionen derart durch Nebel gehindert, dass es fast unmöglich war, die Ergebnisse der einzelnen Tage mit einander in Beziehung zu bringen.

Auf der Karte sind unter der rothen Farbe sämmtliche Gesteine eruptiven Ursprungs zusammengefasst; es sind dies spilitische Mandelsteine, welche die bei weitem überwiegende Masse der vulkanischen Gesteine darstellen, quarzföhrnde, feldspathreiche Porphyrite, schiefrige Diabase (in dynamometamorpher Umwandlung¹⁾ Schalsteineonglomerate und Tuffe. Vielleicht sind am Monte Dimon selbst einige, besser als Grauwackengestein zu bezeichnende grüne Schiefer mit durch die Eruptivfarbe bedeckt. Die Untersuchungen des Herrn Dr. MILCH haben ergeben, dass mikroskopisch die grünen sedimentären Schiefer des Monte Panlaro von den ebenso gefärbten geschieferten Diabasen und Mandelsteinen derselben Gegend kaum zu trennen sind; dasselbe gilt für den braunen Porphyrit der Costa Robbia und

¹⁾ Nach den Bestimmungen des Herrn Dr. MILCH, dessen ausführliche Beschreibung sich in dem petrographischen Anhange findet.

die Sedimente dieses Fundortes. Doch ist bei dem erheblichen Vorwiegen der spilitischen Mandelsteine der Fehler nicht sehr ins Gewicht fallend.

Am deutlichsten heben sich die in schroffen Felswänden abbrechenden Eruptivgesteine aus den, sanftere Bergformen zeigenden Schiefen im Süden der Promosalp ab. Im übrigen vermochte ich nur durch eine Anzahl paralleler Begehungen, die im Folgenden kurz beschrieben werden mögen, die erforderlichen Anfschlüsse zu gewinnen.

Den Ausgangspunkt der die beiden Abhänge des Carfj-Thales betreffenden Exeursionen bildet die obere Promosalp, wo der Culmschiefer durch die unregelmässig aufgequetschte Antiklinale des Clymenienkalkes (vergl. unten) von den eingelagerten Eruptivmassen getrennt wird. Der Sattel, über den ein Fusssteig in östlicher Richtung zur Cerevesa-Alp hinüberführt, bezeichnet die geologische Grenze zwischen dem Porphyrit bezw. dem Schalsstein mit zerquetschten Kalkgeschichten und rothen Eisenkieseln einerseits sowie dem normalen Culmschiefer andererseits. Der letztere streicht NW (bis WNW) bis SO, zeigt steiles Nordfallen oder saigere Schichtenstellung und begleitet den Weg bis zu der Schluffanhäufung, auf welchem die Alp Stna di Raina steht. Die zahlreichen Bruchstücke rothen Orthocerenkalkes, die man am Wege findet, stammen aus dem vom Elferspitz und Hohen Trieb hinüberstreichenden Zuge, dessen Verlauf auch hier noch im kleinen verschiedene Knieke und Biegungen zeigt. An dem gegenüberliegenden linken Bachufer, an der Holzklause von Stna di Raina tanzen diese Obersilurgesteine unter dem Gehängeschutt auf; man beobachtet an dem guten, nach Paularo führenden Alpwege 1. graue schiefrige, mit Schiefen wechsellagernde Kalke Str. NW (bis WNW)—SO Fallen steil NO; 2. graue Crinoidenkalk, sehr wenig mächtig mit unbestimmbaren organischen Resten, vielleicht ein eingefalteter Fetzen von Unterdevon; 3. rothe und graue kalkige Schiefer; 4. rothen Kramenzelkalk. Nach einer längeren aufschlusslosen Strecke beobachtet man Thonschiefer und Kieselschiefer (Str. NW—SO) mit Lagen von grauem, halbkrySTALLINEM Kalk. (Die an sich untergeordneten Schieferzüge sind kartographisch nicht angeschlossen, da ihre Verbreitung an dem dicht bewal-

deten, weglosen und schlecht aufgeschlossenen Gehänge des Monte Gémula (non Zernula) ohnehin nicht verfolgt werden konnte.

Die Grenze gegen das Carbon ist ebenfalls wegen mangelnder Anschlüsse und Aehnlichkeit der Schiefergesteine nicht festzustellen. Die flachgelagerten Thonschiefer, welche an der Stelle anstehen, wo der Weg den Rivo Tamai kreuzt, fallen jedoch mit grosser Wahrscheinlichkeit dem Obercarbon zu.

Unmittelbar darauf folgt, von den Schiefen wahrscheinlich durch eine untergeordnete Verwerfung getrennt, eine Serie eruptiver Schichten, an deren Gleichartigkeit mit den Gesteinen des Monte Dimou nicht zu zweifeln ist. Doch sind beide durch die normalen Culmgesteine des Chiarso-Cañons von einander getrennt. Am Wege nach Paularo herrschen grüne (zweilen röthlich gefärbte) spilithische Mandelsteine vor, die bis zum Torrente Rufoso (Rufuseo) durchstreichen; in geringerer Ausdehnung finden sich schiefrige Diabase, grüne, kalkreiche Schalsteine mit Mandelsteingeröllen und Quarzadern sowie grüne Schiefer. Der untercarbonische schiefrige Diabas, der an der Südgrenze ansteht, wird vor den ersten Häusern von Paularo discordant von den flach S fallenden Bänken des Grödener Sandsteins bedeckt; letzterem sind Mergelschichten mit Knollen und Lagen von grauem Kalk eingelagert.

Eine zweite Begehung führte mich von der Promosalp auf dem linken gegenüberliegenden Ufer des Chiarso nach Treppo Carnico. Zwischen dem Cerevesa Joeh und der Alp Fontana fredda folgt man fast genau der Grenze des Culmschiefers (Fallen steil SW) und der grünen bezw. grauschwarzen Porphyrite. Die Kieselschieferconglomerate des Culm enthalten Gerölle von rothem Silurkalk. Von Fontana fredda nach der Casa Dimou in Cima und di Mezzo führt ein guter (auf der Karte nicht angegebener) Weg zuerst über Schlutt, dann über grünlichen Thonschiefer und Kieselschiefer. Vor der Casa Culet springt der silurische Kalkzug des Hohen Trieb mit einer kilometerlangen SSW gerichteten Querverschiebung in das Culmschiefergebiet vor. Auch die Culmkieselschiefer

sind aus ihrem gewöhnlichen Streichen (NW—SO) in das der Querverschiebung (SSW—NNO) umgebogen und fallen steil nach dem Bruche zu (OSO). Hingegen streichen die roth und grau gefärbten, theils schiefrig, theils kramenzelartig ausgebildeten Silurkalke NW (bis NNW)—SO und stehen saiger. Das weichere Gestein ist also von dem härteren in seiner Richtung beeinflusst.

Unmittelbar südlich der Casa Culet biegt der Weg wieder in den Culmschiefer zurück (Str. NNW—SSO Fallen steil ONO oder saiger); letzterer hält bis in die Nähe der Costa Robbia an. Im Rivo Maggiore weisen zahlreiche Blöcke von Grödener Sandstein neben weniger häufigen Eruptivgeröllen auf die relative Verbreitung dieser Gesteine am Monte Dimon hin. An den Costa Robbia führt der Weg noch eine kurze Strecke durch schmutziggelben Porphyrit, der vom Grödener Sandstein bedeckt wird.

Einen Einblick in die verwickelte Zusammensetzung der Eruptivbildungen des Monte Dimon gewinnt man durch eine Wanderung, die von Tischlwang über die Höhe des Kammes und durch das Mauranthal nach Treppo Carnico führt. Beim Aufstieg durch das Thal des Rivo Moscardo beobachtet man zunächst normalen Culmschiefer, dann folgen dunkle Glimmergrauwacken und grüne, grauwackenartige Schiefer, die den Uebergang zu den schiefrigen Eruptivgesteinen zu vermitteln scheinen und den Abhang bis weit hinauf zusammensetzen. Die grünen Sedimente vom Monte Paularo ähneln gewissen Spiliten und geschieferten Diabasen bei makroskopischer Betrachtung ausserordentlich und sind daher bei der geologischen Aufnahme vielleicht nicht immer richtig abgetrennt worden. Trotzdem vermochte Herr Dr. Mulu bei der mikroskopischen Untersuchung keinen Uebergang zwischen den „pseudoeruptiven“ Sedimenten und den Eruptivgesteinen zu finden. Vor dem Gipfel des Monte Paularo sind zwei schmale Züge von Grödener Sandstein in den Culm eingefaltet. An dem Gipfel des genannten Berges findet sich ein z. Th. grünlich z. Th. röthlich gefärbter Porphyrit, der mit Tuffen unmittelbar zusammenhängt; der eigentliche Gipfel besteht aus röthlichem Schalsteineonglomerat (mit Geröllen von Porphyrit und splitischem Mandelstein).

Auf dem, in östlicher Richtung zum Monte Dimon verlaufenden Kamm finden sich wieder Grödener Mergel (roth und grün), die mit NW—SO Streichen und saigerer Schichtenstellung eingefaltet sind und vollkommen Schiefercharakter angenommen haben. Darauf folgt nach O:

1. Grünlisches oder röthliches Schalsteineonglomerat mit Geröllen von spilitischem Mandelstein. (Dies Gestein stimmt äusserlich durchaus mit Nassauer Vorkommen [Dillenburg, Haiger] überein, die z. Th. auch dem Ulm angehören.
2. Dichter grüner Spilit (ohne Mandeln, im mikroskopischen Gefüge mit den Mandelsteinen übereinstimmend.) Derselbe verwittert in schroffen Zaeken, während der eigentliche
3. aus rothem und grünem Grödener Schiefer bestehende Gipfel eine flache abgerundete Form besitzt und vollkommen mit Gras bewachsen ist.

Beim Abstieg in südlicher Richtung fand sich an einem kleinen, auf der Karte nicht verzeichneten See

4. grünes und rothes Ulmeonglomerat mit Geröllen von spilitischen eisenhydroxydreichen Mandelsteinen, von Quarz und sericitreicherem sowie sericitärmerem Sandstein; auch der letztere ist theilweise von Eisenhydroxyd durchtränkt.

Am Südrhang findet sich ferner die letzte, wenig ausgedehnte Einfaltung von Grödener Sandstein. (Dieselbe konnte nicht eingefragen werden, da Nebel und die Engenartigkeit der Karte die Orientirung erschwerte.)

Der Eruptivzug des Dimon ist durch das Vorkommen von quarzhaltigem, Feldspat führenden Porphyrit ausgezeichnet, während der metamorphe Diabas mit Biotitblättchen bisher nur im Osten, am Torrente Chiarso gefunden wurde. Spilitische Mandelsteine sind in beiden Zügen das vorherrschende Eruptivgestein.

Im obersten Mauraenthal steht grüner Schiefer an, der neben dem erwähnten Grödener Sandstein NNW—SSO Streichen bei saigerer Schichtenstellung zeigt. Im mittleren Theile des

Thales erschweren Vegetation und Schuttbedeckung die Beobachtung, so dass die Grenze hier nicht mit voller Sicherheit festgestellt werden konnte; im unteren Thale finden sich bereits wieder Cahngrauwacken, die auf Klüften stellenweise Malachitheschläge zeigen. Der discordant auflagernde Grödener Sandstein zeigt einige tektonische Unregelmässigkeiten; unmittelbar an der Gesteingrenze beobachtet man einen, durch untergeordnete Verwerfungen bedingten Wechsel von a) Grauwacke, b) Grödener Sandstein, c) Grauwacke (ein schmaler WNW—OSO streichender Streifen), d) Grödener Sandstein. Das letztere Gestein fällt an der Mauranbrücke bei Treppo Carnico steil nach SW ein.

In dem nächsten Parallelgraben des Rivo Mauran, dem Rivo Pit ist in das grüne Eruptivgestein ein Fetzen von kohligem Schiefer eingequetscht, der bei den Bewohnern von Ligosullo vergebliche Hoffnungen auf Steinkohlen erweckt hat. Wenn man in dem Thal des genannten Baches eine gute halbe Stunde steil aufsteigt, so erscheint unmittelbar in Liegenden des Grödener Sandsteins die erste etwa 4 m mächtige Lage von schwarzem, kohligem Schiefer. Derselbe fällt unten 45° nach SO. Weiter oben trifft man das grüne, stark zersetzte Eruptivgestein, welchem eine 12 m mächtige Schieferpartie in unregelmässiger Weise eingefaltet ist. Fallen und Streichen konnte wegen der vollständigen Zerquetschung dieser Kohlschiefer nicht festgestellt werden. In dem Schiefer kommt ein etwa Centimeter starkes Schmitzchen brüchlicher anthracitischer Kohle vor. Weiter aufwärts trifft man nur Eruptivgestein an.

4. Das Westende des Hochwipfelbruches und die Querverwerfungen des Incarajothales.

Das tiefere Silur der Karnischen Hauptkette, die Mauthener Schichten, sind durch einen regionalen Facieswechsel zwischen Kalk, Schiefer und grauwaekenartigen Gesteinen ausgezeichnet: Im Osten, sowie vor allem in den angrenzenden Karawanken sind die Grauwaeken verbreiteter als die auf den Nordrand beschränkten Schieferzüge. Am Osternigg gewinnt allmählig der Kalk die Oberhand und am Po-

ludnigg sowie im Durchsehnitt des Garnitzengrabens findet sich dieses Gestein ansschliesslich. Allerdings ist hier durch tektonische Vorgänge die Breite der Silurzone ausserordentlich verringert. Doch besteht noch der ganze Nordabhang des Schwarzwipfels aus halbkristallinem, zuweilen schwarz und weiss gebändertem Kalk und Kalkphyllit. Derselbe streicht bei Tröppelach in westnordwestlicher Richtung an dem O—W verlaufenden Nordabhang des Gebirges aus, ohne dass von einer eigentlichen Wechsellagerung die Rede sein könnte. Beim Anstieg durch den Oslitzengraben beobachtet man z. B. Kalkphyllit, der in spitze, saiger stehende Sättel und Mulden zusammengeschoben ist. Weiter im SO ist an einer Stelle im Bachbett die Grenze gegen den im S folgenden Silurschiefer (bei dem Höhepunkte 1033 m) entblösst. Der Kalk ist gequetscht, zertrümmert und von zahlreichen Sprüngen durchsetzt, obwohl an der ursprünglichen concordanten Aufeinanderfolge beider Gesteine wohl kein Zweifel bestehen kann. Es handelt sich also um eine Dislocation, die nur durch die sehr verschiedenartige Härte der Gesteine bedingt und für den tektonischen Aufbau des Gebirges ohne besondere Bedeutung ist.

Zudem folgt der Hochwipfelbruch, von dem das oben beschriebene System untergeordneter Sprünge abgesplittert ist, in geringer Entfernung weiter im S.

Am Hochwipfel selbst und westlich etwa bis zum Kernitzelgraben besteht der ganze Nordabhang des Gebirges aus silurischem, saiger stehendem Thonschiefer mit untergeordneten Granwaeken- und Kieselschieferbänken. Im Bach zwischen Tröppelach und dem Ederwiesele findet man auch ein aus Brocken von Kieselschiefer, Granwaeke und Thonschiefer bestehendes Silurenglomerat. Von silurischem Kalk habe ich hier weder bei zahlreichen Durchquerungen des Gebirges noch bei der Untersuchung der ausgedehnten Schuttkegel (Dobernitzen, Strainger Graben) eine Spur gefunden.

Die Feststellung des Bruches wird dadurch erleichtert, dass auf einer über 14 km langen Strecke zwischen Schwarzwipfel und Waschlthel die im Süden abgesunkene Scholle aus Oberearbon besteht. Wo in dem letzteren, wie zwischen Hochwipfel und Schulterkofel die Fusulinenkalke vorkommen, stellt sich der Bruch mit einer modellartigen Deutlich-

keit dem Auge des Beobachters dar. Auch der rein landschaftliche Gegensatz zwischen den grünbewachsenen, sauft aufsteigenden Schieferhöhen und den Wänden des flach gelagerten Kalkes ist höchst eindrucksvoll. Als drittes, abweichendes Element folgen weiter südlich die Abstürze des schichtunglosen Triasdolomites. (Vergl. das Lichtbild III.)

Zwischen Oharnachalp und Waschbühl wird die grosse Längsverwerfung durch einen Querbruch abgeschnitten.

Zwischen Feldkogel und Würmlacher Alp sind die Mauthener Schichten wiederum durch grössere Häufigkeit der Kalkeinlagerungen ausgezeichnet. Dieselben verstärken sich nach O zu in etwas unregelmässiger Weise, bis an der Mauthener Alp ein ähnliches Maximum, wie am Poludnigg zu beobachten ist. Den landschaftlichen Charakter des Gebirges beeinflusst die grössere oder geringere Häufigkeit der Kalkeinlagerungen kaum in irgendweleher Weise. Die gerundete Form der waldbedeckten Schieferberge ist auch für die geschichteten Kalke bezeichnend. Nur hier und da erinnern hellere Wände und weisse Schutthalden an das Vorkommen eines widerstandsfähigeren Gesteines. Oberhalb der Baumgrenze heben sich die Kalkzüge naturgemäss deutlicher ab. Die prächtigen Buchenwäldungen, welche den unteren Theil des Gehänges (bis ca. 1400m) bedecken, sind nicht auf den Kalk beschränkt.

Die Eintragung der meist wenig beständigen Kalkzüge beruht auf zahlreichen Durchquernngen des Gebietes. Einige Auszüge aus meinen Tagebüchern mögen die Darstellung der Karte erläutern:

A) Durchschnitt von Kirchbach zum Inearjothal. Ueber den Schuttkegel und die deutlich ausgeprägte Terrasse empor zum Straninger Alpweg: Thonschiefer des Untersilur Streichen NW (bis NNW)—SO, Fallen steil NO oder sniger. Der Kalkzug des Feldkogel, der östlichste von allen streicht nur in einer Breite von 4—5 m zum Weg hinab und keilt hier ganz aus. (Auf der Höhe des Feldkogels sind die zu dem Kalkzug gehörenden, fast durchweg sniger stehenden Silurgesteine vortrefflich aufgeschlossen; man beobachtet von N nach S: 1. Graue Thonflaserkalke. Streichen NNW—SSO. 2. Thonschiefer, von 1. durch eine untergeordnete Dislocation getrennt.

3. Rothen Kramenzelkalk. 4. Thon- und Kieselschiefer. Streichen WNW—OSO. 5. Auf der zweiten Kuppe breccienartiges Conglomerat; Brocken von Kieselschiefer, Grauwacke und Schiefer in Schiefermasse. Streichen WNW—OSO. Fallen sehr steil N. 6. Auf der dritten Kuppe: Thonschiefer. Streichen W—O, saiger. 7. Conglomeratschiefer. 8. In der Einsenkung südlich von der dritten Kuppe: schwarzen, weiss verwitternden Kieselschiefer. 9. Thonschiefer. 10. Kieselschiefer. Das Durchstreichen der Schichten zu der gegenüberliegenden Buehaeber Alp ist deutlich verfolgbar.)

Das durchweg flach gelagerte Carbon (mit einer Dolomitschieht südlich der Straninger Alp) liegt als regelmässiger Graben zwischen dem Silur des Nordens und Südens. Der südliche Rosskofelbruch verläuft auf dem rechten Ufer des Marehgrabens, dessen westnordwestlicher, beinahe mit der Kammhöhe zusammenfallender Verlauf unmittelbar durch die Dislocation bedingt erscheint. Das Obersilur im Süden besteht zunächst am Bruch aus rothem Kramenzelkalk mit Orthoeceren; an der Umbiegung des Bruches unweit der Alphütte Pittstall wird der ausspringende rechte Winkel von Kieselschiefer gebildet. Weiter folgt im Süden schwarzer Kalk mit verkieselten Crinoiden und an der Alphütte Meledis Thon- und Kieselschiefer (NNW—SSO, saiger) nebst Kieselschieferconglomerat und Grauwacke. Die Wechsellagerung dieser beiden Gesteine, deren genaue Wiedergabe auf der vorliegenden Karte undurchführbar ist, kennzeichnet das Obersilur bis zur Oharnaehalp.

Den Abstieg zur Hütte Stua di Raina unternahm ich durch einen steilen Graben, der vortreffliche Aufschlüsse, aber auch mehr als genügende Gelegenheit zum Klettern bot. Die Aufeinanderfolge von N nach S ist: 1. Orthoecerenkalk (an der Thörlhöhe und dem Findenigkofel. 2. Schiefer (Cnsa Meledis). Die dunkle kohlige Beschaffenheit dieser Gesteine macht es wahrscheinlich, dass die Graptoliten TARAMELLI's von hier stammen; leider blieb mein Suchen erfolglos. 3. Orthoecerenkalk, grau, z. Th. roth, meist kramenzelartig ausgebildet. Streichen NW (bis WNW)—SO, Fallen steil NO oder saiger. 4. Graptolithenschiefer steil NO fallend, verschwindet unter dem Gehängesehutt der Stua di Raina. Die Horizonte 1 und 4 sind einheitlich zusammengesetzt und viel mächtiger als 2 und 3.

Die beiden letzteren sind besser als eine überaus mannigfache Wechsellagerung von Kalk, Kieselschiefer, Thonschiefer und Grauwacke aufzufassen so zwar, dass in 2 die Schiefer, in 3 die Kalke überwiegen.

Noch weiter südlich erreichen im Cañon des Torrente Chiaro die Kalke (3.) eine, wohl auf Schuppenstructur zurückführbare, bedeutende Mächtigkeit.

B) Durchschnitt Nöblinger Graben—Oharnachalp. Man beobachtet an dem von Dellach ausgehenden Alpweg: Nahe der Mündung einen breiten Zug grauer, dichter klüftiger Kalke (der zum Feldkogel nach SO durchstreicht). Weiter Thonschiefer mit Einlagerungen quarzitischer Grauwacke, tief-schwarzen dünn-schieferigen Thonschiefer mit einzelnen Kalkknollen (NW—SO saiger) und einen zweiten Zug von dichten, grauen und röthlichen Thonflaserkalken.

Weiter aufwärts quert ein dritter, schmaler Zug von grauen und rothen Kramenzelkalken den Bach; an der Vereinigung der beiden Quellbäche steht kieselig Thonschiefer (NW—SO) an. Die vierte Einlagerung, schwarzer Kalk und grauer Kramenzelkalk (NNW—SSO, saiger), beobachtet man in dem westlichen Thal, das in seinem oberen Theile noch Andeutungen eines fünften nach O zu ausgehenden schmalen Zuges von Kramenzelkalk zeigt. Die herrschenden Gesteine in dem Sammeltrichter des Nöblinger Baches nördlich von Kollen Dianl (Collen dianl Thörl G. St. K.) sind kieselige Thonschiefer, Kieselschiefer und Grauwacke; dieselben ziehen östlich bis zur Oharnachalp durch.

Hier keilt der WNW-streichende aus rothem, hellem Kramenzelkalk und schwarzgrauem Eisenkalk bestehende Zug des Findenigkofels aus und erleidet vorher noch eine an sich unbedeutende, aber gut zu beobachtende Dislocation. Der sehr steil SSW fallende Kalk ist im Liegenden von schwarzem, kohligem Kieselschiefer, im Hangenden von Thonschiefer begrenzt; der westliche Theil des Zuges ist um etwa 200 m abgesunken und gleichzeitig nach N verschoben. Im Vordergrund des Bildes erscheinen die N fallenden Schichtköpfe des nun einen viel bedeutenderen Betrag abgesunkenen Oberearbons; beide Querbrüche verlaufen in NNO Richtung.

Auch auf dem Südabhang des Findenigkofels keilen die Kalkzüge nach Westen zu aus; der nördliche derselben, welcher die unmittelbare Fortsetzung des die Höhe des Findenigkofel bildenden Lagers darstellt (1 im Durchschnitt A) enthält im Westen verkieselte Riffkorallen des Obersilur (*Actinostroma*, *Heliolites*, *Cyathophyllum*; vergl. den stratigraphischen Theil). Mangelhaft erhaltene Orthooceren sind in den Kramenzel- und Eisenkalken der Oharnachalp und des Findenigkofels allgemein verbreitet, wie schon STRUB erkannt hat.

C) Durchschnitt Kronhofgraben—Hoher Trieb. Im




Abbildung 25.

Der Findenigkofel.

unteren Theil des Grabens steht auf dem rechten Ufer grauer klüftiger Kalk an — das Ende des Feldkogelzuges. Dann Thonschiefer (WNW—OSO, saiger) und weiter aufwärts eine Einlagerung von grauem oder schwarzem wohlgeschichtetem Kalkstreich (WNW—OSO, Einfallen steil SSW (= 2. Kalkzug des Nöblinger Grabens). Unterhalb der beiden verfallenen Sägemühlen beobachtet man in einem Seitengraben wieder Schiefer, der unregelmäßig, schmitzenartig in den Kalk hineingepresst ist. Der dritte, schmalste Zug besteht aus grauem Thonflaserkalk und streicht zum oberen Quellarm des Nöblinger Grabens durch.

Dann kreuzt man einen breiten, aus grauen und rothen Kramenzelkalken bestehenden Zug und betritt weiterhin einen Abschnitt des Bachlaufes, in dem das rechte Ufer aus typischen rothen Orthocerenkalken, das linke aus ebenso bezeichnenden Cullngesteinen, Thonschiefern, Kieselschiefern und Kieselschieferconglomeraten besteht. Die Altersdeutung kann um so weniger einem Zweifel unterliegen, als die hier anstehenden Schiefer die Fortsetzung des palacontologisch (Promosalp) und stratigraphisch (Ueberlagerung des Clymenienkalkes) wohl gekennzeichneten Angerthaler Culmes bilden.

Das Bachbett entspricht also einer z-förmigen, nach SSW gerichteten Umknickung des Kramenzelkalkzuges.

Diese eigenthümliche, bruchlose Umbiegung eines immerhin ziemlich breiten Kalklagers lässt sich beim Durchwandern des Thales nicht deutlich übersehen. Jedoch konnte ich bei einer Begehung des Schieferkammes zwischen Dreischneidenspitz (Köderhöhe der G. St. K. 2281 m) und Skarnitzen-Hütte den eigenartigen Verlauf des Kalkzuges auf das genaueste beobachten. Die Farbe und die Verwitterungsformen des beiderseits von dunkelrother Schiefer begrenzten Kalkes lassen über die Abgrenzung um so weniger Zweifel, als gerade die wichtigsten Punkte waldfrei und nur mit spärlichem Graswehns bedeckt sind.

Nach der südwärts gerichteten Umbiegung streicht der Orthocerenkalk zum Hohen Trieb, dessen Gipfel er bildet und weiter zum Chiarso-Thal durch. (Vergleiche die Landschaftsskizze Hoher Trieb und Monte Dimon.) Auch die kleinen auf der Karte wiedergegebenen Knickungen des Kalkzuges heben sich deutlich ab. An dem auf halber Höhe des Berges hinführenden Steige beobachtet man etwas westlich von der Alp Peccol di Chianl die untenstehend wiedergegebene Einquetschung von Cullngestein zwischen die Schichten des Silurkalkes. Südlich von Peccol di Chianl erfolgt eine stumpfwinkelige Rückbiegung nach N, die allerdings den Betrag der Umknickung im Kronhofgraben nicht erreicht. Immerhin ist die ganze Erscheinung als Heranspressung eines Gebirgssegmentes unter dem Einflusse einer von NNO nach SSW wirkenden Kraft aufzufassen. Eine gleiche Deutung erfordert die winkelig umgrenzte silurische Kalkmasse am Westabhang des Monte Germinla. Im allgemeinen werden unter dem Einflusse

derartiger Kräfte „Blattverwerfungen“ zu Stande kommen, wie sie Stuess von Wildkirehli am Säntis und von Wiener Neustadt beschreibt. Man könnte die hier beobachtete Erscheinung als „Blattverschiebung“ in Gegensatz zur „Blattverwerfung“ stellen. Naturgemäss werden die Vorbedingungen für die beschriebene tektonische Erscheinung selten gegeben sein. Dieselbe dürfte nur dort zur Ausbildung gelangen, wo eine steilgestellte, härtere, aber immerhin nicht gänzlich starre Schicht (der Kramenzelkalk ist ziemlich thonreich) von plastischeren Gebirgsgliedern eingeschlossen und unter allseitiger Belastung befindlich ist.

Wie schon bemerkt, bildet der mannigfach verbogene Silurzug




Abb. 27.

Einquetschung von Culm,

(dunkel) in Silur (hell) westlich von Peccol di Chisol.

Die weiteren Umbiegungen und Knickungen in der Plöckener Gegend werden im nächsten Abschnitte zu behandeln sein.

Die theoretische Erklärung der theils längs, theils quer zur Gebirgsrichtung verlaufenden Dislocation ist keineswegs leicht. Auf Grund des Kartenbildes würde es naheliegend erscheinen, das staffelförmige (Kronhofbaeh und Casa Culet) Vordringen des Silurs nach Süden als eine Aufschiebung der älteren auf die jüngeren Bildungen zu deuten.

Dieser Annahme scheint jedoch die Abb. 26 auf Seite 72 zu widersprechen, welche das einzige deutliche Profil des Silurzuges enthält. Der Kalk fällt scheinbar mit etwa 45° unter den Culmschiefer ein, und zwischen beiden fehlt die ge-

zug Chiassothal—Eiferspitz die Grenze zwischen dem Culm und dem älteren Palaeozoium des Nordabhanges der Hauptkette; weiter westlich, am Pollinigg, wird das Obersilur durch Unterdevon ersetzt. Hier beeinflusst die schon beschriebene Dislocation am eindrucklichsten die Form der Berge und mag daher als „Polliniggbruch“ bezeichnet werden.

Die

weiteren Umbiegungen und Knickungen in der Plöckener Gegend werden im nächsten Abschnitte zu behandeln sein.

Die theoretische Erklärung der theils längs, theils quer zur Gebirgsrichtung verlaufenden Dislocation ist keineswegs leicht. Auf Grund des Kartenbildes würde es naheliegend erscheinen, das staffelförmige (Kronhofbaeh und Casa Culet) Vordringen des Silurs nach Süden als eine Aufschiebung der älteren auf die jüngeren Bildungen zu deuten.

Dieser Annahme scheint jedoch die Abb. 26 auf Seite 72 zu widersprechen, welche das einzige deutliche Profil des Silurzuges enthält. Der Kalk fällt scheinbar mit etwa 45° unter den Culmschiefer ein, und zwischen beiden fehlt die ge-

Monte Dimon

Cerevesa Joch

Hoher Trieb (2200 m.)



Abbildung 26.

Nach einer photogr. Aufnahme des Verf. ges. von O. Berner.

Monte Dimon und Hoher Trieb von O.

Das Gebiet zwischen Monte Dimon und Cerevesa Joch besteht aus untercarbonischen Diabasen, Porphyryten und Mandelsteinen, auf der Spitze des Dimon liegt Größener Sandstein. Die Mitte des Bildes zwischen Cerevesa Joch, Hohem Trieb, dem Buchstaben S und der Tiefe des Thaies besteht aus Caimmelstein, der Vorlagerung aus oberer Permianer Schiefer, der Nordabhang des Hohen Trieb aus oberer Permianer Orthoceraskalk (OK). Zwischen Oberer Permianer und Caimm liegt der Pollinger-Brunnen.

samte Mächtigkeit des Devon. Aus dem Einfallswinkel des Bruches könnte man schliessen, dass der Culm durch einen schräg verlaufenden Senkungsbruch abgeschnitten sei. Dem widerspricht jedoch der eigenthliche, nur durch Faltung erklärbare Verlauf des Silurzuges. Ausserdem stehen, wie die Messungen ergaben, die Schichten am Hohen Trieb ganz oder annähernd senker; der scheinbar geringere Betrag des Einfallswinkels herrht auf dem schrägen Streichen des Kalkzuges über den Abhang.

Man muss also doch auf die Ueberschiebung zurückergreifen und sich vorstellen, dass das Devon zuerst eingefaltet und dann vom Silurschiefer überschoben wurde. Eine ähnliche Erscheinung werden wir weiter westlich am Rathhanskofel wiederfinden; nur ist bei letzterem die tektonische Bewegung in kleinerem Massstabe erfolgt.

Ein ursprüngliches Fehlen des Devon anzunehmen, ist bei der mächtigen Entwicklung dieser Formation im Osten und Westen unmöglich. Zwischen den beiden plastischen, aus Schiefer bestehenden Widerlagern konnte dann der Silurkalkzug seine eigenartig gewundene Form annehmen.

Auch während der miocaenen, durch Brüche gekennzeichneten Gebirgsbildung folgten in unserem Gebiet die Dislocationen zum Theile der NNO-Richtung. Der Abbruch des Oberearbon an der Ohornachalp und im Lanzengraben sowie die grosse, die jüngeren Bildungen abschneidende Störung am Monte Germula weisen darauf hin, dass die uralte carbonische Dislocationsrichtung in späterer Zeit wieder anflehte.

Zusammenfassung von Kapitel I und II.

Die Triasplatte der Westkarawanken und östlichen Karnischen Alpen kann als ein, der Hauptrichtung des Gehirges folgender Längsgraben aufgefasst werden, dessen nördliche und südliche Begrenzung sehr verschieden ist. Die Julischen Alpen sind eine Scholle mit flach gelagerten Schichten, die am Nordabfall eine regelmässige Folge der Trias erkennen lässt; die südlichen Karnischen Alpen sind so weit abgesunken, dass der Schlierdolomit derselben im allgemeinen neben den Werfener Schichten der Julischen Alpen liegt. Der

Betrag der Grabensenkung ist im N grösser als im S. Allerdings ist die nördliche Dislocation nicht nur durch Absinken der Triasplatte sondern vor allem durch erneuerte Aufwölbung der älteren Palaeozoischen Bildungen entstanden. Im Osten bildet ein einfacher Bruch die Grenze von Silur und Trias; weiter westlich schieben sich zwischen die beiden Hauptformationen untergeordnete Horste und Gräben ein, so dass ein staffelförmiger Abbruch entsteht. Etwa 10 Kilometer weiter im Westen werden durch Querbrüche die jüngeren Formationen abgeschnitten.

Graphisch werden die soeben geäusserten Ansichten durch die beiden schematischen Durchschnitte Osternigg—Uggwagraben und Hochwipfel—Monte Germula veranschaulicht






Abbildung 26.

Nach einer photogr. Aufnahme des Verf. gez. von O. Berner.

Das Gailthal und die Karnische Hauptkette von den Vorhöhen des Reliekofels.

Die dunkel gefärbten Berge bestehen mit Ausnahme des Lantachock (Talmischler) aus eifrisches Schiefer und eingelagerten Kalken. Die devonischen Kaltriffe der Pollingitz, Kölln, Gamskofel und Pfenge sind weiss gelassen. Die Glacial-Terrasse, die Fortsetzung des Lessacher Thalbodens hebt sich im Westen deutlich ab.

III. KAPITEL.

Das Hochgebirgsland der devonischen Riffe.

(Silur, Devon, Culm.)

Im Herzen der Karnischen Alpen fehlen die jüngeren, nach der mitteleuropäischen Faltung gebildeten Formationen so gut wie vollständig; das ganze Gebiet besteht aus altpaläozoischen Gesteinen, deren verwickelter Faltenbau durch die energische Denudation des Hochgebirges freigelegt ist. Wie an einem geschickt präparirten und injicirten anatomischen Objekt sind die Grundzüge wie die feineren Einzelheiten des inneren Baues mit plastischer Deutlichkeit wahrnehmbar. Die Rolle der injicirten Flüssigkeit übernimmt die Vegetation, welche den Gegensatz der reinen Kalk- und Schiefergesteine schärfer hervortreten lässt.

Der geologische Bau und die oroplastische Form unseres Gebietes wird in erster Linie durch die devonischen Riffe bedingt, welche unregelmässig in die älteren und jüngeren Schiefer eingefaltet, zuweilen auch durch Querbrüche abgeschnitten sind. Die Berggruppen des Pollinigg, der Kellerwand und des Hochweissteins bestehen aus devonischem Riffkalk und heben sich durch Farbe und Form scharf von den Schieferhöhen ab (Abb. 26); nur der Zug der Steinwand setzt sich aus grünem, z. Th. aus Eruptivmaterial bestehendem Quarzit zusammen, dessen Gebirgsformen etwas an die des Kalkes erinnern. Doch kennzeichnet die dunkelgrüne Farbe (Cresta Verde) das Gestein als eigenartiges Gebilde.

1. Der Pollinigg.

Der O—W verlaufende Kamm des Pollinigg besteht aus devonischen, fast versteinungsleeren Riffkalcken, die im Grossen und Ganzen ungeschichtet sind, zum Theil jedoch ein

flach südliches Einfallen zeigen. Dieselben scheinen im Süden unter den steil stehenden Culmschiefer des Angerthales einzufallen und sind auf allen übrigen Seiten von Schiefern und Kalken silurischen Alters begrenzt. Von einer regelmässigen Zwischenlagerung kann jedoch deshalb keine Rede sein, weil auf der Südseite des Pollinigg jede Andeutung von Clymenien-schiechten fehlt. Auch verläuft die Gesteinsgrenze senkrecht über den Abhang, während die Kalke nach S einfallen.

Im Westen schneidet der Pläckerer Querbruch die Masse der höheren devonischen Kalke von den steil aufgerichteten bunten Kalken und Schiefern des Obersilur ab, in welche das Valentin-Thal eingesenkt ist. Gegenüber dem Ederhof schwenkt der Querbruch allmählig in die Längsrichtung (O weiterhin ONO) um und bedingt die Einquetschung einer schmalen Falte des devonischen Riffkalkes in die silurischen Schiefer (Abb. 26, Mitte). Man muss annehmen, dass analog den oben geschilderten Verhältnissen des Osternigg auch hier eine, bei der carbonischen Gebirgsbildung eingequetschte Kalkfalte später in unregelmässiger Weise weiter eingebrochen ist. Wenn man nur den heutigen Zustand berücksichtigt, würde der schmale Kalkzug der Würmlacher Alp am besten mit den Spaltenversenkungen des Grödener Sandsteins (Lanzen) zu vergleichen sein. Der WSW—ONO streichende Kalkzug spaltet sich östlich des Kressbaches in 2 Aeste, von denen der nördliche, an Breite wesentlich reduirte bis in die Gegend des Kronhofs zu verfolgen ist. Es scheint, dass an dieser Dislocation die beiden nördlichen silurischen Kalkzüge des Kronhofbaches abschneiden.

Der devonische Kalkzug bildet die nördliche Begrenzung eines Längstales, in welchem das Würmlacher Alp¹⁾ liegt. Der südliche Kamm besteht aus dem rothen, obersilurischen, hier und da Orthoceren führenden Kalk der Elferspitz, der von dem Culm des Angerthales durch den, an Sprunghöhe zunehmenden Polliniggbruch getrennt ist. Man erkennt auf der linken Ecke des Bildes Lancheek—Kellerwand—Gams-


¹⁾ So wird das Kar nördlich der Elferspitz von den Einwohnern bezeichnet; auf der G. St. Karte steht hier mit grosser Schrift Würmlacher Alpe. Der letztere Name kommt nur dem ziemlich ausgedehnten Weidengebiet zwischen den Höhennoten 1180 und 1959 zu.

Profil-Tafel IV.

birge
(m.)
grenze

Val Grande
(ca. 900 m.)

Torrente Giadegna
oberh. Cereivento.




1/50 000

Kellerwand
(2810 m.)

Casa Moreretto

Monte Crostis

Senke von Ravascletto



1/75 000

Kellerwand.

(S.S.)

andere angegeben werden.

kofel (vergl. unten) deutlich, wie hinter der steil abfallende Kalkwand der gerundete Schiefergipfel des Lancheek hervorschaunt. (Der östliche Verlauf dieses Kalkzuges und Bruches ist oben geschildert worden.)

Den besten Einblick in den eigentümlichen Aufbau des Pollinigg gewinnt man auf dem, auch landschaftlich höchst gemütsreichen Wege von Mauthen über den Kressbach und die Scharte zwischen Pollinigg und Eiferspitz nach dem Plüekenwirthshaus. Beim Anstieg von Mauthen nach S (Missoria) trifft man zuerst phyllitischen Thonschiefer mit Quarzflasern (tiefere Mauthener Schichten) in flacher, unregel-




Abb. 29.

mässig sattelförmiger Lagerung; derselbe bildet das Liegende der silurischen Schichtenfolge. Weiter aufwärts finden sich halbkristalline, grüne Bänderkalke in saigerer Stellung (Str. O—W bis WSW—ONO), etwas weiter östlich am Schlosse Waldegg streicht derselbe Kalk WNW—OSO und steht ebenfalls saiger. Dann betritt man die südliche, in das anstehende Gestein eingeschnittene Thalterrasse, die Fortsetzung des Lessacher Thalbodens, welche weiter östlich die letzten glacialen Schutthügel trägt.

Das ganze Nordgehänge oberhalb Missoria besteht wiederum aus silurischem Thonschiefer mit eingelagerten Granwacken,

die weiter östlich durch eine Abzweigung des unsehnenkenden Plöckener Querbruches abgeschnitten werden. Oberhalb des Höhenpunktes 1180 quert man das von Silurschiefer umgebene Devon und beobachtet steiles südliches Fallen der undeutlich geschichteten grauen Kalke, welche hie und da Korallenreste (*Cyathophyllum* sp.) enthalten. (Die Stelle ist auf dem Bilde p. 78 links oberhalb der Tannen deutlich sichtbar).

Der Boden der Würmlacher Alpe besteht aus O—W streichendem saiger stehendem Silurschiefer mit Kieselschieferbrocken (weiter oben mit Granwacke und Kieselschieferconglomerat). Der Schiefer enthält etwas unterhalb einer scharf ausgeprägten Thalstufe, fast unmittelbar an der Grenze des Devon eine Einlagerung von dunklen, rothbraun verwitterndem Eisenkalk, der in früheren Zeiten abgebaut und in Wetzmann verhüttet wurde. Auf den alten, beinahe verwachsenen Halden sammelte ich:

Phacops Grimburgi FRECH?

Orthoceras dulce BARR. (Syst. Sil. Vol. II. t. 294, 215.)

Orthoceras potens BARR?

Orthoceras transiens BARR?


Marchisonia sp.

(Eine ähnliche, auf der gegenüberliegenden Würmlacher Alp anstehende Schicht wurde ebenfalls früher bergnämisch ausgebetet.)

Nach Besteigung der erwähnten, noch ganz dem Schiefer angehörenden Thalstufe beobachtet man am Ostabhug des Pollinigg ein eigentümliches Eingreifen der Silurschiefer in die Devonkalke. Der unregelmässige Verlauf der Grenze erklärt sich aus der verschiedenen Härte der in einander gekneteten Gesteine. Der mechanische Contact ist hier wie überall durch massenhaften Gangquarz gekennzeichnet. Die gleichen Contacterscheinungen treten in grossartigerem Maasstabe am Kollin- und Rathhauskofel auf.

Die Scharte zwischen Pollinigg und Elferspitz, welche den Uebergang zum Angerthal bildet, beruht ebenfalls auf dem Eingreifen einer Schieferzunge zwischen den silurischen und devonischen Kalk.

Auch am Elferspitz sind die verschiedenen Silurgesteine, schwarze wohlgeschichtete Plattenkalke, graue und rothe Thon-



IV

Nach einer fotogr. Aufnahme des Verf. gr. v. G. Berner.

Das Hochland der Devonischen Riffe von N.

Gr. Grödenor Sandstein (im Vordergrunde nördlich von Kotschach). C. Calschiefer (liegt am Latschek neben Orthocerenkalk, zwischen beiden der Pollinggraben, greift auf der grünen Schicht zwischen Cellon- und Kollinkofel auf den Nordabhang über). D. Unterdevonischer Riffkalk. OS. Oberdevonischer Orthocerenkalk (am Cellonkofel durch den Flockner Bruch vom Devon getrennt). SK. Untereildevonischer Kalk. Sch. Untererildevonischer Schiefer der Mauthener Schichten. — Im Vordergrunde der Abhang nördlich von Kofls hoch, im Mittelgrunde das Gailthal und die Gailtalerrasse.

Abbildung 30.

flaserkalke sowie graue Eisenkalke mit Orthoceren¹⁾ in der abenteuerlichsten Weise miteinander verknetet. Auf dem Südabhang folgen die O—W streichenden, meist saiger stehenden Thou- und Kieselchiefer des Cnlm. (Vergl. d. Profil des Pollinigg.)

Der Devonkalk des Pollinigg ist splittrig, leicht zerbröckelnd und vielfach von dolomitischer Beschaffenheit. Ausserdem findet sich eine ca. 80 m. mächtige Lage von Quarzit im oberen Theil des nördlichen Pollinigggehanges und ist schon von weitem an ihrer durch Flechten verursachten grauen Färbung leicht von dem Kalke zu unterscheiden. Dass die Verwerfung am Südabhang des Pollinigg mit der alten Faltung zusammenhängt, wird n. a. durch das Vorkommen einer eingeklemmten Scholle von rothem Orthocerenkalk zwischen Devon und Culmschiefer bewiesen. Dieselbe greift von Westen her nicht sonderlich tief ein und hängt mit dem, gegenüber an der Vereinigung von Valenti- und Plöckenbach anstehenden Kalke zusammen. Man kreuzt das Vorkommen auf dem Wege, der vom Plöckenwirthshaus zur Himmelberger Alp führt.

2. Der Plöckener Querbruch und die im Osten abgesunkene Scholle.

Während der Pollinigg die nördlichen Silurbildungen von dem südlichen Culmgebiete trennt und in dieser Hinsicht dieselbe tektonische Stellung wie die Kellerwand einnimmt, ist die orographische Fortsetzung des letzteren ein in tektonischer Hinsicht wesentlich abweichendes Gebilde: Die Hochfläche des Pal und der scharfe Kamm des Tischlwauger Kofels sind eine unregelmässige, antiklinale Aufwölbung von Mittel- und Oberdevon, die rings von Culmschiefern umgeben ist und im Osten an der Promosalp normal unter dieselben hinabtaucht.

Im Westen trennt der, ein wenig östlich vom Plöckenpass in nordsüdlicher Richtung verlaufende Querbruch das Mittel- und Oberdevon des Palgebirges von dem tieferen Devon des Cellonkofels. Auf das Vorhandensein einer Dislocation weist, abgesehen von der ausserordentlich tiefen Einschärtung des Kammes

¹⁾ In einer früheren Publication (S. deutsche geol. G. 1887, p. 690) hatte ich die Elferspitze als Fortsetzung des devonischen Pollinigg angesehen — die Obersilurversteinerungen wurden erst später hier aufgefunden.

der gestörte Verlauf der Kalkschichten hin, deren Biegungen, Verquetschungen und Brüche von der Plöckenstrasse aus deutlich zu beobachten sind. Die tiefe Einsehtung des Kammes ist auf einer, weiter unten folgenden Abbildung in charakteristischer Weise wiedergegeben.

Am schärfsten prägt sich der Plöckener Querbruch an dem Wirthshaus selbst aus; hier grenzt die östliche aus Culm und Mittel-Devon bestehende Scholle an die westliche, welche letztere von Silur und Unterdevon aufgebaut wird.

Man könnte zur Erklärung dieser wunderlichen Verhältnisse annehmen, dass die östliche aus Pollinigg und Tischwunger Kofel bestehende Scholle abgesunken, die westliche gleichzeitig blattförmig nach Süden verschoben sei. Der unterdevonische Pollinigg ist dann die Fortsetzung des unterdevonischen Cellonkofels, die Culmschiefer des Angerthales entsprechen der Culmzunge der Collinetta-Alp (südlich des Cellon), der mitteldevonische Pal ist dem gleichalten Kalkzuge zwischen Casa Collinetta und Casa Monuments homolog. Zweifellos hängt ferner das Umbiegen des gesammten Streiehens aus OSO—WNW in ONO—WSW zwischen Valentihal und Niedergailthal mit dem Vorhandensein der Blattverschiebung zusammen. Die Abweichung des Streiehens ist auf den erwähnten kurzen Gebirgsabschnitt beschränkt. Es scheint als ob die von Norden wirkende Faltung die im O und SO gebildete Senkung später zu überschieben versucht habe.

Immerhin haben in einem durch zweimalige Gebirgsbildung dislocirten Gebiete derartige tektonische Constructionen nur einen secundären Wert. Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Verschiebungen und Brüche der ersten Gebirgsbildung durch die spätere Massebewegungen wieder aufgerissen und in unregelmässiger Weise weiter ausgebildet werden. Es ist dann nicht immer möglich, die mannigfachen tektonischen Veränderungen bis ins einzelne zu verfolgen, um so weniger, als, abgesehen von der Hochgebirgsregion und einzelnen tiefen Erosionsrissen die Aufschlüsse vielfach anzureichend sind. Jedoch wird meist aus der eingehenden Aufnahme eines zusammenhängenden Gebietes die klare Anschauung über die Grundzüge des Gebirgsbaues hervorgehen.

Grade bei der Beurteilung des Plöckener Querbruchs lässt sich der Einfluss palaeozoischer, tertiärer und jüngerer Erdkrustenbewegungen deutlich nachweisen. Die Versenkung der östlichen Scholle geht wohl auf die carbonische Faltung zurück; denn weiter nördlich in der Gegend des Gailberges ist von einer derartigen Bewegung kaum etwas wahrzunehmen; ebenso deutet die mechanische Verknüpfung von Schiefer und Kalk in der Kollin- und Pollinigg-Gruppe auf eine energische Faltung hin, während die Trias des Lienzer Gebirges derartige Anzeichen eines bis auf das äusserste gesteigerten Gebirgsdruckes nicht erkennen lässt.

In der nördlichen Fortsetzung des Plöckener Querbruchs, am Gailbergsattel, findet sich dagegen eine von Norden nach Süden verlaufende Dislocation, welche den grossen, der Längsrichtung des Gebirges folgenden Gailbruch durchsetzt und der Nord-Süd-Verschiebung der Plöcken entspricht. Das Alter dieser Störung ist also jungmesozoisch oder tertiär.

Endlich verläuft, wie die HOFER'sche Erdbebenkarte Kärntens¹⁾ zeigt, in ganz geringer Entfernung westlich, parallel zu der Querbruchzone Gailberg-Plöcken die „Obervellacher Erdbebenlinie“. Es ist sogar möglich, dass diese Linie mit dem Plöckener Querbruch vollkommen zusammenfällt; denn wie die Uebersicht der Erdbeben (l. c. p. 60 und 61) beweist, beruht die Konstruktion derselben nur auf dem gleichzeitigen Auftreten der Erdbeben in St. Jacob (Lessachthal) und Ober-Vellach im Müllthal. (SW—NO.) Die weitere Fortsetzung derselben, für welche keine bestimmten Daten vorliegen, könnte also ebenso gut in rein südlicher, wie in südwestlicher Richtung erfolgen. Jedenfalls ist das Fortwirken der gebirgbildenden Kraft bis in die Jetztzeit von Bedeutung.

Die an dem Plöckener Querbruch und der Längsverwerfung des Pollinigg abgesunkene Scholle zeigt einen ziemlich regelmässigen Verlauf der O—W streichenden Falten. Die fast durehweg auf dem Kopfe stehenden Culmschiefer des Angerthales werden von den wohlgeschichteten Kalkbänken der Clymenienstufe unterteuft; letztere fallen zwischen

¹⁾ Denkschriften der kaiserlichen Akademie (Wien) math. naturw. Kl. 42. Bd. II. Abth. S. 30.

Plüekenpass¹⁾ und grossem Pal steil nach N. ein und nehmen an Breite allmählig zu. Durchschnitte von schlecht erhaltenen Clymenien finden sich fast überall. Der Fundort, von dem die sämtlichen im stratigraphischen Theile aufgezählten Versteinerungen stammen, liegt am Südgehänge des Grossen Pal im oberen Theile des Palgrabens, in unmittelbarer Nähe einer auf der Generalstabkarte angegebenen, aber nicht mit Namen belegten Alpkütte. Der Punkt ist leicht wieder anzufinden, denn die Versteinerungen kommen ausschliesslich 2 m. im Liegenden der Culrschichten unmittelbar neben einem Querbruch vor, welcher die Fortsetzung der Clymenien-schichten einige hundert Meter nach Süden verwirft. Die Clymenienkalkte bilden den steilen Nordabfall des Tischlwanger Kofels und sind hier durch zahlreiche untergeordnete Brüche zerstückt; sie setzen dann, immer noch versteinерungsführend, bis zur oberen Promosalp fort, fehlen hingegen am Südabhang der Kalkkette so gut wie gänzlich.

Eine eigentümliche, klippenartige Ausbildung besitzen zwei kleine, reihenförmig angeordnete Kalkkuppen, welche sich vom Tischlwanger Kofel in nordöstlicher Richtung abzweigen und südlich von der Promosalp in einer steil zu dem kleinen Promos-See abstürzenden Wand endigen. Dieselben sind als die dislocirten Reste einer, in früherer Zeit einheitlich ausgebildeten Antiklinale anzusehen. (Vgl. die Abb.)

In dem am weitesten nach Osten vorgeschobenen Kalkvorkommen der oberen Promosalp wurden Clymenien-durchschnitte beobachtet; ebenso enthalten die Culrschiefer in dieser Gegend undeutliche Abdrücke von Calamiten und anderen Pflanzen. Auch die Grenze dieser concordant und normal auf einander folgenden Formationen ist durch untergeordnete Störungen gekennzeichnet, wie die zerrüttete Beschaffenheit der Schiefer und das Vorkommen ausgedehnter Harnische im Kalk beweist. Dieselben treten in der Nähe der Promosalp und am Nordabhang des Tischlwanger Kofels auf, lassen sich jedoch unge-

¹⁾ Das Durchstreichen der Clymenien-schichten bis zum Pass habe ich erst bei späteren Begehungen festgestellt; bei der Abfassung meiner ersten Arbeit hatte ich hier eine, durch Dislocation zu erklärende Lücke in der Schichtenfolge annehmen zu müssen geglaubt. (Vgl. die Profiltafel S. 76.)

Promos-Berg. Promoser Jöchl.



Abbildung 31.

Nach einer photogr. Aufnahme des Verf. gez. von O. Berner.

Der Tischwanger Kofel.

Eine Antiklinale von oberdevonischen Blf. und Cymmenkalk (K) in Culo-schiefer. Aus letzterem besteht der Gross-Pal im Vordergrunde des Bildes. In der NO-Fortsetzung der Antiklinale (am Promoser Jöchl) sind zwei isolirte Klippen von Cymmenkalk (K) durch den Calm hindurchgepresst.




Abbildung 32.

Nach einer fotogr. Aufnahme von Prof. K. Müller und Skizzen des Verfassers
gez. von E. Ohmann.

Unregelmässige Aufwölbung der Devonkalk im Culmschiefer des Palgrabens.

GD. Geschichteter Devonkalk (weiter südlich von Calm begrenzt). In der Mitte massiger
Devonkalk, der mit einer gewaltigen Rutschfläche gegen den Schiefer abbricht. Die
dunkle Schraffur des Schiefers sollte etwas weiter (bis Sch.) reichen. Im Hintergrunde
Devonkalk D.

zungen durch die sehr verschiedenartige Härte der unter starkem Drucke befindlichen Gesteine erklären.

Auf der Südseite des Kalkzuges Pal—Tischlwanger Kofel fehlen infolge einseitiger, ungleichförmiger Aufwölbung die Clymenienschichten.

Die Bruchgrenze ist nördlich von Tischlwang durch das Aufsetzen einiger Silber und Kupfer führender Gänge gekennzeichnet, deren Vorkommen durchaus an die weiter unten zu beschreibenden Gänge der Avanza erinnert. Der Abbau der Erze wurde von Gailthaler Bergknappen betrieben, die vor etwa 300 Jahren den bis jetzt deutsch gebliebenen Ort Tischlwang gegründet haben. Leider sind die Gruben seit Laugem verlassen, so dass ich über das Vorkommen der Erze nichts Weiteres in Erfahrung zu bringen vermochte.

Auch am Nordabfall des Tischlwanger Kofels findet sich ein kleiner Versuchsstolln, zu dessen Abtenfung Einsprengungen von Kuferlasur in Kalkspath Veranlassung gegeben haben.

Auf der Hochfläche des kleinen Pal¹⁾, einem von tiefen Furchen durchsetzten Karrenfeld finden sich bezeichnende mitteldevonische Korallen: *Cyathophyllum caespitosum* GOLDF., *Cyathophyllum Lindströmi* FRECH, *Alveolites* sp. (grosszellig), *Favosites* sp., *Stromatoporella* sp. Auf dem Südabfall sind infolge der stärkeren mechanischen Pressung die Kalke umgewandelt und zum Theil marmorisirt, so dass organische Reste hier gänzlich fehlen.

Parallel zu dem breiteren Zuge des Pal verläuft auf beiden Seiten des Val Grande ein schmaler, durch Erosion mannigfach zerstückter Streifen devonischer Kalke. Man findet im Osten der Plöckenstrasse, an der Mündung des von der Casa Pal Grande herabfliessenden Grabens, südlich von dem Kalke des Pal Culmschiefer und dann eine saiger stehende Masse von ungeschichtetem Kalk. Dieselbe ist nach Norden zu dreh die, auf dem Bilde dargestellte kolossale Rutschfläche abgeschnitten. Im Süden lagern sich noch geschichtete gelbliche Kalke mit steilem Südfallen an; dann folgt die Masse des Culmschiefers, in dem besonders das Vorkommen

¹⁾ Derselbe bildet den Vordergrund der Abb. 37, S. 92.

lauchgrüner Kieselschiefer bemerkenswert erscheint. Schon LEOPOLD VON BUCH beschreibt die merkwürdige Stelle: „Nur kurz vor Tamann (Timau, Tischlwang) erscheint wieder eine ungläublich schroffe, ganz glatte Wand, völlig unersteiglich. Es ist dichter Kalkstein, dem ähnlich, wie er oben an Passe vorkam. Die ganze Masse sieht nicht anders aus, als wäre sie von oben, von der Höhe herabgestürzt, und hier auf fremdartigen Boden: und wahrscheinlich ist es auch so. Grauwacke und Thonschieferschichten umgeben sie von allen Seiten.“ (LEONHARD'S Taschenbuch XVIII, 1824, S. 463.) Der nördliche Schieferzug ist in dem Palgraben durch prächtige, im grössten Maassstabe entwickelte Reibungsbreccien von Kalk im Schiefer ausgezeichnet.

Die westliche Fortsetzung unseres eigenthümlichen Vorkommens ist eine kleine, rings von Gehängeschutt umgebene Kalkmasse auf der rechten (westlichen) Seite des Palgrabens und ferner ein südlich vom Val Grande liegender Kalkkeil, der von der Strasse aus leicht wahrzunehmen ist. Im Osten vereinigt sich der Parallelzug wieder mit der Masse des Tischlwanger Kofels.

3. Die Kellerwand.

Auch die jenseits des Plöckener Querbruchs aufragenden Devonriffe sind in einen nördlichen und südlichen Zug gegliedert. Zwischen beiden liegt die Silurmasse des Rauekofels, ein unregelmässiger, von Dislocationen umgebener, antiklinaler Aufbruch. Im Wolayer Gebirge vereinigt sich der nördliche Kalkzug mit dem südlichen.

Die unterdevonischen Kalkbänke im Hauptkamme des Cellon sind unter sehr steilem Winkel nach SW geneigt und von mehreren Brüchen durchsetzt, an denen ein staffelförmiges Absitzen nach Süden zu beobachten ist. Die beiden Seitenansichten des Cellonkofels bringen diese Verhältnisse zur Anschauung. (Taf. IV und Abb. 33.) Bei einer Betrachtung von Nord scheint der Berg aus horizontalen Schichten zu bestehen (Abb. 34), da die Streichrichtung des Kammes der der Schichten vollkommen parallel läuft.


Im Cellon kommen, abgesehen von grauen massigen Riff-

Taf. IV



Photogrammetrische Aufnahme des Kilimanjaro

© 1900



Der Cellonkofel vom Valententhal.

Im Vordergrunde ist das Eustarkron flach gelagert, am Cellon steil aufgerichtet. Die entsprechenden Schichten sind mit den gleichen Nummern bezeichnet. Im N trennt der Plöckauer Firnh die Silt von Devou.

Grüne Schneid.



Abbildung 33.

Nach einer photogr. Aufnahme des Verf. ges. von O. Berner.

Der Cellonkofel von Süden.

Steil SSW fallende Plattenkalks des Unterdevon. Weiter im Süden und Westen die (dunkel gebäutete) Calmschiefer des Collinetstages; in denselben ein leinlirter Kell von Devonkalk (Vordergrund).

kalken (mit *Eudiphyllum* sp., *Favosites* sp., *Cyathophyllum* n. n.) besonders die bräunlichen Plattenkalke häufig vor.

Südlich vom Cellonkofel greift eine etwa $\frac{3}{4}$ km. breite, zusammengepresste Synklinale von Culmschiefer tief in die devonischen Riffralke ein. (Man vgl. das Uebersichtsbild 30 S. 78, die Ansicht des Cellon von Süden und das Lichtbild Taf. IV.) Man kann dieselbe, wie schon erwähnt wurde, als die nach




Abbildung 34.

Nach photogr. Aufnahmen gez. v. J. Ohmann.

Der Cellonkofel von Norden.

Die steil nach SSW geneigten Bänke des devonischen Kalkes sind scheinbar flacheingert. Untergeordnete Verwerfungen bedingen ausserdem ein staffelförmiges Abbrechen nach Süden, wie die Schicht DD erkennen lässt. Der Vorbergründ besteht aus Oberdevon (Lunkel), das durch einen scharfen Bruch von dem Devon getrennt ist.

Süden verschobene Spitze des Angerthaler Culm auffassen, oder annehmen, dass die zwischen Kalkzügen eingeschlossene Schieferzone am Südhänge des Pal die abgesunkene östliche Fortsetzung darstelle.

Diese aus saigeren Culmschichten bestehende Synklinale der Collinetta-Alp ist insofern für den Gehirgshau von Bedeutung, als sie die fast auf dem Kopf stehende Scholle des Cellonkofels von der flachgelagerten Kalkmasse

der Kellerwand trennt. Von einem Standpunkte etwas oberhalb der unteren Valentinalp übersieht man mit einem Blick die kulissenartig hintereinander liegenden Schollen, die flache Lagerung am Kollin und die saigere Stellung der Schichten am Cellon¹⁾. Man kann sogar fünf etwas verschiedenartige, durch ungleiche Färbung und Dicke der Platten ausgezeichnete Schichteneomplexe durch die beiden Schollen hindurch verfolgen. Das von diesem Standpunkte aus aufgenommene Lichtbild ist auf Taf. IV. wiedergegeben. Das Verhältniss der saigeren und der flachgelagerten Scholle erweckt die Vorstellung, dass das gewaltige Riff der Kellerwand und des Wulayer Gebirges innerhalb der in Faltung begriffenen Gebirgsschichten wie ein Klotz stehen geblieben, bezw. nur von untergeordneten randlichen Störungen betroffen sei. Am Cellonkofel war dagegen die Mächtigkeit der Kalke infolge ursprünglicher Verschiedenheit oder späterer Denudation geringer. Dieselben konnten somit hier von der gebirgsbildenden Kraft gewissermassen überwältigt und mit eingefaltet werden.

Den besten Überblick über die verschiedenen zum Theil höchst eigenartigen Faltungserscheinungen gewinnt man auf einem vom Plüekenpass nach Westen gerichteten Ausflug. Unmittelbar südlich von der Passhöhe führt die alte Römerstrasse nach W ab, um in weitem Bogen ansholend die Tiefe des Val Grande zu gewinnen. Der stark veränderte und gestörte, z. Th. marmorisirte Devonkalk trägt die Reste einer römischen Inschrift und die uralten Wagengeleise.


Der im Süden folgende, zusammengeschobene, O—W streichende Culmschiefer hat Anlass zur Entstehung eines O—W streichenden Längsthalcs gegeben, an dessen Mündung die vordere Casa Collinetta steht. Das Thal endet am Fusse des nach O zu sanft abdachenden Kollinkofels mit einem wohl ausgeprägten Kar, oberhalb dessen das erste Lichtbild „die Grüne Schneid“ zwischen Kollin und Cellonkofel aufgenommen worden ist. (Taf. V.) Man erkennt rechts unten

¹⁾ Es hat auf Taf. IV den Anschein, als seien die Schichten des Cellon nach N übergeklippt; doch beruht dies z. Th. auf perspektivischer Täuschung und ist in Wirklichkeit nur für einen Theil des am höchsten aufragenden Kannes zutreffend. Thatsächlich macht sich auf der anderen Seite eine Schichtneigung nach SSW geltend. (Abb. 33.)



Photographie (Druck H. Richard & Co. Bern)

Prof. A. Miller phot.



Der Ostabhang des Kollinkofels.

Eingebetteter Culmenleier (c), von Devonkalk (k) umgeben. Im Schiefer eingelagertes, isolierte Kalkblöcke. Die Schichten sind im Osten und in der Mitte des Jildes steil gestellt, im Westen flach nach Süd geneigt.



Prof. R. Miller photo


Photograph of a view of the top of the mesa

Entwurf
Hofmann, b

Grüne Zeichnung

Kolli-Kollet

Der Kolli-Kollet von Osten



Höllin Kofel

Grüne Schneid

*Abhang
d. Mosskofel*



Der Kollinkofel von Osten.

Mechanischer Contact von verfestetem Oalmuschiefer (S) und Devonkalk (K).

und links oben den unregelmässigen Verlauf der Grenze; am letzteren Punkte, also genau am Fusse des Kollin sind in einem wilden, schwer zugänglichen Graben alle Einzelheiten des unregelmässigen mechanischen Contactes wahrzunehmen. In dem Kalk beobachtet man eine, parallel zur Gesteinsgrenze verlaufende Klüftung, welche ebenfalls auf die Faltung und Pressung zurückzuführen ist.

In den Culmschiefer, der hier *Archaeocalamites radiatus* enthält, zieht nach O ein langer, z. Th. winkelig verlaufender Streifen isolirter Kalkblöcke hinein, die man bei oberflächlicher Betrachtung für lose aufgelagert hält. Die nähere Untersuchung zeigt jedoch, dass dieselben fest in den Culmschiefer eingepresst sind und aller Wahrscheinlichkeit nach die abgequetschten Endigungen einer schmalen Kalkfalte darstellen, welche jetzt sammt dem umgebenden Schiefer durch die Denudation entfernt worden ist. Rechts oben ersieht man auf dem Bilde eine Reihe niedriger Kalkzaunen, welche dem Culmschiefer scheinbar aufgesetzt sind. In Wahrheit stehen sie saiger neben denselben und sind die westlichen Schichtenköpfe der aufgerichteten Devonkalke des Collinokofels.

Schon oberhalb der Collinetta-Alp und am Südfall der Grünen Schneid beobachtet man zahlreiche Blöcke von Reibungsbreccien, die in bedeutenderer oder geringerer Grösse ausgebildet sind. Auch die eben beschriebenen abgequetschten Endigungen der Kalkfalte könnten als solche aufgefasst werden. Meist liegen unregelmässig begrenzte, halb marmorisirte und zerklüftete Kalkbrocken in einer aus zerquetschten Thon- und Kieselschiefer bestehenden Grundmasse; seltener greift der Schiefer intrusiv in Risse und Klüfte des Kalkes ein.

In allergrösstem Maassstabe treten die mechanischen Contacterscheinungen dem Beschauer nördlich vom Kamme der Grünen Schneid entgegen.

Das Lichtbild, Ostabfall des Kollinokofels (Taf. VI), welches von dieser Stelle aus aufgenommen wurde, giebt, besser als Beschreibungen, einen Begriff von dem hier herrschenden wilden Durcheinander. Der untere Theil des aus Schiefer bestehenden Abhanges ist etwas von Schutt überrollt; doch treten auch hier die grösseren im Schiefer liegenden Kalk-

massen als steilere Abstürze hervor. Besonders bemerkenswerth ist ein schmaler Kalkkeil, der rechts unten in den Schiefer eingreift.

Die in der Mitte und etwas rechts gelegenen Schieferkeile sind die letzten Ausläufer der Collinetta-Synklinale; der eine derselben ist bereits durch die Denudation äusserlich von dem übrigen Schiefer getrennt. Über den letzteren führt der einzige, einigermaßen gangbare Steig in das am Fusse der Kellerwand auf einer Terrasse liegende Eiskar; man kann auf diesem Wege die eigenthümlichen Oberflächenformen beobachten, welche die Verwitterung in einem so eigenartig zusammengesetzten Gestein schafft. Schroffe Kalkwände wechseln mit sanfteren Schieferhängen, und besonders eigenthümlich sind die häufigen Unterhöhlungen und tief eingegrissenen, stark verzweigten Gräben, deren Entstehung auf den häufigen Gesteinswechsel zurückzuführen ist.

Die von Schieferkeilen durchsetzte Kalkmasse, welche die Mitte und den rechten Theil des Bildes einnimmt, zeigt bereits die flache Schichtenstellung, welche für die Kellerwand bezeichnend ist.

Im Norden werden die Kalkmassen des Cellonkofels und der Kellerwand im Wesentlichen durch den Plöckener Längsbruch begrenzt, dessen östliche Ablenkung oben besprochen wurde. Am deutlichsten macht sich diese Störung am Cellonkofel geltend. Hier besteht der grünbewachsene, sanfte Umrisse zeigende Vorberg aus silnrischem Schiefer und Kalk, von dem die schroff einporragenden Wände des Devon tektonisch und orographisch scharf getrennt sind. (Vgl. das Übersichtsbild Abb. 30, S. 78, ferner Lichtbild Taf. IV.)

Die Störung verläuft dann in WNW-Richtung zur oberen Valentinalp, oberhalb deren man die Thonschiefer und schwarzen Plattenkalke des tieferen Obersilur in unmittelbarem Contact mit den grauen Devonkalcken beobachtet. Man könnte bei oberflächlicher Betrachtung an eine einfache Überlagerung denken, erkennt jedoch bei näherer Untersuchung an dem unregelmässigen Absetzen der devonischen Kalkblöcke nach unten, sowie an den mannigfachen Faltungen und Knickungen der Silurschiefer das Vorhandensein einer Verwerfung.



U. v. J. J. J. J.

Photographie v. Dr. H. H. H. H.

Schichtenstauungen im Unterdevon des oberen Valentintales



Abbildung 35.

Nach einer photogr. Aufnahme von Dr. v. d. Borja gen. von O. Berner.

Die Wand des Eiskars, vom oberen Valentinthal gesehen.

Der auserevontische Kalk ist in diesem tieferen Thale deutlich geschichtet (und von manigfachen Störungen durchsetzt). Nach oben zu verschwindet die Schichtung allmählig, so dass massiger Riffkalk zur Ausbildung gelangt. Vergl. Taf. VII.

Die Streeke zwischen oberer Valentinalp und Wolayer See ist durch eine, in dem von zahlreichen Störungen durchsetzten Gebiete selten vorkommende Regelmässigkeit der Schichtenfolge ausgezeichnet. Das schon früher beschriebene¹⁾ klare und versteinungsreiche Profil des Wolayer Thörls wird im stratigraphischen Theil noch einmal in vervollständigter Form gegeben werden. (Man vgl. unten die betr. Abb. u. Profil S. 76.)

Die einzige hier beobachtete tektonische Unregelmässigkeit besteht in einer Umbiegung des Streiehens aus SW nach S. Trotz des im Grossen und Ganzen wenig gestörten tektonischen Aufbaues beobachtet man verschiedene kleinere Dislocationen besonders am Abhang des Eiskar. Dasselbe ist als gewaltige, im Umriss dreieckige Terrasse der Kellerwand in Norden vorgelagert. Das nebenstehende Bild der Wand des Eiskars stellt den wenig unterhalb des Wolayer Thörls aufgenommenen Ausblick nach O dar; man erkennt, dass die flach gelagerten, in ihrem unteren Theile deutlich geschichteten Devonkalke nach oben zu allmählig massige Structur annehmen und von verschiedenen senkrechten Klüften durchsetzt sind. Links (N.) unten beobachtet man eine mit Brüchen verknüpfte flexur-ähnliche Stauchung der tieferen Schichten, die auf dem nebenstehenden Kupfer-Lichtdruck in grösserem Maassstabe als auf dem Uebersichtsbilde dargestellt ist. Dieselbe liegt, wie besonders hervorgehoben werden muss, etwa einen halben Kilometer südlich von dem Plöckener Längsbruch und ist, trotzdem die Höhe des, über dem Schneefeld beginnenden Sprunges ca. 200 m. beträgt, doch nur als eine untergeordnete Störung anzusehen.

Auch die Lage des Wolayer Sees ist durch eine untergeordnete Dislocation und zwar durch eine Querverschiebung der rothen, das tiefste Unterdevon bezeichnenden Kramenzelkalke nach S. gekennzeichnet. Das Ausmass derselben beträgt nur einen halben Kilometer. Die im Norden des Sees auf einem kleinen Hügel anstehenden rothen Kalke und Thonschiefer des tiefsten Devon setzen sich im Süden zwischen Kellerwand und Seekopf fort und ziehen durch die Schlutt-

¹⁾ Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. 1887. S. 683—688.

massen des oberen Wolayer Thals z. Th. verdeckt unter den Wänden des Wolayer Gebirges hin. (Man vergleiche das Lichtbild Taf. XV im stratigraphischen Theile.) Das südliche Einfallen der Schichten tritt auch hier deutlich hervor. Der stolz aufragende Seckopf ist die Profilansicht eines ziemlich breiten, langgedehnten Kalkzuges. Der massige Rifffalk zeigt local, besonders in den tiefsten und höchsten Theilen, Andeutungen von Schichtung. Unter den mannigfach zusammengesetzten Bildungen des tiefsten Unterdevon tritt besonders eine, die Schiefer- und Kramenzelkalke unterlagernde, massige Kalkbank hervor, welche einen Damm im Süden des Sees bildet.

Von diesen tiefsten Grenzschichten bis hinauf zum Oberdevon, ist, wie bereits früher aneinandergesetzt wurde¹⁾, die devonische Schichtenfolge im Massiv der Kellerwand fast durchweg versteinerngsführend entwickelt. Es ist mir seitdem gelungen, die weitere Verbreitung des Oberdevon durch bessere Versteinerngsfunde festzustellen und eine naturgemässere kartographische Abgrenzung des mittleren und unteren Devon durchzuführen.

Die Schichten fallen im Grossen und Ganzen flach, nur zwischen Kellerwand und Monte Cogliano mit 40°—50° nach SSW (oder S) ein, und somit liegen im Norden die älteren, im Süden die jüngeren Bildungen. Die Basis bildet das mannigfach gegliederte Obersilur. (Vergl. den stratigraphischen Theil.) Über den unteren Grenzhorizonten des *Goniolites inexpectatus* und der *Illychonella Meyera*, die noch eine Menge silurischer Arten enthalten, folgen im oberen Valenthäl und am Wolayer See graue Kalke mit der reichen Fauna von Konieprus (*F*₂). Neben zahlreichen Korallen finden sich vor allem Crinoiden, Brachiopoden und Gastropoden, seltener Vertreter der übrigen Thierklassen. Das gegen früher wesentlich erweiterte Verzeichniss der Arten ist im stratigraphischen Theile enthalten.

Dem geschichteten und ungeschichteten Unterdevon dürfte etwa die Kalkmasse bis zur Höhe des Eiskars zuzurechnen sein; somit würde die oben abgebildete Wand insgesamt dem Unterdevon zufallen. Leider habe ich bei einem

¹⁾ Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. 1887. S. 630 ff.



Abbildung 36.

Nach einer photogr. Aufnahme des Verf. ges. von O. Berner.

Der Südfall der Kellerwand.

Vegetationsfreie Karrenfelder des äonischen Eifalktes zwischen 3200 n. 2800 m. Im Vordergrunde Culmablätter der Forca di Morentio.

Besuche des Eiskars keine genauer bestimmbarcn Versteinerungen gefunden; ein *Orthoeras*, ein *Gouiatitenbruchstück* (*Aphyllites?*) und einige kleine *Favositiden* gewähren keine bestimmten Anhaltspunkte. Auch die z. Th. recht schwierigen Abstiege, die ich vom Kollinkofel zum Eiskar und, bei einer anderen Gelegenheit, zur Grünen Schneid unternahm, erwiesen sich in geologischer Hinsicht als ziemlich unfruchtbar. Allerdings muss man bei derartigen Klettereien die Aufmerksamkeit auf andere Dinge, als auf Versteinerungen richten.

Auf der Höhe des Kammes zwischen Kollinkofel und Kellerwand¹⁾ habe ich den schon früher beschriebenen, dem

¹⁾ Über die Namen Kollinkofel, Kellerwand und Monte Cogliano (Coglians G. St. K.; die Identifizirung des Seekopfs mit dem Monte Cogliano bei STACHE, Zeitschrift der deutschen geol. Gesellschaft, 1886, p. 310 ist offenbar ein lapsus calami) bestehen in der Litteratur, vor allem aber auf der G. St. K. selbst manche Unklarheiten. Ich glaube nach einer Überkletterung der Schneide vom Kollinkofel bis zur Kellerwand und einer Umgehung der ganzen Gruppe im Süden (über die Forea di Moreretto) Folgendes feststellen zu können: Die nebenstehende Skizze, welche nach einer Photographie (Staudpunkt Forea di Moreretto) angefertigt wurde, zeigt den Monte Cogliano (W), die Kellerwand (O), und zwischen beiden eine scharf angeprägte Einsenkung, den „Keller“. Die beiden Gipfel sind auf der G. St. K. durch die Höhennoten 2799 und 2810 bezeichnet, aber mit ungenauen Namen versehen. Der westliche, von Collina aus leicht ersteigbare Berg (2799 m.), führt den Namen Monte Cogliano od. Coglians, (false = Kellerwand G. St. K.). Der östlich gelegene Kollinkofel der G. St. K. (2810 m.) ist die Kellerwand der Umwohner. Die Kellerwand ist ein einziges Mal (durch Grolmann) direkt vom Eiskar erstiegen worden. Ein weniger schwieriger, allerdings nur für kletterfeste und schwindelfreie Steiger gangbarer „Weg“ führt von dem weiter östlich gelegenen, auf der G. St. K. nicht besonders bezeichneten Kollinkofel hinüber. Auch bei letzterem lassen sich noch mindestens zwei Gipfelpunkte unterscheiden; am weitesten nach Osten gerückt ist ein niedrigerer, etwa als kleiner Kollinkofel zu bezeichnender Höchepunkt, der von der Collinetta-Alp gut zu erreichen ist und den österreichisch-italienischen Grenzstein trägt. In sehr geringer Entfernung westlich liegt, von dem kleinen Kollin durch einen tiefen, schwierig zu durchkletternden Einschnitt getrennt, der eigentliche grosse Kollinkofel, die Fundstätte des *Stringocephalus* und *Macrocheilus arvalatum*. Derselbe kommt an Höhe der Kellerwand ungefähr gleich. Die Lage der Gipfelpunkte lässt sich am besten auf dem oben p. 75 wiedergegebenen Bilde „das Hochland der devonischen Kalkriffe von N“ übersehen; auf demselben ist jedoch der Monte Cogliano durch die Kellerwand vollkommen verdeckt.

obersten Mitteldevon angehörenden Kalk mit ziemlich zahlreichen Versteinerungen anstehend gefunden. Die Grenze von Mittel- und Unterdevon musste infolge des Fehlens von Versteinerungen in den Zwischenhorizonten etwa in der halben Höhe des Berges, also am Eiskar durchgezogen werden.

Das Vorkommen des Oberdevon beruhte bisher auf dem Funde eines vereinzelt Blockes mit *Rhynchonella pugnus* am Ostabhang des Kollinkofels. Seitdem habe ich z. Th. auf der Collinetta-Alp, z. Th. am eigentlichen Ostabhang des Kollinkofels, noch weitere Arten gesammelt. Dieselben kommen mit Ausnahme von einigen unwichtigen Varietäten auch im Iberger Kalk des Harzes vor:

- Rhynchonella cuboides* Sow.
 „ *pugnus* MONT.
 „ *acuminata* MART.
 „ ? *contracta* A. ROEM sp. (Iberg bei Grund).
 „ ? *contracta* var. *obesa*. FRECH (nur alpin).
Athyris globosa A. ROEM sp. (Rübeland).
 „ „ var. *elongata* FRECH (nur alpin).
Spirifer Urii FLEMM.
Othis striatula SCHL.
Productella forojuliensis FRECH (vicariirend f. *suboculcata*)
 „ *Hermiae* FRECH (Rübeland).

Die früher geäußerte Meinung, dass ein stratigraphisch untrennbar mit dem Mitteldevon verbundenen Rest von Oberdevon auf dem Gipfel erhalten geblieben sei, ist etwas zu modifizieren. Entsprechend der allgemeinen Neigung der Schichten dürften sich diese Reste eher auf dem Südgehänge bzw. — in etwas diskreiter Stellung — auf dem Ostabhang befinden.

Da Mittel- und Oberdevon vollkommen isop entwickelt sind, erscheint eine Trennung der Horizonte nur an solchen Stellen denkbar, wo Versteinerungen gleichmässig vertheilt vorkommen; das Auftreten desselben ist jedoch im höchsten Grade unregelmässig.

Das höhere Oberdevon, der Clymenienkalk, scheint zwischen dem Iberger Kalk und dem Culm zu fehlen. Einige an der Collinetta-Alp gefundene Blöcke ähneln allerdings petrographisch dem Clymenienkalk des östlichen Gebirges, sind aber gänzlich versteinungsleer.

Forca di Moreretto.



Abbildung 37.

Nach einer photogr. Aufnahme des Verf. gez. von O. Berner.

Das Ineinandergreifen von Culmschiefer (dunkel) und devonischem Riffkalk auf dem Südhang des Kollinkofels.

Der Riffkalk, von dem eine isolirte Klippe (DD) inmitten des Culms liegt, gehört z. Th. dem unteren Oberrhein (oberer Kalk) an. Im Vordergrund des Bildes der Kleins Pal; zwischen diesem und dem Kollinkofel der Fluckengass.

Der Südrhang des Kollinkofels und der Kellerwand ist bis Collina und weiter bis zur Croda Bianca überall durch das eigenthümliche keilartige Eingreifen des härteren Kalkes in die weichen Culmschiefer gekennzeichnet (Abb. 36) und enthält mitteldevonische Korallen (*Cyathophyllum caespitosum* Gf. und *heterophyllum* M. Edw.). Ein längerer Keil liegt östlich von der Casa Monnments, ein kürzerer, den man von dem Wege Wolayer See-Collina gut übersehen kann, nördlich von der Casa Moreretto. (Vergl. die nebenstehende Abb. 38.) Aneh im Kleinen zeigt der Contact von Kalk und Schiefer die üblichen Quetschungserscheinungen.




Abbildung 38.

Keilförmiges Eingreifen des Devonkalkes (hell) in die Culmschiefer (dunkel).

Oberhalb der Casa Moreretto bei Collina.

Das ansgedehnte, vom Südrhang der Kellerwand, dem Val di San Pietro, der Senke von Ravaseletto und dem Canal di Gorto eingeschlossene Gebiet besteht, wie die einförmige Gestalt der grünbewachsenen Kämmen (Abb. 37) schon von weitem erkennen lässt, durchweg aus Culmgesteinen. Ich kenne nur die eben genannten Grenzwege aus eigener Anschauung, und habe hier so wenig Bemerkenswerthes gefunden, dass ich von einer weiteren Untersuchung des Inneren absehen zu können glaubte. Am Ost-Eingang von Collina kommen in einem, am Bache anstehenden Gestein Abdrücke von *Archaeocalamites* vor. An der Südgrenze

des Culm zwischen Mieli und Povolaro steht zwischen dem Culmschiefer und den transgredirenden, aber durch einen untergeordneten Bruch abgeschnittenen Bellerophonkalken ein graner Thouflaserkalk an; es muss unentschieden bleiben, ob derselbe als eine Einlagerung im Culm oder als aufgesprestes älteres Gestein aufzufassen ist.

STUR gibt vom Monte Crostis und Monte di Terz Eruptivgesteine an, die also die Fortsetzung der Diabase des Monte Dimon bilden würden.

4. Der Gamskofel und die Plenge.

Die quer zum Streichen verlaufende Dislocation der Plöcken ist, wie erwähnt, wahrscheinlich als eine unregelmässige Blattverwerfung mit abgesunkenem Ostflügel aufzufassen. Das anormale ONO—WSW Streichen zwischen Valentinthal und Wolayer Gebirge deutet auf das hohe Alter dieser, der carbonischen Gebirgsbildung zuzurechnenden Störung hin. Die Einschaltung des Plöckenpasses und der mittlere Theil des Valenthales ist unmittelbar durch die Blattverwerfung vorgezeichnet, wie ja diese Form der Dislocationen auch sonst zur Bildung von Querthälern Veranlassung giebt.

Die uralte, dem Valenthale und dem Plöckenpässe folgende Verkehrsstrasse ist auch von früheren Beobachtern, LEOPOLD VON BUCH, TARAMELLI und STACHE untersucht und beschrieben worden. Auch STUR erinnert häufig an das „Normal-Profil des Plenge“. Wie nach dem Vorhergehenden kaum bemerkt zu werden braucht, ist gerade das Valentinthal die ungeeignetste Stelle zum Studium der normalen Schichtenfolge. Zu den tektonischen Schwierigkeiten gesellt sich ein rascher Facieswechsel von Kalk und Schiefer innerhalb des an und für sich versteinungsleeren Untersilur. Auch erschwert das dichte Unterholz, sowie die Steilheit der Gehänge und Gräben im unteren Valenthale die Untersuchungen ungemein. Wege sind in diesem Gebiete in höchst geringer Zahl vorhanden. Trotz zahlreicher, in allen möglichen Richtungen unternommener Touren bin ich noch nicht über alle Einzelheiten ins Klare gekommen¹⁾.

¹⁾ Meine frühere Darstellung (*Zeitschr. d. deutschen geol. Ges.* 1857, S. 682) wird durch die nachfolgende verschiedentlich ergänzt und verändert.

Auf der alten Römerstrasse, die von Mauthen auf dem linken Ufer des Valentinbaches zum Plückenwirthshaus führt, überschreitet man zunächst die aus schlecht aufgeschlossenen Glacialsehotttern aufgebaute Terasse von Maria Schnee und betritt dann das Gebiet des Untersilur. Dasselbe besteht im wesentlichen aus halbkrySTALLINEN Kalken und Kalkphylliten; die Thonschiefer erscheinen nur als Einlagerungen.

1. Das tiefste Glied der ganzen Schichtfolge, ein Thonschiefer mit Quarzfasern, ist nur unten an der Mündung des Valentinbaches aufgeschlossen und hier durch Wechsellagerung mit dem Kalkphyllit verknüpft. (Vergl. das Profil S. 76.)

2. Der erste Aufschluss, den man in den untersilurischen Mauthener Schichten beobachtet, enthält grauen Kalk mit weissen Spathadern. Weiter folgt krySTALLINER Kalkthonschiefer, der nach oben zu in reinen, weissen, halbkrySTALLINEN Kalk übergeht; die deutlich ausgeprägten Klüfte verweisen die Schichtung. An einer Wegbiegung eröffnet sich ein grossartiger Rückblick auf die aus weissem Kalk bestehenden schroffen Wände des unteren Valentinbaches.

3. Die nächste, längere Strecke des Weges führt durch eine Thonschieferleinlagerung. Das Streichen ist meist W—O, das Einfallen äusserst wechselnd, zuweilen nach S, zuweilen saiger. Bemerkenswerth sind Einlagerungen von conglomeratischer Granwacke mit Quarzbrocken (z. Th. wasserklar), sowie graue Quarzite mit Schwefelkies.

4. Unmittelbar vor dem Ederbaner erscheinen bei einem Heiligenbild wieder die Kalkphyllite; dieselben werden aber bald von dem ausgedehnten Gehängeschutt bedeckt, der das Entstehen zweier Gehöfte in dem abgelegenen Thale ermöglicht hat.

5. Das erste anstehende Gestein, das zwischen dem Tillaicher Hof und den Sägemühlen des Thalgrundes aufgeschlossen erscheint, ist ein schmaler Zug blauer Thonschiefer, wahrscheinlich ebenfalls eine Einlagerung. Fallen steil SSW.

6. Darüber folgen in grosser Mächtigkeit halbkrySTALLINE Bänder- und Schieferkalken von grauer, seltener von rother Farbe, wohl umgewandelte Orthoerokalken. An der Vereinigung von Valentin und Plückenbach liegen wieder mächt-

tige Schuttmassen. An dem Leitersteg, welcher die weit ansholende Serpentine der Strasse abschneidet, treffen wir rothe und grane Kalke mit Orthoceren, meist von dichter Beschaffenheit. Das Fallen und Streichen wechselt hier, wo die Kalkmassen des Cellon, Pollinigg und Mooskofel wie ein Schranbstock gewirkt haben, in der abenteuerlichsten Weise. Wo der Weg im Angesichte des gastlichen Plöckenhanses den Wald verlässt, erscheint noch einmal Silurkalk, der bald von Moränen und jüngerem Bachalluvium bedeckt wird.

Westlich und südlich von dem Plöckenhans steht an der Römerstrasse, die in einem weit in das Valentinthal einschneidenden Bogen die Höhe erreicht, überall silurischer Thonschiefer an. Die Grenze gegen die Kalke des Leitersteges ist durch Gehängeschutt und Wald bedeckt. Ueber dem Thonschiefer liegen die rothen und schwarzen Orthocerenkalke des Cellonvorberges. Die letzteren lagern im allgemeinen flach, nur am Ostabhang kommen local aufgerichtete Schichten (vergl. Lichtbild Taf. IV, ganz links) vor. Trotzdem ist gerade hier das flache Durchstreichen einiger mächtiger schwarzer hornsteinführender Kalkbänke für den unteren Theil des Abhanges bezeichnend.

Auf dem Vorberge des Cellon ist die Zone des *Orthoceras alticola* (n. a. mit *Orthoceras pectinatum* und *Cheirurus intermedius*) sehr versteinungsreich entwickelt. Genauere Angaben finden sich im stratigraphischen Theile. Der oben beschriebene Bruch zwischen dem flachen gelagerten Silur und dem steil aufgerichteten Unterdevon ist in einigen Gräben so deutlich angeschlossen, dass man im buchstäblichen Sinne die Hand darauf legen kann. (Vgl. oben die Abb. 30 S. 78, 34 S. 85 und Lichtbild Taf. IV.)

Die Tektonik des Gebirges zwischen dem Valentinbach und dem schutterfällten Sittmooser Thal lernt man am besten auf dem Pfade kennen, der von Manthen über die ansichtsreiche Manthener Alp an den Fass der Wände des Mooskofels führt. (Vergl. das Uebersichtsbild S. 78.) Am Lamprechthof biegt ein Alpweg von der Plöckener Strasse ab und schliesst beim Aufstieg grauen splittrigen Kalk in saigerer Schichtstellung auf. Die Streichrichtung ist hier noch NW (bis WNW)—SO.

Sehr bald erscheint Thonschiefer, der eine weithin verfolgbare Einlagerung darstellt, aber höchst wahrscheinlich von den beiden, an der Plöckener Strasse beobachteten Schieferzügen getrennt ist. Das Streichen ist bei der unteren Hütte WNW (bis W)—OSO saiger. Bei der oberen Hütte beobachtet man ein steileres oder flacheres Nordfallen; unterhalb der aus Kalk bestehenden nördlichen Kuppe (Δ 1785 m.) der Mauthener Alp hat der grünliche, Kalkfasern und Gangquarz enthaltende Thonschiefer bereits das vorherrschende NO-Streichen angenommen.

Die eigentliche Hochfläche der Mauthener Alp besteht aus Kalk und macht mit ihren unregelmässig vertheilten, moorerfüllten Vertiefungen den Eindruck, als ob ein altes Karrenfeld von Vegetation überzogen sei und als ob das Versickern des Wassers in den Kalkklüften die Herausbildung eines regelmässigen Abflusssystemes verhindert habe. Erst weiter südlich streicht der Thonschieferzug wieder auf die Hochfläche und fällt nach NNW. Unterhalb der Wände des Mooskofels biegt der Schiefer jedoch aus der vorherrschenden WNW—OSO-Richtung nach S um, erweist sich also in seinem Verlauf als vollkommen abhängig von der Grenze der devonischen Kalkmassen.

In dem Weidegebiet der unteren Valentin-Alp ist das anstehende Gestein durch Gehängeschutt bedeckt; man vermag also nicht zu unterscheiden, ob der eben beschriebene Thonschiefer der Mauthener Alp mit dem auf dem nördlichen Cellongehänge anstehenden gleichartigen und gleichalten Gestein (Streichen NW bis WNW—SO, Stellung saiger) unmittelbar zusammenhängt. Die Aenderung des Streichens erklärt sich wohl aus der Nähe des ebenfalls WNW verlaufenden Plöckener Längsbruches; auch höher hinauf tritt im Thale (nahe der oberen Valentin-Alp) derselbe untersilurische Thonschiefer auf. Weiter aufwärts, südlich von der Höheneote 1371, vereinigt sich der WNW streichende Plöckener Bruch mit der genau O—W verlaufenden Dislocation, welche die Südgrenze des Gamskofels bildet. Der vereinigte Bruch trennt dann weiter das nördlich liegende Devon des Wolayer Thales von den Silurschiefern der Maderkopfalp. Die Verschiedenheit der beiden Schollen ist sehr erheblich. Nördlich

bezw. nordöstlich liegen die flachgelagerten, dickbankigen, reinen Kalke des Devon, die nach W zu ihre Schichtung verlieren, nach O zu steil aufgerichtet sind; südlich, am Rauekofel streichen die schieferigen Plattenkalke und Schiefer des Silur von NO nach SW und stehen saiger. Wo Schiefer unmittelbar an die devonischen Riffkalke grenzen, tritt naturgemäss die Grenze besonders scharf hervor. Der Bruch fällt unter einem Winkel von ca. 70° nach N ein, das abgesunkene Devon bildet also das Hangende.

Die Verwerfung liegt fast genau in der Scharte des Raue- und Gamskofels und wird bei ihrem Eintritt in das Valentintal durch eine devonische, vom Gamskofel herabgeglittene Gehängescholle verdeckt. Die dickbankigen reinen Unterdevonkalke, welche noch auf den Abhang des Rauekofels hinübergreifen und reich an Korallen sind (*Cyathophyllum aff. helianthoides*, *Favosites*), fallen flach nach S, die silurischen Plattenkalke steil nach SO. Vom Thal aus sieht man die Schichtflächen der Devonkalke und kann dieselben nach Farbe und Struetar nur unvollkommen von dem angrenzenden Silur unterscheiden. Es hat den Anschein, als ob die Silurschichten eine torsionsartige Umdrehung erfahren hätten, während in Wahrheit eine hinabgeglittene Scholle jüngeren Kalkes neben den am Ort verbliebenen älteren Schichten liegt.

Der Abbruch der Gehängescholle hängt offenbar mit der Zersplitterung der Hauptverwerfung zusammen. Der Nordrand der kleinen Scholle bildet die genaue Fortsetzung der Bruchgrenze von Devon und Silur am Gamskofel.

Die fortgesetzte Zersplitterung der Verwerfungen ist offenbar in unserem, von einer zweimaligen energischen Gebirgsbildung betroffenen Gebiete die Regel. Wie weiter unten eingehender auseinandergesetzt werden soll, treffen die Ausläufer der Villnösser Bruchlinie auf die Gruppe der Kellerwand und bedingen die ungewöhnliche Verworrenheit des Gebirgsbaues.

Der Plückener Bruch streicht kaum einen Kilometer in der normalen Richtung nach WNW weiter. Dann tritt eine Umbiegung nach WSW ein, und in den jähren Nordwänden des Wolayer Gebirges verschwindet jede Spur einer Störung. Eine westnordwestliche Fortsetzung scheint zu fehlen; jedoch beob-

Grubenspitz

Rathauskofel

Plenge




Abbildung 39.

Nach photographischen Aufnahmen und Skizzen des Verf. ges. von O. Berner.

Plenge und Grubenspitz von der Mauthener Alp.

Der Kilianschleifer (dunkel gezeichnet) ist auf den, den Sockel des Berges bildenden devonischen Riffkalk, hinaufgeschoben. Unterhalb der Grubenspitz einige Züge von Orthoversteinkalk. (Vergr. Abb. 40 und das schematische Profil Rathauskofel—Kellerwand. 28 26.)

Rothauskefel



Abbildung 40.

von der unteren Wolayer

achtet man oberhalb der unteren Wolayer Alp im Lahngraben einen eigenthümlichen, schmalen, WNW streichenden Schieferzug inmitten der Devonkalke, der weiter westlich mit den Grabenbrüchen der Bordaglia-Alp und dem dislocirten Nordrand der Avanza-Masse unmittelbar zusammenhängt. Es kann wohl keinen Zweifel unterliegen, dass es sich hier um ein „Wiederaufleben“ des Plöckener Längsbruches handelt, dessen weitere Verfolgung späteren Abschnitten vorbehalten bleibt. Die viereckig begrenzte, von Dislocationen allseitig umgebene Kalkmasse des Gamskofels und der Plenge ist vor allem durch die Einfaltungen und die Ueberschiebungen von Silur auf Devon ausgezeichnet, welche entsprechend der anormalen Streichrichtung von NNW nach SSO erfolgt sind. (Man vergleiche vor allem das schematische Profil Rathhanskofel-Kellerwand.)

Von der Höhe der Manthener Alp beobachtet man, dass in dem gegenüberliegenden Gebirgszug der nördliche und südliche Gipfel (Plenge und Grubenspitz) ebenso wie der untere Theil des Abhanges aus Kalk besteht und dass eine Schiefermasse scheinbar muldenförmig aufgelagert ist). (Abb. 39.) Ein ähnliches Bild enthält sich von der gegenüberliegenden Seite, der beste Standpunkt ist die Hütte der unteren Wolayer Alp. Das Vorhandensein einer Ueberschiebung zeigt sich hier wesentlich deutlicher; der Schiefer ist flacher aufgelagert, die Grenze beider Gesteine äusserst unregelmässig, und endlich liegt auf dem Gipfel der Grubenspitz der Kalk wieder scheinbar über dem Schiefer. (Abb. 40) Wie ein Vergleich mit dem ersten Bilde beweist, hängt dieser Kalk mit der scheinbar im Liegenden auftretenden Masse unmittelbar zusammen. Das Silur ist also local an bzw. in das Devon hineingepresst. Ausserdem findet sich in der Scharte zwischen Grubenspitz und Gamskofel ein isolirter, nicht sehr ausgedehnter Schieferkeil im Kalke und bildet in tektonischer und topographischer Beziehung den Uebergang zu den am Mouskofel beobachteten Einsprengungen. (Abb. 41 u. 47 u. d. schematische Profil S. 76.)

*) Anfangs hatte ich diesen Schiefer für Culu gehalten und diese Auffassung auch auf einer früheren veröffentlichten Kartenskizze zum Ausdruck gebracht. Die petrographische Beschaffenheit lässt keinen Zweifel über das silurische Alter.

Die Untersuchungen des anstehenden Gesteins stimmen auf das Beste mit den Vorstellungen überein, welche der Beobachter von den gegenüberliegenden Bergen aus über den tektonischen Verband von Silur und Devon gewonnen hat. Beim Anstieg von der Ramunda-Alp zur Scharte zwischen Rathhanskofel und Grnbenspitz trifft man zunächst steil aufgerichteten, rothen Kramenzelkalk, der durch den Gebirgsdruck halbkristalline Beschaffenheit angenommen hat; weiterhin steht violetter und grüner Schiefer an, der weiter westlich, an der Steinwand, als leicht kenntliche Einlagerung in dem normalen Silurschiefer auftritt. Der dunkle Thonschiefer, der wie in dem NW liegenden Gebiet die Masse




Abbildung 41

Ein silurischer Schieferzug im Devonkalk.

(Aufgenommen vom südlichen Thalgehänge des Valentinthales.)

des Silur bildet, steht durchweg auf dem Kopf und streicht am Rathhanskofel WSW—ONO. Das zaunförmige ineinander-greifen von Kalk und Schiefer, die Reibungsbreccien und der unregelmässige Verlauf der Grenze ist besonders auf dem westlichen Abhang gut zu beobachten; hie und da dringen horizontale, bis 7 m. mächtige Kalkkeile in den Schiefer ein. Wie am Kollinkofel trifft man auch hier isolirte Kalkblöcke im Schiefer und Schieferintrusionen im Kalk.

Am Mooskofel sind nur noch Reste einer ehemals bedeutenderen überschobenen Masse vorhanden. Wie man auf dem Bilde „das Ostgehänge des Wolayer Thales“ erkennt, stehen die Devonkalke des Gamskofels fast vollkommen saiger, und am

Mooskofel ist dasselbe Verhältniss zu beobachten. Eine über diese saigeren Kalkbänke hingeschobene Masse muss hier und da intrusiv zwischen die Schichtfugen eingreifen; auf diese Weise ist das Vorhandensein eines in seinen unteren Theile gespaltenen Schieferzuges) zu erklären, der schräg über den Südabhang des Mooskofels hinzieht. Derselbe ist am besten vom Eiskar oder von der Grünen Schneid zu überblicken (vergl. Abb. 41). Vom Plöckenwirthshaus sieht man nur das Ausgehende des Zuges, eine dunkle Masse, die scheinbar als Kappe dem Gipfel des Mooskofels aufsitzt. Die nähere Untersuchung des Anstehenden zeigt auch hier an der Grenze von Kalk und Schiefer ein zackenförmiges oder blockartiges Ineinandergreifen beider Gesteine sowie ferner typische Reibungsbrecceien. Der devonische Riffkalk hat eine halb- oder ganz-krystalline Beschaffenheit angenommen. Man erkennt innerhalb einer dunkleren Grundmasse helle, völlig krystallin gewordene Flasern und kann dieselben als Reste von Korallen deuten, die unter der Einwirkung des Druckes ihre Structur vollkommen verloren haben.

Gamskofel und Plenge, die in oroplastischer Hinsicht durch den schutterfüllten Erosionsriss des Sittmooser Thales zerschnitten sind, bilden tektonisch ein Ganzes und sind von den Silurkalken der Manthener Alp durch einen im wesentlichen N—S verlaufenden Querbruch getrennt. Auch diese Dislocation könnte als eine westliche Absplitterung des Plöckener Querbruchs aufgefasst werden. Die weit nach N vorspringende Masse devonischer Kalke, die vielleicht stellenweise unmittelbar an den Quarzphyllit angrenzt, ist als eine ausgedehnte Senkungscholle aufzufassen. Leider macht der massenhafte Gehängesehutt am Nordabhang der Plenge genauere Beobachtungen unmöglich. Allerdings ist weiter westlich, unterhalb der Herrenstiege ein schmaler Schieferstreifen zwischen dem Devonkalk und dem Gehängesehutt aufgeschlossen. Auch am Ostabhang des Sittmooser Thales sind Beobachtungen möglich; hier grenzt der Quarzphyllit ohne schiefrige Zwischenlage unmittelbar an die grauen halbkrySTALLINEN Kalke und Kalkphyllite der Manthener Alp. (Vergl. d. Profil S. 76.)

*) Auch dieser Schiefer muss entsprechend der veränderten Auffassung als Silur (nicht als Culm) gedeutet werden.

5. Die Steinwand.

Der durch sein abweichendes NO-Streichen gekennzeichnete Gebirgstheil zwischen Wolayer Gebirge und Valentintal ist in südlicher Richtung aus dem Gesamtverhunde herausgedrängt worden, wie vor allem das Vorspringen des Devonkalkes in das Culmgebiet zwischen Plöckenpass und Collina beweist. Die östliche Begrenzung unseres Abschnittes wird durch die zwei Querbrüche des Plöckenpasses und des Mooskofels gebildet, an denen die meist wohlgeschichteten Silurgesteine mit massigen Devonkalken zusammenstossen.

Weniger scharf ist die westliche Grenze des durch seine fast ungläublichen Disloentionen ausgezeichneten Gebirgstheiles gegen die weiter folgende, einfacher gebaute Kette. Es lässt sich eine, durch mancherlei Interferenzerscheinungen ausgezeichnete Umhiegung des Streichens in der Nähe der Krenzen (Δ 2152 m.) beobachten. Auch ein Querbruch ist angedeutet. Die Grenze von Devonkalk und Silurshiefer zeigt am Stallonkofel dieselbe nord-nordöstliche Richtung wie der wesentlich aus Bellerophonkalk bestehende Längsgraben der Bordaglin-Alp. Zwischen beiden streichen allerdings die grünen Quarzite und die Thonschiefer des Silur ungestört durch. Die scheinbar verworrene Tektonik des Krenzengebirges wird verständlich, sobald man die Interferenz des anormalen NO-Streichens mit der normalen WNW-Richtung zum Ausgangspunkt der Erklärung nimmt. Die beiden tiefen Scharten, welche die Kalkwände des mittleren Wolayer Thales unterbrechen, sind durch antiklinale Auffaltungen von Mauthener Schiefer zu erklären. Die neben der unteren Wolayer Alp ansteigende Schieferzung von Lühna entspricht bereits der normalen WNW-Richtung, die breitere Furche des Henriesenweges streicht hingegen nach ONO. Die eigentümliche Verbreitung der grünen Silurgesteine zwischen Säbelspitz und Steinwand, der Verlauf der devonischen Kalkzüge zwischen Krenzen und Vetta Navastolt beruht ebenfalls auf dem mehr oder weniger scharf ausgeprägten Umschwenken aus der ostnordöstlichen in die westnordwestliche Richtung.

Am schärfsten ist die Umknickung des Streichens in dem weissen Kalkzuge ausgeprägt, welcher im Quellgebiete des Niedergailbaches dem grünen und blauen Silurshiefen eingefaltet ist. Das erste der beiden Bilder (Abb. 42) zeigt




Abbildung 43.



Abbildung 42.

Die eingefalteten Devonkalk im Silur des Niedergailthals.

Auf Abb. 43 kommt nur Silurschiefer (dunkel) und Kalk vor; auf Abb. 42 ist das Silur in Grünschiefer (Gr.) und Thonschiefer getrennt. K_1 und K_2 entsprechen dem südlichsten Theil von Abb. 43.

das Ende des südlichen Kalkzuges der Kreuzen und den NO streichenden Theil der Niedergailfalte. (Die Skizzen wurden beim Abstiege vom Wasserkopfe zu der Niedergailhütte aufgenommen und stellen das östliche Thalgehänge dar.) Schon die Thatsache, dass die Grenze der normalen Silurgesteine und der Grünschiefer quer zum Streichen der beiden Kalkzüge verläuft, deutet darauf hin, dass hier eine Drehung der tektonischen Axe erfolgt ist. Einen klaren Ueberblick gewährt selbstredend nur die Karte. Die zweite Ansicht versinnbildlicht das unregelmässige Ansehen des Kalkzuges. (Abb. 43.)

Weiter westlich wendet das Streichen wiederum nach WNW um und bleibt mit geringen Abweichungen bis Innichen, d. h. bis zur Vereinigung der Karnischen Hauptkette mit der „Schieferhülle“ der „Gneissalpen“ unverändert.

In rein oroplastischer Hinsicht ähnelt der westlich von dem Querriegel des Wolayer Gebirges liegende, aus zwei parallelen Ketten bestehende Abschnitt den Zügen der Kellerwand und des Gamskofels. Das südliche Kalkgebirge der Avanza und Paralba bildet die Fortsetzung der ersteren und erreicht in dem Hochweisstein (Paralba 2691 m.) fast die gleiche Höhe. In touristischer Hinsicht bildet die — meines Wissens bisher noch unerstiegene — Avanza eines der schwierigsten Probleme im gesammten Karnischen Gebiete. Hingegen ist der stolze Aussichtspunkt des Hochweissteins vom Oregione-Joch aus leicht zugänglich.

Der nördliche, verhältnissmässig kurze Zug der Steinwand ist an Höhe (Δ 2514 m.) dem Gamskofel (2516 m.) gleich und ebenfalls von der höheren südlichen Kette durch Thonschiefer getrennt, der zur Ausbildung eines kleinen Längsthalcs (Torrente Degano und Rivo Sissans) Veranlassung gegeben hat. Die grünen quarzitischen und schieferigen Gesteine der Steinwand, Randenspitz und Tiefenspitz sind den alt-silurischen Manthener Thonschiefern normal eingelagert und allseitig durch Uebergänge verbunden. (Man vergleiche die Beschreibung des Profils Obergailberg-Randenspitz im stratigraphischen Theile.) Insbesondere beobachtete Herr ROEMER, der den Südabhang der schwer zu ersteigenden Randenspitz genauer untersucht hat, ganz allmähliche Uebergänge zwischen normalen Thon- und Quarzitschiefern und den grünen,

schiefrigen und quarzigen Gesteinen. Bei dem Anstieg von der Brennerhütte zur Randenspitz trifft man zunächst phyllitischen Schiefer (mit schwarzen Kieselschieferlagen) und dann grünliche Schiefer und Quarzite. Den letzteren sind unweit der Höhe der Randenspitz zwei Züge des gewöhnlichen phyllitischen Thonschiefers eingelagert. Der südliche dieser Züge enthält graue Conglomerate mit Geröllen von rothem Eisenkiesel, wie sie weiter östlich am Roskarspitz wiederkehren.

Trotz dieser Uebergänge, welche die kartographische Abgrenzung der grünen Gesteine nicht unerheblich erschweren, ist der landschaftliche Unterschied gegenüber den gewöhnlichen Manthener Schiefen augenfällig. Die schroffen, dunkelblaugrün gefärbten Wände der quarzreichen Gesteine heben sich scharf von den gerundeten Schieferkämmen ab. (Man vergleiche die nebenstehende Ansicht der Tiefenspitz.) Schon die Spärlichkeit des Pflanzenwuchses auf den Quarziten ermöglicht eine leichte Unterscheidung. Der Kalkgehalt der Quarzite wird durch eine bemerkenswerthe botanische Eigenthümlichkeit, das häufige Vorkommen von schönen Edelweiss an der Randenspitz erwiesen.

Wie überall in dem Karnischen Gebiet, ist auch an der Steinwand der Nordabsturz durch besondere Schroffheit ausgezeichnet.

Die weitere Nordabsenkung der Hauptkette besteht im wesentlichen aus Thonschiefer mit wenig mächtigen Einlagerungen von gelblichem Kalkphyllit und Marmor. In stratigraphischer Hinsicht beansprucht der allmähliche Uebergang des altsilurischen Thonschiefers in den cambrischen Quarzphyllit einiges Interesse. Auf dem Kamm des Obergailberges sind die sämtlichen in Frage kommenden Gesteine gut abgeschlossen. (Vergl. das Profil im stratigr. Theile.)

6. Das Wolayer Gebirge und die Croda Bianca.

Das Wolayer Gebirge ist in geologischer Hinsicht die unmittelbare Fortsetzung der Kellerwand und des Monte Cogliano (oder Coglians G. St. K.). Zwar hängt der tiefe Einschnitt des Seekopf Thörl mit einer unbedeutenden Querverschiebung des Gebirges nach S zusammen; aber die Ueber-



Abbildung 41.

Nach einer photogr. Aufnahme des Verf. ges. von O. Berner.

Die Tiefenapitz (ca. 2400 m.) von W.

Der durch scharfe Formen ausgezeichnete Berg besteht aus grünem Quarzlit (Gr.), die niedrigen Höhen der Umgebung aus weichem Thonschiefer (S).

lagerung der mannigfachen Grenzhorizonte des Silur und Devon durch den massigen Riffkalk tritt an der stolzen Pyramide des Seekopfs mit derselben Deutlichkeit hervor, wie an Wolayer Thörl. Die auch im Bilde (Taf. XV) wiedergegebene verschiedenartige Färbung des Devonkalkes ist als Andeutung von Schichtung innerhalb der Riffmasse aufzufassen.

Der Wolayer Kamm, dessen nördlicher Steilabsturz durch eigentümliche, auf Verwitterung zurückführbare Höhlen in der Waud (Tangellöcher) ausgezeichnet ist, biegt bald in eine




Abbildung 45.

Gez. von Dr. Franz E. Suess.

**Die Grabenversenkung (Bellerophonkalk) der Bordaglia-Alp
von der Spitze der Croda Bianca.**

D Devonischer Riffkalk, B Bellerophonkalk. Die Schiefergesteine des Silur sind dunkel punctirt.

meridionale Richtung um. Dieser abnorme Verlauf ist wesentlich durch Verwitterung bedingt und nur indirect auf tektonische Ursachen zurückzuführen. Im Osten wie im Westen wird das Wolayer Gebirge durch Niederungen begrenzt, welche theils nur aus Mauthener Schiefer (Wolayer Alp), theils aus Bellerophonkalk und Mauthener Schiefer bestehen.

Der Bellerophonkalk, welcher zwischen der Alp Bordaglia di sotto und der Kreuzenspitze ziemlich unerwartet inmitten des devonischen Riffkalkes auftritt, zeigt flache La-

gerung und die typische Zusammensetzung aus dunkelen, etwas bituminösen Plattenkalken und Rauchwaacke. Dass diese Grabenversenkung die südwestliche Fortsetzung der aufgedrängten Antiklinale des Heuriesenweges bildet, wurde bereits erwähnt. Die Aufwölbung des Silurschiefers inmitten des Devonkalkes dürfte während der älteren Faltungsperiode erfolgt sein, der Einbruch des Bellerophonkalkes gehört selbstredend einer jüngeren Phase der Gebirgshildungen an und ist als letzter Ausläufer der Villuösser Bruchlinie aufzufassen. Somit haben hier in den alten Dislocationsrichtung auch in späterer Zeit wieder Störungen stattgefunden. Der Einbruch des Bellerophonkalkes inmitten des Devongebietes ist durch mehrere tektonische Erscheinungen ausgezeichnet. Innerhalb des ersten Gesteines beobachtet man zwei aufgedrängte Fetzen von typischem Grödener Sandstein. An der Grenze von Devon und Perm sind ferner schmale Züge von phyllitischem Mauthener Schiefer emporgedrückt worden, welche eine geradezu abenteuerliche Zertrümmerung erkennen lassen.




Abbildung 46.

**Schematische Skizze
der Umgebung der Bordaglia-Alp**
(ca. 1:12,500).

1. Phyllitischer Silurschiefer. 2. Devonischer
Bifkalk. 3. Grödener Sandstein. 4. Bellerophonkalk.

Streifen sichtbar. Der andere längere Schieferstreifen findet sich im Westen (ist also auf der Abb. nicht wahrnehmbar). Die Aufwölbungen an der Bordaglia-Alp gehören zu den vorwiegendsten, die ich in dem genannten Gebiete kennen gelernt habe. Wie die kleine, etwa in vierfachem Maasstabe der G. St. K. entworfene Planskizze zeigt, treten zwischen Bordaglia di sotto und der Krenzen die folgenden Gesteine auf: 1. Devonkalk, 2. phyllitischer Schiefer, verhältnissmässig breit, 3. Grödener Sandstein, 4. Schiefer, 6. Grödener Sandstein, 6. Schiefer, 7. Grödener Sandstein (4—7 in

Vorn auf dem unteren Theil der Abb. 45 (Herr Dr. F. E. SUSS fertigte dieselbe freundlichst für mich an) ist der östliche

Grubenspitz. Gamskofel (2516 m.). **Wolayer Gebirge.** Rauchkofel (2463 m.). **Kellerwand** (2810 m.). **Monte Cogliano** (2799 m.).



Abbildung 47.

Nach einer photogr. Aufnahme von Dr. v. d. Horne geol. von O. Berner.

Das Hoohland der devonischen Kalkriffe von Westen (Kreuzen).

Die meisten dargestellten Berge bestehen aus mittel- und unterdevonischem Kalk (D). Im Vordergrund der eingebrochene Bellerophonkalk (B) der Hohtaglia-Alp, insamt von Sturnschläfer (S). Zwischen Gamskofel und Grubenspitz übersehenees Bild (S). Der Rauchkofel besteht aus oberdevonischem Kalk (S).

Zu Seite 107.



Abbildung 45.

Das Wolayer Gebirge vom Gipfel der Croda Bianca.

Zungenförmiges Sedimentgestein von devonischem Bifkalk und Colmschiefer (dunkel).

schmalen, oft nur wenige Meter breiten Zügen), 8. Bellerophonkalk, breiter, 9. Schiefer. Die beiden Quelläste des kleinen Bordagliabaches vereinigen sich unweit der Casa di sotto und folgen genau der Grenze des devonischen Riffkalkes gegen die eingesunkenen bzw. aufgedrückten Massen. Auf dem nebenstehenden Uebersichtsbild 47, Kellerwand-Gumskofel, erkennt man im Vordergrunde den ansteilenden Bellerophonkalk und Silurschiefer.

Eigenartige Faltungsercheinungen kennzeichnen den Südabhang des Wolayer Gebirges und vor allem die „Weisswand“ (Croda Bianca, auch Monte Ombladet genannt, 2200 bis 2300 m.). Vom Gipfel des gemunten Berges beobachtet man auf dem Südabhang des Wolayer Gebirges eine langgestreckte Schieferzunge, welche tief in den Kalk hineingreift. Die beifolgende Skizze veranschaulicht das Ineinandergreifen beider Gesteine, erlaubt aber keinen sicheren Rückschluss auf die Richtung der alten Faltung. Der Kalk könnte in den Schiefer eingepresst sein, aber der umgekehrte Fall wäre ebenfalls denkbar.

Die Beobachtungen an der Croda Bianca gestatten sichere Folgerungen. Der im Grossen und Ganzen flachgeneigte Südabhang des Berges besteht vorwiegend aus Culu; unter den Gesteinen erscheint der in anderen Gebieten vorherrschende dunkle Thonschiefer verhältnissmässig selten. Die Stelle desselben nehmen rothe und grüne Schiefer ein, welche z. Th. mit gefaltetem Grödenner Mergel verwechselt werden könnten. Ausserdem sind Kieselschiefer und Grauwacken sehr verbreitet. In diese verhältnissmässig plastischen Gesteine ist von N her ein ursprünglich zusammenhängender Keil von devonischem Riffkalk hineingetrieben worden. Dass eine echte Faltungsercheinung vorliegt, beweisen die umgebogenen Kalkschichten auf dem Lichtbild mit aller erforderlichen Deutlichkeit. Der in der nunmüthigsten Weise zusammengeschobene ältere Kalk wird im Hangenden und Liegenden von jüngerem Schiefer eingefasst. Jedoch ist ein von W nach O gelegter Durchschnitt weniger geeignet, die Richtung der Einfaltung zu erläutern. Hierfür vergleiche man die kleineren Skizzen und Abb. 49.

Das schönste Beispiel derselben findet sich an der grossen, rund begrenzten Kalkmasse südlich des Gipfels und ist in einem

Wasserriss neben einer auf der Karte nicht angegebenen Alphütte aufgeschlossen. Drei Gesteinszonen, ein schneeweisser Kalk, ein brauner durch Eisenoxydhydrat gefärbter Kalk und schwärzlicher Schiefer sind hier in der wunderlichsten Weise durcheinander gekuetet.




Abbildung 50.

Der Kalkkeil der Croda Bianca von Frassenetto.

Die ungleiche Härte der beiden Gesteine sowie vor allem das Vorhandensein zahlreicher Klüfte in dem Kalk lassen es erklärlich erscheinen, dass dieser letztere bei der Einfaltung



Abbildung 51.

Die Croda Bianca von Westen.

Ein zersprengter Kalkkeil im Culmschiefer.

in verschiedene Schollen aneinander getrieben wurde. Dass der in die Risse des Kalkes eindringende Schiefer eine sprengende Wirkung entfaltet, wurde bereits verschiedentlich (Wolayer Gebirge) beobachtet. Das eigenthliche Vorkommen von 7 oder 8 getrennten Schollen eines zweifellosen devonischen

Zu Seite 108.



Abb. 49.

Nach Skizzen des Herrn E. Suess jun. und des Verfassers.

Die Croda Bianca von Osten.

Der Berg besteht aus Colan (dunkel), in welchem ein aus devonischem Riffkalk (weiß) bestehender, gutgeschuener Kalkkeil horizontal eingeschoben ist. Im Hintergrunde die Trilsberge von Biadon.



Monte S. Angelo, S. Angelo, S. Angelo

Taf. VII. Taf. VII.



050

Die Croda Bianca von Norden.

Culmshiefer (s) und devonischer Riffkalk (k) sind horizontal in einander gefaltet. Im Vordergrunde Helterphosphkalk (B).

Riffkalke inmitten des Culms ist auf diese Weise am einfachsten zu erklären. Gegen die Annahme von Einlagerungen spricht schon das Vorhandensein von Reibungsbreccien. Es braucht kaum bemerkt zu werden, dass die zahlreichen kleinen Kalkmassen auf den verschiedenen Skizzen grossentheils unter sich zusammenhängen und nur durch die Rasendecke getrennt erscheinen; das einzige objectiv richtige Bild giebt die Karte, deren Massstab allerdings für die vorliegenden verwickelten Verhältnisse kaum ausreicht.

Die allgemeine Neigung der Kalkschollen ist von Nord nach Süd gerichtet und die beiden an der Strasse unterhalb von Frassenetto aufgeschlossenen halbkristallinen Vorkommen sind beinahe 4 km. von der zusammenhängenden Masse des Wolayer Gebirges entfernt. Die Kalkschollen, welche den Gipfel und den Beginn des nach S ziehenden Kammes der Croda Bianca umgürten, lassen die ursprüngliche Verbindung am deutlichsten erkennen. (Vergleiche die Skizzen.) Es wäre denkbar, dass die beiden äusserlich durch Schiefer getrennten Schollen im Inneren des Berges noch zusammenhängen. Die weite Verbreitung der Kalkblöcke im Thale von Frassenetto macht eine grössere Ausdehnung derselben in früherer Zeit wahrscheinlich.

Das allmähige Auskeilen der Schollen nach Süden, der in der gleichen Richtung mehr und mehr geockerte Zusammenhang, sowie die Verbindung der Keile mit der Hauptmasse des Kalkes im Norden, lassen den Schluss unabweisbar erscheinen, dass die faltende Kraft von Nord nach Süd gewirkt hat.

7. Der Hochweisstein (Paralba).

Die stolze Pyramide des Hochweissteins verdankt ihre allseitig freie Lage einer tektonischen Unregelmässigkeit, welche innerhalb des westlichen Gebirgsabschnittes die einzige erheblichere Abweichung von dem regelmässigen Faltenbau darstellt. Der zusammenhängende Zug der massigen altdevonischen Riffkalke wird durch einen nach Süden eindringenden Keil silurischer Thonschiefer gewissermassen auseinander getrieben und stellt somit einen nach Norden offenen, verzerrten Bogen dar. Den östlichen Abschnitt desselben bilden Monte Avanza und

Monte Ciadensis, eine gewaltige, nach allen Seiten jäh abstürzende Masse von halbkristallinem Devonkalk; den westlichen Theil stellen der Hochweisstein und die Hoehalplspitz dar. In der Mitte liegt eine niedrigere, von zahlreichen Verwerfungen und Rissen durchsetzte namenlose Spitze, die ich als Bladener Joehkofel bezeichnen will. (Vgl. die nebenstehende Abb. 52.)

An dem Bladener Joehkofel ist die Wirkung der gebirgsbildenden Kräfte am energischsten zum Ausdruck gelangt. Die unregelmässigen Risse in demselben entsprechen durchweg Verwerfungsklüften, welche das Gestein quer durchsetzen und im Norden wie im Süden deutlich hervortreten. Eine physiognomische Aehnlichkeit mit den Zirkelspitzen ist zweifelsohne vorhanden — nur bot der massige, halbkristalline Riffkalk des Bladener Joehkofels der Verwitterung weniger Angriffspunkte als der bröcklige, leicht zerfallende Trias-dolomit.

Die orographische Trennung unseres Kalkkopfes von der aus massigem Riffkalk bestehenden Avanza und Paralba beruht auf dem beiderseitigen zungenförmigen Eingreifen weicherer Kalkphyllite. Am Avanzajöchl (im O) dringt auch eine Zunge von schwarzem typischem Silurshiefer weiter vor. Hauptsächlich wird jedoch der massige graue Kalk des Bladener Joehkofels von bunten und grauen Bänderkalken oder Kalkphylliten eingefasst, die als umgewandelte Kramenzelschichten des tiefsten Devon zu deuten sind und auch am Oregione-Joeh im Westen der Paralba wiederkehren. Es ist unmöglich, über den tektonischen Wirrwarr, der in einandergeschobenen, gepressten und deformirten Schiefer, der massigen und der geschichteten Kalke vollkommen ins Klare zu kommen. Im Allgemeinen darf man annehmen, dass, wie am Seekopf und Wolayer Thörl hier die devonischen Riffmassen von bunten thonreichen Kalken und wechsellagernden Thonschiefer unterteuft werden; letztere haben jedoch am Bladener Joeh infolge des höheren Gebirgsdruckes eine halbkristalline Beschaffenheit angenommen. Die zwischen den Bänderkalken lagernden Schiefer am Bladener Joeh — westliche Ecke der obigen Skizze — wurden auf der Karte ebenfalls zu dem tiefsten Devon gezogen, da auch im Wolayer Profil ein derartiger Schiefer zwischen den Kramenzelkalken

Bladener Joehkofel.




Abbildung 52.


Der Bladener Joehkofel.

Eine kleine, von Diablasenapalten durchsetzte Masse von devonischem Riffkalk in der Loèche zwischen Ananza und Hochweinstein. In unregelmässiger Weite sind beiderseits Züge von geschichteten Unterdevon (GD Kalkphyllit) und Silurschiefer (dunkel) eingefaltet.

Gemskotel
(2114 m.)Raudenspitz
(2495 m.)

Torrente Degano Monte Avanza Bergwerk Rivo Avanza

Monte Cadin



Schematischer Durchschnitt durch Raudenspitz und Monte Avanza. 1:50 000.

Höhen und Längen im natürlichen Verhältnis. (Die nördliche Fortsetzung auf Profil-Tafel VIII.)

auftritt. Die Farben der Bänderkalke und Kalkphyllite sind am Bladener Joeh überaus mannigfaltig, schwarz, grau, gelb und roth in verschiedenen Abstufungen.

Während im Silurshiefer des Ofener Joehes die Häufigkeit der Gangquarze auf tektonische Verschiebungen hindeutet, sind an den gefalteten Bänderkalcken des Bladener Joehes noch weitere Einzelbeobachtungen möglich. Abquetschungen und überschohene Falten treten in Handstücken ebenso deutlich hervor wie im tektonischen Aufbau des ganzen Gebirges. Man nimmt vor allem wahr, dass Zerreibungen und Verschiebungen, welche durch die spätere Ausfüllung mit weissem Kalkspath sichtbar werden, der Richtung der Falten und Fältchen parallel verlaufen und somit gleichzeitig mit diesen entstanden sind. Viel seltener sind Kalkspathadern, welche die ersteren quer durchsetzen und somit auf spätere Zerreibungen hindeuten. Eigentliche Reibungsbreccien sind infolge der mannigfachen Uebergänge von Kalk und Schiefer ziemlich selten und bisher nur an der Forella dell Oregione (westlich vom Hochweisstein) beobachtet worden. Einige im Handstück zu beobachtende Faltungsercheinungen werden im allgemeinen Theile beschrieben werden.

Der äusserst krummlinige und unregelmässige Verlauf der geologischen Grenzen zwischen Avanza und Hartkarspitz beweist, dass in diesem Abschnitt des Gebirges die Faltung — also die carbonische Gebirgshildung — das maassgebende Moment gewesen ist. Die Verwerfungen der jüngeren miocänen Phase zeichnen sich durch Gradlinigkeit aus. Nur am Südabhang der Avanza, wo die Grenze von Kalk und phyllitischem Schiefer fast senkrecht verläuft, könnte man an ein späteres Nachsinken der gewaltigen Kalkmasse denken. Die Gesteinsgrenze ist hier durch Vorkommen von silberhaltigen Erzen — Fahlerz, Kupferkies, Bleiglanz und viel Schwerspath — gekennzeichnet. Der alte von R. HOERNES eingehender geschilderte Bergbau ist längst zum Erliegen gekommen¹⁾. (Vergl. das schematische Profil der Avanza.)

Die Riffmasse des Hochweissteins ist abgesehen von den Kalkphylliten des Bladener Jöchls fast allseitig von silurischen

¹⁾ Verhandlungen der Geol. Reichsanstalt. 1876.

Schiefergesteinen verschiedener Zusammensetzung umgeben; nur im Norden führt ein schmaler Zug von grauen Kalken zwischen Ofener- und Oregione-Joch hinüber zur Hoehalpl- und Hartkarspitz.

Das Lichtbild „das Oregione-Joch“ bringt den Verlauf dieses Kalkzuges zwischen dem Nordabhang der Paralba und dem Hoehalpspitz zur Darstellung. Die pralle Wand der Paralba (S) entspricht, wie ein Vergleich mit den Uebersichtsskizzen lehrt, nur dem unteren Drittel des eigentlichen Abhanges, der hier (im Oregione-Thal) gewaltige Rutschflächen — bis zu 120 m. Höhe — zeigt. Die dunkle, rasenbedeckte Höhe im Hintergrunde begrenzt das Ofener Joch, die weiter uördlich liegende steile Kalkwand bildet den südlichen Eckthurm der Hoehalpspitze. Letztere besteht aus einem eigentümlichen, in steilen hellen Wänden abbrechenden feldspathführenden Silurschiefer, dessen Bergformen aus der Entfernung oder bei schlechter Beleuchtung mit denen des Kalkes verwechselt werden könnten. Der feldspathführende Schiefer — nach Dr. MILCH möglicherweise ein umgewandelter Quarzporphyr — bildet offenbar eine Einlagerung im Silur. (Genauerer über die petrographische Beschaffenheit des beim ersten Anblick an Knotenschiefer erinnernden Schiefers im stratigraphischen Theile.)

Jenseits des erwähnten Eckthurms zieht der Kalk auf dem Nordabhang hinüber und unterlagert, wie das Profil der Hoehalpspitz zeigt, den Feldspathschiefer scheinbar. In Wirklichkeit handelt es sich wohl um eine horizontale Einfaltung des letzteren. Denn auf dem Südwestabhang der Hoehalpspitz (im Piavethal) gehen die grauen oder grünen feldspathführenden Schiefer durch ein Zwischenglied grünlicher Schiefer in die gewöhnliche Schiefergesteine der Mauthener Schichten über. Dass die Hoehalpspitz von höchst euergetischen Faltungsvorgänge betroffen worden ist, beweisen die Einquetschungen von schwarzem, graphitischem Schiefer auf der Nordostseite. Dieselben stellen vollkommen zerfüttete, von Gangquarzen durchsetzte Massen dar und bilden eine zusammenhängende Zone am unteren Theile des Gebüges. Das Auskeilen der Schieferkeile in südlicher Richtung deutet darauf hin, dass die faltende Kraft von Nord gewirkt hat.



Das Oregon-Joch von Westen.
Feldspathic (F) des Silur (geschieferter Quarzporphyr), devonischer Riffkalk (K) und silurischer Thonschiefer (S) stehen in steiler Stellung nebeneinander.

каждый из них имеет свой особый характер.

Каждый из них имеет свой особый характер, который обусловлен особенностями его географического положения.

Das Olegjone-See von Westen

2. Ziel: ...
Ziel: ...
Ziel: ...

2. Ziel: ...

Олегjone-See
von Westen

5216 m
Hochwasser

101 IV. Hochwasser


Fig. 10



Fig. 10

Photograph of Great Western in the Sierra

Der Kalkzug bedingt trotz seiner verhältnissmässig geringen Breite die anormale NNW-Richtung der Hauptkette; an der Hartkarspitz wird derselbe etwas breiter und gewinnt noch einmal die Höhe des Kammes, verschmälert sich dann aber wieder. Der weitere Verlauf ist recht verwickelt. Unmittelbar westlich vom Gipfel der Hartkarspitz streicht der hier deutlich geschichtete Kalk auf den Nordabhang, bildet



Anh. 55 u. 54.

Profilansicht der Hochalplspitze.

Die Spitze besteht aus Feldspathischeiefer (FS) des Silur. Darunter lagert e'ngefalteter Devonkalk; in letzterem finden sich Einquetschungen von schwarzem, graphitischem Silurschiefer. Abb. 54: Einzelaussicht einer solchen.

dann noch einmal die Kammhöhe für eine kurze Strecke und schwrukt auf die Südseite der Kette hinüber, indem er gleichzeitig ein wenig nach O zurückbiegt.

Auf den beiden folgenden, von entgegengesetzten Standpunkten aus aufgenommenen Ansichten des Hochweissteins und der Hartkarspitz ist der Zusammenhang des Kalkzuges nur unvollkommen zu beobachten; man glaubt vereinzelte Einquetschungen vor sich zu haben — allerdings findet sich auch

eine solche südwestlich der Hartkarspitz (vergl. die Abb. 56 unter 2—4) und eine zweite, noch kleinere südöstlich der Steinkarspitz. Doch habe ich mich beim Umwandern der ganzen Bergkette von dem auf der Karte dargestellten Zusammenhang des Kalkzuges von dem Hochweisstein bis zu dem Spitzchen 5 überzeugen können. Man vergleiche auch Abb. 56.

Die Grenze zwischen Devonkalk und Silurschiefer ist in ähnlicher Weise durch zaekenartige Vorsprünge und Zungen gekennzeichnet, wie der mechanische Contact von Devon und Cuhn. Allerdings ist das scheinbar äusserst verwickelte Ineinandergreifen der Gesteine am Bladener Joehkofel zum Theil durch ursprüngliche Wechsellagerung, zum Theil auch durch perspectiveische Verkürzung des Bildes zu erklären. Um so




Abbildung 55.

Der in den Silurschiefer (dunkel) eingefaltete Kalkzug der Hartkarspitz von Nordwest.

deutlicher ist dagegen der nebenstehend abgebildete Sporn von Devonkalk, der in den Schiefer des Ofener Joehes vordringt. Der Abhang ist gleichmässig auf den Beschauer zu geneigt. Man kann sich leicht vorstellen, dass derartige Vorsprünge — wie an der Croda Bianca — durch die Faltung auch vollkommen abgetrennt werden können. In ähnlicher Weise sind die vereinzelt Kalkblöcke an der Hartkar- und Steinkarspitz zu erklären.

Schon bei der Beschreibung des Mooskofels wurde darauf hingewiesen, dass umfangreiche Kalkmassen, welche mit anormalem Streichen in die Schiefer eingefaltet sind, auch die Richtung der letzteren in massgebender Weise beeinflussen. Wie gewaltig der Hochweisstein über die um-

Hochweisstein.

Ausläufer der Hartkarspitz.

5 4 3 2 1




Abbildung 56.

Nach photographischen Aufnahmen von Dr. v. d. Born und F. Frech, g. z. von G. Berner.

Hochweisstein und Hartkarspitz von SO.

Die Ausläufer der Hartkarspitz sind mit denselben Buchstaben bezeichnet, wie auf der, von der entgegengesetzten Seite aufgenommenen Abb. 55. Der nach SW zu auskeilende Kalkzug scheidet sich durch seine Farbe innerhalb des dunkelen Schiefers aus.

Hartkaraspitz.

Hochalpeispitz.

Hochweisstein.




Abbildung 58.

Nach photographischen Aufnahmen und Skizzen des Verf. gen. von O. Berner.

Hochweisstein (Paralba) von Westen. Rechts das Valle Visadende.

S. Silurschiefer, F. Feilspathschiefer des Silur, K. Devonische Riffkalk, G. Gipsener Sandstein. Der Kalk der Hartkaraspitz hängt auf der Nordseite mit dem der Hochalpeispitz zusammen.

gebenden Schieferkämme hervorrägt, das zeigt das nebenstehende Landschaftsbild in anschaulicher Weise; dem entsprechend besitzen auch die Schiefer auf eine Entfernung von 2—3 km. eine vorwiegend nördliche, auffallend unbestimmte Streichrichtung. Ebenso deutet die grosse Häufigkeit von Gangquarz auf bedeutende Dislocationen hin. Der nachfolgende Bericht über den Aufstieg vom Valle Visdende zum Oregione-Joch giebt zugleich eine Uebersicht der mannigfachen Schiefervarietäten des älteren Silur. (Vergl. Abb. 58 und das Lichtbild des Oregione-Joches.)

Der Weg — einer der wenigen im Valle Visdende,




Abbildung 57.
Ein devonischer Kalkkeil in dem dunklen Silurschiefer des Othier Joches.

welche richtig auf der österreichischen G. St. K. angegeben sind¹⁾ — führt von der Hüttengruppe südlich des Namens „Valle di Carnia“ zuerst durch die Schotter des Antolobaches und erreicht zwischen diesem und dem Torrente Piave anstehendes Gestein. Am Wege sind die folgenden Schichten sichtbar:

1. Weisses oder hellgrünlicher sericitischer Phyllit, NW—SO streichend, saiger stehend oder steil SW fallend. (Bei diesem Gesteine war die Bestimmung Quarzphyllit oder

¹⁾ Das betr. Blatt der italienischen Tavolette ist leider erst ein Jahr nach Abschluss meiner Arbeiten im Gebirge erschienen.

Mauthener Schiefer? zweifelhaft; angesichts der geringen Mächtigkeit des Sericitphyllites und der Unmöglichkeit, das schlecht aufgeschlossene und kartographisch meist unrichtig dargestellte Valle Visdende genauer anzunehmen, wurde der letztere Ausweg gewählt. Nach der mikroskopischen Untersuchung ist das Gestein granwackenähnlich.)

2. Einige Bänke von Kalkphyllit. Streichen N (bis NNW) —S. Fallen steil O.

3. Schwarzer, weissgeaderter Kieselschiefer, wenig mächtig.

4. Schwarzer, dünnblättriger, glimmeriger Thonschiefer, ebenfalls wenig mächtig. Streicht NNO—SSW; saiger.

5. Einige Bänke von Kalkphyllit. Streichen N—S saiger.

6. Grünlicher Thonschiefer, ziemlich mächtig. Streichen N—S, Fallen steil O. Der Schiefer wird weiterhin glimmerreich und phyllitisch, zeigt bedeutende Störungen und ist sehr mächtig. Das Streichen biegt aus der reinen Nordrichtung nach NNW, dann wieder nach N, dann nach NNO und wieder nach N um; die verschiedenen Aenderungen vollziehen sich in kurzen Zwischenräumen.

7. Weiter oben steht röthlicher Granwackenschiefer von geringer Mächtigkeit und dann wieder grünlicher, seidenglänzender Schiefer an.

8. Eine Strecke weit fehlen die Anfschlüsse. Sodann beobachtet man Thonschiefer mit vielem Gangquarz. Streichen NNW—SSO, saiger, dann N—S.

9. Auf der Höhe des Rückens zwischen Antolo- und Piavethal findet sich eingefaltetes Grödener Conglomerat. Das Einfallen ist steil und nach NW gerichtet. Unten im Piavethal ist der Sandstein nur auf eine kurze Strecke hin aufgeschlossen.

10. Weiter aufwärts im Thale erscheint noch einmal grünlicher Thonschiefer. Streichen N—S, saiger; dann

11. Feldspathführender Schiefer der Hoehalpspitz.

12. Der schmale Zug von Devonkalk (N—S streichend zwischen Hoehweisstein und Hoehalpspitz) mit stark gepressten schwarzen, gelben und rothen Kalkphylliten. (Dieselben konnten kartographisch wegen ihrer geringen Ausdehnung nicht ausgetrennt werden.)

13. Thonchiefer mit viel Gangquarz, das Gestein der Forella Oregione und des Ofener Joehes.

Weiter abwärts findet sich im Piavethal in der Nähe der Häusergruppe Costa Zucco noch ein Vorkommen von Quarzphyllit, das jedoch zu beschränkt ist, um kartographisch ausgeteilt zu werden.

Auf einem Wege, der ungefähr parallel zu dem oben beschriebenen Durchschnitt in der Tiefe des Piavethales führt, beobachtete ich ebenfalls nur schiefrige Gesteine, die nicht zum Quarzphyllit gerechnet werden können, nämlich:

1. Grünlichen phyllitischen Schiefer NNW (bis NW) —SSO Fallen mit ca. 20° WSW.

2. Kalkphyllit (= 2 der obigen Seite) mit gleichem Fallen wie 1. Die weiteren Aufschlüsse sind infolge der Schuttheckung lückenhaft; es herrscht ein grünlicher Thonchiefer (mit eingelagerten Bänken von sericitischem Phyllit) vor. Am Colle di Cánova steht hellgrüner, glimmeriger Quarzchiefer an. Das Streichen ist NNW (bis NW)—SSO saiger, stimmt also fast mit dem normalen überein. Der Einfluss des Kalkmassivs der Paralba ist hier kaum mehr wahrnehmbar.

IV. KAPITEL.

Die westlichen Karnischen Alpen.

(Quarzphyllit, Silur, Devon.)

1. Allgemeines.

Der Westabschnitt der Karnischen Hauptkette bildet ein typisches, den Rheinischen und noch mehr den Thüringer Bergen vergleichbares Faltengebirge. Die steil aufgerichteten älteren Bildungen, die gewaltigen, randlichen Senkungsrümpfe und die flachgelagerten jüngeren Formationen sind hier wie dort in gleicher Weise entwickelt.

Die meist saiger gestellten Quarzphyllite und Silurschiefer, welche weiter östlich nur den Nordabhang des Gebirges bilden, wiegen bei weitem vor; einige Züge von devonischem Riffkalk (Porze und Königswand) nehmen auf der Karte einen verhältnissmässig geringen Raum ein, beeinflussen aber die ganze Physiognomie des Gebirges in erheblichem Masse. Anstehende carbonische Gesteine fehlen vollkommen, und das Perm ist auf einige eingefaltete Fetzen von Gröden Sandstein beschränkt. Eine grössere Einfachheit in der Zusammensetzung des westlichen Theiles ist, im Gegensatz zum Osten, unverkennbar. Rechnet man, was aus geologischen Gründen unabweisbar ist, die phyllitische Vorstufe der Gailthaler Alpen zur Hauptkette, so besitzt diese letztere zwischen Valle Visdende und Sillian synklinalen Bau: Quarzphyllit im Norden und Süden, Silur nebst eingefaltetem Devon in der Mitte. Dagegen sind die östlichen Theile der Hauptkette im Grossen und Ganzen durch einen monoklinalen Aufbau gekennzeichnet: Quarzphyllit und Silur im Norden, die jüngeren Formationen (zuweilen in der Folge: Devon, Unterearbon) im Süden.

Königswand
2510 m

Heret-Sp.

Roskar-Sp.
2508 m

Taf. I.



Königswand und Roskarspitze von Süden.

Kia in den schiefen Quarzhyllit (s) eingeführter Zug von derselben Riffelt (k); im Westen eine kurze Unterbrechung des Kaltes.

Ընդհանրական դեպքում
 քիչ և չոր շրջաններում հասնում են 20-30 աստիճանով ցածր ջրի մակարդակին, որի հետևանքով
 հողերը և անտառները չեն կարողանում ապահովել բնակչությանը և անասնաբուծությանը անհրաժեշտ
 ջրով:


Ջրի պահուստի և օգտագործման հարցերը



ԸՆԴՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 ԳՐԱԴԱՐԱՆ

ԵՐԵՎԱՆ

ԸՆԴՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 ԳՐԱԴԱՐԱՆ



Paesaggio a Divod d'Alferaz e La Berina

Die Regelmässigkeit des Faltenbaues erscheint im Westen wenig gestört. Die ungleiche Breite, welche die Schiefergesteine auf der Karte einnehmen, wird — wie überall — durch die grössere oder geringere Zahl der Falten bedingt, in welche dasselbe Gestein gelegt ist (Schuppenstruetur).

Drehungen im Streichen wie an der Mauthener Alp oder an der Paralba, sowie grössere Brüche fehlen vollkommen. Das keilförmige Ineinandergreifen verschiedenartiger Gesteine erfolgt nur noch in kleinerem Maassstabe. Stumpfwinkelige Wendungen in der Richtung der Falten, wie sie an der Porze und am Rosskar auftreten, sind im Vergleich zu den im Osten beobachteten Unregelmässigkeiten unerheblich. Die einzige ansgedehntere Dislocation, der Einbruch der Triassesholle des Sasso Lungerin liegt bereits an der Südgrenze der Hauptkette.

Der regelmässige Faltenbau des westlichen Abschnittes ist bereits von STACHE im Grossen und Ganzen richtig erkannt und die Bedeutung der, durch silurische und devonische Versteinerungen sicher horizontirten Gesteine für die Deutung der sogenannten Schieferhülle der „Gneissalpen“ hervorgehoben worden.¹⁾

¹⁾ Das Paralba-Silvella-Gebirge, Verhandl. der geol. Reichsanstalt, 1883 S. 213 ff.: „In erster Linie bildet dieser Nachweis (des Silur) den Ausgangspunkt für die schärfere Altersbestimmung der dem krystallinischen, älteren Gneissgebirge aufgelagerten, durch tektonische Störungen in Bruch- und Faltenhüllen sowie selbst auf Rückenlinien erhalten gebliebenen, verschiedenen subkrystallinischen Facies palaeozoischer Formationen, unter welchen das Silur die hervorragendste Stelle einnimmt, nicht minder in den Nordalpen wie in den Südalpen.“ Ich halte den Inhalt dieses Satzes im Allgemeinen für richtig, kann jedoch in Bezug auf die Auffassung der devonischen Kalkzüge nach der Meinung STACHES folgen. Ich glaube nicht, dass die Kalkmassen theils dem Schiefer „direkt aufsitzen“, theils „eingebettet“ sind, sondern halte die letztere Auffassung für allein zutreffend; dieselbe ist dahin zu erweitern, dass es sich theils um normale Einlagerungen von Silur, theils um Einfaltungen von Devon handelt. Man vergleiche die nachfolgende Darstellung. Ebenso ist die am gleichen Ort geäusserte Ansicht, „dass die tektonische Hauptanlage des Grundgerüstes der Ostalpen schon vor der Ablagerung der Dyasformation bestand“, nur theilweise mit meinen Beobachtungen in Einklang zu bringen. Ein Hochgebirge bestand allerdings in der betreffenden Zeit, aber die Hauptanlage desselben war, wie schon die — unzweifelhaft vorhandene — umgekehrte Faltungsrichtung beweist, ganz wesentlich verschieden.

Der Regelmässigkeit des Faltenbaues entspricht der einfache Verlauf der Käämme, vorausgesetzt, dass keine Kalkriffe die Eintönigkeit der Schieferhöhen unterbrechen. Allerdings wird diese modellartige Ausbildung der Bergformen durch den parallelen Verlauf der Hauptthäler — Valle Visdende und Krenzbergesenke im S, Lessachthal im N — wesentlich mit bedingt. Auch die in gleicher Höhe liegenden Nebenthäler zeigen einen überaus gleichförmigen Charakter. Den Abschluss bildet ein Endkar mit einer mehr oder weniger deutlich ausgeprägten Thalstufe. Der Mittel- und Unterlauf des gleichmässig geneigten Thales ist ausnahmslos von massenhaftem Gehängeschutt erfüllt.

2. Die Gruppe der Porze.

Das ziemlich ausgedehnte Gebiet zwischen Hartkarspitz und Tülliacher Joeh besteht fast ausschliesslich aus den gewöhnlichen Thonschiefern des Untersilur und bietet wenig Bemerkenswertes. Die Tagebuechnotizen über die Begehung der verschiedenen Querthäler zeigen somit auch eine ungewöhnliche Gleichförmigkeit. Vom Winkler Joeh ist das Vorkommen schöner Faltungsercheinungen im Kleinen zu erwähnen. Der Nordfuss des Gebirges zwischen dem Niedergail- und Luggauer Thal wird von Quarzphyllit gebildet. Ein auch weiter östlich (bei Mauthen) beobachtetes Uebergangsgestein, Thonschiefer mit wohlausgebildeten Quarzfasern kommt im Dorfer Thal sowie am Eingange des Rollerthales vor. (Str. NW—SO, Einfallen steil SW.) Grünliche und rüthliche, z. Th. arkosenartig ausgebildete Grauwacken und Grauwackenschiefer finden sich vornehmlich in dem Schuster- und Winkler Thal bei Kartitsch. Ausserdem erscheinen noch in dem silurischen Thonschiefer hier und da schmale Lagen von Kalkphyllit, so am Gamskofel, am Sonnspitz (hier mit Orthocerenresten) sowie am Schulterkofel.

Der Südabhang zum Valle Visdende ist durch das Vorkommen verschiedener Denudationsreste von Grödener Sandstein ausgezeichnet, die z. Th. — so am Rivo Rindelondo — ziemlichen Umfang besitzen. Das Valle Visdende verdankt seine Entstehung der Gesteinsverschiedenheit zwischen der palaeozoischen Kette und den im Süden vorgelagerten Trias-

Zu Seite 121.



Abbildung 59.

Monte Palumbina und Forze von Osten.

Ph, Phyllit, Gr, Grauwacke, Gr-Sch, Graue Schiefer des Silur, D, Devontischer Riffkalk.

bergen des Comelico. Die Basis der letzteren bildet der leicht verwitternde Grödener Sandstein, der — abgesehen von den Werfener Schichten — ausschliesslich von härteren Kalken überlagert wird. Auch die palaeozoischen Schiefer, Grauwacken-Quarzite und Kalke setzen der Verwitterung im allgemeinen mehr Widerstand entgegen als der Grödener Sandstein. Am deutlichsten ist der Gegensatz der Gesteine an dem östlichen und westlichen Eingang des Valle Visdende ausgeprägt, wo den devonischen Riffmassen des Hochweissteins und der Porze die triadischen Dolomitwände des Scheibenkofels und des Sasso Lungerin gegenüberstehen. (Abh. 60 S. 123).

Die Vorbedingungen für die Entstehung einer ausgedehnten Senkung waren demnach vorhanden, nmsomehr als das Gebiet auch von zahlreichen Störungslinien älteren und jüngeren Ursprungs durelsetzt ist.

In einer wahrscheinlich postglacialen Zeit war das Visdendethal von einem See eingenommen, dessen Vorhandensein durch ausgedehnte Terrassen erwiesen wird. Die Vorstellung eines ehemaligen Seebeckens ist sogar den Bewohnern des Thales geläufig.

Die ausgedehnte Schutthedeckung der Gehänge bedingt trotz des dichten Tannenwaldes den Wildbachcharakter sämtlicher Wasserläufe. Ueberall sind in dem alten, aus horizontal gelagertem Schotter bestehenden Seeboden breite Flussbetten eingefreht; dieselben werden nach jedem grösseren Regenguss von tosenden, Schlamm und Geröll führenden Wassermassen durchbraust, liegen aber bei gewöhnlichen Witterungsverhältnissen trocken: Das Wasser versinkt ganz oder teilweise in dem Schutt.

Die Schuttbedeckung ist der geologischen Untersuchung des Thales ungemein hinderlich; ansserdem erschwert der Tannenwald, welcher nur den ebenen Seeterrassen teilweise fehlt, den Ueberblick, und die Mangelhaftigkeit der G. St. K. macht eine genauere Aufnahme zur Unmöglichkeit. Die Wege sind anch wohl zur Zeit der Aufnahme (in den Dreissiger Jahren) z. Th. unrichtig eingezeichnet worden. (Wenigstens besitzen ausgedehnte Häusergruppen wie die, das ganze Jahr hindurch bewohnte Costa Zucco auf der Karte keinerlei Wegverbindung.) Jetzt stimmt kann noch der eine oder andere Fahrweg. Anch

das Terrain ist überans flüchtig behandelt; so fehlen die weit hin sichtbaren Kalkwände im unteren Dignas- und Londo-Thal, und nicht einmal die Flussläufe sind genau. Da zudem auch die Zugänglichkeit und die Unterkunftsverhältnisse des Thales sehr mangelhaft sind, so kann die geologische Aufnahme auf Genauigkeit in allen Einzelheiten keinen Anspruch machen. Nur die geologisch wichtigen Punkte, die Umgebungen des Hochweissteins und der Porze sind wiederholt und eingehend untersucht worden.

In landschaftlicher Hinsicht ist das so gut wie unbekanntes Thal eine wahre Perle: weite, parkartige mit Bäumen besetzte Wiesenflächen, dichter, üppiger Tannenwald, im Hintergrunde die dunklen Kämme der Schieferhöhen und die schroffen bleichen Wände des Kalkes — all das vereinigt sich zu einem eindrucksvollen Bilde.

Der petrographische Charakter der Manthener Schiefer ist, wie erwähnt, höchst eintönig. Am Steinkarspitz findet sich eine unbedeutende Einlagerung von grünem, chloritischen Quarzit; eine mächtigere Lage des gleichen tuffartigen Gesteins zeichnet die nördlichen Vorberge der Porze aus, grenzt also unmittelbar an die dolomitischen Devonkalke. Man kreuzt diese Gesteine auf dem viel betretenen Uebergang des Tilliacher Joches, zu dem auf der österreichischen Seite eine gut angelegte, jetzt verfallene Fahrstrasse emporführt, die für den Holztransport¹⁾ nach Italien bestimmt war.

An dieser Strasse vermag man den Uebergang von dem gewöhnlichen, bläulichen Thonschiefer zu hellgrünem Thonschiefer (Bärenhadlannereck) und den hell oder dunkel gefärbten chloritischen Quarzitschiefern Schritt für Schritt zu verfolgen. Das Streichen der meist vertikal gestellten Schiefer ist im Allgemeinen entsprechend dem regelmässigen Verlauf des Devonkalkes normal NW (auf dem Joch lokal NNW)—SO. Ein Streifen chloritischen tuffartigen Schiefers begleitet den Südfall der Porze. Das Hauptlager streicht hinüber zum Heret (auch Herat angesprochen, 2430 m.) und Rosskarspitz (2508 m.). Besonders an dem letzteren Berge treten

¹⁾ Auf der italienischen Seite wurden die Stämme durch Holzriesen hinabgeführt.



1. Pinnacolo - (Vista) - (S. Maurizio) - (S. Maria)

2. Pinnacolo - (Vista) - (S. Maurizio) - (S. Maria)




Abbildung 60.

Nach einer gleichartig mit der Photographie aufgenommenen Skizze des Verf.

Die triadischen und palaeozoischen Berge des Valle Visandene von Osten.
 (Zur Erläuterung des Lichtbildes Taf. XI.)

Ph. Quarzphyllit. Silur: Gr. Grauwacke, Gr. Sch. Grüner Schiefer. D. Devonischer Kalk. g. Girondner Sandstein. b. Bellerophonkalk. w. Werfener Schichten. m. Mischelkalk. tr. Schlierdolomit. (Vergl. Abb. 57 u. 58.)

(man vergleiche die Abb. 61 „Ansicht von der Porze“) die charakteristischen Abstürze des dunkelgrünen Quarzits hervor, welche etwa die Mitte zwischen den gerundeten Formen des Schiefers und den Steilwänden des Kalkes halten. Am Heret steht hellgrüner, selten dunkelgrün oder grau gefärbter Glimmerquarzit an, der die steile Thalstufe im Leiterthal bildet und am Plankenkofel auskeilt. Den Uebergang zu dem normalen Thonschiefer bildet hier Quarzitschiefer (blauer Thonschiefer mit weissen oder braunen Quarzitschichten.) Streichen WNW (bis NW)—OSO, Einfallen steil NNO. Am Rosskar, einem typisch entwickelten, wohl erhaltenen Ciren mit flachem geröllbedecktem Boden walten die Chloritschiefer vor; vereinzelt finden sich darin Conglomeratlagen mit Geröllen von grauem oder röthlichem Quarzit und Blutjaspis.

Das Devon der Porze besteht in der Haupterhebung wesentlich aus dolomitischem Kalk, seltener aus reinem Kalk; der nach dem Valle Visdende zu streichende Zug setzt sich aus Kalkphyllit und Marmor zusammen. Versteinerungen sind zwar hier noch nicht gefunden worden, fehlen aber weder in der unmittelbaren östlichen Fortsetzung (*Favosites sp.* am Obstoanser-See), noch an der Paralba (Durschnitte von *Pleuronomaria* im Torrente Piave und *Striatopora sp.* am Hoehalpspitz). Als beweisend für das devonische Alter der Kalke sehe ich vor allem die Einquetschungen von Thonschieferfetzen an, welche den Kamm und den Nordabsturz anzeichnen. Dieselben fehlen den eingefalteten und gequetschten Devonkalken des Karnischen Gebietes nirgends, während sich bei den eingelagerten, petrographisch oft ununterscheidbaren Silurkalken Derartiges niemals nachweisen lässt.

Das Devon des Porzegebietes besteht aus zwei, im Grossen und Ganzen parallel verlaufenden Zügen, welche im Osten, im Val Dignas zusammenhängen, im übrigen aber durch verschiedene Schiefergesteine von einander getrennt sind. (Vgl. das Lichtbild Taf. XI sowie Abb. 59 u. 60.) Der nördliche Zug bildet die stolze Erhebung der nach N schroff abfallenden, nach S zu sanfter abgedachten Porze. Der Verlauf desselben ist theils WNW (die an sich höchst wahrscheinliche Verbindung der beiden Theile ist an der Casa Dignas durch Schutt unterbrochen) theils nach W, theils nach NW gerichtet. Die W—O

streichende Strecke entspricht der grössten Breite und der höchsten Erhebung des Zuges. Das allmähliche Auskeilen des Zuges in der NW-Richtung ist auf dem Lichtbild Taf. X. und der von W aus aufgenommenen Skizze des Monte Palmbina (S. 126) zu beobachten. Allerdings streicht der Zug noch auf den Nordabhang des Kammes hinüber und findet erst dort, unmittelbar vor der Königswand sein Ende. Die letztere ist selbstverständlich als die einfache Fortsetzung der Porze anzusehen. Die ungleiche Breite und das lokale Aussetzen der Kalkzüge ist wohl kaum auf eine schon ursprünglich vorhandene verschiedenartige Mächtigkeit der Riffe zurückzuführen. Vielmehr dürfte die Einfaltung in die Schiefer in ungleichmässiger Weise bis zu verschiedener Tiefe erfolgt sein, und die ungleiche Deudation im Gebirge hat dann des Weiteren dazu beigetragen, um den ursprünglichen Zusammenhang der Kalkzüge zu unterbrechen.

Der südliche Parallelzug der Porze ist bereits in dieser Weise in zwei Abschnitte geteilt. Der schmalere und kürzere westliche Teil des Zuges bildet die Spitze des Monte Palmbina, der etwas ausgedehntere Ostabschnitt den Nordabfall des tief eingeschnittenen Val di Londo und vereinigt sich weiterhin mit dem Nordzuge. In ganz ähnlicher Weise wie es an der Königswand der Fall zu sein scheint, trennt die Kalkfalte den südlichen Quarzphyllit von den Silurshiefern im Norden.

Die Aufeinanderfolge der Gesteine von der Porze über den Monte Palmbina nach Süden ist somit eine mannigfaltige. Wie die Abb. 59, 60 und das schematische Profil Porze—Sasso Lungin erkennen lassen, beobachtet man:

1. Den dolomitischen Devonkalk der Porze.
2. Manthener Schiefer bis zur Höhe des Monte Palmbina und zwar: a) grünen chloritischen Schiefer am Contact steil NO fallend, b) sericitischen Granwackenschiefer und Grauwacke, c) gewöhnlichen dunklen Thonschiefer, als Griffelschiefer entwickelt. (a—c sind auf dem Profil nicht getrennt.)
3. Devon des Monte Palmbina, weisser, halbkristalliner Kalk und Marmor.
4. Quarzphyllit bis zum Filone della Costa Spina; Streichen WNW—OSO, saiger. Der Phyllit ist z. Th. hell und seric-

Roskar-Flanaspitz
Spitze
2595 m 2671 m

Eisigenwand-Großgletscher
2670 m

Hohle Tauern Lickflüchel
2413



Abbildung 61.

Nach einer photogr. Aufnahme des Verf. gez. von O. Berner.

Die westlichen Karnischen Alpen von dem Gipfel der Forse.

Innerhalb des vorherrschenden Schiefers (Silar) sind die eingefalteten Devonkarke durch ihre Signatur D und die höhere Färbung ausgesprochen. Im Vordergrunde die von tiefem Grün durchfarbenen Quarzite der Romkarpitia und des Herst (Rechts).

eitisch, wie im Piavethal, z. Th. dunkel und von normaler Beschaffenheit, z. Th. quarzitisch.

5. Drukele mergelige Plattenkalke mit Kalkspathadern und Hornsteinknollen: unterer Muschelkalk (Gutensteiner Facies), im Osten unterlagert von kalkigen, typisch entwickelten Werfener Schielsten (mit Zweischalern). Dieses bisher unbekannte Vorkommen stellt eine räumlich sehr beschränkte Scholle dar, die auf der mannigfach gestörten Transgressionsgrenze von Phyllit und Grödener Sandstein eingesunken ist.

6. Grödener Sandstein in der Forea di Palumbina, grossentheils von dem Dolomitschutt des Sasso Langerin bedeckt, nach O und W weiterstreichend. Jenseits einer bedeutenderen Verwerfung folgt dann

7. Schlerndolomit, der in steilen Wänden den Nordabsturz des Sasso Langerin bildet.

Man vergleiche zur Erläuterung des Vorstehenden vor allem den schematischen Durchschnitt Porze—Sasso Langerin auf der Profiltafel.

2. Die Gruppe der Königswand.

Die Gruppe der Königswand und Pfaunspitz bietet scheinbar eine Reihe von recht verwickelten geologischen Bildern, wie ein Blick auf die zahlreichen beigegebenen Ansichten beweist. Sobald man jedoch die senkrechte Anfrichtung sämtlicher Schichten erkannt und die Unterschiede der z. Th. unmittelbar nebeneinander stehenden Silur- und Devonkalken richtig aufgefasst hat, bleibt ein nicht sonderlich schwieriges Faltengebirge übrig, in dem hier und da ein rascher Wechsel gleichalter Gesteine eine gewisse Abwechslung bedingt. Querwerfungen treten hingegen sehr zurück. Nur die Dislocation des Sägebaches und das plötzliche Abbrechen des devonischen Kalkzuges der Liköflwand ist wohl auf Querbrüche der älteren Gebirgsbildungsphase zurückzuführen.

Wie bereits erwähnt, keilt der Kalkzug der Porze auf dem Nordabhang des Silvella-Rückens allmählig aus (Abb. 62), um nach kurzer Unterbrechung in der Königswand wieder aufzusetzen und zu erheblicher Breite und entsprechenden Höhe anzuschwellen. Genau im Profil gesehen macht der Kaum der Königswand den Eindruck einer schroff aufragenden Spitze,

eines kleinen Matterhorns. Das Lichtbild zeigt denselben Berg halb im Profil, so dass der nordwestliche Abschnitt conlissenartig vortritt. Bemerkenswerth ist ferner die Thatsache, dass auf der nördlichen (Wetter-)Seite der Kalk in viel ausgedehnterem Masse entblüsst erscheint, als auf dem Südabhang.

Das östliche Kuppehen am Fusse der grossen Königswand (= Kinigat 2510 m., die höchste westliche Erhebung auf der G. St. K. „kleiner Kinigat“ misst 2676 m.) besteht aus gelblichem



Abb. 63.

Nach einer photogr. Aufnahme des Verf. gen. von O. Berner.

Die Königswand von SO.

Eine eingefaltete und durch Denudation freigelegte Masse von devonischem Riffkalk inmitten unterjurassischer Schiefer (dunkel). Der langgestreckte Kamm ist hier genau im Profil dargestellt.

Kalk, der übrige Berg aus einem grauen, klüftigen, halbkrySTALLINEN, theilweise geschichteten Gestein. Nach Westen, nach dem Rosskofel und dem Obstoanser See zu verschmälert sich der Zug allmähig und geht zugleich aus der nordwestlichen in die westliche Richtung über. Der Kalkzug keilt ein wenig westlich von dem Obstoanser See (Obstanz ist die corampirte, „hochdeutsche“ Form der G. St. K.; ob Stoans = über den Steinen), dessen Entstehung er veranlasst hat, endgiltig aus. (Vergl. die Abb. 67 S. 130.) Das schon



Abbildung 62.

Perse und Palumbina Joch von Westen.

Ph. Phyllit. & Schiefer. Gr.-Sch. Grünschiefer des Unterliur. D. Deron (an Monte Palumbina und Perse, hier nach SW enakkellend). G. Gredener Sandstein. Tr. Schliersdolomit. Der kleine Hügel „Pflona di Costa Spina“ besteht aus einer eingesenkenen Scholle von Muschelkalk. Vergl. Abb. 60 S. 123 u. Taf. X.



Photograph by Chuck Kitchin & G. Smith

© 1984

S

N

Liköflwand

Tscharknollen

Königswand



Die Liköflwand.

Devonischer Riffkalk (D) in Stürzschiefer eingefaltet. Im Süden des Bildes der Devonkalk der Königswand. Im Norden sind zahlreiche Schieferfetzen (S D) in des Devonkalk eingequetscht. (Vergl. Abb. 64.)

von STACHE festgestellte Vorkommen von Favositen ist, zusammen mit dem geologischen Auftreten für die Altersdeutung beweisend.

Der Nordwestabhang der Königswand ist — unmittelbar nördlich von der Pfannspitze — durch das intrusive Eingreifen einer schmalen schwarzen Schieferzunge in den Kalk ausgezeichnet (links unten auf dem Lichtbilde: NW-Absturz der Königswand). In ausgedehnterem Masse finden sich diese Anzeichen mechanischer Pressung am Nordwest- und am Nordostabsturz der Liköflwand, dem nördlichen devonischen Parallelzuge der Königswand. (Taf. XII.) Die im Grossen und Ganzen parallel verlaufenden, unregelmässig-welligen, dunkelen Bänder, welche auf der linken Seite des Lichtbildes hervortreten, erwiesen sich bei näherer Untersuchung sämmtlich als eingepresste Schieferfetzen. In ausgedehntem Massstabe beobachtete ich die gleichen Erscheinungen auch auf der Nordostseite des genannten Berges; hier treten wahre Reibungsbröccien auf und des Weiteren wird der geologische Aufbau dadurch verwickelt, dass ein schmaler Zug von gelbem, krystallinem, silurischem Kalkphyllit stellenweise in unmittelbare Berührung mit dem devonischen Riffkalk tritt. Auch hier kann man stets beobachten, dass die Grenze des Riffkalkes gegen den Silurschiefer durch unregelmässige Quetschungserscheinungen, die des Kalkphyllits durch allmäligen petrographischen Uebergang gekennzeichnet ist. Erwähnenswerth ist endlich die Beobachtung, dass im Osten, wo der Kalk der Liköflwand an einer annähernd N—S streichenden Verwerfungslinie abbricht, auch der hier anstehende sericitische Schiefer meridionales Streichen angenommen hat.

Der Westen der Karnischen Hauptkette ist ebenso wie die Mitte und der Osten durch ein locales Anschwellen der untersilurischen Manthener Kalke ausgezeichnet; jedoch erreichen dieselben nicht entfernt die bedeutende Mächtigkeit wie anderwärts. Ein schmaler Kalkphyllitzug beginnt am Resler Knollen oberhalb des Stuckensee's, zieht — parallel zum Streichen der Devonmassen — im Norden der Liköflwand entlang, schwillt im Ersehbaumer Thal erheblich an und lässt sich dann weiter bis zum Sägebach südlich von Sillian verfolgen.

Eine sehr mannigfaltige Zusammensetzung zeigen die Silurgesteine, welche an den Nordabhang der Königswand angepresst sind. Man beobachtet hier, wie das nebenstehende Lichtbild erkennen lässt, von S nach N in steiler Stellung nebeneinander:

1. Schwarzen silurischen Kalkschiefer (auf der Karte nicht von der Masse der Mantlener Schiefer getrennt) mit Griffelschiefer wechsellagernd.
2. Grauen silurischen Quarzit.




Abb. 64.


Der Tscharknollen.

Die Skizze veranschaulicht den Zusammenhang der beiden vom gleichen Standpunkte und in unmittelbarem Anschlusse aufgenommenen Lichtbilder Taf. XII und XIII. s Silurische Schiefer, K Devonkalk.

3. Grünlichen, fleckigen Chloritschiefer.

Weiter folgt der normale Thonschiefer der Mantlener Schichten mit dem nördlichen Kalkzug.

Das stärkere Anschwellen des silurischen Kalkes im Erschbanmer Thal erfolgt an der Manerspitze (2290 m.), wo, wie die untenstehende Ansicht (Abb. 66) zeigt, der Kalk nördlich fällt und durch Wechsellagerung in den Schiefer übergeht. Der südliche, auf demselben Bilde sichtbare Kalkzug, welcher die Spitze des Rosskofels bildet, ist die stark verschmälerte




Die Königswand von Westen.
 (Anschluss an Taf. XII.)

Devonkalk (D) und verschiedene Silurgesteine stehen in engerer Stellung neben einander.

Должность (D) или наименование должности не вносится в текст, а вносится
 (в скобках в III, VII)

Die Kartierung von Meeren



2.



Photographie a l'ouest, a l'altitude de 2000 m.

Prima foto.

Fortsetzung der devonischen Königswand. Zwischen beiden liegt ein mittlerer, aus gelben, braunen und schwarzen Bänderkalken des Silur bestehender Zug, der ziemlich erhebliche Mächtigkeit aber geringe Längserstreckung besitzt und (in der Mitte des Bildes) zur Entstehung eines ziemlich jungen Wandbruches Veranlassung gegeben hat.

Der devonische Kalkzug des Rosskofels und das nördlich angrenzende, bald auskeilende silurische Kalklager sind auf




Abb. 65.

Die Gattlerspitz von Osten.

Conforme Einlagerungen silurischer Kalke und Kalkphyllite im Schiefer.

der nächsten Ansicht (Abb. 67) von der anderen Seite, von dem Obstoanser See aus dargestellt. Der eigentümliche Umriss der beiden einander genäherten Kalkköpfe erleichtert die Vergleichung mit der Abb. 66. Die scheinbare Breite des wohlgeschichteten Devonkalkes im Vordergrund des Bildes erklärt sich aus der Lage der Ansicht (Halbprofil). In Wirklichkeit bildet der Devonkalk einen verhältnismässig schmalen, die Erhaltung des Sees bedingenden Damms.

Das Kalklager der Manrerspitz (Abb. 66) schwillt nördlich des Obstoanser Sees erheblich an und bildet eine weisse, pralle, das Winkler Thal quer durchsetzende Wand. Dieselbe hat zur Entstehung eines zweiten Seebeckens Veranlassung gegeben, das jedoch bereits angefüllt bezw. durch die immer tiefer einschneidende Erosion entwässert worden ist. STACHE führt von hier sibirische, nicht näher bestimmte Korallenreste an.

Wie das obenstehende Profil der Westseite des Winkler Thales (Gatterspitz 2431 m.) zeigt, wird der weisse, halbkristalline, massige Silurkalk im Süden von einer Reihe kleinerer, aus phyllitischem Kalk bestehender Einlagerungen begleitet. Auch diese setzen weiter nach Osten bis zum Sägebach fort. Die beiden in Rede stehenden Züge bestehen im Hollbrucker Thal aus grünen, halbkristallinen Bänderkalken sowie aus weissen und gelblichen Kalkphylliten.

3. Das westliche Ende der Hauptkette.

Nach dem endgiltigen Auskeilen des Devonkalkes, welcher Silurschiefer und Quarzphyllit trennt, stellt sich weiter im Westen ein verhältnissmässig wenig mächtiges Lager von chloritischem Schiefer an der Grenze beider Gesteine ein. Man beobachtet in dem grossartigen Kar, das zwischen Widdersehwin und Eisenreich (2664 m.) den Abschluss des Schusterthales bildet, grüne, violette und hell- bis dunkelgrüne Chloritschiefer, die durchweg reich an Sericit sind. In unmittelbarer Verbindung mit diesen Gesteinen tritt ein Thonschiefer auf, der fein vertheilten Quarz sowie zahlreiche Fasern und Gänge desselben Minerals enthält.

Die Chloritschiefer ziehen hinüber bis in das Hollbrucker Thal, wo sie den Thalriegel unterhalb des Endkars bilden und (wie am Tilliacher Joeh) in Verbindung mit grünen quarzitischen Gesteinen auftreten. Dieser Zug konnte zusammen mit den Kalkphylliten bis in das obere Sägebachthal (nweit Sillian) verfolgt werden. Hier brechen Thonschiefer, Chloritschiefer und Kalke plötzlich quer gegen das Streichen ab, und weiter westlich findet sich ausschliesslich Quarzphyllit. Wenn man auf dem gewöhnlichen, von Sexten nach Sillian führenden Touristenwege die Helmspitze (2430 m., Fallen des Quarz-



Abbildung 66.

Nach einer photogr. Aufnahme u. Skizzen des Verff. gez. von O. Berner.

Der Nordabhang der Pfannspitz von Osten gesehen.

Die beiden nördlichen stürzenden Kalkzüge (S-S) sind dem Stürzschiefer (drübel) regelmäßig eingelagert, der südliche, devonische Kalkzug ist unregelmäßig eingelagert.

Königswand Pfannspitz

Reiskofel

DK

SK

NW.

SO.




Abbildung 67.

Nach einer photogr. Aufnahme u. Skizze des Verf. gez. von O. Berner.

Der Nordabhang der Pfannspitz von Westen gesehen.

Der nordwestliche, slurrische Kalkzug (SK) ist dem Stürzschiefer (denkel) regelmäßig eingelagert. Der devonische Kalkzug des Reiskofels (DK) erscheint im Vordergrund und bildet die nördliche Begrenzung des Obertauern Beck.

phyllits auf dem Gipfel 45° nach NO) überquert, findet man dieses einförmige Gestein überall anstehend. Ebenso trifft man am Nordgehänge des Drauthales zwischen Arnbach und Sillian ausschliesslich Quarzphyllit.

Die Linie des Sägebaches dürfte also einem Querbruche entsprechen; denn ein Auskeilen der silurischen Gesteine in einer nach Westen zu aufsteigenden Synklinale ist unwahrscheinlich. (Vergl. die Karte.) Wenngleich über das Vorhandensein eines Querbruches kaum Zweifel bestehen können, so ist doch eine genauere kartographische Feststellung desselben nicht ausführbar, da gerade das kritische Gebiet theils mit glacialen Bildungen oder Gebirgsschutt bedeckt, theils mit dichten Walde bestanden ist.

Ein syuklinaler Aufbau der gesammten Hauptkette ist also nur für die kurze Strecke zwischen Sägebach und Winkler Thal nachweisbar, östlich ist derselbe durch die unregelmässige Einfaltung von Devon und den Einbruch der Trias, westlich durch die beschriebene Querverwerfung gestört.

Der nördliche Gegenflügel der Synklinale wird von den Vorhügeln der nördlichen Gailthaler Berge gebildet, soweit dieselben aus Quarzphyllit bestehen. Die geologische Grenze zwischen diesem Gestein und den Mauthener Schieferen ist bis in die Gegend von Unter-Tilliaach das Gailthal. Erst am Ans gange des Luggauer Thaales trifft man anstehenden Quarzphyllit auf dem Südabhang (Streichen NW bis WNW—SO, saiger). Nur am Leiterhof — zwischen Ober-Tilliaach und Kartitsch — beobachtet man ein kleines Vorkommen von Thonschiefer auf dem nördlichen Gehänge. (In ganz ähnlicher Weise ist zwischen Mauthen und Nötsch das Thal auf der Scheide der beiden, verschieden harten Gesteine eingeschnitten; auch hier gibt es nur eine einzige räumlich sehr beschränkte Ausnahme, das Uebergreifen des Quarzphyllits auf den Südabhang bei Nampolach.)

Erheblich breiter als der nördliche Phyllitzug ist der „Südflügel“ der unregelmässigen Synklinale, der sich zwischen dem Drauthal (Sillian—Innichen) und dem Piave (Comelico Inferiore—Prezenajo) ausdehnt. Im Südwesten, zwischen Innichen und Comelico Inferiore wird der Quarzphyllit durch die transgreidirenden Grödenner Schichten überlagert, im Südosten


durch Brüche begrenzt. Ueber das weitläufige, aus einförmigen Gestein bestehende Gebiet ist wenig zu sagen — nur das Verhältniss des Quarzphyllites zu dem Grödener Sandstein erheischt eine kurze Besprechung. Ueber diesen Punkt besteht eine scheinbar schwer zu erklärende Meinungsverschiedenheit zwischen STACHE und R. HOERNES. Während nach dem ersteren Forscher das Perm in den Karnisehen Alpen überall discordant auf dem Quarzphyllit liegt, nimmt der letztere an, dass zwischen Sexten und Comelico sämtliche Schichten ohne grosse Discordanz und in regelmässiger Lagerung auf einander folgen und dass nur „untergeordnete Störungen und Falten im Phyllit wahrzunehmen seien“ (Verhandlungen der geologischen Reichsanstalt 1876 p. 65).

In gewissem Sinne haben beide Geologen Recht: An der tief eingreifenden Bedeutung der Discordanz der Grödener Schichten ist selbstredend nicht zu zweifeln. Jedoch sind diese Schichten in der Gegend des Kreuzherges durch die spätere Aufwölbung der Karnisehen Hauptkette mit betroffen und — local — aufgerichtet worden. Man beobachtet zwischen dem Kreuzberg und Candide in den vortrefflichen Aufschlüssen der neu erbauten Strasse steiles W—WSW-Fallen des Grödener Sandsteins bezw. verticale Stellung desselben. Der Phyllit, ein glimmerreiches, dunkelbläuliches Gestein mit Quarzfasern (stellenweise thonschieferartig) zeigt im Grossen und Ganzen dasselbe Streichen und Fallen; allerdings ist das letztere mehr WSW bis SW gerichtet. Trotz des im Wesentlichen übereinstimmenden Streichens ist auch hier eine Discordanz an den erwähnten vortrefflichen Aufschlüssen (welche zur Zeit der HOERNES'schen Aufnahme noch nicht vorhanden waren) mit voller Deutlichkeit zu beobachten: Der Phyllit ist überall stark gefaltet oder gefältelt und in die denkbar verwickeltesten Biegungen gelegt. Die Grödener Schichten, die infolge ihres bedeutenden Thongehaltes einen hohen Grad von Plastizität besitzen, sind trotzdem nirgends gefältelt sondern nur aufgerichtet: Die Phyllite haben eine wahre Faltnng und Zusammendrückung (zur Carbonzeit) erfahren, die Grödener Schichten sind während der jüngeren (mioeänen) Aufwölbung der Karnisehen Hauptkette an der Grenze gegen dieselbe aufgerichtet worden. Dass es in dieser schmalen Störungszone


Palumbina

**Sasso
Lunger**
(ca. 2400)

Schlendel



Digone



**nd und Port
Verhältniss.**

auch zu localen Faltungen gekommen ist, wurde schon weiter im Osten (Monte Dimon, Valle Visdeude) beobachtet, wo Fetzen des permischen Gesteins eingefaltet im älteren Palaeozoicum vorkommen. Auch am Monte Spina und Col Rossone (nördlich von der Kreuzbergstrasse) finden sich zwei derartige unregelmässige Synklinale, und ein ähnliches Vorkommen kennzeichnet die Rothecke (2393 m.) oberhalb des Matzenbodens. (Ich habe diese rothen Sandsteine nicht in situ untersuchen können, zweifle jedoch angesichts des Vorkommens von losen Grödener Gesteinen am Fusse der betreffenden Berge und des überaus augenfälligen Farbenunterschiedes nicht an der Richtigkeit der Deutung).

Eine analoge tektonische Erscheinung, die antiklinale Aufwölbung von Phyllit inmitten der permischen Gesteine, findet sich zwischen dem Krenzberg und Padola. Die neue Strasse (deren Richtung auf der G. St. K. ungenau angegeben ist), krenzt diesen Phyllitzug zu wiederholten Malen.

Auf das Vorkommen von rosenrothen Fusulinenkalken im Grödener Conglomerat bezw. Verrucano (besonders deutlich an der Brücke der neuen Strasse über den Torreute Padola), sowie von Stromenden der Bozener Quarzporphyre im gleichen Gestein am Matzenboden und bei Danta (Comelico) hat bereits R. HOERNES in der erwähnten Mittheilung hingewiesen. (Man vergleiche ferner die Karte, den schematischen Durchschnitt Comelico—Königswand und die Profile von Loretz, Zeitschrift der deutschen geolog. Gesellschaft 1876.)

Der westliche Ansläufer der Karnischen Alpen ist ein langgestreckter, niedriger Quarzphyllittrüeken, der sich westlich von dem Abfall der Helmspitze bis nach Innichen hin erstreckt und verschiedene Denudationsreste der Grödener Conglomerate trägt. Der Quarzphyllit, der innerhalb des Fleckens Innichen (Streichen NW bis WNW—SO, saiger) abbricht, setzt jenseits der Draa ohne Unterbrechung fort, wie schon die übereinstimmende Form der Berge erkennen lässt. Die Angaben der HAVER'schen Uebersichtskarte, welche nördlich „Thonschiefer“ südlich „Steinkohlenschiefer“ verzeichnet, sind somit ungenau.

V. KAPITEL.

Der Gailbruch und die palaeozoische Scholle am Dobratsch. (Phyllit, Untercarbon, Grödener Sandstein, Trias.)

1. Allgemeines.

Die Aehnlichkeit der nördlichen Gailthaler Gebirge mit den Nordtiroler Kalkalpen ist schon vor Jahren von EMMERTON mit scharfem Blicke erkannt worden: Die Entwicklung von Lias, Bhaet und Cardita-Schichten in nordalpiner Facies sowie das Fehlen der Bellerophonkalke¹⁾ sind in erster Linie bezeichnend.

Auch in tektonischer Hinsicht stellen die Berge zwischen Drau und Gail ein Stück Nordalpen dar, das sich ebenso sehr von dem verwickelten Faltenbau der Tauern und der Karnischen Alpen, wie von den flachgelagerten, durch Brüche zerschnittenen Hoehflächen der südlichen Trias unterscheidet. STUSS vergleicht das Lienzer Gebirge mit einer „dreieckigen, monoklinal nordwärts geneigten Scholle mit aufgeschlepptem oder gestaechtem Scheitel“²⁾. Jedoch besitzt das Gebirge einen vollkommen regelmässigen, an den Jura oder die Voralberger Ketten erinnernden Faltenbau. Wie die Aussicht von der Musenalp nach W (vergl. das gleichnamige Bild 68) erkennen lässt, besteht die südliche, breite Seite des Dreiecks aus einer weitgespannten regelmässigen Antiklinale, an die sich im Norden die schmale Synklinale des Rauchkofels bei Lienz mit ihren Küssener und Adnetter Schichten³⁾ anschliesst. Das Gebirge gleicht also im Querschnitt einem liegenden , dessen südlicher Bogen wesentlich ausgedehnter ist, als der nördliche.

¹⁾ Abgesehen von einem zweifelhaften Aequivalent derselben bei Nütseh.

²⁾ Antlitz der Erde I, S. 340.

³⁾ Ibid. S. 340.




Abbildung 68.

Nach photogr. Aufnahmen des Verf. ges. von O. Berner.

Das Lienzner Gebirge (Unholde) von der Munsen-Alp. 1945 m.

Die Antiklinale des rhaetischen Plattenkalkes tritt deutlich hervor. Die Spitze des Eisenschuss (912 m.) bildet die Ase der Antiklinale.

Anf den wichtigen Umstand, dass die obere Trias im Norden zwischen Sillian und Lienz, sowie zwischen Lienz und Oberdranburg von dem Quarzphyllit durch Brüche getrennt sei, hat bereits STRESS (l. c.) hingewiesen. Von viel einschneidenderer Wichtigkeit ist jedoch die gewaltige Bruchlinie, welche zwischen Sillian und Villach auf dem Nordgehänge des Gailthales die obere Trias im Norden von dem Palaeozoicum im Süden trennt.

An einigen Stellen, im Gailthal und bei Deutsch Bleiberg ist das Vorhandensein von Dislocationen bereits von STRESS¹⁾ und MOJISOVICIS nachgewiesen worden. STRESS hat insbesondere hervorgehoben, dass die beiden nördlichen Seiten des Dreiecks Sillian—Lienz—Greifenburg von Brüchen gebildet werden und dass der Gitschbruch seine gradlinige Fortsetzung im Drauthal fände: Von der Richtigkeit der letzteren Annahme habe ich mich nicht überzeugen können, da die Pässe zwischen Gitsch- und Drauthal besonders stark mit Glacialbildungen bedeckt sind, und da ferner ungünstiges Wetter meine Anflüge in dieser Gegend wesentlich beeinträchtigte. Jedenfalls finden die tieferen Triasbildungen (bis zu den Carditasechichten aufwärts) jenseits der Linie Weissensee—Greifenburg keine Fortsetzung nach Westen, sei es, dass dieselben durch die von STRESS angenommene Fortsetzung des Gitschbruches abgeschnitten sind, sei es, dass sie einfach in westnordwestlicher Richtung austreichen und an dem Draubruuch abseheiden. Die hauptsächlichliche Fortsetzung findet der Gitschbruch jedenfalls in westlicher Richtung; derselbe streicht, im Gebirgsbau und den Oberflächenformen deutlich unterscheidbar, in flachem, nach S convexem Bogen um den Reisskofel herum. Einen vortrefflichen Anschluss zeigt der Mucnik-Graben nordwestlich von Weissbriach. Da die verschiedenen Eigentümlichkeiten des Gailbruches²⁾ hier mit vollkommener Deutlichkeit erkennbar sind, möge eine kurze Schilderung desselben gegeben werden.

¹⁾ STRESS, *Antlitz der Erde* I, S. 139, 140.

²⁾ Diese Bezeichnung ist wohl vorzuziehen, trotzdem der SUSS'sche Name Gitschbruch die Priorität hat; man kann nicht wohl eine tektonische Linie, welche auf eine Strecke von mehr als 100 km. der Thalfurche der Gail parallel verläuft und die Entstehung derselben bedingt hat, nach einem Nebenbache benennen.

An der von Weissbriach nach Güssering führenden Strasse beobachtet man bis zu der den Moenikgraben überschreitenden Brücke anstehenden Quarzphyllit. Jenseits steigen plötzlich die ungeschichteten dolomitischen Kalke der oberen Trias in steilen Wänden empor, ohne dass Grödener Sandstein hier auch nur andeutungsweise sichtbar wäre. Auf einem am nördlichen Bachufer unterhalb der Wand entlang führenden Holzwege trifft man bald wieder Quarzphyllit; der Bach entspricht




Abbildung 69.

Der Gailbruch im Moenikgraben bei Weissbriach.

Rhätischer Dolomit neben steil aufrichteten Grödener Sandstein und gefaltetem Quarzphyllit.

also nicht genau dem Bruche sondern hat sich in das weichere Gestein eingegraben. Etwa 800 m. (in der Luftlinie) kann man in dem gut gangbaren Bachbett den hier und da quarzitischen Bänke führenden Phyllit verfolgen, bis Kalkschutt (von der nördlichen Wand stammend) die Aufschlüsse verdeckt.

Weiter westlich beobachtet man im Bachbett neben saigeren O—W streichenden Phylliten die steil nach Nord fallenden Grödener Sandsteine und Mergel (vergl. das Profil). Die beiden Gesteine liegen zwar mit gleichem Streichen und Fallen

nebeneinander; doch ist diese Concordanz nur eine scheinbare, durch Gebirgsdruck bedingte. Denn in anderen Durchschnitten überlagert der Grödener Sandstein discordant die sämtlichen älteren palaeozoischen Schichten vom Phyllit bis zum Oberearbon. Zudem fehlt im Moenikgraben das basale Conglomerat, und die gut angeschlossene Grenze von Sandstein und Phyllit ist durch Quetschungs- und Reibungserscheinungen gekennzeichnet.

Von Abfaltersbach bis zum Fusse des Dobratsch, wo der Schutt des Bergsturzes die Aufschlüsse verdeckt, liegt der Bruch zwischen den jungtriadischen (meist rhaetischen) Kulken und dem Quarzphyllit. Der den letzteren discordant überlagernde Grödener Sandstein ist in steiler Stellung und ganz unregelmässiger Breite in die Bruchspalte eingeklemmt. Derselbe fehlt nur selten (Abfaltersbach, St. Lorenzen, Gitschthal) gänzlich, ist meist als rother, 10 bis einige hundert Meter breiter Streifen weithin am Gehänge sichtbar und schwillt nur einmal zu grösserer Breite an (2,5 km. bei Kötschach).

Der regelmässig gefaltete Streifen von nordalpinen Trias ist also auf der langen Strecke Abfaltersbach—Greifenburg zwischen zwei tiefe Brüche eingesenkt.

Man wird diese Brüche mit Rücksicht auf die Lagerung der angrenzenden Schichten als Faltungsbrüche zu bezeichnen haben und von den Tafellandbrüchen der südalpinen Trias unterscheiden müssen. Schon TELLER hat das Lienzer Gebirge als Fortsetzung der langen von Brnneck durch das Villgrattener Gebirge ziehenden Triasfalte aufgefasst, die bei Winbach östlich Sillian im Drauthal ausstreicht und bis Abfaltersbach auf etwas über 10 km. unterbrochen ist. Der Nachweis, dass das Lienzer Gebirge beiderseits¹⁾ von tiefgreifenden Brüchen begrenzt ist, bestätigt diese Ansicht in jeder Beziehung. In dem weiter östlich zwischen Drau und Gail liegenden Gebirgszug bildet nur im Süden ein Bruch die

¹⁾ Die früheren Beobachter, vor allem EMMRICH und STUR, deuteten die Schichtenfolge auf dem südlichen Abhang als regelmässige Ueberlagerung, indem sie den — damals von den Werfener Schichten nicht getrennten — Grödener Sandstein als Bantsandstein und den angrenzenden Theil des rhaetischen Plattenkalkes als Muschelkalk deuteten.

Grenze, während nördlich die Trias in regelmässiger Folge den Grüdener Sandstein und Phyllit überlagert.

Im Einzelnen ist über den Gebirgsbau des nördlichen Gailthaler Gebirges das Folgende zu bemerken:


2. Das Gebirge zwischen Sillian und dem Gailberg.

Das Ende des von TELLER aufgefundenen Brunecker Kalkzuges östlich von Sillian ist durch eigentümliche petrographische Veränderungen ausgezeichnet: Bei Parggen steht normaler dichter Triaskalk an, in der Schlucht von Wimbach ist die Beschaffenheit desselben halb krystallin und erinnert an die paläozoischen Kalke des Karnischen Gebietes. Rutsch- und Gleitflächen sind ausserordentlich deutlich und in grosser Flächenausdehnung vorhanden; ihr Streichen ist nordwestlich bei vollkommen saigerer Schichtstellung.

Auf der etwa 11 km. langen Strecke zwischen Parggen und Abfaltersbach ist im Drauthal auch nicht die geringste Audeutung von triadischen Gesteinen vorhanden. Quarzphyllit ist das einzige anstehende Gestein, welches zur Beobachtung gelangt.

Der Punkt, wo Drau- und Gailbruch unter sehr spitzem Winkel zusammenstossen, liegt schräg gegenüber der Eisenbahnstation Abfaltersbach, unmittelbar gegenüber der Mündung eines von Norden kommenden Wildbaches (Gerichtsbach). Die Schichten sind durch die Erosion des Drauffusses vorzüglich aufgeschlossen. Der spitze Sporn rhaetischer Gesteine, der in den Phyllit hineindringt, besteht hier aus wohlgeschichteten dunkelen Mergeln und gleichgefärbten dünnplattigen Mergelkalken. Die Mergel streichen bei sehr steilem Nordfallen O—W (bis WNW); die Kalke sind von den wenig mächtigen Mergeln durch eine untergeordnete Verwerfung getrennt, von krummflächigen Harnisehen durchsetzt und stehen (bei NW—SO-Streichen) saiger.

Das normale Streichen in dem Gebirgsdreieck südlich von Lienz ist von Ost nach West gerichtet. Die vorwaltenden Gesteine sind Hauptdolomit und rhaetischer Plattenkalk (nebst Kössener Schichten). Den Kern der mehrfach beschriebenen Synklinale südlich von Lienz bilden rothe Adneter



Nach einer photogr. Aufnahme des Verf. gez. von O. Berner.

Abbildung 20.

Das nördliche Gailthaler Gebirge von Süden.

Ihr Gailthaler trennt die aus Phyllit bestehende Vorlage von den aus rhätischem Kalk bestehenden, höher aufragenden Bergen. Die Berge des Vor ergründes (Zwiesel bis Hoheck) werden von dem Untereozänen der Karnischen Hauptkette gebildet.

Liaskalke, deren gefaltete Schichten an der Lienzer Klause gegen das Drauthal ansstreichen. Nördlich von dem Lias erscheint wieder die rhaetische Stufe, hauptsächlich durch das Kalkriff des Rauchkofels vertreten; die tieferen Triasglieder scheinen, soviel man aus den bisherigen Darstellungen¹⁾ entnehmen kann, zu fehlen. Der Grädener Sandstein, welcher am Tristacher See bei Liencz durchstreicht sowie der darunter lagernde Phyllit der Heimwälder dürften demnach schon durch den Dranbruch von der jüngeren Trias geschieden sein.

Ob die von der Musenalp aus beobachtete Antiklinale des Eisenschuss nach Westen fortsetzt, konnte bisher nicht mit voller Sicherheit festgestellt werden. Jedoch ist die Annahme a priori wahrscheinlich und lässt sich ferner ziemlich ungezwungen aus einem von ЕММАН beschriebenen²⁾ Profil über das Schönjoch und den Ecken- (oder Eggen G. St. K.) Graben ableiten. Der Verfasser glaubt zwar — im Sinne der oben erwähnten Ansichten — eine regelmässig absteigende Schichtfolge vom Lias zum Phyllit annehmen zu müssen. Doch ist es wahrscheinlicher, dass sich in dem Profil die mergeligen Kalke 2) und 4) entsprechen und den Hauptdolomit einschliessen. („Dolomitbreccie und Dolomit, wohlgeschichtete Bänke zu tausenden nebeneinander gestellt.“) Die Schichtenfolge 4) („graue, aussen braune Kalke“) wird — allerdings unter Vorbehalt — auf St. Cassian bezogen. Da jedoch aus diesen Bildungen ausser der stratigraphisch unerheblichen Cidaritenstacheln *Dinyodon* („*Ostrea*“) *intusstriatus* und „Lithodendren“ angeführt werden, erscheint die Deutung als Rhaet näher liegend. — Die „Lithodendren“ der jetzt in Halle befindlichen ЕММАН'schen Sammlung habe ich sämmtlich eingehend untersucht und aus dem Lienzer Gebirge jedenfalls keine der an sich leicht kenntlichen Cassianer Arten gefunden; die einzige näher bestimmbare Art ist *Thecosmilium Omboni* STOPP. (?), die zuerst aus dem Rhaet von Azzarola (Lombardei) beschrieben worden ist³⁾.

Das weiter südlich, zwischen 4) und dem Grädener Sandstein des Gailthales gelegene Gebirgsmitglied ist, wie ЕММАН

¹⁾ Man vergleiche besonders SUESS, Antlitz der Erde. I. S. 340.

²⁾ Jahrbuch der geol. R.-A. 1855. S. 444 ff.

³⁾ Palaeontogr. XXXVII. S. 17, T. III, Fig. 3.

angieht, wieder dolomitisch: a) Dolomithbreccie, b) Stinksehiefer im Wechsel mit bituminösem Dolomit, c) Dolomithbreccie, d) dolomitische Stinksehiefer, e) weisser, krystallin-körniger Dolomit, f) Rauchwacke.

Dies Vorwalten dolomitischer Gesteine in den prächtigen Felswänden des Eckenkofels (Eggen G. St. K. 2587 m.) habe auch ich beobachten können. Wahrscheinlich handelt es sich um eine neuerliche Aufbiegung des Hauptdolomits. Die Küssener Schichten 4) würden demnach eine zusammengepresste Synklinale mit parallelen Flügeln bilden. Das Lienzer Gebirge im Ganzen bestände dann aus einem von Synkinalen begrenzten Hauptsattel und einem halben durch den Gaillrueh zerschnittenen Sattel im Süden. Ich habe leider keine Gelegenheit gefunden, das ausserhalb des Bereiches der Karte liegende Gebirge näher zu untersuchen, sondern mich auf die Verfolgung des Gaillruehes beschränken müssen.

Die beiden aneinander grenzenden Gesteine bilden auch landschaftlich die denkbar schärfsten Gegensätze:

In schroffen Wänden stürzen die hellen Dolomite und Kalke zum Thale ab, aus tief eingeschnittenen Gräben quellen weite, öde Schnittströme hervor; die Vegetation beschränkt sich, abgesehen von den in tieferen Lagen vorkommenden Wäldern, auf spärlichen Graswuchs und Kiecholz. Hingegen zeigen die Phyllitberge durchweg gerandete Formen und sind — schon weil ihre bedeutendste Erhebung, die Wolfseran nur um 300 m. die Baumgrenze (2000 m.) überragt — von einem zusammenhängenden Vegetationsmantel bedeckt.

Die landschaftliche Erscheinung des aus diesen verschiedenen Elementen zusammengesetzten Gebirgszuges hängt von der Ausdehnung der nördlichen Kalkzüge ab. Die Breite der Phyllithöhen unterliegt keinen Schwankungen. Im Westen ragen, wie das von S. aufgenommene Landschaftsbild (Abb. 70) zeigt, nur einige Kalkspitzen, der Rauchkofel, der Spitzenstein und der Breitenstein über die gleichförmigen Vorhöhen des Phyllites empor. Die bedeutendste dieser Massen ist der Breitenstein (ca. 2400), dessen Seitenansicht das Lichtbild Taf. XIV zeigt. Das Vorhandensein des Bruches erkennt man auf dem Abhang deutlich an dem senkrechten Verlauf




Thursdays Creek, California

© Fred Pfeiffer

Wölferau

Alpelspitz

Breitenstein



S

g

N

Die nordwestlichen Galthaler Berge.

Der rhaetische Kalk (pk) ist von dem Gröden Sandstein (t) und dem unterlagernden Quarzphyllit (g) durch den Galthal getrennt.

der Kalkgrenze. Merkwürdigerweise zieht dieselbe gerade über die Höhe der Alpelspitz. Die jüngere, vom Drunthal her wirksame Erosion hat sich also nicht an den Wechsel des Gesteins gekehrt, sondern Alpelspitz und Breitenstein von einander getrennt. Den Gegensatz bildet die, während unendlich langer Zeiträume wirksame Denudation, welche den vollkommenen Parallelismus zwischen Gailbruch und Gailfluss bedingt. Der letztere hat sich offenbar auf der uralten, durch Verwitterung erweiterten Gesteinsgrenze eingeschnitten, um dann allmählig in das weichere Gestein hinauszugleiten.

Mit der Demmlerhöhe (2373 m.) beginnt der zusammenhängende Zug der stolzen Kalk- und Dolomitgipfel, Eekenkofel, Eisenschuss (2612 m.), Rosenköpfel (2618 m.), denen die niedrigen Phyllithöhen nur als flache Hügelreihe vorgelegt sind. Unser Uebersichtsbild (Abb. 70) bringt die mit dem inneren Bau des Gebirges in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Landschaftsformen anschaulich zur Darstellung.

Im Einzelnen wurde über den Gailbruch und die angrenzenden Gesteine zwischen Obertilliaach und Köttschach Folgendes beobachtet: Der Phyllit nimmt nördlich des erstgenannten Ortes durch gleichmässigeren Vertheilung des Quarzes den Charakter von Glimmerschiefer an; auch am Steinrastl (Fallen steil SW) erinnert derselbe noch an das letztere Gestein. Am Tuffbad (die G. St. K. hat die kuriose Orthographie Tuffbad) stellt sich ein normaler Quarzphyllit mit dunkelen Granaten (Pyrop) ein. Auch am Gemeinberg (nördlich Liesing) beobachtet man gelegentlich Granaten sowohl im Phyllit wie im Glimmerschiefer. Bei Tscheltseh tritt wieder der weiter westlich durchans vorherrschende, normale (nicht Glimmerschiefer ähnliche) Quarzphyllit auf. (Fallen flach NO.) Granatphyllit findet sich im Pannwald nördlich St. Jacob sowie westlich von Köttschach (Streichen OSO—WNW).

Die wechselnde Breite des arg verdrückten und zerquetschten Grödener Zuges wurde schon erwähnt; bezeichnend ist das anormale Streichen am Eekenkofel (WSW—ONO) und das regellose Durcheinander von Conglomeraten und Sandsteinen. Sonst bilden die ersteren mit grosser Regelmässigkeit die Basis der Schichtserie. Ein wirkliches Ansteilen der Grödener Zone ist — abgesehen vom Westende des Bruches — nur am

Tuffhade zu beobachten; auch am Eckenkofel ist die Breite der rothen Sandsteine und Conglomerate sehr unbedeutend, ihr locales Verschwinden jedoch durch die Ueberschüttung mit Kulkgeröll bedingt.

Am Satteljoeh findet sich ein schon von früheren Beobachtern erwähnter, stark verwitterter Quarzporphyr, der in scharf begrenzten Klippen aus dem Sandstein hervorragt. Derartige Vorkommen werden meist als Stromenden der Bozener Quarzporphyre gedeutet.

Dass der Sandsteinhorizont an der Grenze der klüftigen Kalke überall durch kalkhaltige Quellen ausgezeichnet ist, bedarf kaum der Erwähnung. Eine derselben, das schon erwähnte Tuffbad bei St. Lorenzen, dient der Gebirgsbevölkerung zu Heilzwecken und hat bereits einen ziemlich ausgedehnten Hügel von Kalktuff abgesetzt.

Während im Westen vor allem Dolomite (am Grabenbach bei Ober-Tilliach mit eingelagerten schwarzen Mergeln) an der Bruchgrenze vorherrschen, beobachtet man im Osten die typischen Mergel und dunklen Plattenkalke rhaetischen Alters. Ein Ausflug von Köttschach auf die Mussenalp lehrt eine ziemlich Mannigfaltigkeit von Gesteinen kennen. Am Rüthelkreuz quert man den Grödener Sandstein und trifft dann grane, splittrige, dolomitische Plattenkalke, stellenweise bituminös und ranchwnekenartig. Streichen O—W (bis WNW), Fallen sehr steil N. Die Höhe der Mussen wird von dunklen, knolligen Plattenkalken mit schwarzem Hornstein und thonigen Zwischenlager gebildet. Seltener sind reine Kalke und Einlagerungen von Glimmersandstein. Beim Abstieg nach St. Jacob beobachtet man auf den Pruniglwiesen schwarze gehänderte Kalke und tief schwarze Kalkseliefer. All diese Gesteine stimmen mit den am Gailbergsattel beobachteten überein und deuten auf Rhaet hin; Versteinerungen sind leider weder hier noch dort gefunden worden.

Die Mussen ist bekannt durch ihren üppigen Graswuchs und ihren Reichtum an seltenen Alpenpflanzen. Einen eigentümlichen Gegensatz hierzu bildet das vollkommene Fehlen von Quellen. Der Thongehalt des Kalkes erklärt die eine und die steile Stellung der Schichten die andere Erscheinung.

3. Die Triasberge östlich vom Gailbergsattel.

Der Sattel des Gailberges ist die einzige Stelle, an der der einfache Verlauf des Gailbruches durch verschiedene tektonische Unregelmässigkeiten unterbrochen ist. Die Entstehung der tief eingesenkten Furehe im Gebirge hängt zweifellos mit diesen Erscheinungen auf das innigste zusammen. Es handelt sich im wesentlichen um die Interferenz eines Querbruches mit der grossen Längstörung, die hierdurch auf die Strecke von 9 km. in drei, im Wesentlichen parallel verlaufende Sprünge zersplittert wird. Bei dem Versuch, die eigentümlichen, auf der Karte zum Ausdruck gebrachten Verhältnisse zu deuten, wird man ferner davon ausgehen haben, dass Grödener Sandstein und Phyllit in unmittelbarer Zusammengehörigkeit die südliche Scholle bilden.

Von der Mussen her streichen Grödener Sandstein und ein schmaler Zug von schneeweissen Dolomit in der normalen OSO-Richtung auf Laas zu, brechen hier aber plötzlich quer gegen das Streichen ab. Nach einiger Entfernung taucht inmitten des Grödener Sandsteins am Gehöfte Lanz ein langer, schmaler, aus rhaetischem dunkeltem Kalk und eingelagerten Mergeln bestehender Zug wieder auf und streicht bis in die Gegend von Dellach weiter. Im Süden grenzt dieser Kalk (der schon von STUR erwähnt wird) theilweise an Phyllit. Man könnte im Zweifel sein, ob hier ein einfacher Gehängebruch oder die Fortsetzung der ursprünglichen Bruchrichtung in einer Grabenspalte vorläge, wird jedoch das letztere anzunehmen haben. Denn thatsächlich entspricht der mit Kalk angefüllte Graben der normalen Störungsrichtung, während durch einen südlich des Gailbergsattels gelegenen, etwa nach NNO gerichteten Querbruch die Fortsetzung des Triasgebirges um etwa einen Kilometer nach Norden verworfen wird. (Richtung und Länge des Querbruches konnten nicht genau festgestellt werden, da der auf der Passhöhe angesammelte Gehängesehutt das anstehende Gestein an den entscheidenden Punkten verdeckt.)

Man durchschneidet also auf der Gailbergstrasse von Nord nach Süd zuerst Rhaet, dann 2) Grödener Sandstein. (mit einer reichlichen Quelle an dem Heiligenbild; Streichen NW bis WNW—SW, saiger), 3) den schmalen, in der Oberflächens-

form der Landschaft deutlich hervortretenden Dolomit. (Derselbe trägt oberhalb von Laas eine Burgruine). 4) Grödener Sandstein steil ONO fallend. Der weiter südlich folgende Phyllit ist an der Chaussee durch Moränen und Gehängeschnitt verdeckt.

Es handelt sich also im Wesentlichen um die im Lanzengraben beobachtete tektonische Erscheinung (vergleiche Seite 57), wo ebenfalls die Hauptstörung (des Rosskofels) durch einen Querbruch nach Norden verworfen ist; auch hier verläuft in der normalen Bruchrichtung eine schmale, von jüngeren Gesteinen angefüllte Grabenspalte.

Dass der Plöckener Querbruch in der Fortsetzung der Störung des Gailberges liegt und dass beide einer Erdbebenlinie entsprechen, wurde schon oben erwähnt. Das Gebiet zwischen den beiden Längsstörungen, der Südabhang des Jackbühel besteht aus Grödener Sandsteinen und Conglomeraten, deren ungewöhnliche Ausdehnung wohl z. Th. darauf zurückzuführen ist, das auch hier Versenkungen stattgefunden haben. Auf dem Wege von Kütschach zum Janken, am sogenannten „Faden“ liegt im Grödener Sandstein ein kleines Vorkommen von Bozener Quarzporphyr, das östlichste, welches bisher zur Beobachtung gelangt ist.

Am Gailbergsattel sind, wie die Abb. 71 zeigt, die schwarzen mergeligen Plattenkalke des Rhaet steil aufgerichtet und z. Th. unregelmässig zusammengestaucht und verdrückt.

Weiter östlich nehmen ältere Triasgesteine an dem Aufbau der nördlichen Kalkzone, wenn auch nur in beschränkter Ausdehnung Theil. Parallel zu dem Hauptbruch verläuft ein schmaler Zug von Carditaschichten. Am Nordabhang des Jackbühel wurden die charakteristischen dunklen schiefrigen Mergel der Carditaschichten, wenngleich ohne Versteinerungen beobachtet. Oberhalb der Dellacher Alp streicht der Zug auf den Südabhang hinüber und an der Kreuz-Tratten¹⁾ fand ich grünliche Glimmersandsteine, wohlgeschichtete dunkle

¹⁾ Der oft vorkommende Name Tratten bedeutet eine von Wald umgebene Wiese.



Abbildung 71.

Nach einer photogr. Aufnahme des Verf. ges. von O. Berner.

Der nördliche Theil des Gailbergsattels (von der Strasse gesehen).

Die dunkelen mergeligen Plattenkalke des Rhaet sind steil auferichtet und zerstückelt. Im N hellere reinere Kalks.

Mergel und oolithische Kalkmergel mit undeutlichen Terebrateln und *Spiriferina Lipoldi* BIRN. (det. BIRNER). Die letztgenannte Art ist eine der Leitformen der Carditaschichten. Leider habe ich die Ausdehnung des Zuges der Raibler Schichten nicht mit aller erforderlichen Genauigkeit feststellen können. Da sich auf der Mussen keine Andeutung dieses Horizontes fand, halte ich die Annahme für gerechtfertigt, dass der Querbruch des Gailberges die weitere Fortsetzung abgeschnitten habe. Auch bei der Besteigung des Reisskofels von SO fanden sich keine Spuren der Carditaschichten; es ist somit wahrscheinlich, dass dieselben an der stumpfwinkligen Umbiegung des Bruches in dieser Gegend austreichen.

Die schmale dolomitische Kalkzone zwischen den Carditaschichten und dem Bruche habe ich als Äquivalent des — auch am Dobratsch vorkommenden — Wettersteinkalkes angesehen. Versteinerungen wurden allerdings nicht beobachtet.

Das nördliche Triasgebiet besteht wohl anschliesslich aus Gesteinen vom Alter des Hauptdolomites und der Koessener Schichten. Es wäre nicht ausgeschlossen, dass ein zweiter Zug von Carditaschichten nördlich von dem oben erwähnten durchstreicht; wenigstens habe ich bei der Alp Schätzen Mergel und Glimmersandstein und an dem Bergwerksweg in der Nähe der Steiner Kammern Mergel und Oolithe beobachtet. Leider macht das Fehlen von Versteinerungen eine sichere Entscheidung unmöglich.

Falls sich das Raibler Alter und der Zusammenhang des Zuges Schätzen-Alp—Steiner Kammern nachweisen liesse, würde die Auffassung der Tektonik des Gebirgszuges selbstredend geändert werden müssen. Statt der einfachen Reihenfolge 1. Rhaet (einschliesslich der zweifelhaften Carditaschichten), 2. Hauptdolomit (um Jauken in überkippter Stellung), 3. Carditaschichten, 4. Wettersteinkalk, 5. Gailbruch würde Folgendes anzunehmen sein: Die Schichtengruppe 1 (Mergel und Plattenkalke) umfasst Äquivalente des Rhaet und der oberen karaischen Stufe. Die beiden Züge von Carditaschichten begrenzen eine unregelmässige Antiklinale von Sehledolomit

bezw. Wettersteinkalk¹⁾, welcher letztere noch einmal in einem schmalen Zuge am Gailbruch aufgebogen erscheint.

Leider haben mich die auch für alpine Triasgebiete ungewöhnliche Versteinerungsarmuth und das ungünstige Wetter des Sommers 1891 an der Lösung dieser Frage verhindert.

Jedenfalls beschränkt sich dieselbe auf das engere Gebiet des Janken, ohne die im Osten und Westen angrenzenden Triasgebiete zu berühren. Janken und Reisskofel bilden infolge mehrfachen Umbiegens des Gailbruches eine nach S vorspringende Halbinsel, und sind im W zweifellos, im O möglicherweise durch Querbrüche begrenzt.

Ueber die Gesteine und ihre Lagerung am Nordabhang des Juckbühel (1891 m.) und Jauken (2252 m.) habe ich Folgendes feststellen können: Beim Anstieg von Oberdrauburg zum Adamskofel trifft man die schwarzen, Hornstein führenden Plattenkalke des Rhaet, welche auch am Gailberg und der Mnsen auftreten, in saigerer Stellung oder steil Nord fallend. Jenseits der zweifelhaften Carditaschichten an der Alp Schätzen erscheint Hauptdolomit (Streichen WSW—ONO, Fallen steil N), dann die sicheren Carditaschichten, dolomitischer Wettersteinkalk (bezw. Schlerndolomit) und der Gailbruch.

Die schwarzen rhaetischen Plattenkalke nehmen in ziemlicher Breite den eigentlichen Nordabfall des Gebirges ein. Beim Aufstiege zum Jauken beobachtet man auf dem nengebanten Bergwerkswege zuerst steiles (anormales) NW-Fallen, weiter anwärts steiles Einfallen nach WSW. Bemerkenswerth ist hier auf den Schichtflächen das Vorkommen von Wülsten, welche an Rhizokorallen erinnern. Auch weiter östlich zwischen Dellach und Greifenburg streichen diese charakteristischen Schichten weiter: Im Massbach oberhalb Gassen stehen mergelige Plattenkalke mit Rauhwaacke (Streichen NW—SO saiger) an, und unterhalb von Eben sind dieselben Gesteine im Liegenden der Moränen durch die Erosion der Drau freigelegt.

Auch auf dem Nordufer der Drau finden sich zwischen Nürsach, Oberdrauburg und Dellach einige durch Seitenbäche von

¹⁾ Der erzführende Kalk des Jauken würde dann zu dem älteren Horizonte gehören. Für diese Altersdeutung wäre auch der Umstand anzuführen, dass die Erzführung bei Bleiberg und Arnoldstein auf die älteren Triaskalke beschränkt ist.



Nach einer photogr. Aufnahme des Verf. gez. von O. Berner.

Der Nordabfall des Jauken.

Flache Lagerung der bleiführenden Trias-Kalke im nördlichen Galtthaler Gebirge. Im Vordergrund die Stalact Kantonen.

einander getrennte Vorkommen der rhaetischen Kalke. Der Draubruh folgt also auch hier nicht dem Thale, sondern zieht auf dem nördlichen Gehänge entlang. Der Fluss hat sein Bett, das ursprünglich der Gesteinsgrenze folgte, später in die weichen rhaetischen Mergel und Rauchwacken eingegraben.

Bei Nörsneh, am Westende der auf dem Nordgehänge liegenden Trins ist (ausserhalb des Bereiches der Karte) ein schmaler Fetzen von Quarzphyllit in die rhaetischen Kalke eingepresst. Die Grenze zwischen den arg gestauchten und gequälten Quarzphylliten und der Trias verläuft über eine kleine Einsattelung nördlich des Rabautberges. Der südliche Theil des letzteren besteht aus granen dichten Plattenkalken, die in einer mächtigen Wand zu der Strasse westlich von Oberdrauburg abstürzen. Vorwiegend finden sich schwarze, dünn-geschichtete Kalkmergel, Mergel und Rauchwacken. Dieselben streichen O—W und sind meist verbogen, verdrückt und verquetscht.

Die besten Aufschlüsse gewährt der Wurmitzbaeh bei Oberdrauburg, in dem die weichen Gesteine in den abenteuerlichsten Formen verwittern.

Die verhältnissmässig sehr bedeutende Breite der rhaetischen Mergel und Plattenkalke ist wohl dadurch zu erklären, dass dieselben zwischen dem harten Quarzphyllit im Norden und dem ebenfalls widerstandsfähigen Hauptdolomit im Süden in eine Reihe spitzer Syn- und Antiklinalen zusammengepresst sind. Dieselben sind im Einzelnen nicht mehr nachzuweisen, da naturgemäss die Schenkel derselben parallel stehen; es bildet sich also eine Art von Schuppenstructur ohne Ueberschiebungen.


Ein Zug von meist kalkig entwickeltem Hauptdolomit beginnt, wie oben erwähnt, an der Schätzentalp. Derselbe nimmt in der Nähe des Jauken infolge der Verringerung des Fallwinkels erheblich an Breite zu. In der Lücke zwischen Juckbühel und Jauken fallen die Schichten mit etwa 45°, auf dem Südabhang des letztgenannten Berges mit etwa 12° nach Süden ein. Die deutliche Schichtung und das flache Einfallen wird auf der Ansicht des Jauken von N gut zur Darstellung gebracht (Abb. 72). Der Bergbau auf dem Südabhang des Jauken ist neuerdings von der Trifailer Gewerkschaft wieder in Betrieb

gesetzt worden. Das Erz ist lagenförmig in die Kalkschichten eingesprengt, aber nur dort in reichlicherer Menge vorhanden, wo die Schichten von Klüften durchschnitten werden; man gewinnt Bleiglanz und Zinkblende, welche letztere im Ausgehenden in Kohlenamalme umgewandelt ist.

Die ungewöhnliche Breite, welche der Zug des Hauptdolomites am Jauken annimmt, ist zweifellos auf die überaus flache Lagerung (12°) zurückzuführen und prägt sich landschaftlich in der geringen Neigung aus, welche der obere Theil des Südgehänges besitzt. Auch am Reisskofel ist die Lagerung offenbar flach, obwohl das vollkommene Fehlen jeder Schichtung (Vergl. Abb. 73) in den wildzerrissenen Wänden des Südgehänges diesen Schluss nur mittelbar gestattet. Das Gestein des Reisskofels ist nur in den unteren Theilen stärker dolomitisch, sonst im Wesentlichen kalkig; ganz an der Basis findet sich plattiger Kalk in geringer Ausdehnung. Das Gestein verwittert ungewöhnlich rasch und erschwert hierdurch die Besteigung des Berges. Die Schutthalden erreichen erhebliche Ausdehnung, und der in das Thal hineingebante Schuttkegel ist der ausgedehnteste im ganzen Flussgebiet der Gail.

Der Dolomitzug des Sattelnoek (2037 m.) oder kleinen Reisskofels ist die verschmälerte und niedrigere Fortsetzung des Hauptgipfels nach Osten; dieselbe endet in der bereits oben beschriebenen Wand über der Moenikbrücke bei Weissbriach. Doch besteht auch jenseits des Gitschthales der Triaszug zum grössten Theile aus Dolomit. (Vergleiche die Profiltafel VII S. 150.)

Da, wie erwähnt, der Draubruch in der Gegend von Greifenburg erlischt, so überlagern hier die Perm- und Triaschichten in regelmässiger Folge den Quarzphyllit, werden aber dann durch den Gail- (bezw. Gitsch-)Bruch scharf abgeschnitten. Im westlichen Theile des Gebirges, bei Steinfeld, am Weissensee und bei Weissbriach ist das anstehende Gestein vielfach durch Moränen und Gehängeschutt verdeckt. Bei Trübsberg und beim Krenzwirth beobachtet man weissen und dunkelen, meist massigen Kalk mit Spathadern, (wahrscheinlich Muschelkalk.) Am Krenzbergpass zwischen Weissbriach und dem Weissensee bestehen die niedrigen Berge jederseits aus weissen,



Nach einer photographischen Aufnahme des Verf. aus. von O. Berner.

Abbildung 13.

Der Reinskofel von Süden.

Ph. Phyllit, G. Gneisser Sandstein, Tr. Kalkiger Haaptdolomit; zwischen G. und Tr. der Fallbruch. Im Vordergrunde der Abhang der Hauptkette (SU), Unterthier-Schleifer. Im Mittelgrunde der gewaltige Schuttkegel von Reinsach.

kleinklüftigem Hauptdolomit, der leicht verwittert und in Schnittströmen das Thal überdeckt.

Der Durchschnitt Lind (Dranthal)—Weissensee—St. Lorenzen (Gitschthal) ist durch E. SUSS in meisterhafter Weise geschildert worden; seine gleichzeitig entworfenen und mir in zuvorkommendster Weise zur Verfügung gestellten Profile (T.VII S. 150) erläutern die folgende Darstellung (Antlitz der Erde I, p. 358. Anm. 43): „Im Fellbach oberhalb Lind beginnt der Anstieg. Wir gehen über südlich geneigten Thonglimmerschiefer, welcher gegen oben grüne Lagen aufnimmt. Es folgt gegen Süd geneigt der Grödener Sandstein und in schönem Aufschlusse beinahe senkrecht gestellt die untere Trias, dabei Lagen mit *Spiriferina fragilis*, *Retzia trigonella* u. A. Auf der Höhe des Rückens liegt Marmor, blaigran und geschichtet, 50—60° S ein wenig in W geneigt. Wir steigen über zahlreiche Schichtenköpfe hinab zum Weissensee, denn der Triaskalk ist steiler gegen Süd geneigt als der Abhang. Der See liegt beiläufig im Streichen; wir krenzen ihn an seiner engsten Stelle; erst steigen wir jenseits über weissen Dolomit, dann folgt schwarzer Schiefer mit Resten von Fischen und Krebsen, wohl der Fischschiefer von Raibl, hier mit Hornsteinlagen, er ist nur 30—40° S etwas in W geneigt. Der zweite Rücken ist erstiegen und gewährt uns einen herrlichen Blick über die südlichen Gipfel; noch immer hält dieselbe Fallrichtung an; unter der Lorenzer Hütte folgt brauner Schiefer mit zahlreichen Schalen von *Cardita*. Die Neigung ist 45° Süd. Dem Schiefer folgt Dolomit, in grösseren Wänden entblüsst. Absteigend erreichen wir geschichteten Kalk; es ist der Plattenkalk.“

Der letztere entspricht dem Rhaet, der Dolomit dem Hauptdolomit; weiter westlich, bei Weissbriach ist, wie oben erwähnt, der ganze Zng dolomitisch, so dass hier die Dolomitentwicklung durch das gesammte Rhaet hindurchreichen dürfte. Bekanntlich kommen ähnliche Beispiele heteroper Differenzierung in der alpinen Trias häufig vor.

„Der Plattenkalk stellt sich steiler, endlich senkrecht und vollzieht einige S-förmige Biegungen; ein kurzer Abhang folgt gegen St. Lorenzen; der Plattenkalk biegt auf dieser kurzen Strecke fächerförmig bis zu 30° Nordfallen um. Die Sohle des Gitschthales ist erreicht. Der grüne jenseitige Abhang ist

Phyllit.¹⁾ Jede Fortsetzung der mächtigen, in Süd geneigten Serie, durch welche wir seit dem Köhlerhanse ab Fellbach gegangen sind, ist verschwunden. Der Weg betrug in der Luftlinie 9 km., die Mächtigkeit zum mindesten 3—4 km. Alles ist abgesunken an dem Gitschbruche.“


Etwas weiter östlich, in der Höhe von Hermagor, habe ich einen zweiten, parallelen Durchschnitt durch die Triasbildungen aufgenommen, der allerdings nur bis zu den Raibler Fischschiefern hinabreicht, aber den Plattenkalk in breiterem Durchchnitt und besseren Aufschlüssen trifft. In dem an der Bodenalp entspringenden Bach, der von SO her in den Weissensee mündet, beobachtet man aufwärts steigend zunächst dunkelen, bituminösen, dünnplattigen Kalk und den schwarzen Raibler Fischschiefer, der dann auf das Nordgehänge hinüberstreicht. Auf der Höhe der Thalwasserscheide liegen einige Moränenhügel sowie gewaltige Mengen von Gehängeschutt mit kleinen aufgedämmten Wasserbecken. Erst jenseits der Bodenalp (1242 m.) beginnt der Aufstieg zu dem Pass zwischen Golz (2008 m.) und Möschacher Wipfel (1899 m.). Der Abhang besteht zunächst aus blaugrauem, geschichtetem Kalk, dann aus weissem, splittrigem, dolomitischem Kalk, in der Mitte nendentlich geschichtet, sonst massig (= geschichteter Dolomit bei SUSS s. o.) Etwa in der Höhe von 1400 m. erscheinen die unzweifelhaften Carditaschichten, hier versteinungsleer, und alsdann der Hauptdolomit. Jenseits der Passhöhe geht der z. Th. kalkig entwickelte, meist geschichtete Hauptdolomit allmählig in Plattenkalk über. Derselbe bildet, wie bisher mit steilem Südfallen, den ganzen Abhang und ist durch das Vorkommen zahlreicher Einlagerungen von Rauchwaeken sowie von mergelig-sandigen Gesteinen ausgezeichnet. Die einzigen bestimmbar Versteinerungen sind kleine Steinkerne von *Megalodus Tofanae* HOEKX.? (Vergl. Profil-Tafel IX.)

Den dünngeschichteten Plattenkalken sind zunächst bei ca. 1500 m. Höhe braune sandige Mergel und Rauchwaeke und weiter abwärts Oolithe (mit Schneckenresten und Cidaritenstacheln) eingelagert; bei ca. 1450 m. erscheinen wieder

¹⁾ Der etwas weiter abwärts auch auf dem diesseitigen Abhange zum Vorschein kommt.

Profil-Tafel VII.

St. Lorenzen im Gitschthal



Entworfen von E. Suess.

Profil, unten der nördliche Theil in ca. 1/2 facher Grösse.)

branne, sandige, unregelmässig geschichtete Mergel mit Terebratelresten. In ca. 1300 m. Höhe entspringt aus einer Einlagerung von grünen und bräunlichen Mergelsandsteinen eine schöne Quelle. Bei 1100 m. Höhe erscheint branner und bläulicher Kalkmergel, weiter abwärts eine Schicht von röthlichem Dolomit mit Steinkernen, innig mit Ranehwacke verbunden. Alle diese rhaetischen Mergelgesteine sind durch dickere oder dünnere Lagen des normalen Plattenkalkes von einander getrennt.

Jenseits des an der Veränderung der Landschaftsformen deutlich kennbaren Gitschbruches liegt auf der Nordseite des Gitschthales die Hochfläche von Radnig. Die ausgedehnten Moränen derselben sind z. Th. durch den Gehängeschnitt der Kalkberge verdeckt; weiter abwärts erscheint wiederum, durch spätere Erosion freigelegt, der Quarzphyllit. Ein isolirtes Vorkommen dieses Gesteines findet sich im Möschacher Graben fast unmittelbar am Fusse der Kalkwand.

In dem nach Norden zu einspringenden Winkel, den der Bruch am Gailberg bildet, liegt fast ausschliesslich Grödener Sandstein; das ähnlich umgrenzte Gebiet des oberen Gitschthales besteht hingegen fast durchweg aus Quarzphyllit denn am Fusse des Reisskofels zieht sich die bis dahin ziemlich breite Sandsteinzone ausserordentlich zusammen und keilt im Moenikgraben, wie erwähnt, gänzlich aus. Erst nördlich von Nötsch erscheinen dann wieder Grödener Schichten.

Die Breite und somit auch die relative Höhe der Phyllitzone unterliegt zwischen Grafendorf, Weissbriach und Hermagor-Vellach erheblichen Schwankungen; die scharfe Abgrenzung gegen das nördliche Kalkgebirge ist überall die gleiche, wie die Ansichten des Reisskofels und des Vellacher Egels zeigen. (Abb. 73 und weiter unten.)

Durch eigentümliche Erosion und Flussverlegung (vergl. unten) ist bei Hermagor die in Rede stehende Gesteinszone in drei Theile zerschnitten worden: den ausgedehnten, mit 1658 m. im Hohenwarth culminirenden Gebirgszug im Westen, die Hochfläche von Radnig im Norden und die inselartig vom Presseker See und von Flussläufen umgebene Hochfläche von Egg im Osten. In den beiden letztgenannten Gebieten besitzen die Moränen des alten Gitschgletschers bedeutende Ausdehnung.

Der Quarzphyllit bietet wenig Bemerkenswerthes. Das Vorkommen des Kalkphyllits und eines Dioritganges bei Reissach wird im stratigraphischen Theile ausführlicher besprochen werden. Hervorzuheben ist das Fehlen von Granatphylliten und Glimmerschiefern sowie das gelegentliche Vorkommen quarzitischer Bänke; dieselben erscheinen an der Chaussee unmittelbar südlich von Hermagor und bei Mellweg auf der Hoehfläche von Egg. Hier zeigt das Gestein zwei sehr deutliche, unter rechtem Winkel gekreuzte Kluftrichtungen und fällt unter 50° nach N. Endlich findet sich dort, wo der Weg von Hermagor durch den Egger Forst emporführt, eine wenig mächtige Einlagerung von graphitischem Schiefer. (Vergl. das Profil durch das ältere Silur im stratigr. Theile.)

4. Das Ostende des Galibruches und die palaeozoische Scholle am Dobratsch.

Bei Ober-Vellach dreht der als Gitschbruch bezeichnete, WNW—OSO streichende Theil des Galibruches genau nach O und verläuft in dieser Richtung bis Ober-Kreuth bei Bleiberg. Hier biegt der Bruch fast genau in rechtem Winkel nach Süden um, lenkt aber westlich von Nötsch allmählig wieder in die alte Richtung zurück. Das bastionsartige Vorspringen der nach Osten und Westen auf weite Entfernung sichtbaren Masse des Dobratsch hat also eine tieferliegende tektonische Ursache.

Die Umbiegung des Bruches bei Kreuth bedingt zugleich die Zersplitterung desselben sowie eine Verminderung der Sprunghöhe: Die Aufquetschung von Muschelkalk (in der Facies der Gutensteiner Kalke), welche man im Bachbett zwischen Kreuth und Dentsch-Bleiberg beobachtet, ist zweifellos als eine Fortsetzung des Bruches in der ursprünglichen östlichen Richtung aufzufassen. Weiter östlich scheint diese Dislocation noch einmal in dem Vorkommen der Carditaschichten bei Heiligengeist aufzuleben. — Jüngere Schichten liegen hier im Thal, während die Höhen aus älterem Kalke bestehen. — Oberflächlich ist bei Bleiberg und weiter im Osten alles durch Gehängeschutt oder künstliche Geröllhalden bedeckt; der Bergbau hat bei Bleiberg selbst die „Bleiberger“ (= Raibler) Schichten mit dem nordalpinen Car-

nites floridus sowie im Liegenden derselben die erzführenden Kalke angeschlossen. Der erzführende Kalk von Bleiberg (mit *Megalodus triquetus* WILF. s. str.) gehört ebenso wie der des Dobratsch (mit *Pseudomelania* cf. *Rasthorni* HOERS. sp.) dem Horizonte des Wettersteinkalkes an.

Es ist somit — abweichend von MOJSISOVICS¹⁾ — dieser Bleiberger Längsdislocation geringere Bedeutung beizumessen. Allerdings hat schon dieser Forscher vermuthet, dass möglicherweise im Osten von Bleiberg ein Punkt gefunden werden könne, „an welchem die Verschiebung gleich Null ist.“

An der kurzen Nord—Süd gerichteten Strecke des Bruches östlich vom Nötschgraben trennt derselbe den Grödener Sandstein von dem Wettersteinkalk des Dobratsch; es fehlen also Muschelkalk und ? Werfener Schichten (S. 157). Auf der O—W gerichteten Strecke zwischen Kreuth und der Windisehen Höhe grenzt hingegen der Wettersteinkalk des Nordens unmittelbar an die Conglomerate und Grauwacken der untercarbonischen Nötscher Schichten.

Die einschneidende Bedeutung der gewaltigen Gailbruchlinie ist bereits von MOJSISOVICS im Jahre 1872 mit klarem Blicke erkannt worden. Derselbe hat den Bruch über Hermagor bis Weissbriach im Gitschthal verfolgt und ebenfalls richtig hervorgehoben, dass sich nach Westen zu der vertikale Abstand der längs dem Bruchrande anstehenden Formationen steigert.²⁾ In der Gegend von Nötsch grenzt Grödener Sandstein, bei St. Stefan Unterearbon an den Wettersteinkalk der Nordsholle; auch bei Matschiedel und Polland treten Grauwackenschiefer und Conglomerate (Str. NW—SO, saiger) auf, die nach dem Bruche zu eine mehr und mehr zerrüttete Beschaffenheit annehmen. Bei Hermagor, wahrscheinlich sogar schon in der Nähe von Förolach, wo der Gehängeschutt

¹⁾ Verhandlungen der geologischen Reichsanstalt 1872. S. 352.

²⁾ Allerdings bin ich betreffs der Deutung einiger Einzelheiten zu abweichenden Ergebnissen gelangt; ich habe „unterhalb der Windisehen Höhe“ nicht den Grödener Sandstein in Contact mit Wettersteinkalk beobachtet; am letzteren Orte verläuft der Bruch zweifellos zwischen Unterearbon und Trias. Der Grödener Sandstein reducirt sich auf einen geringen Denudationsrest im Hangenden des Carbon, der westlich der Windisehen Höhe bei der Höhencote 1427 ansteht.

alles verdeckt, steht südlich des Bruches Quarzphyllit, nördlich der rhaetische Plattenkalk bezw. Hauptdolomit an. Wo die Grenze von Wettersteinkalk und Plattenkalk liegt, bezw. wo die Carditaschichten des Möschacher Wipfels gegen den Bruch ausstreichen, habe ich leider nicht feststellen können. Entsprechend dem allgemeinen Streichen müsste dies in der Gegend der Windischen Höhe der Fall sein. Das Vorkommen von Bleiglanz und Zinkblende nördlich der Windischen Höhe ist, wie am Reisskofel, zum Theil auf die Dislocationen des Gebirges zurückzuführen.

Eine weiter westlich „nahezu parallel zum Drauthal“ verlaufende Längsverwerfung hat ebenfalls v. Mojsisovics von Villach bis in die Gegend von Paternion verfolgt. „Am nördlichen Bruchrande stehen theils Muschelkalk, theils die unteren Glieder der norischen Stufe an, ziemlich flach nach Süd einfallend; am südlichen Bruchrand trifft man mit steilem nördlichen Verflähen bald Hauptdolomit, bald Wettersteinkalk, bald Carditaschichten.“ Das Einfallen der Schichten nach den Verwerfungen zu ist eine Erscheinung, die BUTNER auch in den nördlichen Kalkalpen beobachtet hat.

Das Gebiet, welches im Westen des Dobratsch und im Süden des Tschekel-Neck durch die zweimalige Umbiegung des Gailbruches abgegrenzt erscheint, bildet das sogenannte Mittelgebirge von St. Stefan und enthält zwei geologisch und landschaftlich verschiedene Theile. Der Nordosten, etwa ein Drittel des ganzen Gebietes besteht aus carbonischen Conglomeraten und Schiefen mit eingelagerten Eruptivlagern; im Südosten bildet Quarzphyllit in der Fortsetzung der Egger Hoehfläche das Grundgebirge, ist jedoch fast durchweg von Glacialschottern bedeckt. Das aus widerstandsfähigem Gestein bestehende Untercarhou bildet ein bewaldetes Hüggelland, das in den Badstuben (1360 m.) gipfelt. Das Culturland der Phyllitfläche besitzt eine wesentlich geringere Höhe (720—780 m.) und ist von tiefeingeschnittenen Bächen durchfurcht. (Vergl. die im allgemeinen Theile folgende Abb.: „Das Mittelgebirge von St. Stefan“.)

Die Tektonik der palaeozoischen Scholle ist überaus lehrreich: Die Grenze von Carbon und Phyllit ist ein WNW—OSO streichender Bruch („Bruch von St. Georgen“), der am

Koves Nock



Abbildung 74.

Q. Quarzphyllit, D. Untercarbonat
lagert transgredierend dar

besten im Nötsehgraben aufgeschlossen ist (vgl. Abb. 74). Die Störung ist jungcarbonischen Alters, denn der am Fusse des Dobratsch in flachgelagerten Bänken auftretende Grödener Sandstein überdeckt dieselbe, ohne seinerseits irgendwie disloziert zu sein. Unmittelbar daneben erscheint der posttriadische Gailbruch, welcher hier aus der meridionalen Richtung wieder nach Osten umbiegt.

Wir unterscheiden also:

1. Jungcarbonische Faltung und Ausbildung des Bruches von St. Georgen.

2. Transgression des Grödener Sandsteins.

3. Entstehung des Gailbruches in posttriadischer, (wahrscheinlich cretaeischer) Zeit. Die weitere Ausbildung desselben fällt in das Tertiär.

Die hier beobachteten Thatsachen sind von grosser Bedeutung, da im Gebiet der Karnischen Hauptkette zwar zahlreiche Faltungen und Ueberschiebungen der älteren Gebirgsbildung, aber keine einfachen, gradlinigen Brüche von gleichem Alter zur Beobachtung gelangt sind. Aus anderen Wahrnehmungen wurde gefolgert, dass die carbonische Faltung von Norden nach Süden gerichtet war, und das ausschliessliche Auftreten einfacher Brüche im Norden stimmt mit dem Vorkommen der Ueberschiebungen im Süden gut überein.

Die Zusammensetzung des Untercarbon ist recht mannigfaltig. Eruptivdecken, Tuffe und Schalsteine wechseln mit Grauwackenschiefern, Conglomeraten und Thonschiefern ab.

Den besten Durchschnitt durch die palaeozoische Scholle im Westen des Dobratsch gewährt der Nötsehgraben (Abbildung 74); man beobachtet an der Chaussee zwischen Nötseh und Bleiberg die folgenden meist vortrefflich aufgeschlossenen Schichten:

1. Quarzphyllit von typischer Beschaffenheit; derselbe steht in ganz flacher Lagerung oberhalb des Nötseher Schuttkegels bis Labitschach hin am Wege an.

2. Glaciälschotter.

3. Grödener Sandstein, flach gelagert, im Liegenden der Schotter für eine kurze Strecke aufgeschlossen.

4. Quarzphyllit, Streichen WXW—OSO, Fallen steil SSW, oberhalb einer Wassermühle gut aufgeschlossen.

5—8 Nötscher Schichten (Untercarbon) und zwar:

5. Körnigen Diabas (bezw. Diorit; die blaugrüne Hornblende ist nach Herrn Dr. MÜLLER aus Angit entstanden — vergl. den petrographischen Anhang), von dem Quarzphyllit durch eine gewaltige Dislocation getrennt, die sich in der Form der Landschaft nur durch einen kleinen Baueinschnitt kennzeichnet. An der Bruchgrenze ist das Eruptivgestein sehr deutlich geschiefert.

6. Dunkle Conglomerate mit zahlreichen weissen Quarzgeröllen und Granwacken, steil SSW fallend (an der Stelle, wo die Strasse auf das linke Ufer hinüberführt).

7. Thonschiefer, WNW—OSO streichend, saiger stehend. Der westlichen Fortsetzung dieses Zuges gehört der bekannte Fundort des „Bleiberger Kohlenkalkes“ mit *Productus giganteus* am Gehöft Oberhöher¹⁾ an.

8. Grünliche Granwacke, im Ansehen manchen Eruptivgesteinen ähnlich (an das Gestein von S. Daniele erinnernd). Die Granwacke ist dicht, grün, von zahlreichen Klüften und Sprüngen durchsetzt und verwittert z. Th. braun, z. Th. roth. Eingelagert finden sich Bänke von Schalsteineonglomerat, das Diabasgerölle und Blöcke eines weissen oder rosafarbenen marmorisirten Kalksteins (bis 1 m. Durchmesser) enthält. (Man vergleiche den petrographischen Anhang.)

9. Thonschiefer, enthält oberhalb der Mündung des Thorgrabens eine kalkreiche Bank voll von *Productus giganteus* (mit seltenen Zweischalern und Korallen, meist *Lonsdaleia floriformis*).

10. Grödenener Sandstein in dicken Bänken, ganz flach NO fallend, das Untercarbon discordant überlagernd (an der Mündung des Erlachgrabens). Die Hangendschichten des rothen Sandsteins bestehen nach STUSS (vgl. unten) zunächst aus „wechselnden Bänken von mürbem, gelblichweissem Sandstein; dazwischen liegen schwarze, glimmerreiche Schiefer, blaugraue, thonige Schiefer und kalkige Zopfplatten. Myacitensteinkerne kommen vor. Höher beobachtet man stark ge-

¹⁾ Der Fundort liegt etwas westlich vom Gehöft im Walde an einem in gleicher Höhe am Berge hinführenden Wege; man sammelt die aus kalkigem Schiefer herauswitternden oder herabgerollten Versteinerungen in einer kleinen Geröllhalde.

wundene Bänke von dünngeschichteter Rauchwacke und glimmerigem Sandstein, schwarzgrau und röthlich (den Werfener Schiefen ähnlich). Darüber Bänke von dünngeschichtetem dunkelgrauem Kalk, weissgelb an der Aussenfläche und hoch oben noch mit glimmerig schieferigem Zwischenmittel. Gyps kommt in Adern und Sehnüren von den ersten Rauchwacken an bis hinauf vor.“ Die zuletzt beschriebenen Schichten sind ein Aequivalent der Bellerophonkalke oder der Werfener Schichten.

11. Muschelkalk, vom Grödener Sandstein durch eine Verwerfung (Gailbruch) getrennt. Mergelkalke und dunkle kalkspathreiche Kalke. NW—SO streichend und in verwickelte Falten zusammengepresst und gestaucht. Der Muschelkalk verschwindet unter dem natürlichen oder künstlichen Gehängeschutt. Der Abhang zur Rechten und Linken des Bleiberger Längsthalles besteht aus

12. Wettersteinkalk.

Auf dem nördlichen Thalgehänge grenzt, wie Abb. 75 (S. 160) deutlich erkennen lässt, der Wettersteinkalk unmittelbar an das Unterearbon.

Weitere Aufschlüsse bietet die östlich der Chaussee liegende Mündung des Nötschgrabens, wo Quarzphyllit (Thonglimmerschiefer) und weiter aufwärts Grödener Schichten anstehen; die letzteren sind hier local durch das Vorkommen von Kalk und Gyps ausgezeichnet. Ich entnehme dem mir in liebenswürdigster Weise zur Verfügung gestellten Tagebuche¹⁾ des Herrn Prof. Ed. SUSS die nachfolgenden Angaben:

„Der Nötschgraben ist in seinem untersten Theile beiderseits in ONO fallenden Thonglimmerschiefer eingeschnitten. Blöcke von Gyps [weiter östlich anstehend getroffen, Verf.] fallen von den Abhängen des Dobratsch in den Graben. Im

¹⁾ Ungefähr die gleichen Angaben sind in der Arbeit über die Aequivalente des Rothliegenden in den Südalpen enthalten. (LVII. Band d. Sitzb. d. k. Akad. d. Wissenschaften. I. Abth. Febr.-Heft. Jahrg. 1868.) Jedoch ist die Auffassung des Gebirgsbaues dort eine durchaus abweichende. Der Quarzphyllit (Thonglimmerschiefer) der nach meiner Ansicht die Basis des Palaeozoicum bildet, soll zwischen Carbon und Grödener Sandstein liegen (l. c. p. 23). Ich habe es daher vorgezogen, das Tagebuch, welches nur die thatsächlichen Beobachtungen enthält, an Stelle der Publication zu berücksichtigen.

östlichen Arm legt sich auf den Thonglimmerschiefer schiefriger Kalk mit Talkblättchen von grell grüner Farbe, entsprechend dem Quecksilbervorkommen von Kersedorf (vergl. unten). Etwas höher fließt der Bach im Streichen des Thonglimmerschiefers, welcher zuerst $30-40^{\circ}$ N, dann steil S fällt.

Nun folgt ein ganz neues Glied und zwar blaugrauer, sehr thoniger Kalk mit grösseren Höhlungen voll Ocker und dünnblättrigem Schiefer von ockergelber Farbe ganz ohne Glimmer [zu den Grödener Schichten gehörig]. Fallen Süd. Der thonig-schiefrige Complex ist einige Klafter stark, dann untertenft von einer licht-gelblichen, mürben [Grödener] Sandsteinbank, welche 30° S fällt. Der blaugraue Schiefer wiederholt sich mitsammt den Sandsteinbänken.

Es sind die typischen Zopfplatten und man sieht, dass das convexe Relief stets der unteren Seite der Schicht angehört. Die eingeschalteten Sandsteinbänke sind ebenflächig, und der neu erscheinende glimmerreiche Schiefer ist meist schwarz mit kleinen, weissen Glimmerblättchen bedeckt, bald roth wie Werfener Schiefer; sehr undeutliche Spuren von Myaciten.

Zurück in den Hauptstamm des Nötsegrabens; unten Thonglimmerschiefer, Fallen NNO—NO, dann sehr flach, fast schwebend. An der linken Thalseite gewahrt man nun im Waldgrunde den Sattel der Zopfplatten, bald darauf im Liegenden den rothen Sandstein. Viel mannigfaltiger ist die rechte Thalseite. Hier sieht man infolge einer Verwerfung zunächst den blaugrauen Mergel mit Zopfplatten, darunter das rothe Sandsteinglomerat (60° SSO-Fallen) und unmittelbar darunter mit gleichem Fallen den Thonglimmerschiefer. Das SSO-Fallen hält an, wird nach und nach im Thonglimmerschiefer steiler und plötzlich besteht wieder der ganze hohe Abhang aus den Bänken des rothen Sandsteins und Conglomerats. Der Graben ist hier einige hundert Fuss tief eingeschnitten. Fallen des Sandsteins $30-35^{\circ}$ nach Ost, des liegenden Thonglimmerschiefers $30-35^{\circ}$ nach Süd bis SSO. Die Discordanz ist auch hier deutlich wahrnehmbar. Es ist also festzuhalten, dass der grellgrüne, schiefrige Kalk zum Quarzphyllit gehört, während der blaugraue (? Belleophon-)Kalk das Hangende der Grödener Schichten

bildet. Eine ungefähre Uebersicht des merkwürdigen Nebeneinanders der Formationen im Nötschgraben giebt die ebenfalls von E. STRESS entworfene Landschaftsskizze (Abb. 74).

In der südlichen, durch den Bruch von St. Georgen abgetrennten Phyllitmasse nimmt besonders das Vorkommen von Kupferkies, Silber- und Quecksilbererzen die Aufmerksamkeit in Anspruch. Der Bergbau, der besonders im vorigen Jahrhundert blühte, ist allerdings schon längst zum Erliegen gekommen. E. STRESS schreibt über die geologischen Verhältnisse dieses Gebietes: „Wir wenden uns nächst Emmersdorf in dem Graben aufwärts, der aus der Gegend von Tratten nach St. Paul hinabkommt. Zunächst empor über geschliffenen Moränenschutt [ein vereinzeltes Vorkommen, das nicht von dem Glacialschotter getrennt wurde; vergl. unten]. Dann der membranöse Thonglimmerschiefer, der im frischen Zustande viel dunkeler aussieht, als auf alten Flächen; stellenweise fein runzelig. Fallen 25°—30° nach O. Bei einer kleinen Mühle folgt darüber eine derbe massige Felsart von mehr kalkiger Beschaffenheit, die einen Absturz ansieht. Gegen oben stellt sich senkrechtes Fallen ein, es folgt etwas schwarzer Schiefer mit schwarzen thonig-kalkigen Einlagerungen und weissen Adern, dann grüne Waeken mit rothen Beschlägen. Das Fallen ist constant Süd. . . . Ueber Aecker nach Kerschdorf; der Thonglimmerschiefer fällt SSW. Unterhalb des Ortes im Graben legt sich auf denselben eine scheinbar derbe Masse, welche hauptsächlich aus lichtem Kalkschiefer besteht, der mit talkigen Blätchen auf den Schichtflächen belegt ist. Hier findet man Zinnober und gediegen Quecksilber. Der Kalk, welcher auch zuweilen blaugrau ist, enthält viel Erz, theils als rothen Beschlag auf den Klüften, theils in Verbindung mit Schwefelkies auf kleineren Kalkspathgängen, seltener in Verbindung mit Quarzgestein. Auch gediegen Quecksilber kommt in Tropfen auf Kalkspathgängen vor. Auffallend ist die grell lichtgrüne Farbe des Talkes oder Glimmers im Kalk und in den benachbarten Schiefen. Das Gestein stimmt mit den derben Massen an der Mühle im vorderen Graben und im Nötschbueh (östlicher Arm) überein.“

Dass der Gailbruch am Südbhang des Dobratsch entlang streicht, wurde schon mehrfach erwähnt. In der That lässt

sich am Südabhang des Berges der Quarzphyllit bis über das Dorf Saak hinans verfolgen, der rothe Streifen des Grödener Sandsteins zieht sogar weithin sichtbar unter dem Kalkschutt bis zur sogenannten Kanzel hin. Man wird also annehmen dürfen, dass der Hauptbruch auf dieser Seite bis in die Gegend von Villach verläuft. Die gegenüberliegenden Karawanken bestehen aus untersilurischem Sebiefer und erheben sich zu Höhen, welche hinter der des Dobratsch nur um einige hundert Meter zurückbleiben; der Quarzphyllit von Nötsch, der erst wieder östlich von Villach sichtbar wird, bildet wohl wie im Westen das Liegende der Silnrchiefer und grenzt andrerseits — mit oder ohne Zwischenlagerung von Grödener Sandstein — an die von dem Gailbrunn abgesehchnittene obere Trias.

Der Dobratsch (oder Villacher Alp) besteht im Wesentlichen aus Kalk vom Alter des Wettersteinkalkes mit Gyroporellen und Pseudomelanien (cf. *Chemnitzia Rosthorni* HOERN.) Riesenoolithe, oft rothgefärbt, sind überaus häufig; der Kalk ist in Allgemeinen massig und von gewaltigen Klüften durchsetzt; nur am Schlossberg ist dentliche Schichtung ausgeprägt. Am oberen Theile des Westabhanges, zwischen Kuhriegel und Rudolfsbrennen finden sich local splittrige z. Th. breccienartige Oolithe. Die Hochflächenform des nach Osten zu allmählig abdachenden Dobratsch ist bedingt durch die fast schwebende Lagerung des Gesteins und kehrt im nördlichen Gailthaler Gebirge nirgends wieder. In diesem sind die langgezogenen Ketten (Abb. 75), welche die Voralberger und westlicheren Tiroler Kalkalpen kennzeichnen, durchaus vorherrschend. Plateaus von der Form der Villacher Alp sind hingegen charakteristisch für den Nordosten und Süden der Ostalpen.

Dass das Auftreten der Carditasechichten (*Corbis Mellingeri*, *Carnites floridus*) bei Heiligengeist mit einer untergeordneten Störung zusammenhängt, kann wohl keinem Zweifel unterliegen; die Kette im Norden des Bleiberger Längsthalles gehört zu demselben Horizont wie der Dobratsch, und die jüngeren Carditasechichten liegen zwischen beiden in der Tiefe. Leider fehlte es mir an Zeit, um diese in der geradlinigen Fortsetzung der Krenther Mischelkalkaufpressung liegende Dislocation näher zu untersuchen.

Zu Seite 160.



Drau
Kellerberg

NO.

... einer Photograph. von A. Beer gez. von O. Berner.

NW.

... das durch den Gailbruch abgeschnittene Untererbon
... und 3 Latscher 2238 m.: Krystalliner Kalk und Kalk-
Tauern.

Der Dohratsch ist berühmt als Aussichtspunkt, (Abb. 75) noch berühmter vielleicht als Urheber des mächtigsten Bergsturzes, der in historischer Zeit im Gebiete der Alpen vorgekommen ist. Die gewaltige Ausdehnung der Trümmernmassen wird durch die Karte¹⁾, die noch immer nicht verhasste Wunde des Südabhanges durch das weiter unten folgende Bild veranschaulicht. Wohlgegläubigte Nachrichten verthigen die Thatsache, dass ein Erdbeben die unmittelbare Veranlassung des schrecklichen Ereignisses gewesen ist. Wir haben den Gailbruch, dessen Richtung mit der gleichnamigen Erdhebenlinie auf der Karte Höfers ziemlich gut übereinstimmt, bis an den Südabhang des Dobratsch verfolgt. Die in dieser Dislocationsrichtung wirksamen seismischen Kräfte sind also seit grauer geologischer Vorzeit bis in die jüngste Vergangenheit lebendig geblieben: Die im Bau der Erdrinde begründete Störung, welche die Ausbildung des ganzen Thalsystems bedingte, hat noch in jüngster Zeit umgestaltend in die Geschichte des Thales eingegriffen.

¹⁾ Die ausführlicheren Nachrichten über den Sturz, über die Aufdämmung der Gail etc. siehe in dem Abschnitt über Bergstürze.

VI. KAPITEL.

Die Triasgebirge im Süden der Karnischen Hauptkette.

(Venetianer und Julische Alpen.)

1. Allgemeines.

Die Karnische Hauptkette wird im Norden und Süden fast ausschliesslich von triadischen Gebirgen begrenzt, deren tektonischer Aufbau wesentliche Verschiedenheiten erkennen lässt. Im Norden erhebt sich der aus nordalpiner Trias bestehende, in regelmässige Sättel und Mulden gelegte Zug des Gailthaler Gebirges; derselbe wird durch den Gailbruch, eine der grossartigsten einheitlichen Verwerfungen in den Ostalpen scharf abge schnitten.

Das im Süden angrenzende, aus permotriadischen Ablagerungen bestehende Gebirge ist mannigfacher zusammengesetzt, unterscheidet sich jedoch von den Gailthaler Alpen durch bestimmte stratigraphische und tektonische Merkmale.

In stratigraphischer Hinsicht ist hervorzuheben, dass der Bellerophonkalk im Norden fehlt (bzw. durch zweifelhafte, wenig mächtige Bildungen vertreten wird); hingegen ist derselbe im Süden, vor allem in der Carnia mächtig entwickelt. Während die Werfener Schichten (ebenso wie die Gröden Sandsteine) eine auffallend gleichartige Entwicklung zeigen, ist für den Muschelkalk das Fehlen der bunten Kalkeonglomerate und Schiefer im Norden hervorzuheben. Bei der mannigfachen Faciesentwicklung der Norischen und Karnischen Stufe lassen sich im Norden und Süden der mediterranen Triasprovinz keine einheitlichen Unterschiede feststellen. Doch darf das Zurücktreten eruptiver Gesteine im Norden hervorgehoben werden. Im Gailthaler Gebirge fehlen dieselben gänzlich.

lich, während in der Carnia die Pietra-verde-Tuffe und im Osten die Raibler Quarzporphyre eine wichtige Rolle spielen.

Die Verschiedenheit der Raibler Schichten ist bekannt: In den Gailthaler Bergen und auf dem Nordabhang der Karawanken herrscht die nordalpine Entwicklung der Carditasehichten (= Bleiberger Schichten) vor, im Süden finden wir, soweit nicht die dolomitische Riffaacies platzgreift, rothe Schlerenplateau- oder graue mergelige Torer („Raibler“) Schichten mit verschiedenartigen organischen Resten. *Carnites floridus* und *Cardita Guembeli* kennzeichnen u. a. die nördliche, *Myophoria Kefersteini* und *Pachycardia rugosa* die südliche Entwicklung.

Ans der obersten Trias ist nur das Fehlen schwarzer dünnschichtiger Plattenkalke¹⁾ und Mergel im S hervorzuhelen, während der Hauptdolomit allgemein verbreitet ist. Der Daehsteinkalk im engeren Sinne, der helle, z. Th. röthliche, diekbankige, reine Kalk mit Megalodonten und Thecosmilien ist bekanntlich in Südtirol und Venetien das weitaus vorherrschende rhætische Gestein, tritt aber bemerkenswerther Weise in den Gailthaler Alpen sehr in den Hintergrund.

In tektonischer Hinsicht wird die südliche Grenze der alpalaeozoischen Gesteine der Karnischen Hauptkette im Wesentlichen durch die transgressive Anlagerung der permotriadischen Schichten gebildet: Doch ist diese Linie vielfach durch Brüche gestört, die man als Fortsetzungen der im W beobachteten Villnösser und Sugana- (bezw. Antelao) Linie auffassen darf.

In tektonischer Hinsicht lässt sich die Südgrenze der Karnischen Hauptkette in die folgenden Abschnitte zerlegen:

1. Normale Anlagerung des am Ausseurande aufgehobenen Sextener Gebirges zwischen Innichen und Comelico (S. Stefano); an letzterem Orte bildet die Fortsetzung der

¹⁾ Ich gebrauche diesen Namen nicht in dem Sinne von SUSS (= Daehsteinkalk), sondern in rein petrographischem Sinne für die wohlgeschichteten, dünnbankigen, meist dunkel gefärbten und mit Spathadern versehenen rhætischen Kalke der Gailthaler Gebirge. Diese Gesteine stimmen mit dem Guttensteiner Kalk petrographisch oft vollkommen (abgesehen vonder Hornsteinführung) überein und sind auch früher mit demselben verwechselt worden.

Villnösser Linie die Grenze von Quarzphyllit und Schlern-dolomit.

2. Vorsprünge der Bladener Trias in das palaeozoische Gebiet; im Norden normale Transgression, im Westen (Sasso Lungero bis Monte Curie, Profil-Tafel VI), und im Osten (Monte Vas) Brüche.

3. Normale Auflagerung zwischen Forni Avoltri und Comeglians.

4. Bis Paularo ist die Auflagerung ungestört (am genannten Orte) oder durch unbedeutende Brüche, die Ausläufer der Sngana-Antelao-Linie gekennzeichnet (Senke von Ravaseletto).

5. Westlich von Paularo (am Monte Salinchiotto) lebt die Sngana-Linie in einem System paralleler, tiefeingreifender Längsbrüche wieder auf, geht dann (Pontafel) in eine Antiklinale und östlich (bei Leopoldskirchen) wieder in einen Bruch zwischen dem gesenkten Schlerndolomit (N) und der unteren Trias (S) über. Dieser Längsbruch, der Savebruch bildet weiterhin die Südgrenze der Karawanken und reicht durch das Fella-, Gailitz- und Savethal nach Osten bis zum Beginn des Laibacher Senkungsfeldes.

Die Karawanken kennzeichnen sich also nicht nur durch die Gleichartigkeit des tektonischen und stratigraphischen Aufbaues sondern auch durch die Einheitlichkeit der südlichen Grenze als die unmittelbare Fortsetzung der Karnischen Hauptkette.

Die vorwiegende Begrenzung durch Brüche im Norden und Süden und vor allem der Umstand, dass die Hochregion der Karnischen Kette die um vieles jüngeren Gailthaler und Venetianer Berge entschieden überragt, rechtfertigen die Annahme einer antiklinalen Aufwölbung des gesamten Karnischen Längszuges.

Die im Süden an die Karnische Hauptkette angrenzenden Triasalpen sind zum Theil durch muster-giltige Aufnahmen der wissenschaftlichen Kenntniss erschlossen, zum Theil so gut wie unbekannt. Das erstere gilt insbesondere für den westlichen und östlichen Theil des Gebietes. Das letztere bezieht sich auf das, in tektonischer Hinsicht sehr verwickelte Bergland zwischen Pontafel und Paularo. Ueber die angrenzenden




Abbildung 11.

Nach einer Photographie von Al. Beer gez. von O. Berner.

Pontebba von Süden.

Die Berge im Hintergrunde zeigen die charakteristischen Formen des Schiefermassivs. Der Vordergrund und der untere Theil des nördlichen Gehanges besteht aus Werfener Schichten. Zwischen beiden eine Zone von Muschelkalk (M. M.). Sämtliche Schichten sind nach aufgerichtet bzw. überkippt.

Theile der Carnia und der Julischen Alpen liegen keine eingehenderen Veröffentlichungen vor; jedoch ist der Gehirgsbau überaus einfach.

2. Die südwestlichen Triasberge.

(Sexten, Comelico, westliche Carnia.)

Die Sextener Gebirgsgruppe gehört noch zu den in dem Werke von MOJŠIČIĆ („die Dolomitriffe“) behandelten Gebiete und ist von R. HOERNES genauer aufgenommen worden. Die gesammte permotriadische Schichtenfolge ist vollständig vertreten von den Gröden Conglomeraten bis zum Dachsteinkalk, der die stolzen Gipfel der Rothwand, des Zwölfers und der Drei Zinnen zusammensetzt. (Man vergl. besonders die Profil-Tafel VI S. 132 rechts unten.)

„Die tektonischen Verhältnisse der Sextener Gebirgsgruppe sind ansserordentlich einfach. Im Centrum und am Innenrande herrscht söhliche Lagerung. Am Aussenrande, im Pusterthal bei Toblach und im Sexten-Thal (sowie im Comelico) fallen die tieferen Schichten ziemlich steil vom Phyllit weg gegen Süden. In den höheren Schichten nimmt dann der Fallwinkel allmählig ab, bis sich die söhliche Lagerung einstellt. So erscheint die Sextener Gebirgsgruppe als ein horizontaler gelagerter Gebirgsteil, dessen nördlicher und östlicher Anssenrand aufgebogen ist.“¹⁾ Es braucht kaum hemerkt zu werden, dass diese peripherische Aufbiegung auf das beste mit der Ansicht übereinstimmt, dass die Karnischen Alpen in ähnlicher Weise wie die Centralkette emporgewölbt seien.

„Mit dem Südrande der Sextener Gruppe fällt der östliche Theil der Villnösser Bruchlinie zusammen. Der Monte Rosiana und der Monte Malone bei Anronzo bilden eine verworfene Scholle am Nordrande der Bruchlinie und gehören tektonisch noch der Sextener Gruppe an.“ (l. c.) Der Villnösser Bruch zieht, wie die Untersuchungen von Harada lehren²⁾ in östlicher Richtung weiter und treunt den am Colle di Mezzo Giorno durch Hauptdolomit überlagerten Schlerndolomit von

¹⁾ Dolomitriffe S. 301.

²⁾ Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. Bd. 33 (1883), S. 162 ff.

dem Quarzphyllit des Nordens. Der letztere trägt an der Mündung des Val Frisone Denudationsreste von Grödener Sandstein und Bellerophonkalk.

Der Villnösser Längsbruch wird an dem Westabhange des Eichenkofels (Terza piccola) durch einen von Norden, vom M. Curie her kommenden Querbruch abgeschnitten. Wir betreten hiermit das Gebiet der Bladener nach N vorspringenden Triasberge. In der Abgrenzung derselben gegen das Palaeozoium wechseln kurze Quer- und Längsbrüche




Abbildung 76.

Croda Bianca und Monte Vas.

Durch eine Verwerfung sind die Werfener Schichten (W) unmittelbar neben dem devonischen Riffkalk (D) gebracht. Im Hangenden der Werfener Schichten erscheint Muschelkalk.

in scheinbar unregelmässiger Weise mit der normalen Transgressionsfläche ab. Trotzdem herrscht eine merkwürdige Symmetrie in der Vertheilung der einzelnen Schollen: Die beiden Ecktürme, Sasso-Lungerin im W (Vgl. Abb. 60 S. 123 und Profil-Tafel VI) und Monte Vas (Abb. 76) im Osten bestehen aus jüngerer Trias bis zum Selherndolomit bezw. bis zum oberen Muschelkalk aufwärts und sind auf der Aussenseite durch kurze winkelige Brüche von dem älteren Palaeozoium geschieden; nach dem Inneren des Triasgebietes zu folgt im

Liegenden die normale Schichtenserie bis zum Bellerophonkalk abwärts.

Die Dislocationen des Sasso Lungerin und des Monte Vas setzen sich in das palaeozoische Gebirge fort: Die Scholle von Muschelkalk und Werfener Schichten am Filone di Costa Spina nimmt dem Sasso Lungerin gegenüber dieselbe Stellung ein, wie die Versenkung der Boddaglia-Alp gegenüber den Monte Vas. (Man vergl. oben die betr. Abbildungen S. 123—126 und Abb. 45 S. 105.)

Auf der gemeinsamen Unterlage der Bellerophonkalke lagert östlich vom Sasso Lungerin der Monte Schiaron und westlich vom Monte Vas der Monte Cadin. Beide besitzen genau die entsprechende Lage und zeigen nur auf der Südseite unerheblichere Verwerfungen. Den orographischen und geologischen Mittelpunkt der nördlichen Bladener Triasberge bildet das Riff des Scheibenkofels und des Monte Rinaldo mit einigen eingelagerten heteropen Mergelzungen. (Herr Dr. DIEXER machte mich auf das Vorkommen der letzteren aufmerksam.)

Südlich vom Monte Rinaldo und Monte Ferro liegt das Längsthal von Bladen, eingesenkt in die Antiklinale der Buchensteiner Schichten. Auf dem gewöhnlichen Wege, der von Bladen (Cima Sappada) durch das Thal des Zötzbaches (Torrente Sesis) zum Bladener Joeh emporführt, durchquert man in dem Nordflügel der Antiklinale ein regelmässiges Profil der gesammten Trias: Die Buchensteiner Schichten sind als dunkle Plattenkalke entwickelt und enthalten massenhaft Pietra verde als Einlagerung. Bemerkenswerth sind die mannigfachen Fältelungen und Kniekngen, welche diese weichen Schichten zwischen den Riffmassen erlitten haben. Weiterhin folgen Muschelkalk (als Guttensteiner Kalk entwickelt), Werfener Schichten, Bellerophonkalk und, an der abgebrannten unteren Zötzhütte, Grödener Sandstein. (Vgl. Profiltafel V. S. 111.) Die regelmässige permotriadische Schichtfolge bildet einen höchst bezeichnenden Gegensatz zu den wild ineinander gefalteten und zerquetschten Devon-schichten des Bladener Joehes.

HARADA deutet die unregelmässige Bladener Antiklinale wohl mit Recht als Ausläufer der Villnösser Linie. Ist doch

das Abwechseln von Brüchen und Falten in derselben Dislocationsrichtung eine häufig (unter andern auch bei Pontafel) beobachtete Erscheinung. Die Dislocationen am Monte Vas, wo Werfener Schichten unmittelbar an Devon grenzen¹⁾, (vergl. die Abb. 76) sowie der Einbruch der Bordaglia-Alp bezeichnen das Wiederanleben dieser Dislocationslinie. Man wird somit auch den Plöckener Längsbruch und den Polliniggbuch als weit entfernte östliche Fortsetzungen der Villnösser Dislocationslinie ansehen dürfen. Die Bezeichnung als Plöckener Bruch erscheint jedoch schon mit Rücksicht auf die zahlreichen Unterbrechungen gerechtfertigt, welche den Verlauf dieses Spaltensystems kennzeichnen.

In der nächsten Umgebung von Forni Avoltri steht — abgesehen von Flussterrassen und Moränen — Gröden Sandstein an (nicht, wie die Karte HARADAS angiebt, Culmschiefer); von hier bis Comeglians überlagert dasselbe Gestein transgredierend die gefalteten altpaläozoischen Bildungen.

3. Die östliche Carnia.

Von Comeglians nach Osten bezeichnen wieder für eine Strecke Dislocationen von verhältnismässig geringer Sprunghöhe die Südgrenze der Karnischen Hauptkette und zwar betreten wir hier die Region der Sugana-Brüche.

Die Betrachtung der Bruchkarte in MOJSISOVIC'S Dolomitriffen (S. 516) lehrt, dass die bedeutende Dislocation, welche im oberen Val Sugana die Südgrenze der uralten Cima d'Asta bildet, von dort aus in nordöstlicher Richtung über Primiero und Agordo nach Pieve di Cadore zieht, überall den Aufbruch älterer Triasgesteine inmitten der jüngeren Kalkmassen bedingend. Ein wenig nördlich von der Heimath Tizians vereinigt sich der Antelao-Bruch mit der Sugana-Linie. Bei Lorenzago, östlich von Pieve di Cadore beobachtet man sogar drei von Perm umgebene, kleine Aufbrüche von

¹⁾ Am Ostabhang des Berges grenzt weiterhin der Muschelkalk bzw. der Werfener Schiefer an den Culm; die verquetschte Partie von Gröden Sandstein, welche Harada von hier angiebt, ist in Wirklichkeit nicht vorhanden; die rothe Färbung des Culmschiefers, die auf dem ganzen Abhang des Croda Bianca zu beobachten ist, hat zu dieser Verwechslung Anlass gegeben.

Quarzphyllit. Die drei parallelen Spalten, an denen das ältere Gestein an die Oberfläche tritt, werden jedoch westlich vom Piave theils vereinigt, theils durch einen Querbruch abgelenkt. Südlich von Bladen, am Abhang des Enlenkofel, des Hinterkärl, des Monte Siera und Monte Tnglia trennt ein tief eingreifender, ONO streichender Bruch den Schlerndolomit der genannten Berge von dem ausgedehnten Werfener Schiefergebiet von Zahre (Sauris). Zwischen Prato Carnico und Forni Avoltri hört der nach NO streichende Bruch plötzlich auf. Hingegen wird die östliche Fortsetzung durch ein, in der Tiefe des Canale di San Canziano (Avansa) gelegenes Vorkommen eines, wohl als Culmschiefer zu bezeichnenden Gesteines („Phyllit“ bei HARADA) angedeutet.

Ein unzweifelhaftes Wiederaufleben der Sugana-Linie ist in der, fast genau Ost—West streichenden Senke von Ravascello zu beobachten. Soweit nicht die ausgedehnten vom Monte Clavais stammenden Schutthalden die Beobachtung erschweren, stösst hier der Culm an Bellerophonkalk. Der Grödener Sandstein, dessen Mächtigkeit zum mindesten auf 200—250 m. zu veranschlagen ist, ist also verschwunden; doch findet sich südlich von Zovello in der Tiefe des Gladegna-Thales ein unverhältnissmässig schmaler, stark von Störungen durchsetzter Streifen dieses Gesteines (vergl. Profiltafel III), der bei Cercivento unter den alten Flussterassen und den gewaltigen Schotteranhäufungen des Torrente But verschwindet.

Östlich von Palnzza bis Paularo bildet auf eine Strecke von 11 km. der flachgelagerte, in gleichförmiger Breitenstreckung auftretende Grödener Sandstein die untere Grenze der permotriadischen Schichtenfolge. Auch die Berge im Osten und Westen des Torrente But, die Monti di Sutrio, der Monte Cucco und Monte Tersadia besitzen, wie schon die Betrachtung aus der Ferne zeigt, einen überaus regelmässigen Aufbau. Bemerkenswerth ist die bedeutende Flächenentwicklung des gypsreichen Bellerophonkalkes (besonders zwischen Comeglians und Sutrio) sowie der Werfener Schichten. Der Bellerophonkalk besteht im Wesentlichen aus Rauhwaacke und dolomitischer Asche, welche beide der Verwitterung schnell unterliegen. Wesentlich hierauf ist die Entstehung gewaltiger Abrutschungen und Schnttkegel zurückzuführen, welche beson-

ders die Gegend des Schwefelbades Arta auszeichnen. Die Bellerophonschichten haben hier — ebenso wie bei Lussnitz und Malborget — zur Entstehung einer an Schwefelwasserstoff reichen Quelle Veranlassung gegeben.

Die Auscheidung der Formationen auf den Monti di Sutrio und Tersadia musste, da ich keine Zeit zu ausgedehnteren Begehungen hatte, theils auf Grund von Beobachtungen à vue, theils mit Benutzung der Taramellischen Karte erfolgen; ich habe diese in hohem Grade unzuverlässige Zusammenstellung nur für die in Rede stehende, ungewöhnlich einfach gebaute Gegend zu Rathe gezogen. Auch die Hanersee, auf den Aufnahmen Sruk's beruhende Uebersichtskarte ist in diesem Gebiet wenig brauchbar; dieselbe verzeichnet n. a. die ausgedehnten Ablagerungen von Bellerophonkalk als Raibler Schichten. Oestlich von Paularo beginnen — als unmittelbare Fortsetzung der Sugana-Linie die Brüche bzw. Antiklinalen der Fella- und Savegebietes, die schon in einem vorhergehenden Abschnitte kurz geschildert worden sind.

Auch das südwestlich von Pontebba liegende Bergland der östlichen Carnia ist von zahlreichen Brüchen und Aufaltungen der weichen Werfener und Bellerophon-Schichten durchsetzt, gehört aber leider in tektonischer Hinsicht zu den am wenigsten bekannten Gegenden der Ostalpen. Eine flüchtige Begehung des Gebietes zwischen Paularo und Pontebba hat mich nur die Schwierigkeiten; welche hier noch ihrer Lösung harren, kennen gelehrt.

An der Strasse, die von Paluzza bzw. Arta zu der Stazione per la Carnia führt, beobachtet man zunächst den oben erwähnten Bellerophonkalk, der unterhalb von Arta durch einen O—W verlaufenden Längsbruch abgeschnitten ist; Muschelkalk und oberes Perm befinden sich hier in gleicher Höhenlage. Die von dem härteren Kalk gebildete Bergrippe tritt deutlich hervor. Bei Zuglia beobachtet man im Liegenden des Muschelkalkes die rothen Werfener Schichten. Südlich von Tolmezzo erscheint an einem zweiten Bruche massiger Triaskalk, wohl vom Alter des Schlerndolomites. Derselbe wird, wie es scheint, normal von dem wohlgeschichteten Dachsteinkalk des Monte Amarinna bei Stazione per la Carnia überlagert. Auch diese Kalkmassen werden von einer



Abbildung 78.

Nach einer photogr. Aufnahme von Prof. K. Maller gez. von O. Berner.

Der Monte Amariana bei Stazione per la Carnis (Provinz Udine).

Elbe im Scheitel gebrochene Antiklinale von Dachsteinkalk. Den Vordergrund des Bildes erfüllt ein gewaltiger Schuttkegel.

O—W streichenden Längsstörung durchsetzt, die als eine im Scheitel aufgebrochene Antiklinale zu deuten ist und somit keine bedeutendere Vertikalverschiebung verursacht hat (Abb. 78).

Die weissen Kalke der Carnia zerfallen in Folge der zahlreichen Klüfte überaus leicht; die Heftigkeit der Regengüsse und die Spärlichkeit des Baumwuchses erklären die gewaltigen Schuttmassen, die in trostloser Einförmigkeit die gesammte Breite des Tagliamento-Thales erfüllen.

Die Linie Pontafel-Chinsaforte entspricht nach DIENER¹⁾ einer Querverschiebung, doch macht dieselbe sich erst in der Gegend von Studena in ihren Anfängen bemerkbar; hier liegen inmitten der vorherrschenden Werfener Schichten zwei schmale, aus Schlerndolomit bestehende Grabenversenkungen, die rings von Quer- und Längshrtehen begrenzt sind. Nur der zwischen Aupa und Studena liegende Dolomit, welcher grossentheils von Werfener Schichten, im Westen auch von Bellerophonkalken umgeben wird, konnte genauer untersucht werden. Infolge der leichteren Zersetzbarkeit der älteren Trias ragt der tektonische Graben in orographischer Beziehung als „Horst“ hervor. Eine in vieler Hinsicht vergleichbare Stellung nimmt der zwischen Oberearbon und nnterer Trias eingebrochene Dolomit des Monte Salinchetto ein.

Der mit Alpweiden und Wäldern bedeckte Höhenzug des Monte Glazat und Monte Cullar besteht aus O—W streichenden, verquetschten Falten von Werfener Schichten und Bellerophonkalk, welche offenbar die Fortsetzung der Pontafeler Antiklinale bilden (Abb. 77). Die Stanchungen und Faltungen treten deutlich am Pradolina-Sattel hervor, wo ein Zug der Werfener Schichten zwischen Schlerndolomit und Bellerophonkalk ansteilt. Der letztere enthält am Monte Cullar unbestimmbare Reste von Zweischalern.

4. Die Julischen Alpen.

Der südöstliche Theil der Karnischen Hauptkette ist, wie im ersten Kapitel auseinandergesetzt wurde, als ein

¹⁾ Jahrbuch der k. k. geol. R. A. 1884, S. 70.

zwischen den Julischen Alpen und dem aufgewölbten paläozoischen Gebiet eingesunkener Längsgraben aufzufassen. Die südliche Verwerfung, der „Save-Bruch“ tritt im Fella-, Gailitz- und Savethal überall mit der grössten Deutlichkeit hervor: Im Norden liegt Schlerndolomit (hie und da von aufgepressten Fetzen der älteren Gesteine durchsetzt), im Süden erscheinen in gleicher Höhenlage die Werfener Schichten. Auch deren Liegendes, die Bellerophonkalke, sind im Schwefelgraben bei Lussnitz aufgeschlossen.

Nur bei Pontafel geht, wie bereits früher erwähnt, die Verwerfung in eine steile antiklinale Anfraltung über. Die Werfener Schichten (Abb. 77, im Vordergrunde) werden im Norden und Süden von Muschelkalk (Guttensteiner Facies) und Schlerndolomit überlagert.

Der Wall der Julischen Alpen besteht östlich von der dislocierten Region der Carnia aus einer vollkommen regelmässigen Schichtenfolge des Trias von den Werfener Schichten bis zum Dachsteinkalk. Die Gleichförmigkeit des geologischen Aufbaus prägt sich mit seltener Schärfe auch in den Formen der Landschaft aus. (Man vergleiche unten das Bild „Obertarvis von Nord“.)

Ueber einer bewaldeten, aus Werfener Schiefer und Muschelkalk bestehenden Vorstufe bauen sich die schroffen bis zu 2000 m. und mehr ansteigenden Berge des Schlerndolomites auf: Lipnitz, Brda, Zweispitz und Mittagskofel (2091 m.) bilden eine geschlossene Mauer, der sich jenseits des Seissera-Thales die wilden Jäger und weiterhin der Königsberg sowie die Fünfspitzen bei Raibl anschliessen. Das Längsthal von Dognä entspricht ungefähr der Einlagerung der weichen Raibler Schichten, die über die Raibler Scharte und den Torer Sattel weiter streichen. Weiter südlich erhebt sich als dritte Staffel die majestätische Mauer des Dachsteinkalkes mit ihren scheinbar unersteiglichen Wänden, ausgezeichnet durch die deutliche, fast nirgends fehlende Bankung. Der Monte Usez und Montasch (2752 m.), weiter südlich der Vischberg (2669 m.) und der Mangart (2678 m.) bilden diese höchste Erhebung des Gebirges (Abb. 79). Der Dachsteinkalk dehnt sich nach Süden als eine weite, an Höhe allmählig abnehmende Hochfläche aus.




Abbildung 7b.

Nach einer Photographie von A. Beer gen. von U. Berner.

Der Montasch von Luschari.

Flachgelagerter Dachsteinkalk der Jülicchen Alpen.

Die westlichen Julischen Alpen sind mir — abgesehen von einem Ausflug nach Raibl — nur durch die allerdings häufig genug genossene Aussicht bekannt, welche die Höhen der Karnischen Hauptkette gewähren. Herr Dr. AUG. v. BÖHM in Wien hat das Gebirge zwischen Raibl, Pontafel und Chiusaforte näher untersucht, die Ergebnisse seiner Aufnahmen jedoch nicht veröffentlicht. Derselbe bestätigte mir jedoch mündlich in freundlichster Weise, dass die Anschauung von dem überaus einfachen Aufbau der Julischen Alpen, welche sich aus der Betrachtung der Gebirgsformen ergibt, auch den thatsächlichen Verhältnissen entspricht.

Genauer sind wir über den östlichen Theil des Centralstockes der Julischen Alpen unterrichtet. Die älteren Arbeiten von FOETTERLE, STUR und besonders die klassische von SUSS verfasste Monographie der Umgegend von Raibl, berücksichtigen vor allem die Stratigraphie. In neuerer Zeit hat DIENER¹⁾ eine anziehend geschriebene Darstellung der östlichen Julischen Alpen veröffentlicht, in der besonders der tektonische Aufbau des Gebirges und die heteropen Verhältnisse der in die Korallenriffe eingreifenden Mergelzungen eingehend und sachgemäss geschildert werden. Eine ziemlich abfällige Kritik dieser Arbeit hat STUR 1887 in einem der bemerkenswerthen Jahresberichte der k. k. geologischen Reichsanstalt veröffentlicht.

Es sei ausdrücklich hervorgehoben, dass ich an den von mir besuchten streitigen Punkten der Umgegend von Raibl durchgängig die Ansicht DIENERS bestätigt fand. Es liegt somit keine Veranlassung vor, die Kritik STUR's zu berücksichtigen.

Der von DIENER untersuchte Gebirgstheil grenzt im Wesentlichen an das obere Savethal bzw. die Karawanken und bildet nur zum kleineren Theile die Vorlage der Karnischen Hauptkette. Die flach gelagerte mesozoische Tafel der Julischen Alpen wird von zwei Systemen kurzer, z. Th. intermittirender Verwerfungen zersplittert, die sich nahezu unter rechten Winkeln kreuzen. Meridional verlaufende Querbrüche spielen die hervorragendste Rolle und scheinen bereits

¹⁾ Jahrb. der k. k. geolog. Reichsanstalt 1884.

weit im Westen zu beginnen, wo der Durchbruch der Fella zwischen Pontafel und Chinsaforte einer Querversechiebung entspricht. Die Blattflächen im Erzberge bei Raibl, die Störung am Fallbach (Raibl) und die Grabensenkung des Lahnthales gehören dem gleichen System an. Während die ersteren echte Querversechiebungen darstellen, ist im Lahnthal ein Absinken des Oberflügels mit der horizontalen Dislocation verbunden. Dies Bestreben, den Ostflügel zu senken, tritt in den östlich folgenden Querbrüchen, der Flexur am Ausgange der Velika Pisechna bei Kronan und vor allem in der grossen Kermalinie (vergl. die tektonische Karte) noch viel ausgesprochener zu Tage. Die mesozoischen Tafeln brechen staffelförmig nach dem Laibacher Senkungsfeld zu hinab.

DIENER, dem wir im Vorangegangenen wesentlich gefolgt sind (l. c. S. 703, 704), führt die Quer- und Längsbrüche auf die adriatische Senkung zurück, während im Sinne der früheren Ausführungen die Längsstörungen durch die antiklinale Anfwölbung älterer Schichten zu erklären sind. Dagegen liegt selbstredend keine Veranlassung vor, an dem Zusammenhang der Querbrüche mit der Laibacher Senkung zu zweifeln.

Die NW streichenden Dislocationen, so den Mirnikbruch und die bedeutendere, am Bjelopolje zersplitterte Triglavlinie bezieht DIENER — ebenfalls mit Recht — auf die dinarischen Faltenbrüche. Der letzte Ausläufer derselben im Gebiete der Karnischen Hauptkette ist die nordwestlich streichende Mürschelkalkscholle von Uggowitz und der in gleicher Richtung fortsetzende Theil des Hochwipfelbruches.

In den dinarischen Ketten, in welchen die Faltung nach SW gerichtet ist, erscheint der Südflügel als der tiefer liegende Theil, eine Thatsache, die vor allem an der Isonzolinie bei Tolmein klar hervortritt. Am Triglav und Mirnik ist hingegen ebenso wie weiter westlich in der Fassa—Grödener Tafelmasse, an der Rosengartenflexur und an der Vilmösslinie der nördliche Flügel gesenkt. In den Karnischen Alpen erscheint an dem Hochwipfel- und Polliniggbruch der nördliche Theil emporgewölbt. Es dürfte schwer halten, diesen mehrfachen Wechsel in der Richtung der Absenkung einfach auf den adriatischen Einbruch zurückzuführen. Es liegt näher,

im Sinne der oben entwickelten Anschauung anzunehmen, dass das im Allgemeinen horizontal gelagerte Gebirge der Südalpen theils durch antiklinale Aufwölbungen älterer Schichten, theils durch die damit zusammenhängenden Emporzerrungen der Trias dislocirt worden ist. Der Einfluss der adriatischen Senkung würde sich somit auf die südlichsten Dislocationen, den Isonzobruclı und die Belluneser-Dislocationenlinie beschränken, welche letztere nach Ansicht der italienischen Geologen die Fortsetzung der ersteren bildet.

Petrographischer Anhang

von

Dr. L. Milch.

1.

Eruptivgesteine des Nötschgrabens (Untercarbon).

A. Südlicher Eruptivzug.

Sämmtliche Handstücke tragen den Charakter mässig veränderter Eruptivgesteine; eine undeutliche Schieferung nähert die Gesteine zwar den Amphiboliten, doch ist niemals der Habitus des massigen Gesteins vollkommen verwischt. Dem unbewaffneten Auge erscheinen sie dunkelgrün bis schwarzgrün mit weissen Flecken, die sich bisweilen unvollkommen parallel ordnen; man erkennt in dem dunklen Theile Hornblendespaltflächen, in dem hellen glanzlose, weisse bis schwachgrünliche Feldspathe.

Unter dem Mikroskop erweist sich das Gestein als fast ausschliesslich aus bläulich grüner Hornblende und Plagioklas zusammengesetzt.

Der Amphibol trägt den Charakter der gemeinen Hornblende: der Winkel $e:i$ ist nicht gross und der Pleochroismus

c = blaugrün

b = grün mit einem schwachen Stich in olivegrün

a = gelb.

Gewöhnlich tritt die Hornblende in grossen Parteeu auf, doch hat sie nur selten streng krystallographische Begrenzung, in der Regel erscheint sie unregelmässig, oft in langgezogenen

Petzen, die sich jedoch fast immer auf annähernd dicksäulenförmige Gestalt zurückführen lassen. Geru treten verschieden orientirte Hornblendeindividuen zu grösseren Flecken und Putzen zusammen. Kleinere abgerissene Theile finden sich allenthalben in dem Gestein vertheilt.

Der Feldspath ist Plagioklas mit oft gut erhaltener polysynthetischer Zwillingsbildung; wo er Begrenzung zeigt, erkennt man breite Leisten oder Tafeln, die in Verbindung mit den Zwillingsgrenzen auf eine ursprünglich nach M dicktafelförmige Ausbildung schliessen lassen. Gewöhnlich ist der Feldspath trübe, bei starker Vergrösserung erkennt man als Ursache sehr zahlreiche kleine Sericitblättchen, die sich hauptsächlich auf den Spaltrissen gebildet haben und von hier in das Innere vordringen.

Quarz findet sich in weit geringerer Menge; gewöhnlich sind mehrere Körnehen, die alle undulöse Anslöschung zeigen, zu einem Haufen aggregirt.

Titanit ist in einzelnen Körnern, Aggregaten und kleinen Krystallen sehr verbreitet.

Auffallend ist das Fehlen der Erze.

Geht man von diesem relativ am wenigsten umgewandelten Gestein zu den mehr geschieferten Varietäten, so verändert sich der mineralogische und structurelle Charakter im Princip nicht, nur die Merkmale der Metamorphose werden stärker.

Die grüne Hornblende wird zu langen Flatsehen, der Feldspath verliert die Leistenform, es bildet sich eine rohe Lagerstruktur heraus. In manchen Fällen umgeben Sericitzüge, durch Eisenhydroxyd gelb gefärbt, die einzelnen Quarzkörnehen und erfüllen die Spaltrisse der Hornblende, sehr häufig tritt ein biotitähnliches, unregelmässig gelbbraun und braungrün gestreiftes Glimmermineral ein, das gewöhnlich mit der grünen Hornblende innig zusammenhängt und augenseheinlich aus ihr hervorgegangen ist; bisweilen wurde auch Granat beobachtet.

Grosses Interesse bietet das Vorkommen von Quetschzonen in diesen Gesteinen. Sie bestehen aus den schon genannten Gemengtheilen, doch spielt hier Quarz unter den farblosen Gemengtheilen eine viel bedeutendere Rolle als in dem compacten Gestein. Hornblende tritt in kleinen Säulehen auf, wie überhaupt hier das Korn viel feiner ist; auch sind sie dynamometamorph weiter

entwickelt, als das Gestein, in dem sie auftreten. So tritt beispielsweise das braune Glimmermineral zuerst in Quetschzonen eines Gesteins auf, dem es sonst fremd ist, und findet sich auch dort, wo es in den Gesteinsverband eintritt, hauptsächlich in ihrer Nähe und ziemlich sparsam, während es in der Quetschzone selbst eine grosse Rolle spielt. Epidot wurde im Gesteinsverbande niemals, wohl aber in den Quetschzonen der stärker metamorphosirten Gesteine beobachtet.

Von diesen Quetschzonen völlig verschieden sind Spaltenausfüllungen von Sericit und Quarz; sie durchsetzen das Gestein und die Quetschzone in gleicher Weise, sind also jünger als die letzteren. Neben der durchsichtigen Mineralausfüllung unterscheiden sie sich auch dadurch, dass sie die Gemengtheile wohl verwerfen, aber nie zertrümmern, so dass die Zusammengehörigkeit der Krystalle auf beiden Seiten immer unverkennbar ist, während die an die Quetschzonen stossenden Gemengtheile natürlich in keinem Zusammenhange stehen oder je gestanden haben.

Mit den Gesteinen des südlichen Eruptivzuges im Nötschgraben zeigt ein Handstück vom Hörnsberg bei Bleiberg die grösste Aehnlichkeit, doch ist die Anordnung der Hornblende einerseits, des Feldspaths andererseits bei gänzlichem Verlust der Krystallformen zu ziemlich breiten Lagen viel vollkommener, als bei den beschriebenen Gesteinen. Erwähnenswerth ist der nicht unbeträchtliche Zoisitgehalt dieses Gesteins.

Jedenfalls liegen in allen diesen Gesteinen veränderte Eruptivgesteine vor. Die blaugrüne Hornblende stimmt, obwohl sie durchaus compact, niemals uralitisch ist, mit Umwandlungsbildungen in anderen metamorphen Gesteinen überein. Das Vorkommen des Feldspaths in erhaltenen Leisten und Tafeln sowie das Fehlen jeder Andeutung von porphyrischer Structur führt zu der Annahme, das ursprüngliche Gestein gehöre in die Reihe der holokrystallinen, diabasisch-körnig (ophitisch) struirt Diabase. In diesem Falle wäre die blaugrüne Hornblende aus Angit entstanden, aus dem sie sich fast immer zu bilden pflegt. Dann erklärt sich auch das Fehlen der Erze: es war ursprünglich Ilmenit vorhanden, der sehr oft unter der Einwirkung des Gebirgsdruckes sich in Titanit (Lenkoxen) umwandelt.

Einige chemische Bestimmungen führen auf die saureren Glieder der Diabasfamilie; die Analyse ergab:

SiO ₂	52,55 %
Al ₂ O ₃	18,86
Fe ₂ O ₃ *)	8,76
Ca O	6,83
Mg O	5,58
	<hr/>
	92,58

Auf die Trennung von Fe O und Fe₂ O₃, die Bestimmung der Alkalien und des Wassers wurde verzichtet, da diese Zahlen für die in Frage kommenden Gesteine nicht besonders charakteristisch sind.

B. Nördlicher Eruptivzug.

Während die der Untersnehung zugänglich gemachten Gesteine des Südzuges sämtlich als compacte Eruptivgesteine zu bezeichnen sind, trägt kein Handstück des nördlichen Zuges diesen Charakter. Das unbewaffnete Auge unterscheidet zwei Arten:

1. Breccienartige Conglomerate von dichten, grünen, runden bis eckigen Gesteinsstücken untermischt mit weissen Quarziten, durch nicht besonders reichliches, kalkiges Cement verkittet.

2. Dichte, grangrüne Gesteine mit muscheligen Bruch, von sehr zahlreichen Klüften durchsetzt.

Unter dem Mikroskop zeigt sich, dass eine strenge Grenze zwischen diesen Gesteinen nicht vorhanden ist.

Die breccienartigen Conglomerate bestehen aus sehr verschiedenen grossen Stücken, die im Handstück bis zu vier Centimeter im Durchmesser haben. Bei der geologischen Aufnahme wurden Blöcke von 1 m. Durchmesser beobachtet. Die Umgrenzung ist selten ganz rund, noch seltener aber scharfeckig; in der Regel ist eine polygonale Gestalt mit gerundeten Kanten und Ecken zu erkennen. Die grosse Mehrzahl dieser Stücke besteht aus der blaugrünen Hornblende, die schon bei den Gesteinen des Südzuges beschrieben wurde, und Plagioklas, der

*) Fe₂ O₃ + Fe O (als Fe₂ O₃ bestimmt).

in einigen Fällen durch Zoisit fast völlig vertreten wird. Titanit in Körnern ist auch hier verbreitet, zahlreiche Stücke führen auch Eisenerz, Epidot ist recht selten. Bei aller Verschiedenheit, die die einzelnen Stücke in der Grösse und dem Mengenverhältniss der Hauptgemengtheile zeigen, besitzen sie einen gemeinsamen Zug, eine sehr ausgeprägte lineare Anordnung der Gemengtheile. Diese lineare Anordnung ist in den einzelnen Stücken vollkommen unabhängig von ihrer Lage im Conglomerat: an der Grenze des einen hört sie auf und die Lagen des Nachbarstückchens bilden mit ihr beliebige Winkel. Ob diese lineare Anordnung eine primäre Fluidalerscheinung oder secundär durch Gebirgsdruck entstanden ist, ist schwer zu unterscheiden; im ersten Falle müsste man eine Abrollung der Lapilli und eine moleculare Umlagerung ohne Aenderung der Structur, oder Wassertransport von Bruchstücken fluidal struirtur Gesteine annehmen; im zweiten Falle hätte der Gebirgsdruck, wie der Wechsel in der Richtung der linearen Anordnung zeigt, jedenfalls vor Bildung des Conglomerats gewirkt, es wären schon geschieferte Stücke zu dieser Bildung verwendet worden. (Aus geologischen Gründen ist die letztere Annahme nicht eben wahrscheinlich; an dem untercarbonischen Alter der Breccien ist nicht zu zweifeln und die älteste in unserem Gebiete nachweisbare Phase der Gebirgsbildung gehört dem Obercarbon an. FR.) An der Bildung des Conglomerats betheiligen sich ferner Bruchstücke grosser blaugrüner Hornblendekristalle, marmorisirte Kalke, quarzitische Sandsteine, selten grössere einheitliche Quarzkörner sowie das ausschliesslich aus Carbonat bestehende, oft spärliche CEMENT.

Bei Abnahme des Kornes werden die erwähnten linear struirturten Bruchstücke seltener, es liegen nur wenig erkennbare Reste von ihnen in einer feinkörnigen allotriomorphen Masse von Bruchstücken der blaugrünen Hornblende, des Plagioklases, untermischt mit Quarz und Epidot.

Die dichten graugrünen Gesteine endlich, die die Hauptmasse des nördlichen Zuges bilden, bestehen ausschliesslich aus diesem allotriomorphen Gemenge der genannten Mineralien in einer Anordnung, die sich am Besten mit der gewisser Grauwacken vergleichen lässt. (Ein ganz ähnliches Gestein, das man beim ersten Anblick für eruptiv zu halten geneigt

war, tritt im Culm bei S. DANIELE unweit Paluzza auf; nach der von Herrn ROMBERG ausgeführten mikroskopischen Untersuchung erwies dasselbe sich ebenfalls als Grauwacke. FR.)

2.

Eruptivgesteine des Culm von der Südseite der Karnischen Alpen.

A. Spilitische Mandelsteine.

Die Hauptmasse der culmischen Eruptivgesteine gehört zur Gruppe der spilitischen Mandelsteine.

Makroskopisch erscheinen die vom Monte Dimon, den Ufern des Torrente Chiasso, Monte Paularo, Monte Pizzul stammenden Stücke sehr verschieden, doch zeigt das Mikroskop, dass sie alle, soweit es die Zersetzung noch erkennen lässt, dem Spilittypus angehören und auch innerhalb dieses Typus nur sehr geringe Variationen aufweisen.

Die Hauptunterschiede, die dem unbewaffneten Auge auffallen, beruhen in der Menge der erfüllten Mandelräume und der Färbung des eigentlichen Gesteins. Die Menge der Mandeln schwankt in den weitesten Grenzen: neben Gesteinen, die geradezu an Blattersteine erinnern, finden sich fast oder gänzlich mandelfreie. Ebenso stark wechselt die Farbe des Gesteins; es kommen schwarzgrüne, grünschwarze, graue, grüne, dunkelbraune und braunrothe Varietäten vor.

Unter dem Mikroskop treten alle diese Verschiedenheiten zurück und ein gemeinsamer Charakter kommt zur vollen Geltung: die Gesteine, wie sie auch gefärbt sein mögen, bestehen, unbekümmert um die Menge der Mandeln, wesentlich aus sehr langen schmalen Feldspathsäulehen, die geradezu triebische Formen annehmen. Intratellurische Einsprenglinge sind sehr selten, doch wurden einige Male grosse tafelförmige Plagioklase, theilweise durch Carbonat und Chlorit ersetzt, beobachtet. Grössere Chloritpartieen mit eigentümlich selbstständiger Begrenzung, die sich sehr vereinzelt finden, lassen sich vielleicht als umgewandelte intratellurische Angite deuten.

Die trichitischen Feldspathleichen liegen in einer aus Chlorit und Ilmenit, resp. Chlorit, Magnetit und Titanit bestehenden Grundmasse. In günstigen Fällen ist der Chlorit zwischen den Feldspathleichen in eckigen Ränmen eingeklemmt, nimmt also die Stelle des Angites ein; ist die Zersetzung weiter fortgeschritten, so schwimmen die Leichen in einem zusammenhängenden Chloritteig. Aggregation dieser Leichen zu Sphärokrystallen ist selten, wurde aber beobachtet; typisch dagegen und selbst in stark zersetzten Gesteinen noch sehr gut zu erkennen ist Fluidalstruktur; die Leichen umflossen die intratellurischen Einsprenglinge und die Mandelräume in höchst vollkommener Weise.

Für die Farbe der Grundmasse ist das Vorhandensein von Ilmenit resp. die Art seiner Umbildung maassgebend, je nachdem durch diese Gesteinscomponenten die Farbe des Chlorit für den Gesamteindruck nicht wesentlich verändert, stark modificirt oder gänzlich aufgehoben wird. Ist hauptsächlich Ilmenit mit seinem graubraunen Farbentönen entwickelt, so bleibt die Grundmasse grün oder wird grangrün; findet sich an Stelle des Ilmenit Titanit in kleinen Körnchen und spießiger Magnetit in sehr feiner Vertheilung, so wird die Grundmasse dunkel und ist schliesslich das Erz als Limonit vorhanden, so erscheint das Gestein braun bis roth. Ist sehr viel Limonit vorhanden, so wird in extremen Fällen die Grundmasse im Schliß undurchsichtig und man sieht dann die Feldspathleichen anscheinend in Eisenhydroxyd eingebettet.

Die Mandeln sind hauptsächlich von Carbonat erfüllt, bisweilen von einem Individuum, dessen Spaltrisse gewöhnlich gebogen sind oder schwach divergiren, oder von mehreren Individuen, die vom Rande nach der Mitte zu wachsen und scharf an einander absetzen. Bisweilen sind die Mandeln auch von chloritischen Substanzen erfüllt, seltener von amorpher Kieselsäure und Chalcodon. Auch gemischte Mandelausfüllungen kommen vor, bei denen Chlorit mit Carbonat und Kieselsäure zusammentritt und bald den Rand, bald das Centrum bildet. In einem an Eisenhydroxyd sehr reichen Spilit vom Monte Pizzal bei Paularo betheiligte sich auch Limonit mit Carbonat zusammen an der Ausfüllung der Mandeln.

Ein grosses Gerölle aus dem „Schalsteinconglomerat“

vom westlichen Kamme des Monte Dimon unterscheidet sich in keiner Weise von den eben beschriebenen Spiliten; an dem Aufbau eines feinkörnigeren hellrothvioletten „Schalsteineonglomerats“ vom Südabhang des Monte Dimon beteiligten sich ausser sehr eisenhydroxydreichen Spilitbruchstücken noch Quarz und sericitreichere und sericitärmere Sandsteine, die auch teilweise von Eisenhydroxyd durchtränkt sind.

B. Dynamometamorphe Gesteine der Diabasfamilie.

Nicht auf Spilite, sondern auf körnige Diabase oder Diabasporphyrite lassen sich zwei Gesteine aus der Umgebung von Paularo zurückführen.

Eines dieser Gesteine aus dem Uhu des Torrente Chiarso bei Paularo ist hellgrün, etwas schiefbrig und erhält durch grosse dünne gebogene Biotitblätter ein eigenthümliches Aussehen.

Unter dem Mikroskop fallen zunächst grosse Chloritflatschen auf, die mit analitiseher Hornblende in inniger Beziehung stehen. Bald liegt der Uralit in grösseren Säulen in dem Chlorit und umschliesst dann bisweilen Reste eines schwachgrünlichen bis farblosen Angits, bald ist die Chloritflatsche von einem Saum von analitiseher Hornblende umgeben, deren Längsaxe senkrecht auf der Chloritflatsche steht. Im Chlorit liegen ferner noch sehr zahlreiche Epidot- und Titanitkörnchen. Die wenigen Angitreste wie die ganze Ausbildung des beschriebenen Mineralaggregats beweisen, dass das ganze Gebilde aus Angit entstanden ist.

Diese grossen Chloritflatschen liegen in einer Grundmasse von Chlorit, Hornblendefasern, in einem feinen, farblosen Mosaik von angenseheinlich neugebildetem Feldspath und Quarz, sehr zahlreichen kleinen Epidotkörnchen, Titanitkörnchen und Calcit.

Alle diese Gemengtheile werden von grossen, sehr dünnen Biotitafeln von ungefähr 2—4 mm. Durchmesser regellos durchsetzt. Oft sind diese radial geordnet und, obwohl die jüngsten Gemengtheile, wie sie durch ihre Einschlüsse zeigen, doch mechanisch deformirt, geschleppt und treppenförmig verworfen.

Die Grösse der aus Augit gebildeten Chloritflatschen im Vergleich zu den übrigen Gemengtheilen legt die Vermuthung nahe, ursprünglich sei das Gestein ein Augitporphyrit mit grossen Einsprenglingen gewesen; dass bei einer Umbildung die gebirgsbildenden Kräfte mitgewirkt haben, beweist die annähernd lagenförmige Structur der Grundmasse, bedingt durch Wechsel chloritreicher und quarz-albitreicher Zonen.

Sehr ähnlich ist ein grünes schiefriges Gestein von Paularo aus dem Cnlm nahe an der Grenze gegen den Grödenauer Sandstein. In den Chloritflatschen mit Uralit fehlen die geringen Angitreste, sonst gleichen sie vollkommen den vom Torrente Chiarso beschriebenen Mineralbildungen, dagegen finden sich hier noch Reste breiter Plagioklastafeln, die bisweilen trotz starker Umwandlung in Carbonat und Chlorit Zwillingbildung erkennen lassen. Imenit ist in grösseren Flecken vorhanden, oft schon sehr stark in Titanit umgewandelt, ferner treten als Neubildungen kleine Pntzen eines olivengrünen, stark pleochroitischen Glimmers auf. Die Grundmasse des Gesteins gleicht der des Schiefers vom Torrente Chiarso.

Anhang. In dieselbe Gruppe umgewandelter Diabase gehört ein Gestein aus dem gefalteten Oberearbon der Stangalp (Steiermark) zwischen Turraacher Höhe und Reichenau. Das Gestein ist dunkelgrün und lässt im Handstück dunkle Glimmerblätter erkennen. Unter dem Mikroskop erweist sich das Gestein als ein nicht übermässig veränderter Diabas. Hellrosa bis lederfarbener Augit liegt in grossen, oft lang säulenförmigen Krystallen in Feldspath (Plagioklas) und scheint manchmal die Form des Feldspaths zu bedingen, manchmal sich in seiner Begrenzung nach ihm zu richten. Mit Sicherheit lassen sich diese Verhältnisse nicht entscheiden, da gewöhnlich die Ränder des Augit in Hornblendebürsten verwandelt sind oder noch häufiger der Augit in Chlorit übergeht, während auch der Feldspath sich zersetzt. Die Hauptmasse des Gesteins besteht aus Chlorit und Augit; feldspathreichere Theile, wie die oben beschriebenen, finden sich nur selten. Imenit ist in grossen Tafeln vorhanden und allenthalben theilweise in Titanit verwandelt. Biotit findet sich in dicken, gewöhnlich etwas gebogenen Tafeln; er ist stark pleochroitisch in hellgelben und tiefdunkelbraunen Tönen, die stets ein eigenthümliches Roth enthalten. Quarz wurde in

einzelnen Körnchen nachgewiesen, ferner findet sich ein farbloses, schwach licht- und doppeltbrechendes optisch zweiaxiges Mineral, das vielleicht neugebildeter Feldspath ist, dessen Bestimmung aber nicht gelang.

C. Porphyritische Gesteine.

Von vier Localitäten wurden im Culm auftretende Porphyrite untersucht: 1. fünf Minnten südlich vom Cerevesa Joeh nahe der Schiefergrenze, 2. zwischen Cerevesa Joeh und Fontana fredda, 3. aus dem Culmconglomerat des Monte Paularo, 4. von Costa Robbia. Die drei erstgenannten zeigen dem unbewaffneten Auge grosse Feldspatheinsprenglinge von mattweisser bis hellgrauer Farbe, in dem Gestein von Costa Robbia entziehen sie sich durch ihre trübe Farbe der Wahrnehmung fast gänzlich. Die Farbe der Grundmasse ist sehr verschieden, grün beim Gestein vom Cerevesa Joeh grauschwarz bei dem Porphyrit von Fontana fredda, rothviolett bei der Varietät vom Monte Paularo und schmutziggelblich bei Costa Robbia.

Die Porphyrite scheinen auf den westlichen Eruptivzug beschränkt zu sein.

Unter dem Mikroskop erweisen sich die Feldspatheinsprenglinge als Plagioklase. Die Krystalle sind gross, sehr gut begrenzt, haben deutlich ausgeprägten zonaren Bau und oft gut erhaltene Zwillingstreifung. Bisweilen sind mehrere Einsprenglinge mit einander verwachsen. Infolge des zonaren Bans findet man oft an einem Krystall nach Art und Grad verschiedene Umwandlungen der einzelnen Theile. Frische Zonen wechseln mit epidotisirten, sericitisirten, in Chlorit und Kalkspath umgewandelten. Gern sind, wie besonders schön im Gestein von Costa Robbia, grössere randlich oft gerundete Complexe von Einsprenglingen (bis 6 Individuen wurden zusammenstehend beobachtet) von einem gemeinsamen Saume frischen Feldspaths umgeben, der in seinen einzelnen Theilen streng nach dem Individuum, an das er sich anlegt, orientirt ist.

An Menge tritt unter den Einsprenglingen hinter dem Feldspath der Quarz zurück, doch ist er keineswegs selten. Er findet sich in grossen, corrodirtten Körnern mit allen Eigenschaften des Porphyritquarzes.

Einsprenglinge farbiger Mineralien wurden direct nicht beobachtet, doch treten z. B. in Gestein vom Cerevesa Joeh geradlinig begrenzte Chloritflecken, im Gestein von Costa Robbia Anhäufungen von Erzen, zwischen denen sich neugebildete Serieitnadeln, Quarzkörnchen etc. angesiedelt haben, auf, die sich nur auf Einsprenglinge farbiger Mineralien zurückführen lassen. So weit man es beurtheilen kann, scheint die Form dieser Gebilde mehr für Hornblende oder Angit, als für Biotit zu sprechen.

Die Grundmasse zeigt bei den Gesteinen vom Cerevesa Joeh und von Paularo sehr zahlreiche, lange Feldspathleistehen, die die Gesteine den andesitischen Typen der Porphyrite nähern. Ob thatsächlich Glas vorhanden war, ist nicht mehr zu erkennen; bei dem Gestein vom Cerevesa Joeh schwimmen die Leistehen in einem aus Chlorit und Carbonat mit Serieit bestehenden Teig, bei dem Gestein vom Paularo sind die Leistehen durch ein aus Erz mit Serieitfäserchen bestehendes Caement verkittet, das durch seinen angeprägt zersetzten Charakter gar keinen Rückschluss auf die ursprüngliche Natur erlaubt. Bei den anderen Gesteinen besteht die Grundmasse aus einem feinschnuppigen resp. feinkörnigen Gemenge von Chlorit, Serieit, etwas Erz und Quarz-Feldspath (?) mosaik, doch zeigen einige Feldspathleistehen zweiter Generation, dass ein principieller Unterschied zwischen diesen und den erst beschriebenen Grundmassen nicht bestand. Beim Gestein von Fontana fredda verdient noch ein smaragdgrünes, stark doppeltbrechendes feinfaseriges Glimmermineral, das in der Grundmasse vorkommt und auch in die Feldspatheinsprenglinge einwandert, Erwähnung.

Nach dem Gesagten sind die Gesteine quarzföhrnde, feldspathreiche Porphyrite; eine nähere Bestimmung ist wegen des zersetzten Zustandes der Gesteine nicht möglich.

Sedimentgesteine des Culm.

Von mehreren Localitäten untersuchte Sedimentgesteine bieten wenig Bemerkenswerthes. Dunkelschwarze „Grauwacken“ von Mieli bei Rigolato und von dem oberen westlichen Abhange des Monte Paularo, graugrüne Gesteine vom Fusse dieses Berges, schmutzig braunrothe Sedimente von Costa Robbia bestehen

sämtlich aus unregelmässig gestalteten und verschieden grossen Körnern von Quarz, gestreiftem und ungestreiftem Feldspath, die durch ein grösstenteils sericitisches Caement verbunden sind. Hierzu kommen bei den dunklen Granwaeken gern Biotitblättchen, deren Menge man aber makroskopisch wohl überschätzt, bei den brannen Varietäten Eisenhydroxyd etc. So auffallend aber makroskopisch die Aehnlichkeit einiger eulmischer Eruptivgesteine mit Sedimenten derselben Gegend ist — so ähneln die grünen Sedimente vom Monte Paularo sehr gewissen Spiliten und roh geschieferten Diabasen derselben Gegend, ebenso das Sediment von Costa Robbia dem brannen Porphyrit von derselben Localität — war mikroskopisch kein Uebergang zwischen Eruptiv- und Sedimentgesteinen des Culm zu finden.

3.

Gesteine von Forst zwischen Reissach und Kirchbach im Gailthal.

A. Quarzphyllit.

Sämtlichen untersuchten Stücken des Quarzphyllits aus dem Gailthal ist der Wechsel von linsenartigen dicken Quarz- zonen und Quarzkauern mit silberglänzenden dünnen glimmerreichen Lagen, zwischen die sich wieder concordant quarzreiche dünne Lagen einschieben, gemeinsam. Sie tragen Spuren sehr starker Pressung an sich, die dicken Quarzlinsen sind dabei einfach umgebogen, die Glimmerlagen und dünnen Quarzonen in zahllose Fältchen zerknittert, während sie im Allgemeinen die Hauptfaltung der Quarzlinse zeigen. Demgemäss findet sich auf den Flanken der Falten eine feine Kniekung und Riefnng.

Im Schlifff bestehen die Quarzonen fast nur aus Quarzkörnchen mit vereinzelt Chloritblättchen, die Glimmerzonen aus farblosem Glimmer und Chloritblättchen, die sich zu un- gemein fein gefältelten Strängen ordnen. Oft sind die Falten verworfen und an den Verwerfungen geschleppt, an den letz- teren finden sich dann viel kleine Magnetitkörnchen, die anch sonst dem Gestein nicht fremd sind. Quarzkörnchen sind

untergeordnet auch in diesen Zonen vorhanden. Unabhängig von der Faltung, also durch die gebirgsbildenden Prozesse entstanden, sind ziemlich grosse Biotite mit Pleochroismus zwischen rothbraun und hellgelb.

In einem anderen Schriff tritt zu den genannten Mineralien noch Turmalin in kleinen wohl begrenzten Säulehen mit starkem Pleochroismus zwischen blaugrün resp. grüngrün und farblos sowie Granat in zahlreichen, grösseren Krystallen und runden Körnchen. Er ist immer sehr hell, farblos bis hellrosa und hellgelb und gern in grössere Chloritblätter eingebettet.

Noch stärker metamorph erscheint ein Phyllit, dessen Silberglanz einen grünlichen Ton hat und an dem schon das unbewaffnete Auge grosse Magnetitkrystalle erkennt. Mikroskopisch sieht man, dass zwischen Zonen von der eben beschriebenen Beschaffenheit sich andere einschoben, die hauptsächlich aus Granaten und grossen Magnetiten bestehen. Letztere sind gern von Chlorit umgeben; verkittet werden die genannten Mineralien durch viel Sericit, kleine Magnetitkörnchen und Chlorit. Die grossen Magnetitkrystalle umschliessen Granatkörnchen, erweisen sich also als jünger.

B. Ganggestein im Phyllit von Forst zwischen Reissach und Kirchbach.

In dem eben beschriebenen Phyllit tritt ein massiges, körnig ausscheidendes graues Eruptivgestein auf, das dem unbewaffneten Auge weisse glanzlose Feldspathtupfen und glänzende dunkle Spaltflächen der Hornblende zeigt.

Unter dem Mikroskop weist das Gestein folgende Gemengtheile auf:

1) Plagioklas in Durchschnitten, die auf mässig dicke Tafeln schliessen lassen. Er ist ein ziemlich basischer Kalk-Natronfeldspath mit auffallend scharf ausgeprägtem zonarem Bau. Die inneren Theile sind sehr oft in ungewöhnlich grobkörnigen Saussurit umgewandelt und dabei scharf gegen die äusseren Zonen begrenzt, während die äusserste Zone keine kristallographische Begrenzung zeigt, sondern in die Gesteinsmasse in unregelmässigen Formen zerfliesst. Hat Resorption der Kerne stattgefunden, so heilen die äusseren Zonen die Lücke nicht aus, sondern schmiegen sich eng an die Gestalt des Restes an.

2) Hornblende in grossen kristallographisch begrenzten Individuen. Sie ist braun mit einem Stich in das Olivengrüne. $c : c$ wurde bis zu 20° gemessen, der Pleochroismus ist stark:

- a hellstrohgelb
- b branngrün
- c grünbrann.

In dieser braunen Hornblende liegt in grossen Buchten oder auch grosse, innere Räume anfüllend, ganz hellgrüne, faserige Hornblende, die von Titanit- und Erzkörnchen erfüllt ist und mit der braunen gleichzeitig auslöset. Diese Hornblende ist jedenfalls secundär gebildet, ob aber an primären, mit der braunen Hornblende verwachsenen Augitkernen, oder aus der braunen Hornblende vielleicht durch Austritt von Titan und Eisen entstanden, ist nicht in allen Fällen mit Sicherheit zu entscheiden; für eine Entstehung aus brauner Hornblende spricht jedoch das Vorkommen von dieser hellgrünen Hornblende mit wenigen, unregelmässig begrenzten Resten von brauner Hornblende.

Nicht zu verwechseln ist diese faserige Hornblende mit einer anderen hellgrünen, die als Saum die braune Hornblende umgibt. Ihre Auslösehungsrichtung weicht etwas von der der braunen Hornblende ab; die Grenze der letzteren gegen den Saum ist fast immer streng kristallographisch, während der Saum sich nach aussen unregelmässig anfranzt und auszackt. Die Gestalt dieser Zacken ist durch die Form der äussersten Feldspathzone bedingt, die in ihren Ausläufern wieder durch die Hornblendefasern beeinflusst ist.

Wo mehrere Individuen der braunen Hornblende mit zeretzten Buchten und Kernen zusammenliegen, wird der ganze Complex von einem gemeinsamen Saume der grünen Hornblende umgeben; die einzelnen Teile des Saums sind dann streng nach dem Individuum der braunen Hornblende, an das sie angewachsen sind, orientirt.

3) Ilmeut ist in Tafeln mit prachtvollen Leukoxenrändern in grosser Menge vorhanden.

Nicht sehr verbreitete intersertale Ränne sind von Quarz, bisweilen in grösseren Körnern, seltener von Feldspathmosaik erfüllt; in ihnen liegen Spuren einer zweiten Generation von Hornblende, die mit der saumbildenden vollkommen übereinstimmt.

Von secundären Bildungen ist neben der bereits beschriebenen faserigen Hornblende besonders der Saussurit erwähnenswerth. Er besteht aus viel Epidot und Zoisit in grösseren Krystallen und Körnern, hellgrünen, conventionell Sericit genannten Glimmerblättchen, wenig Hornblendesäulchen und sehr untergeordnet Granat. Chlorit, auch in den intersertalen Rännen verbreitet, findet sich in der Nähe der verschiedensten Gesteinscomponenten, auch Carbonat ist vorhanden.

Die Structur muss als panidiomorph mit Annäherung an eine porphyrische und Intersertalstructur bezeichnet werden. Die Hauptmasse des Gesteins besteht aus Gemengtheilen der ersten Generation und ihren Umwandlungsproducten, dem zonarstrühten Plagioklas mit Saussurit, der brannen Hornblende mit der faserigen, fast farblosen, dem Ilmenit mit Leukoxen. Der zweiten Generation gehören an: die angefaserten äussersten Zonen des Plagioklases, die saumbildende grüne Hornblende und die Ausfüllung der intersertalen Ränne.

Mineralbestand und Structur stellt demnach das Gestein in die Gruppe der dioritischen Ganggesteine, die in den Ostalpen weit verbreitet sind.

In dieselbe Gruppe gehört ein Ganggestein von der Wodner Hütte (Wolayer Thal), das dem Silurschiefer eingelagert ist. Es unterscheidet sich von dem Reissacher Gestein nur dadurch, dass die branne Hornblende noch Angitkerne umschliesst und dass die Andeutungen einer zweiten Generation von Hornblende auf ein Minimum beschränkt sind.

B.
Beschreibung der Schichtenreihe.

VII. KAPITEL.
Der Quarzphyllit.

1. Petrographische Merkmale und geologisches Alter.

Der Quarzphyllit (oder Thonglimmerschiefer) bildet das älteste Glied der palaeozoischen Schichtenreihe im Gailthal und zweigt sich bei Sillian unmittelbar von der „Schieferhülle“ der Tauern ab. Entsprechend dem einseitigen Anfbau der altpalaeozoischen Hauptkette zieht der Phyllit im Norden als regelmässiges $2\frac{1}{2}$ —4 km breites Band von Sillian bis Nötsch und wird im Süden von den silurischen Mauthener Schichten concordant überlagert. Nur im Westen tritt unser Gestein auch auf dem Südabhang der Hauptkette auf, so dass dieselbe hier für eine kurze Strecke als regelmässige Synklinale ausgebildet ist.

Die makroskopische Betrachtung lehrt, dass das Gestein aus Quarzlin sen und Quarzfasern (oft von bedeutender Grösse) besteht, welche mit dünnen, glimmerreichen Lagen wechseln. Die Farbe ist im frischen Zustande meist dunkel und schimmert ins Bläuliche oder Grünliche. Die starke Zusammenpressung und Fältelung des Gesteins tritt besonders in der Vertheilung der Quarzlagen deutlich hervor.

Die von Herrn Dr. MÜLCH ausgeführte mikroskopische Untersuchung (vergl. den vorstehenden Abschnitt) stimmt auf das beste mit diesem Befunde überein; die Glimmerzonen bestehen hiernach aus farblosem Glimmer und Chloritblättchen sowie aus ziemlich grossen pleochroitischen Biotiten.


An accessorischen Mineralien werden oben (l. c.) Granat, Turmalin und Magnetit erwahnt. Von diesen ist der Granat von besonderer Wichtigkeit, da er stellenweise auch als wesentlicher Gemengtheil auftritt; echte Granatphyllite (bezw. Granatglimmerschiefer) finden sich u. a. bei Maria Luggan, St. Lorenzen, St. Jacob und Kotischach in erheblicher Ausdehnung.

Von weiteren Abanderungen sind Einlagerungen quarzitischer (sudlich von Hermagor) und graphitischer Banke (schwarze, feingeschichtete Schiefer im Egger Forst) hervorzuheben. Endlich ist der Umstand von Wichtigkeit, dass die Thonglimmerschiefer gelegentlich in echten Glimmerschiefer ubergehen (Gegend von Tiliach und Maria Luggan, Nordgehange oberhalb von Dellach im Gailthal). Audererseits finden sich glimmerarme Gesteine, die den Uebergang zum Thonschiefer bezeichnen (Kreuzberg bei Sexten, Comelico).

Kalkphyllitbanke sind hingegen ausserordentlich selten und nur bei Reissach (vergl. unten) aus den hangendsten Partien des Phyllites bekannt.

Da das Liegende des Phyllites unbekannt ist, so erscheint fur die Altersbestimmung die genaue Untersuehung der im Hangenden folgenden Gesteine von besonderer Bedeutung: Ueberall im ganzen Gail- und Lessachthal folgen sudlich von dem steil aufgerichteten Phyllit mit gleichem Strecken und Fallen die Thonschiefer und Kalke der Mauthener Schichten. Eine concordante Ueberlagerung der einen durch die anderen ist um so wahrscheinlicher, als sudlich von den Mauthener Schichten Obersilur und Devon lagern. Trotzdem ist mir nur eine Stelle bekannt geworden, wo der Uebergang von Quarzphyllit zum Schiefer mit unzweifelhafter Deutlichkeit zu beobachten ist. Meist hat sich gerade langens der Trennungsflache die Furehe des heutigen Thaales eingeschnitten, und auf der kurzen Strecke im unteren Lessachthal, wo die Grenze auf dem sudlichen Gehange verlauft, bedeckt der Gehangesehnt die Aufschlusse. Nur an dem Wege, der sudlich von Liesing den tiefen Einschnitt des Gailflusses verquert und uber den Obergailberg (1435 m) zum Frohnthal hinubersfuhrt, beobachtet man den allmaligen Uebergang vom Quarzphyllit zum Schiefer. Es schieben sich dreimal

Gailfluss. Obergail.



Profil des Obergailberges.

Zeigt den allmählichen Übergang vom Quarzphyllit zu dem Thonschiefer der Mauthener Schichten.
(In dem Grünschiefer ist die Neigung etwas weniger steil als auf der Zeichnung angegeben wurde).

Lagen von typischem Thonschiefer in die Quarzphyllite ein, welche letztere in den hangendsten Bänken zum Theil glimmerschieferähnlich werden. Dann beginnt die Herrschaft des normalen bläulichen Thonschiefers, dem unten einige dünne Bänke von Grünschiefer (3—10 m an den verschiedenen Punkten mächtig) eingelagert sind. (Vgl. das nebenstehende Profil.)

Weiter oben stellt sich an Stelle des etwa zu gleichen Theilen aus Quarz und Schiefermaterial bestehenden Thonschiefers Quarzitschiefer ein; derselbe setzt den Kamm zusammen, dessen einer Kopf als Gamskofel (Δ 2114 m) bezeichnet wird (vergl. Profil VII, S. 111; der Quarzitschiefer ist dort durch ein Versen als Thonschiefer bezeichnet); auch eine Lage von Thonschiefer mit grossen Quarzfasern findet sich beim Anstieg. Das Streichen (welches häufig abgelesen wurde), ist durchweg NW (bei WNW)—SO. Die Quarzphyllite und Thonschiefer stehen im Allgemeinen saiger oder sind sehr steil nach SW geneigt; nur in der Mitte des Profils findet sich local ein flacheres Einfallen nach derselben Richtung, das bei den Grünschieferbänken 45° beträgt.

Herr ROMBERG hat die Freundlichkeit gehabt, diesen Grünschiefer und den Quarzitschiefer des Gamskofels mikroskopisch zu untersuchen. Die Schichtung des Grünschiefers ist auch im Dünnschliff deutlich; die grünlichen, welligen Schichtbegrenzungen weichen den grösseren Krystallen (Magnetit) aus. Die Hauptbestandtheile sind Chlorit und Quarz; ausserdem finden sich Magnetit, Epidot und Plagioklas.

Der Quarzitschiefer (Obergailthal, 760 Schritte westlich vom Roraacher) besteht im wesentlichen aus Quarz. Chlorit ist weniger häufig; ausserdem finden sich Plagioklas und Rutilnadelchen.

An anderen Stellen (bei Mellaach unweit Hermagor, Mauthen, Dorferthal bei Ober-Tilliaach, Obstoanser-See) wird die Grenze von Quarzphyllit und Mauthener Schiefer durch einen Thonschiefer mit grossen Quarzfasern gekennzeichnet. Das letztere Merkmal erinnert an den Quarzphyllit; hingegen fehlen die deutlichen dieses Gestein kennzeichnenden Glimmerblätter (nur am Obstoanser-See treten auch diese zuweilen auf); jedenfalls haben wir es mit einer wahren Uebergangsbildung zu thun. Westlich vom Obstoanser-See, im Winkler, Holl

brueker und im Sägebachthal kennzeichnet — wie bei Obergail — eine mächtige Einlagerung von grünen Chlorit-schiefern den tiefsten Theil der Mauthener Schiefer.

Für die Altersdentung der Quarzphyllite ist der Umstand allein massgebend, dass dieselben das normale Liegende der Mauthener Schichten bilden. Die letzteren entsprechen ungefähr dem gesammten Untersilur (vgl. unten). Ein Hinabreichen bis in das Cambrium ist angesichts ihrer grossen Mächtigkeit nicht auszuschliessen und wahrscheinlicher als die theilweise Zurechnung des Quarzphyllites zum Untersilur; jedenfalls ist also für das letztgenannte Gestein eine nicht näher zu begrenzende Stellung im Cambrium die naheliegendste Annahme. Für ein präcambrisches Alter sprechen keinerlei Gründe.

2. Das dioritische Ganggestein von Reissach und die geologische Verthellung der Karnischen Eruptivgesteine.


Porphyrische oder körnige Ganggesteine sind, wie eine neuerliche Zusammenstellung von TELLER¹ zeigt, in den Phylliten der Ostalpen weit verbreitet; die Auffindung von einigen derartigen Punkten in den Karnischen Alpen ist somit an sich nicht auffallend, wohl aber deshalb wichtig, weil hier das geologische Alter dieser Eruptionen wenigstens mit annähernder Sicherheit zu bestimmen ist.

Das am besten bekannte Gestein kommt am Südhang der nördlichen Gailthaler Berge bei dem Gehöfte Forst oberhalb von Reissach vor; die Schichtenfolge ist aus nebenstehendem Profil zu ersehen. Die Aufschlüsse in den kleinen Bachrissen sind stellenweise nicht schlecht; jedoch bedeckt leider dichter Waldwuchs die Grenzfläche des Eruptivgesteins gegen den Phyllit, so dass über etwaige Contacterscheinungen nichts in Erfahrung zu bringen war. Allerdings stösst in dem ersten Graben östlich von Forst das Eruptivgestein scharf an dem Phyllit ab; doch scheint hier eine Verwerfung vorzuliegen; wenigstens würde keine Spur von Umwandlung beobachtet. Der Gang — denn ein solcher liegt wohl sicher vor — dürfte

1) Ueber porphyritische Eruptivgesteine aus den Tiroler Centralalpen. Jahrbuch der k. k. Geologischen Reichsanstalt 1883. S. 715.

wenig über 100 m mächtig sein und hält auch im Streichen nur für einige Hundert Meter an.

Die genauere Beschreibung des im S des Profils auftretenden eigentümlichen Sericitphyllites (mit Chlorit und grossen Magnetitoetadern, welche Granatkörner umschliessen) ist im petrographischen Auhang von Herrn Dr. MILCH gegeben. Es ist das einzige derartige Gestein, welches ich im nördlichen Gailthaler Gebirge gefunden habe.



Das Profil von Forst zwischen Reissach und Kirchbach.

Der Kalkphyllit, dessen Wechsellagerung mit Quarzphyllit deutlich beobachtet werden konnte, ist schwarz und weiss gefärbt. Die deutlich ausgeprägte Klüftung des Diorits verläuft ungefähr parallel zur Schichtung des Phyllites.

Einem offenbar übereinstimmenden Typus von Ganggesteinen gehören zwei räumlich begrenzte Vorkommen an, welche den Mauthener Schiefern der Hauptkette eingeschaltet sind. Das an der Wodner Hütte im Wolayer Thal vorkommende Gestein unterscheidet sich von dem Reissacher dadurch, dass die branne Hornblende noch Augitkerne umschliesst. Da auch (vergl. den petrogr. Theil) die Struktur unserer Diorite Annäherung an die porphyrische zeigt, ist ein Vergleich mit den

dunkelen, augitreichen und quarzarmen Porphyriten von Vintl und Mühlbach¹⁾ (Pusterthal) nicht fernliegend.

Das dritte oben (S. 11) beschriebene Vorkommen gehört den östlichen Karawanken an, wo am Goritschacher Bache inmitte des Alluviums ein grosskörniges Eruptivgestein vorkommt, dessen nähere Untersuchung durch ungünstige Umstände verhindert wurde. Doch kann man angesichts der körnigen Structur und des Vorkommens grosser dunkelgrüner und weisser Krystalle nur darüber im Zweifel sein, ob es sich um einen Diorit oder einen Diabas handelt.

Auf Grund eines reichen Untersuchungsmaterials hat TELLER festgestellt, das schmale, meist wenige Meter mächtige Gänge porphyritischer Eruptivgesteine in den verschiedensten Theilen der Ostalpen vorkommen (Adamello-Gebiet, Brixener Granitwall, Antholzer Gruppe und Pusterthal). „Bald sind es massige, bald geschichtete Gesteine, in welchen diese Porphyrite zu Tage treten; sie durchsetzen sowohl die granitische Kernmassen, wie ihre Gneissglimmerschieferumhüllung; sie durchbrechen die Gesteine der jüngeren Phyllitzone des Pusterthales und in der südlichen und westlichen Umraudung des Adamello reichen derartige Intrusionen sogar noch in permische und triadische Schichtene Komplexe hinauf.“ „Angesichts der oft überraschenden Gleichartigkeit der Gesteinsentwicklung an räumlich weit auseinanderliegenden Beobachtungspunkten und der Uebereinstimmung, welche in Bezug auf Lagerungsform und Mächtigkeitsverhältnisse der Vorkommnisse besteht.“ liegt es nach TELLER zwar nahe, alle diese Gesteine als Ergebniss einer Eruptionsepoche aufzufassen; „begründen lasse sich eine solche Auffassung aber vorläufig noch nicht.“

Die Eruptivgesteine, welche in verschiedenen Horizonten der Karnischen Alpen vorkommen, lassen die soeben angeführte Ansicht TELLERS wenigstens für den östlichen Theil der Ostalpen als nicht zutreffend erscheinen. Unsere Dioritgänge können als unmittelbare Fortsetzung der im Thonglimmerschiefergebiete des Pusterthales (TELLER l. c. p. 743—746) bei Bruneck und Mühlbach vorkommenden Porphyrite angesehen werden und sind auf das älteste Paläozoikum (? Cambrium und Uter-

¹⁾ Teller l. c. S. 717.

silar) beschränkt. Wie die tabellarische Uebersicht der Formationen (S. 4) zeigt, sind das Obersilar und das gesammte Devon frei von Eruptivgesteinen. In den obersilurischen Schiefen hätte ein dunkles Eruptivgestein vielleicht unbemerkt bleiben können, aber für die weissen Devonkalke, auf deren Unterscheidung besonders viel Zeit verwendet worden ist, muss ein solches Uebersehen als höchst unwahrscheinlich bezeichnet werden.

Die eruptive Thätigkeit erreichte also mit dem Untersilar ihr Ende; für diese Annahme spricht auch die Verbreitung grüner, tuffartiger, z. Th. Angit führender Schiefer in den Mauthener Schichten.

In das Unterearbon fällt dann der Erguss ausgedehnter deckenartig ausgebreiteter Massen von Diabas und spilitischem Mandelstein; das Oberearbon ist frei von Eruptivgesteinen, während weiter oben in den permischen Grödenen Schichten die Ansläufer der Bozener Porphyrgänge auftreten.

Bellerophonkalk, Werfener Schichten und unterer Muschelkalk kennzeichnen wieder eine Unterbrechung der vulkanischen Thätigkeit; an der oberen Grenze des Muschelkalkes liegen die Einschaltungen des Raibler Quarzporphyrs.

Die Annahme, dass die Ansbrüche eruptiver Gesteine in vier verschiedenen, durch Zwischenräume unterbrochenen Perioden stattfanden, wird vor allem durch das überall beobachtete Zusammenkommen von Tuffen und Eruptivmassen erwiesen; nur im Quarzphyllit und im Untersilar finden sich reine Ganggesteine.

Bemerkenswerth ist ferner der Umstand, dass die Diorite, Diabase und Porphyrite des Untersilar und Unterearbon einerseits, die Quarzporphyre des Perm und der Trias andererseits nahe Beziehungen zu einander erkennen lassen und somit wohl demselben Bildungsbeerde entstammen. Der bedeutungsvollste Wendepunkt für die Tektonik wie für die petrographische Beschaffenheit der Eruptivgesteine des Karnischen Gebietes fällt in die Mitte des Carbon.

3. Ueber die Verbreitung des Quarzphyllites in den Ostalpen und sein Verhältniss zu anderen krystallinen Gesteinen.

Da organische Reste im Quarzphyllit bisher weder gefunden sind noch auch voraussichtlich gefunden werden dürften, so ist man für die Beurteilung der Altersstellung lediglich auf die stratigraphischen Beobachtungen angewiesen. Der Quarzphyllit gehört zu der Gruppe der in der sogenannten Schieferhülle vertretenen halb- oder ganzkrystallinen Gesteine, welche die älteren Gneisse und Glimmerschiefer der Centralalpen hülfen-förmig umgeben. Für die Deutung dieser Gebilde sind die vor langer Zeit von ROLLE und STIEB (Geologie der Steiermark S. 66) im Bachergebirge gemachten Beobachtungen bedeutungsvoll, nach denen die Gesteine der Schieferhülle discordant den älteren krystallinen Gesteinen auflagern. In dem vorliegenden Falle liegt im Bachergebirge am Ufer der Drau das jüngste Glied der Schieferhülle, der Thonglimmerschiefer (Quarzphyllit) unmittelbar auf Gneiss und Granit.

STACHE hat das weitere Verdienst, den Gesteinen der Schieferhülle ihren Platz in der palaeozoischen Schichtenreihe angewiesen zu haben. Weniger geklärt ist die weitere Gliederung in die 1) Quarzphyllit-, 2) Kalkphyllit- und 3) Kalkthonphyllit-Gruppe, deren provisorischen¹⁾ Charakter der Verfasser allerdings selbst hervorgehoben hat. Schon im Sinne der ursprünglichen Abgrenzung (Jahrb. der k. k. Geol. Reichsanst. 1874 S. 148 ff. und Verhandl. 1874 S. 214) vertreten sich die Gruppen theilweise; so greift die Kalkthonphyllitgruppe „tief in die Bildungszeit der beiden anderen Gruppen ein“ und „repräsentirt wahrscheinlich ein Aequivalent aller

¹⁾ Da der Verfasser im Jahre 1871 nur den „Versuch einer kritischen Darlegung des Standes unserer Kenntnisse von den Ausbildungsformen der vortriadischen Schichtencomplexe in den österreichischen Alpenländern“ oder „eine orientirende Vorstudie“ liefern wollte, so verbietet sich eine kritische Besprechung der damals veröffentlichten Ansichten von selbst. Aehnlich in der späteren, 1885 in der Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft (S. 277 ff.) niedergelegten Arbeit konnte es sich noch nicht „um die angestrebte Durchführung einer endgiltigen Gliederung des alpinen Silurs und noch weniger der ganzen palaeozoischen Schichtenreihe selbst“ handeln.

in den Nord- und Südalpen vertretenen palaeozoischen Gruppen bis zur Trias, wengleich vielleicht nicht ohne starke Lücken“ (Verhandl. der Geol. Reichsanstalt 1874 S. 216). Ein weiterer Nachtheil der Eintheilung STACHE'S besteht darin, dass den palaeozoischen „Gruppen“ ausgedehnte Massen triadischer Kalke (Fellagebiet, Tribulaun und Kirchdach am Brenner) zugewiesen wurden.

Die neueren Einzelaufnahmen im Gebiete der krystallinen Gesteine, die von HOERNES, VACEK und GEYER ausgeführt wurden, haben somit manigfache Aenderungen der obigen Gliederung zur Folge gehabt. Jedoch bestehen auch zwischen den genannten Forschern nicht unerhebliche Meinungsverschiedenheiten, was bei der Schwierigkeit des Gegenstandes nicht Wunder nehmen kann.

Da nun die gesicherte geologische Stellung des in dem engeren Gailthaler Gebiete beobachteten Quarzphyllites vielleicht über die Deutung der übrigen krystallinen Gesteinsgruppen Licht zu verbreiten vermag, so erscheint ein kurzes Eingehen auf die neueren Arbeiten geboten. Der Quarzphyllit des Gailthales setzt nach Westen zu unverändert fort. Die Angaben verschiedener Geologen sowie meine eigenen Excursionen im Gebiete des Pusterthales, des Ridnaun- und Brenner-Gebietes, des oberen Innthales und des Vorarlberges lassen hierüber keinen Zweifel. Aus der Umgegend von Bruneck (TELLER, Jahrb. d. G. Reichsanstalt 1886 S. 744), vom Penser Joeh, von Klausen (v. MOISSYOUS, Dolomitriffe S. 123), Waidbrunn (ibid. S. 123), von der Cima d'Asta (ibid. S. 400 ff.) und von Recoaro (BITTNER, Jahrb. d. G. Reichsanstalt 1883 S. 579) und vom Adamello wird derselbe Quarzphyllit bzw. Thonglimmerschiefer als jüngstes bekanntes Gestein der krystallinen Reihe beschrieben und es liegt keine Veranlassung vor, an der Gleichartigkeit des Gesteines mit dem der Gailthaler Berge zu zweifeln. Es sei u. a. noch besonders hervorgehoben, dass die Karnische Hauptkette in der Fortsetzung der Aufwölbungszone der Cima d'Asta liegt (vergl. unten).

Besonders lehrreich ist die eingehende petrographische Schilderung — die einzige bisher veröffentlichte der Art — welche WILH. SALOMON von den Gesteinen der „Quarzphyllitgruppe STACHE'S“

entworfen hat, wie sie im italienischen Antheil der Adamezzo-Gruppe am Monte Avioło auftritt. (Zeitschrift d. deutsch. geologischen Gesellschaft 1890 S. 467—469 und mikroskopisch-petrographische Uebersicht S. 528—535.) Da die Beschreibung fast Wort für Wort auf die Quarzphyllite des Karnischen Gebietes zutrifft und somit die weite Verbreitung einer petrographisch einheitlich zusammengesetzten Gruppe erweist, so möge sie im Folgenden wiedergegeben werden (S. 467 ff.):

Das vorherrschende Gestein im Ogliothal, der Quarzphyllit, besteht aus „abwechselnd dünnen Lagen von Quarzkörnchen in quarzitischem Gefüge und solchen von Phyllit, die ihrerseits wieder häufig mächtigere Knauern und Linsen von weissem, größer körnigem Quarz“ umschmiegen. . . . Je nachdem nun darin die Zahl und Mächtigkeit der Phyllit- bzw. Quarzitlager auf Kosten der anderen zunehmen, erhält das Gestein mehr der Habitus echter Phyllite oder echter Quarzite.

Die letzteren sind nicht so häufig ausgebildet wie die Phyllite. Diese finden sich auch in zahlreichen Varietäten, gehören aber immer der Glimmerschiefer-ähnlichen, deutlicher krystallinischen Abtheilung an, die man „Thonglimmerschiefer“ oder „glimmerige Phyllite“ zu nennen pflegt. . . . „Echte Vertreter der mehr Thonschiefer-ähnlichen Schistite treten nur ganz untergeordnet auf. [In unserem Gebiete im Comelico.] Dagegen entstehen umgekehrt durch Vermehrung des Glimmergehaltes und die dadurch bedingte Zunahme des Glanzes auf den Schichtflächen Gesteine, die man vielleicht als Glimmerschiefer bezeichnen würde.“ Diese letzteren finden sich in grösserer Ausdehnung im oberen Lessachthal, zwischen Ober-Tilliaeh und Liesing, treten aber am Monte Avioło nur untergeordnet und ganz local auf.

„Ordnen wir nun all die Gesteine, welche den bisher betrachteten unteren Schiefercomplex zusammensetzen, in einer Reihe an, entsprechend ihrer Verbreitung und Wichtigkeit, so müssen wir mit den Quarzphylliten und normalen Phylliten beginnen. Es folgen dann Quarzite, kohlenstoffreiche Phyllite [unsere graphitischen Schiefer], Chloritphyllite [an der oberen Grenze der Quarzphyllite], sericitische Phyllite [Reissach, Valle Visdende u. Comelico], Granatphyllite

[im Lessachthal sehr verbreitet], Biotitphyllite, Feldspath- und Epidot - Amphibolite, Phyllitgneisse [die letzteren Varietäten fehlen im Gailthal], ganz vereinzelt auch Lagen von Feldspath führendem Quarzit, endlich noch seltener Lagen von Thonschiefer-ähnlichem Phyllit-Schistit.“ Das zuletzt genannte Gestein ist im Comelico recht verbreitet, wurde dagegen im Gailthal kaum beobachtet.

Ueber die Gemengtheile bemerkt der genannte Verfasser weiter (S. 469): „In all den oben angeführten Varietäten der Phyllite ist Chlorit ein weit verbreiteter und charakteristischer Gemengtheil. Neben ihm findet sich in ungefähr gleicher Menge Muscovit und zwar entweder in grösseren, meist unregelmässig conturirten Lamellen, oder als Sericit in winzigen Schüppchen... Biotit wurde nur selten beobachtet.... Turmalin ist constant aber nur spärlich vorhanden. Von den Eisenerzen herrscht der Ilmenit bei weitem vor. Magnetit scheint recht selten zu sein und auch Pyrit wurde nur ganz vereinzelt beobachtet. Rutil tritt in sehr geringen Mengen auf. Die Titansäure scheint fast ganz und gar zur Bildung des Ilmenits verwendet worden zu sein.“ Auch am Monte Ajiolo sind die Quarzphyllite älter als sämtliche Eruptivgesteine.

Die beschriebenen Gesteine wurden der älteren Abtheilung von STACHE'S Quarzphyllitgruppe zugerechnet und überlagern ihrerseits die Gneissphyllite.

Während die gleichartige Fortsetzung der Quarzphyllite nach Westen hin ausser Zweifel steht, ergeben sich beim Vergleich mit den östlich gelegenen Gebieten allerhand Schwierigkeiten. Eine „Quarzphyllitgruppe“ wird zwar auch von VACEK aus dem Grazer Becken und von GEYER aus dem Oberen Murthal beschrieben; der petrographische Charakter derselben zeigt jedoch wenig Aehnlichkeit mit dem Quarzphyllite des Westens. Die Richtigkeit dieser Anschauung ergibt sich am klarsten aus den Beschreibungen der genannten Geologen. Das Obere Murthal, das Gebiet der Aufnahmen G. GEYER'S (Verhandl. der Geolog. Reichsanstalt 1890 S. 203; 1891 S. 108—120; S. 352—362) entspricht einer W—O verlaufenden Depression zwischen den beiden divergirenden Hauptstäben der Centralkette, die man als Niedere Tauern und Norische Alpen bezeichnet. Diese letzteren bestehen aus den älteren

krystallinen Gesteinen (A), während in der zwischenliegenden Bucht die jüngeren halbkrySTALLINEN Schiefer und Kalke (B) erhalten geblieben sind.

A. Das altkrystalline Grundgebirge zerfällt von unten nach oben in:

I. Gneiss-Serie.

1. Hornblendegneiss.
2. Schieferige oder porphyrische Gneisse mit Glimmerschieferlagern.

II. Glimmerschiefer-Serie.

1. Grobschuppiger, quarz- und erzreicher Glimmerschiefer mit Pegmatit, Kalk- und Amphibolitlagern.
2. Hellgrauer, feinschuppiger Granatenglimmerschiefer (ohne Pegmatit u. Hornblendeschiefer).

B. Die jüngere Gruppe der halbkrySTALLINEN Gesteine besteht aus:

III. der Kalkphyllit-Gruppe.

An der Basis liegen grüne Hornblendeschiefer (Strahlsteinschiefer). Darüber folgen hellbraune kalkreiche Schiefer (Biotitschüppechen, die tief verfilzt mit feinen Kalk-Lamellen, mit dünnen Lagen von blaugrauem, körnigem Kalke wechselnd); in dem Kalkschiefer erscheinen häufig schwarze graphitische Schiefer. Dem oberen Theile der ganzen Gruppe gehören zwei oder drei Lager von wohlgeschichtetem krySTALLINEM Kalke an. Crinoidenreste sind zweimal in den Kalkschiefern gefunden worden. Diese Gesteine sind ferner in der Schieferhülle der Hohen Tauern, besonders zwischen Ankogel und Radstädter Tauern entwickelt und von den gleichartigen Gebilden des Murgeths nur durch eine geringe Ueberbrechung getrennt.

IV. „Quarzphyllit“-Gruppe (in den beiden früheren Veröffentlichungen „Kalkthouphyllit-Gruppe“), welche discordant über dem Kalkphyllit bzw. über dem Granatglimmerschiefer lagert. Die Quarzphyllit-

Gruppe wird „nur zum geringen Theile aus dem gleichnamigen Gesteine gebildet. In vollständigen Profilen beobachtet man:

1. Dunkle graphitische Schiefer.
2. Quarzitische Schiefer mit Quarzitbänken, wechsellagernd mit brannen kalkreichen Schichten.
3. Darüber folgt als Hauptmasse der ganzen Abtheilung Grünschiefer mit untergeordneten Lagen von grünlichen Phylliten und Quarzitbänke.
4. Graue Thonschiefer.

Auch bei Judenburg kommen in diesem Horizont vor: a) graue, milde, sericitisch glänzende, häufig graphitische Thonschiefer. Mikroskopische Gemengtheile: Muscovitshuppen mit untergeordneten Quarzlinsen. b) Grünschiefer. Mikroskopische Gemengtheile: Quarzkörner, rhomboedrische Carbonate, Plagioklas, sowie Glimmer und Epidot. (Die Zusammensetzung dieser Gesteine stimmt gut mit der der Grünschiefer der Rauden- und Hoehspitz überein; vergl. unten.) c) Graue, oft sehr feinkörnige Kalke.

Es bedarf wohl kaum des Hinweises, dass diese „Quarzphyllit-Gruppe“ auch bei weitherziger Fassung des petrographischen Begriffes mit den westlichen Quarzphylliten wenig gemein hat, und ähnlich steht es mit der von VACEK beschriebenen „Quarzphyllit-Gruppe“ des Grazer Gebietes. Selbstverständlich ist den beiden genannten Geologen hieraus kaum ein Vorwurf zu machen, vielmehr liegt der Grund wesentlich in der unbestimmten Begrenzung der krystallinischen Gesteins-Gruppen STACHE'S. GEYER weist sogar (Verh. 1891 S. 358) ausdrücklich auf eine „eventuelle Verschiebung hin, welche die Auffassungen über die wahre Stellung jener Phyllite noch erfahren könnten“.

Ueber die Stellung der halbkrySTALLINEN Gesteine des Grazer Gebietes tobt derzeit eine grimme Fehde zwischen VACEK und R. HOERNES. (VACEK, über die geologischen Verhältnisse des Grazer Beckens, Verhandl. d. Geol. Reichsanstalt 1891 S. 41—50; Schöckelkalk und Semriacher Schiefer. Ebendasselbst 1892 S. 32—49. R. HOERNES, Schöckelkalk und Semriacher Schiefer. Mittheilungen des naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark 1892.) VACEK nimmt die nachfolgende Schichtenreihe an:

Unterdevon (Lantschgruppe VACEK = Dolomitstufe
CLAR et auct.)

Discordanz.

Schöckelkalk (bezw. Schöckelgruppe); an der Basis
Grenzphyllit (Kalkschiefer) mit Crinoidenstielen.

Discordanz.

Quarzphyllit-Gruppe (= Semriacher Schiefer
CLAR et auct.).

Discordanz.

Granatenglimmerschiefer-Gruppe.

Discordanz.

Gneiss-Gruppe.

HOERNES bestreitet nun die zahlreichen Discordanzen, deren Vorhandensein in den von VACEK aufgenommenen Gebieten nur vereinzelt von anderen Beobachtern bestätigt worden ist, und nimmt ferner — im Sinne von CLAR — an, dass der Schöckelkalk unter dem Semriacher Schiefer lagere. — Die Schichtenfolge ist also nach HOERNES:

Unterdevon.

Typischer Semriacher Grünschiefer (Chloritischer
Hornblendeschiefer, dessen vollkommene petrographi-
sche Uebereinstimmung mit dem Grünschiefer
von Muraun durch GEYER und HOERNES ausdrück-
lich hervorgehoben wird).

Normaler Thonschiefer mit eingelagerten Kalk-
schiefern (zur Gruppe des Semriachers Schiefers
gehörig).

Schöckelkalk.

Erzführender Schiefer mit Crinoiden (= Grenz-
phyllit).

Aeltere krystalline Gesteine.

Aus der vorhergehenden Darstellung ergibt sich, dass die Quarzphyllit-Gruppe des Grazer und des Murgebietes nur zum allergeringsten Theile aus Gesteinen besteht, welche diesen Namen verdienen und dass somit von einer Uebereinstimmung mit den Quarzphylliten des Gail- und Pusterthales nicht wohl die Rede sein kann. Als einer der wesentlichsten Unterschiede sei das annähernd vollkommene Fehlen des Kalkes in den Gesteinen des Gail- und Pusterthales her-

vorgehoben. Das Vorkommen von Reissach bildet die einzige Ausnahme und findet sich an der oberen Grenze des Phyllites gegen die kalkreichen Mauthener Schichten. Es liegt somit nahe, an Stelle des wenig passenden Namens „Quarzphyllit-Gruppe“ die Bezeichnung „Semriacher Schiefer“ (welche ohnehin die Priorität hat) für die fraglichen Gesteine des Grazer und Murauer Gebietes in Anwendung zu bringen.

Für die westlichen Quarzphyllite bleiben vielleicht als Aequivalent im Osten die oberen hellgranen, feinschuppigen Granatenglimmerschiefer übrig. Zwar ist die petrographische Beschaffenheit, wie hervorgehoben werden soll, nicht durchweg übereinstimmend. Aber im oberen Lessachthal kommen jedenfalls Gesteine vor, auf welche die Bezeichnung Granatenglimmerschiefer durchaus anwendbar ist (vergl. oben), und ferner sind die Abweichungen zwischen dem Granatenglimmerschiefer und dem westlichen Thonglimmerschiefer lange nicht so gross wie die Verschiedenheiten zwischen den Gesteinsgruppen, welche im Osten und Westen als Quarzphyllit bezeichnet worden sind.

Als Aequivalent des Semriacher Schiefers und Schöckelkalkes sind die untersilurischen Mauthener Schichten anzusehen, welche ebenfalls aus normalem grauen Thonschiefer, kalkreichem Thonschiefer, Kalk, Grünschiefer und Quarziten bestehen (vergl. unten). Phyllitische Lagen sind, wie es scheint, ebenso selten, wie in den Semriacher Schiefen. Der Umstand, dass die genannten Schichten im Gailthal aus Kalk und Schiefer in unregelmässigem Facieswechsel zusammengesetzt sind, und im Liegenden bald aus dem einen, bald aus dem anderen Gestein bestehen, erklärt vielleicht die auffallende Meinungsverschiedenheit zwischen VACEK und HOERNES. Der letztere Forscher hat auch für die Grazer Gegend ausdrücklich hervorgehoben, dass die relative Mächtigkeit der Thonschiefer und Kalke wechselnd sei und dass stellenweise der Schiefer einen guten Theil des Schöckelkalkes vertritt.

Wie unten auseinandergesetzt werden wird, entsprechen die Mauthener Schichten dem Untersilur, vielleicht sogar noch älteren Bildungen. Zu dem älteren Palaeozoicum haben aber auch die genannten Forscher den Schöckelkalk und Semriacher Schiefer gerechnet. Dass es sich nicht um alteambrische oder praecambrische Bildungen handeln kann, beweist das mehrfach

erwähnte Vorkommen von Crinoiden. VACEK rechnet seine Schöckelgruppe sogar zum Obersilur, eine Anschauung, die nicht unmöglich, aber auch nicht sicher erweisbar ist.

Die Schichtenfolge, welche VACEK aus den nördlicher gelegenen Gebieten des Wechsels und des Semmering beschreibt, stimmt insofern nicht mit der des Grazer Beckens überein, als die Gruppe des Granatenglimmerschiefers fehlt. (Verhandl. d. Geolog. Reichsanstalt 1888 Nr. 2 und 1889 S. 16.) Ueber dem Gneiss liegt hier unmittelbar die Quarzphyllitgruppe, deren Gesteine jedoch mit denen der gleichnamigen westlichen Formationsabtheilung besser übereinstimmen. Wenigstens beschreibt VACEK vom Semmering die Zusammensetzung der Quarzphyllitgruppe wie folgt:

- 1) Grünschiefer von Payerbach und Reichenau.
(cf. Semriacher Schiefer.)
- 2) Quarzarkosen mit sericitischem Bindemittel
(Silberbergs-Conglomerate).
- 3) die Masse der typischen Quarzphyllite,
- 4) reiner Quarzfels.

Diese Schichtenfolge erinnert vollkommen an die im oberen Lessachthal (KARTTSCH, Ober-Tilliaeh) beobachteten Profile, wo ebenfalls über dem normalen Quarzphyllit Thonschiefer mit eingelagerten arkosenartig ausgebildeten Grauwacken (z. Th. mit Serieit) und Quarziteschiefen, sowie weiterhin die Grünschiefer des Heret und Tilliaacher Joehes auftreten. Kalkige Schichten werden aus diesen tieferen Horizonten vom Semmering nicht erwähnt; aber ein vollständiges Fehlen von Kalkbildungen in dieser Schichtenreihe ist auch in den Karnischen Alpen nicht ungewöhnlich.

Ob man weiterhin die Granatenglimmerschiefer des Murgebietes mit den typischen Quarzphylliten des Semmering unmittelbar vergleichen kann, dürfte schwer festzustellen sein.

Die folgende Vergleichstabelle für die im Vorhergehenden erwähnten halbkristallinen Gesteine ist der Natur der Sache nur als ein vorläufiger Versuch anzufassen. Die von allen früheren Beobachtern hervorgehobene Bedeutung heteroper Verschiedenheiten innerhalb gleichalter Horizonte erhellt auch aus dieser Uebersicht:

Mauthener Zehnten.	Karnische Alpen.	Semmering.	Oberes Murthal.	Grazer Gebiet.
Grünschiefer, Thonschiefer, Kalk, Arkosen in unregel- mäßigen Wechsel.	Grünschiefer v. Payer- bach.	Grünschiefer („Quarz- phyllitgruppe“). Thonschiefer. Quarzitischer Schiefer.	Grünschiefer. Thonschiefer.	Semriacher Grünschie- fer. Thonschiefer.
Quarzphyllit.	Arkosen, (Kalk fehlt).	Quarzphyllit = ? Granatenglimmer- schiefer. Gneiss.	Kalk u. Kalkschiefer mit Crinoiden.	Schöckelkalk u. Kalk- schieferm. Crinoiden. Granatenglimmer- schiefer. Gneiss.

VIII. KAPITEL.

Das Silur.

A. Das Untersilur.

1. Die untersilurischen Mauthener Schichten.

Der tiefere Theil der hierher gerechneten Schichten ist völlig versteinungsleer, so dass die Abgrenzung gegen den Quarzphyllit auf Grund der Gesteinsverschiedenheit erfolgen musste. Es wurde bereits in dem vorhergehenden Abschnitte angesprochen, dass die Zurechnung des Quarzphyllites zum Cambrium und die der höheren Schichten zum Silur nur auf ungefähre Richtigkeit Anspruch machen kann.

Auch die obere Begrenzung des Untersilur beruht im Gebiete der Karnischen Alpen nur in dem (S. 15) beschriebenen Profile des Uggwagrabens auf streng paläontologischer Grundlage: Die braunen Orthoceraschiefer mit der Fauna des oberen Untersilur werden hier von kohligem Graptolithenschichten überlagert, welche der tiefsten Zone des Obersilur entsprechen.

Jedoch ist meist das Obersilur paläontologisch und petrographisch so gut charakterisirt, dass die Abgrenzung gegen die tieferen Schichten keine grossen Schwierigkeiten macht. Dasselbe besteht aus Orthocerenkalken mit der Fauna der böhmischen Stufe E_2 ; Thonschiefer treten im Obersilur nur untergeordnet auf, können dann allerdings kartographisch von den gleichartigen Untersilurschiefern kaum getrennt werden.

Eine besondere Benennung des tieferen Silur wird bedingt durch die eigenthümliche Zusammensetzung aus Thonschiefer (und klastischen Gesteinen), eingelagerten Kalken und verschiedenartigen Bildungen eruptiven Ursprungs (vereinzelte Diorite, ? Quarzporphyre und tuffartige Grünschiefer).

Ich bezeichne also als Mauthener Schichten das $1\frac{1}{2}$ —2 km mächtige, mannigfaltig zusammengesetzte Gebirgsglied zwischen dem Quarzphyllit und dem ober-silurischen Orthoocerenkalk (bezw. Graptolithenschiefer). Dasselbe stellt die eigentümliche ostalpine Entwicklungsform des Untersilur dar; die obere und untere Grenze ist nicht überall vollkommen befriedigend festgelegt.

Die palaeontologischen Beziehungen des ostalpinen Untersilur weisen mehr auf den Westen (Frankreich und England) als auf Böhmen hin; hingegen bildet die reiche Fauna des Karnischen Obersilur einen zweifellosen Ableger des böhmischen und leitet andererseits nach Südwesten, nach Languedoc und Spanien hinüber.

2. Die petrographische Beschaffenheit der Mauthener Schichten.

Die Masse der Mauthener Schichten besteht a) aus normalen klastischen Gesteinen, vor allem aus Thonschiefer sowie untrennbar verbundenen Grauwacken, Quarziten und Grauwackeneonglomeraten; an der Basis bildet der Thonschiefer mit Quarzfasern eine ziemlich regelmässige Zone. Eingelagert finden sich b) Kalk und Kalkschiefer, c) verschiedene Eruptivgebilde und tuffartige Gesteine, welche theils klastischen, theils eruptiven Ursprungs sind. Diese Einlagerungen sind zum Theil auf bestimmte Horizonte beschränkt, gestatten jedoch ebenso wenig wie die Versteinerungen auch nur den Versuch einer durchgreifenden Gliederung der mächtigen Schichtengruppe.

a). Normale klastische Gesteine.

Die folgenden Zeilen sollen naturgemäss nicht eine Wiederholung der bereits gegebenen Localbeschreibung unter anderen Gesichtspunkten enthalten, sondern nur eine kurze Schilderung der petrographischen und palaeontologischen Merkmale sowie eine Schilderung der Faecesbezirke bringen.

Die Hauptmasse, etwa $\frac{2}{3}$ der gesammten Mauthener Schichten des Karnischen Gebietes, besteht aus normalem

bläulichen Thonschiefer. Derselbe baut stellenweise, so am Hochwipfel und in der Gegend von Untertilliach das ganze Untersilur mit Ausschluss jeder anderen Gesteinsabänderung auf. Die Schichtenstellung ist fast immer steil oder vertical; Schieferung und Schichtung fallen, wie die Einlagerungen anderer Gesteinsabänderungen erkennen lassen, meist zusammen. Druck- und Faltungserscheinungen wurden inmitten des Schiefers selten (nur am Ofener Joch) beobachtet. Hingegen sind, wie die häufigen Hinweise in den Einzelbeschreibungen zeigen, die Grenzen der eingefalteten bzw. übersehobenen Devonkalke durch eine grosse Mannigfaltigkeit von Einfaltungen, Reibungserecen, Zerreibungen und Zerquetschungen gekennzeichnet; hier finden sich auch, wengleich selten (Monte Palumbina, Königswand) echte Griffelschiefer.

Die nördliche Grenze der Schiefer gegen den Quarzphyllit wird, wie schon oben erwähnt, meist durch Vorkommen von Thonschiefer mit Quarzfasern bezeichnet, die eine einigermaßen beständige Zone bilden. (Südlich von Hermagor, Mauthen, Niedergail-, Roller-, Dorfer-Thal, Obstoasser See.) An dem letztgenannten Punkte tritt dies Gestein in unmittelbarer Verbindung mit den grau, violett oder grün gefärbten sericitischen Chloritschiefern an, welche weiter westlich bis zum Sägebachthal bei Sillian die eigentliche Grenzzone kennzeichnen.

Im Sittmooser Thal (südlich von St. Jacob) fehlt die Grenzzone zwischen Quarzphyllit und dem halbkristallinen Kalk der Mauthener Alp — vielleicht infolge einer Verwerfung. Weit im Osten, in den Karawanken, findet sich im untersten Theile der Mauthener Schichten ein grauer, quarzitiseher glimmerreicher Schiefer (Lind im Gailthal), bei Reissach und im östlichen Theile des Valle Visdende scheint ein sericitiseher Phyllit den Uebergang der beiden Gebirgslieder zu bilden und am Obergailberg findet, wie oben erwähnt, eine mehrfache Wechsellagerung statt: Eine kartographische Auscheidung der unteren Zone erschien angesichts dieser mannigfachen Unregelmässigkeiten nicht empfehlenswerth.

Unter den Einlagerungen im Thonschiefer ist zumeist der schwarze, meist weissgedarte Kieselschiefer zu nennen,

der an verschiedenen Punkten in Lagern von geringer Mächtigkeit antritt: Zwischen Krainburg und Podlanegg in den Ostkarawanken (hier mit Pyritwürfelchen), bei Arnoldstein, Achomitz, im Uggwathal (schwarze und weisse, überaus dünne Schichten wechseln mit einander ab), Feldkogel bei Reissach, Valle Visdende n. s. w. Die geringe Mächtigkeit der Kieselschiefer bildet einen bezeichnenden Unterschied der Silurschiefer und der sonst recht ähnlichen Cnlmgesteine, unter denen die Kieselschiefer eine hervorragende Stelle einnehmen. Die schwarzen graphitischen kieselreichen Schiefer, welche sich am Findenigkofel (S. 70), der Casa Meledis und am Hochalpspitz (S. 113) finden, schliessen sich den Kieselschiefern eng an, gehören aber wohl durchgängig schon zum Obersilur.

Grössere Verbreitung besitzen die Lagen von Grauwacke und Grauwackenschiefer, welche der Masse nach in den Westkarawanken den Thonschiefer übertreffen, im Osten der karnischen Hauptkette noch recht bedentsam sind und nach Westen zu allmählig abnehmen. Die hervorragenderen Käme der westlichen Karawanken bestehen aus diesem widerstandsfähigen Gestein, das häufig ein dichtes, gleichförmiges Aussehen besitzt und dann an gewisse Eruptivgesteine erinnert; am Kamenberg kommt eine charakteristische Glimmergrauwacke vor. Aus der Karnischen Hauptkette seien erwähnt die Vorkommen südlich des Poldnigg, bei Tröppelach (feste, quarzische Grauwacke), Manthen, östliches Valle Visdende (Grauwackenschiefer), Monte Palumbina (sericitische Grauwacke), Schuster- und Winkler Thal (arkosenähnliche Grauwacke und Grauwackenschiefer).

Die gleichförmig zusammengesetzten Quarzite gehen oft unmerklich in die aus mannigfachen Gemengtheilen (Quarzkörner, Thonschieferbröckchen, Glimmer, Kieselschiefer, ungearbeitete krystalline Schiefer) zusammengesetzten Grauwacken über (arkosenartiger Quarzit südlich des Poldnigg), stehen jedoch an Mächtigkeit und Verbreitung den ersteren bei Weitem nach. Grane Quarzite treten auf an der Königswand (Taf. XIII) und im Valentin-Thal (hier mit Pyrit); Quarzitschiefer (blauer Thonschiefer im Wechsel mit weissen oder braunen Quarzitlagen) findet sich am Gemskofel (vergl. oben

S. 193) und im Leithenthal, hellgrüner, glimmeriger Quarzitschiefer am Colle di Canova.

Local sind die Granwaeken auch mit Conglomeratlagen vergesellschaftet, die jedoch, obwohl an verschiedenen Punkten beobachtet, stets nur geringe Mächtigkeit und Verbreitung besitzen: Unmittelbar oberhalb von Trüppelach findet sich ein aus Brocken von Kieselschiefer und Thonschiefer bestehendes, verhältnissmässig feinkörniges Conglomerat; ein ähnliches Gestein steht am Feldkogel (S. 68) und auf der Würmlacher Alp an (S. 78), wo dasselbe mit Granwacke zusammen vorkommt und vorwiegend Kieselschieferbrocken enthält. Im unteren Valentin-Thal beobachtet man eine conglomeratische Granwacke mit grösseren, z. Th. wasserklaren Quarzkörnern.

b) Die grünen Gesteine (Schiefer und Quarzite) und die Eruptivgesteine.

In unmittelbarem Zusammenhang mit den normalen klastischen Schiefen und Granwaeken und durch zahlreiche Uebergänge mit ihnen verbunden finden sich grüne Gesteine (Schiefer, Granwaeken und Quarzite). Dieselben bilden Einlagerungen z. Th. von bedeutender Mächtigkeit, aber geringer Längsansdehnung und heben sich landschaftlich durch ihre schroffen Formen und die dunkle blaugrüne Farbe von den normalen Thonschiefen scharf ab. (Vergl. die Abbildung der Tiefenspitz S. 104 sowie die des Heret und der Roskarspitz S. 124.)

Ein Zusammenhang mit Eruptivgesteinen ist stellenweise zu beobachten: Die grünen Schiefer und Quarzite erscheinen vielfach in der Nähe von Eruptivgesteinen und lassen in ihrer kartographischen Begrenzung eine auffällige Aehnlichkeit mit den Mandelsteinen des Culm erkennen, welche ja auch den normalen klastischen Gesteinen eingelagert sind.

Die mikroskopische Untersuchung lässt uns hinsichtlich dieser auch in anderen Theilen der Ostalpen verbreiteten aber wenig bekannten Gesteine so gut wie gänzlich im Stich. Sie lehrt nur, dass die Grünschiefer, abgesehen von den Bestandtheilen eruptiver Herkunft, reich an normalem klastischen

Material, d. h. an Quarzkörnern sind. Herr Dr. MILCH, der doch hinreichende Erfahrung auf dem Gebiete metamorpher Eruptivgesteine besitzt, schrieb mir auf Grund einer Durchsicht der gesammelten Handstücke und der davon gefertigten Dünnschliffe: „Alle Gesteine sind so hochgradig metamorph, dass von Structurresten gar nicht die Rede sein kann, und mineralogisch bestehen sie, von wenigen grossen Quarzen und Feldspathen abgesehen, die ihrerseits auch wieder durch Quetschung charakterlos geworden sind, aus Neubildungen von Quarz und Feldspathmosaik, Chlorit, Sericit und Erz; damit lässt sich aber auch nichts anfangen.“ Unter diesen Umständen verzichtete Herr Dr. MILCH naturgemäss auf eine Beschreibung und Eintheilung der Gesteine. „Ich glaube sogar“, fährt derselbe fort, „bei dem jetzigen Stande der Wissenschaft wäre eine Aufsammlung grosser Suiten nach einer vorläufigen mikroskopischen Untersuchung, die erste Bedingung, unter der sich bei ähnlichen Gesteinen etwas erreichen lässt, auch noch ziemlich hoffnungslos. Makroskopische Unterschiede verschwinden oft bei derartigen Gesteinen unter dem Mikroskop, ohne dass andere gute Merkmale an ihre Stelle treten, deshalb scheint mir eine Eintheilung auf Grund der geologischen Aufnahme noch ein besseres Anknüpfungsmittel als eine Eintheilung nach gekünstelten mikroskopischen Unterschieden.“

Ich habe diese Worte wiedergegeben, um die geringe Rücksichtnahme auf die mikroskopische Petrographie zu rechtfertigen. Uebrigens sei hervorgehoben, dass nach einer mündlichen Mittheilung des Herrn Oberbergrath von MOJSEWITSCH ganz ähnliche Erfahrungen bei einer auf seine Veranlassung angeführten Untersuchung von Tanerngesteinen gemacht wurden. Bei anderen Gelegenheiten, vor allem bei der Unterscheidung von dichten Eruptiv- und Grauwackengesteinen, welche z. Th. eine auffallende äussere Aehnlichkeit besitzen, hat jedoch die mikroskopische Untersuchung recht wichtige Dienste geleistet.

Das östlicher gelegene Verbreitungsgebiet der grünen Gesteine umfasst den schroffen Kamm Tiefenspitze — Steinwand (Monte Cresta Verde \triangle 2514 m) — Kesselkofel. (Vergl. Profil-Tafel V S. 111.) Dasselbe sendet Ansläufer

nach Westen zur Hochspitz und nach Osten zur Gruhenspitz, wo inmitten der aufgeschobenen Silurshiefer violette und grünliche Schiefergesteine auftreten. Das Vorkommen der ersteren Farbenvarietät ist für dies Verbreitungsgebiet charakterisierend. Die Uebergänge in den normalen Thonschiefer (Wechsellagerung am Südadhang der Raudenspitz, graugrüner Schiefer am Wasserkopf) sind überall deutlich ausgeprägt.

Die grünen quarzitischen Gesteine der Hochspitz (2592 m., südlich von Maria Luggau) bestehen, wie die Untersuchung von Dünnschliffen lehrte, in erster Linie aus zahlreichen Quarzkörnern und einem grünen chloritischen, die Färbung bedingenden Mineral, ferner aus Kalkspath, Plagioklas, hellem Glimmer, Epidot und Erz. Der Uebergang in den Thonschiefer erfolgt durch Einlagerung von Quarzitbänken, die allmählig den ersteren verdrängen.

Eine bemerkenswerte Folge des Kalkgehaltes ist das Vorkommen von schönem Edelweiss auf der Hochspitz und Raudenspitz (2485 m.). Diese Pflanze bevorzugt bekanntlich reinen Kalkboden und findet sich im Urgebirge nur dort wo ein Kalkgehalt (wie im Glocknergebiete) nachweisbar ist.

Wie oben angeführt wurde, besitzen im Murrgebiet die Grünschiefer die gleiche stratigraphische Stellung, wie in den Karnischen Alpen. Auch die petrographische Beschaffenheit stimmt überein, wie die Diagnose eines von G. GEYER gesammelten und durch von FOULLON untersuchten Grünschiefers von Judenberg beweist: Quarzkörner, rhomboedrische Carbonate, Plagioklas sowie Glimmer und Epidot; auch die betreffenden Gesteine der Gegend von Muran bestehen aus Quarz, Glimmer (? Chlorit) und Epidot-Aggregaten, wozu sich bisweilen noch rhomboedrische Carbonate gesellen.

Die Gesteine der Raudenspitz enthalten die folgenden Mineralien:

- 1) Letzter Gipfel gegen das Frohnthal; graues Gestein mit rothem Einschluss, wahrscheinlich Blutjaspis, wie am Heret (vergl. unten), enthält Quarz (Drnekersehennungen), Chloritstüppchen, Plagioklas, Glimmer, Titanhaltiges Erz mit Leukoxenrand.
- 2) Schutthalde nach dem Frohnthal; frisches, körniges grünes Gestein: chloritisches Mineral, Quarz, Angit

(in reichlicher Menge, z. Th. von Hornblende unrandet), Plagioklas, Kalkspath, Epidot, Erz.

Das Vorkommen von randlich umgewandeltem Angit in diesem letzteren Gestein ist von besonderer Wichtigkeit, weil derselbe auf die theilweise Herkunft der Gemengtheile aus Eruptivgesteinen hinweist. In dem körnigen Gang-Gestein, welches im Henriesenweg oberhalb der Wodnerhütte im Wolayer Thal ansteht, ist der randlich in Hornblende umgewandelte Angit ein charakteristischer und wesentlicher Gemengtheil. (Vergl. oben S. 190.) Da zudem, wie oben angeführt wurde, die Diorit- (bezw. Diabas-) Eruptionen bereits im Untersilur ihr Ende erreichten, steht nichts im Wege die eigentümliche Beschaffenheit der Grünschiefer auf eine theilweise Beimengung von vulkanischem Material zurückzuführen.

Die stark zersetzten und umgewandelten Feldspath-schiefer, welche die phantastischen Zacken und Spitzen der Hoehalpspitz bilden (S. 112. 113), sind nach Herrn Dr. MILCH wahrscheinlich als umgewandelte, geschieferte Quarzporphyre anzufassen. Dies Gestein, das auf der Karte besonders ausgeschieden wurde, erinnert etwas an Fleckschiefer und schwankt in der Farbe zwischen hellgran und dunkelbraun, eignet sich aber wegen hochgradiger Zersetzung nicht zur näheren Bestimmung.

Ein räumlich sehr beschränktes (daher kartographisch nicht ausgeschiedenes) Vorkommen von grünen Quarziten an der Steinkarspitz (2518 m, südl. von Unter-Tilliach) bildet den Uebergang zu den weiter westlich, zwischen Valle Visdende und Königswand vorkommenden grünen Gesteinen. (Vergl. die Profil-Tafel VI auf S. 132.) Der quarzitische bezw. normal-klastische Charakter ist hier deutlicher wahrnehmbar, als in den Gesteinen der Raudenspitz. Die Farben sind weniger lebhaft; da ferner Eruptivgesteine in der Nähe noch nicht nachgewiesen sind, so erscheint auch die tuffige Beschaffenheit dieser Gebilde weniger sicher. Die hellgrünen Thon- und Quarziteschiefer, welche z. B. im Leithenthal und am Bärenhadlahnereek den Uebergang vermitteln, sind hier so mächtig, dass die Abgrenzung ziemlich willkürlich erfolgen muss. Vor allem ist man in dem über den Heret verlaufenden Zug

der Grünschiefer oft in Zweifel, was zu diesen und was zu den normalen klastischen Gesteinen zu rechnen sei. Bemerkenswerth sind Conglomeratlagen (aus Broeken von grauem und rüthlichem Quarzit, sowie aus Blutjaspis bestehend), welche in dem grünen Glimmerquarzit am Rosskar und Heret auftreten. Auch in dem schmalen Zug von Silarschiefer zwischen Porze und M. Palumbina findet sich grüner chloritischer Schiefer.

Der westlichste, isolirte Ausläufer der in Rede stehenden Gesteine ist ein fleckiger chloritischer Schiefer, der wenig mächtig am Nordabfall der Königswand vorkommt. (Vergl. Taf. XIII S. 128.)

e) Die Kalkbildungen der Manthener Schichten und die Entwicklung der Faeciesbezirke.

Während die Grünschiefer auf zwei kleine Gebiete innerhalb des Bereiches der Manthener Schichten beschränkt sind, erscheinen Kalkbildungen verschiedener Beschaffenheit von den Westkarawanken bis in die Gegend von Sillian verbreitet und übertreffen stellenweise die klastischen Gesteine so weit an Mächtigkeit, dass diese als blosse Einlagerungen erscheinen. Die Zusammensetzung der Kalke zeigt grosse Verschiedenheiten; zwischen den allerdings seltenen Extremen eines weissen dichten, an Triaskalk erinnernden Gesteines (Latschaacher Alp) und eines aus dentlichen Krystallkörnern bestehenden Marmors (Gemskofel, Ersehbanner Thal) finden sich alle denkbaren Uebergänge. Am häufigsten sind halbkrySTALLINE Kalke von verschiedenartiger Färbung, weiss (Pökan, Arnoldstein), rüthlich (St. Canzian), grau (sehr verbreitet), weiss und schwarz gebändert (Trüppelach, Schwarzzipfel) u. s. w. Den Uebergang zu den Schiefergesteinen vermitteln thonige Kalke, Kalkschiefer und Kalkphyllit in den verschiedensten Abstufungen des Thongehaltes und der krySTALLINEN Ansbildung. Die eigentlichen bunten Krauenzelkalke mit Orthoceren und die denselben entsprechenden krySTALLINEN Thonflaserkalke und bunten Kalkphyllite gehören grösstentheils dem Obersilur an; doch finden sich im Osten, in der Gegend von Arnoldstein derartige Gesteine auch im Untersilur.

Hochfläche von Egg Melweg Gail
(Moräne) (Flussterrasse) (Alluvium)
Latscherer Alp Dellacher Alp Poludnigg




Abbildung 81.

Profil durch die tieferen Mauthener Schichten südlich von Hermagor.

Eine genaue Schilderung der überaus zahlreichen Kalkvarietäten würde geringes Interesse beanspruchen und ist zudem in der Einzelbeschreibung der Gegenden enthalten. Hingegen erlaubt der regelmässige Verlauf der Mauthener Schichten auf Grund der durch die Kartirung gewonnenen Anhaltspunkte eine Schilderung der Faeciesbezirke innerhalb des Karnischen Untersilur:

1) Im Westen der Karawanken liegt über a) einer dünnen basalen Schieferbildung b) ein mächtiges Lager von Kalken und Kalkphylliten, das den Nordfuss des Gehirges bildet; über dem Kalke lagert c) Granwacke und Schiefer. (Dies ist genau die bei Graz von HOERNES beobachtete Reihenfolge: a) Grenzphyllit, b) Schöckelkalk, c) Semriacher Schiefer.)

2) In den östlichen Karnischen Alpen hält zwar das untere Kalklager weithin (bis nach Tröppelach) an, aber darüber beobachtet man einen unregelmässigen Wechsel der Gesteine: An der Göriaacher Alp und im Bistritza-Graben finden wir Schiefergesteine mit eingelagerten Kalkzügen, am Osternigg das umgekehrte Verhältniss (Profil-Tafel I S. 15). Die letztere Ansbildung (man vergleiche das nebenstehende Profil) hält bis zum Schwarzwipfel an. In dem Durchschnitte des Garnitzgrabens fehlt — abgesehen von dem basalen Thonschiefer mit Quarzfasern — der Schiefer ganz (S. 42).

3) Bei Tröppelach keilt der Kalk aus; am Rattendorfer Riegel und Hochwipfel besteht das ganze Untersilur aus kalkfreien Schieferbildungen.

4) Am Feldkogel schieben sich wieder Kalklagen ein, die zunächst noch etwa an die „bercynischen“ Kalkklingen der unteren Wiederschiefer erinnern, allmählig aber an Mächtigkeit zunehmen (Profile S. 68—71); Kramenzelkalken kommen auch hier in tieferen Horizonten vor. In dem Durchschnitte des Kronhofbaehes sind Kalk und Schiefer an Mächtigkeit ungefähr gleich, am Nordabhang des Pollinigg (Profil-Tafel IV) überwiegt noch einmal der Schiefer, tritt hingegen an der Mauthener Alp nur als Einlagerung auf (S. 95).

5) Durch den Devonkalk der Plenge wird der Zusammenhang des Untersilurzuges beinahe unterbrochen; weiter west-

lich herrschen die normalen und die grünen Schiefergesteine unbedingt vor; wenig mächtige und bald auskeilende Kalkzüge finden sich nur am Gemskofel (Profil-Tafel V S. 111), Sonnstein (non Sonnspitz S. 120), Schulternkofel und im östlichen Valle Visdende (hier nur wenige Meter mächtig). Die Umgebung des Winkler Joehes besteht aus reinem Thonschiefer.

6) Der Westen der Karnisehen Hauptkette ist etwa vom Tilliacher Joeh an ausgezeichnet durch das andauernde Vorwalten der Thon- und Quarzitschiefer, denen die meist wenig mächtigen, aber weithin fortstreichenden Züge von Kalkphyllit und Marmor eingelagert sind. Daneben kommen die Grünschiefer vor.

Der überaus rasche und häufige Facieswechsel innerhalb der Mauthener Schichten ist, soweit meine Erfahrungen reichen, innerhalb der silurischen Formation beispiellos. Das Untersilur Schwedens zeigt zwar in Bezug auf die unregelmässige Vertheilung der Kalkbildungen und Grapholithenschiefer einige Analogien; doch vertheilen sich hier die gleichalten heteropen Gebilde über viel weitere Strecken. Nur die alpine Trias zeigt ähnlichen Facieswechsel auf kleinem Raum und auch im Unterdevon von Nordfrankreich (Seine Inférieure) sind nach der Darstellung von BARROIS die Kalke als unregelmässige Linsen den vorherrschenden Schiefen eingelagert.

In unserem Gebiete konnte das Anschwellen und Auskeilen der verschiedenen Gesteine häufig Schritt für Schritt verfolgt werden. Im oberen Kernitzelgraben ist sogar eine allseitig scharf begrenzte und im Aufschlusse selbst auskeilende Kalkmasse von einigen Metern Mächtigkeit mitten im Schiefer zu beobachten. Ausserdem schliesst die regelmässige Unterlagerung durch den Quarzphyllit und der gleichförmige Verlauf der Grenze die Möglichkeit aus, die petrographischen Verschiedenheiten durch Dislocationen zu erklären.

3. Die Versteinerungen der Mauthener Schichten.

Dass die Kalkbildungen innerhalb der sedimentären Formationen durch organische Thätigkeit entstanden sind, wird wohl allgemein zugegeben. Welche Lebewesen die unter-

silurischen Kalke gebildet haben, ist jedoch schwer zu entscheiden. Ich habe bisher unbestimmbare Orthoceren- und Crinoidenreste an der Unterfeistritzer Alp und im Uggwathal, Orthoceren in etwas grösserer Häufigkeit bei Arnoldstein gefunden. STACHE führt Orthoceren von dem Sonnstein bei Maria Luggan, Korallenreste (ohne nähere Bestimmung) aus dem Winkler Thale an. Die meisten Kalkbildungen erweisen sich jedoch als vollkommen fossilieer und gewähren auch bei dem hohen Grade ihrer dynamometamorphen Umwandlung keine Hoffnung auf bessere Funde. Es liegt angesichts der Einlagerung mächtiger Kalkstücke in klastischen Gesteinen der Gedanke an Korallenbauten immer am nächsten. Jedoch sind untersilurische Korallenriffe bisher noch nicht bekannt geworden. In den Kalken der Wesenbergschen Schicht Esthlands oder der Cineinnati group finden sich zwar recht ansehnliche Anhäufungen von Korallen, aber keine Riffbauten. Es ist somit am naheliegendsten, auch für die Entstehung der Manthener Kalke nur die Mitwirkung von Korallen anzunehmen. Als Stütze für diese Annahme ist noch — abgesehen von der oben erwähnten, etwas allgemein gehaltenen Angabe STACHE'S — die von mir gemachte Beobachtung anzuführen, dass die braunen z. Th. kalkigen Caradoeschiefer des Uggwathales (Profil-Tafel I S. 15) stellenweise ganz erfüllt sind von einer kleinzelligen, baumartig verzweigten Monticuliporide. Dieselbe ist auch den Schichten von Grand-Gluzy, Languedoc eigentümlich, wurde aber noch nicht näher untersucht.

Von sonstigen Arten bestimmte ich aus denselben Schichten:

2. *Monticulipora petropolitana*. EICHW. Selten.
3. Bryozoenreste, nicht näher bestimmbar.
4. *Orthis Actoniae*. SOW. Häufig. DAVIDSON, Monograph of the British Brachiop. III (Palaeontolog. Soc. Bd. XXII) t. 30. f. 5. Languedoc, England, Brest (Calcaire de Rosan).
5. *Orthis cf. respertilio*. SOW. Ein Exemplar. DAVIDSON ibid. t. 30. f. 11, 17.
6. *Strophomena grandis*. SOW. Ein Exemplar. DAVIDSON, Supplement t. 15. f. 6.
7. *Porambonites cf. intercedens* var. *filosa*. MC COY bei DAVIDSON Bd. XXII. t. 26. f. 1. S. 196. Drei Exemplare.

8. *Strophostylus nov. sp.* Dieselbe Art kommt auch in Languedoc vor.

STACHE führt ausserdem noch *Leptaena aff. sericea* Sow., *Strophomena expansa* Sow. (auch in Languedoc), *Orthis cf. solaris* und *Orthis calligramma* an (Zeitschrift d. deutschen geolog. Gesellschaft 1885 S. 325). Ob die zuletzt genannte Form dieselbe ist, welche ich als *O. Actoniae* bestimmt habe, oder ob die beiden nahe verwandten Arten zusammen vorkommen, steht dahin.

Die Beziehungen der Fanna weisen nach Westen hin, wie schon die englischen Autorennamen erkennen lassen. Die böhmische Stufe D₂ (Königshofer Schiefer und Kossover Granwacke), welche diesem Horizonte entsprechen würde, besitzt eine abweichende Faciesentwicklung, so dass nähere Vergleichenungen ausgeschlossen werden. Als faunistischer Unterschied sei jedoch das Fehlen der Gattung *Porambonites* in Böhmen hervorgehoben.

B. Das Obersilur.

1. Allgemeines.

Das Obersilur bildet in Bezug auf die Entwicklung der Facies die wenig veränderte Fortsetzung der Manthener Schichten. Eine zufriedenstellende Trennung ist daher nur dort möglich, wo Versteinerungen vorkommen. Im Obersilur übertreffen die Kalke und zwar vor allem die banten Orthocerenkalke die Schiefer an Mächtigkeit; die letzteren erscheinen fast nur als Einlagerungen. Die Umwandlung der Gesteine durch Gebirgsdruck ist weniger weit vorgeschritten. Eruptivmassen und Grünschiefer fehlen vollkommen. Die Mächtigkeit des Obersilur beträgt durchschnittlich ca. 400 m, am Wolayer Thörl etwas weniger (ca. 350 m), am Kok wahrscheinlich etwas mehr. Die Mächtigkeit des Untersilur ist also um das Vier- bis Fünffache grösser.

Die klastischen Gesteine (Thouschiefer, Kieselschiefer und Granwacke) sind dort, wo dieselben versteinierungslos sind, was fast immer der Fall ist, von den gleichartigen untersilurischen Gesteinen nicht zu unterscheiden und wurden daher durchgehend mit derselben Farbe bezeichnet.

a) Die tiefste Zone des Obersilur wird von den durch STACHE entdeckten Graptolithenschiefen des obersten Uggwathales gebildet (Profil-Tafel I S. 15). In den schwarzen stark bröckeligen Schiefen habe ich bei mehrfachen Besuchen des augenblicklich sehr schlecht angeschlossenem Vorkommens nur unbestimmbare Abdrücke von *Monograptus* gefunden. STACHE hat in der Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft 1878 S. 327 eingehendere Angaben gemacht: *Rastrites peregrinus* BARR., *Diplograptus folium* und *pristis* HUSING., *Diplograptus acuminatus* NICHOLS., sowie *Monograptus sp. sp.* sind häufig, *Climacograptus* selten, *Cladograptus* und *Dendrograptus* zweifelhaft. STACHE vergleicht die Zone mit den böhmischen Schichtgruppen D₃ und E₁. Nun lassen sich aber in den Graptolithenschiefen der letzteren Stufe drei Zonen unterscheiden und zwar von unten nach oben a) mit *Diplograptus*, *Climacograptus*, *Rastrites peregrinus* BARR. und *Monograptus lobiferus*, b) mit *Monograptus priodon*, c) mit *Monograptus colonus* und *testis* (J. KREJCI und K. FEJSTMANTEL, Uebersicht des Silurischen Gebietes im mittleren Böhmen S. 68). Es bedarf wohl keiner weiteren Ausführung, dass die Kärntner Graptolithenschiefer der tiefsten böhmischen Zone, dem Rastritenschiefer vollkommen entsprechen. Da man nun die letzteren allgemein zum Obersilur rechnet, erscheint STACHE'S Ansicht kaum annehmbar, der den Kärntner Horizont „eher dem Untersilur als dem Obersilur anschliessen“ möchte. Wollte man dem genannten Forscher folgen, so müsste gleichzeitig der Nachweis erbracht werden, dass der unterste Theil von E₁ zum Untersilur gehört.¹⁾

¹⁾ Auch ein Vergleich mit den übereinstimmenden Graptolithenschiefen des südlichsten Schwedens (Schonen) beweist, dass im Sinne der allgemein angenommenen Gliederung die Kärntner Graptolithenschiefer zum untersten Obersilur gehören. Nach TULLBERG (Zeitschr. d. deutschen geol. Gesellsch. 1883 S. 227) wird die Grenze von Ober- und Untersilur in Schweden, Böhmen, England durch das erste Auftreten der Monograptiden gekennzeichnet; *Rastrites peregrinus* erscheint sogar (l. c. S. 236) erst in der dritten Zone des Obersilur von unten gerechnet. *Diplograptus acuminatus* ist das Leitfossil des untersten obersilurischen Horizontes. Dass die Kärntner Graptolithenschiefer die Leitformen mehrerer Zonen in sich enthalten, wurde schon von STACHE bemerkt; doch

Graptolithenschiefer werden von TARAMELLI aus dem oberen Inearajo-Thal (Casa Meledis) angeführt. Ich habe dort schwarze kohlige Schiefer gefunden, welche petrographisch mit denen des Uggwathales übereinstimmen und ebenfalls in unmittelbarem Zusammenhang mit Orthocerenkalken stehen, war aber nicht so glücklich, Graptolithen in denselben zu entdecken.

Im Profil des Uggwathales werden die Graptolithenschiefer durch Kalke mit unbestimmbaren Orthoceren unmittelbar überlagert. Am Wolayer Thörl fehlen Schiefer in diesem Horizonte. Hier lagern unter den eigentlichen Orthocerenkalken schwarze hornsteinreiche Plattenkalke, aus denen als einziges bestimmbares Fossil ein Durchschnitt eines *Cameroerinus* HALL. (= *Lobolithus* BARR.) zu nennen ist. Diese eigentümlichen Gebilde finden sich in Böhmen im Obersilur (E₂) und im Staate New-York an der unteren Grenze des Unterdevon (Lower Helderberg).

Die eigentlichen Orthocerenkalke werden überall, wo eine bestimmbare Fauna gesammelt werden konnte, in einen tieferen und einen höheren Horizont getheilt:

- b) die Zone des *Orthoceras potens*,
- c) die Zone des *Orthoceras alticola*.

Die palaeontologischen Eigentümlichkeiten der beiden Zonen erheischen eine Besprechung in gesonderten Abschnitten. Abgesehen von den Schieferzügen, welche besonders am Hohen Trieb und Findenigkofel den Orthocerenkalken in unregelmässiger Weise eingelagert sind, findet sich an dem letzteren Berg ein wenig mächtiger Kalkzug mit verkieselten ober-silurischen Riffkorallen, der einer der oberen Zonen entsprechen dürfte. Graphisch würden die verschiedenen Zonen und Faciesbildungen des Karnischen Obersilur etwa folgendermassen darzustellen sein:

werden diese Zonen, bei deren minutiöser Unterscheidung man im Norden wohl eher zu viel als zu wenig gethan hat, sämmtlich zum Obersilur gerechnet.

Palaeontologische Zonen.	Faciesbildungen	Aequivalente in Böhmen.
d) Obere Grenzzone mit <i>Orthoceras Richteri</i> ,	Unregelmässige Einlagerungen von Thonschiefer,	} E ₂
e) Zone des <i>Orthoceras alticola</i> (Kalk),	Kleselschiefer und Grauwacke in verschiedenen	
b) Zone des <i>Orthoceras potens</i> (Kalk),	Horizonten.	
a) Graptollthenschiefer mit <i>Diplograptus</i> , <i>Rastrites</i> , <i>Climacograptus</i> .	Schwarze Plattenkalke am Wolayer Thörl mit <i>Camero-crinus</i> .	E ₁

Die Selbständigkeit einer oberen dritten Zone mit *Orthoceras Richteri* bleibt angesichts der unzulänglichen Beobachtungen unsicher; die wichtigeren Versteinerungen des Orthocerenkalkes vertheilen sich in folgender Weise auf die Zonen:

Unterdevon mit Goniatiten.

Oberste Zone	<i>Orthoceras Richteri</i> BARR.	
Zone des <i>Orthoceras alticola</i>	<i>Orthoceras alticola</i> , <i>subannulare</i> , <i>pectinatum</i> , <i>firmum</i> , <i>electum</i> . <i>Harpes unguis</i> , <i>Encrinurus</i> n. sp., <i>Bronteus</i> , <i>Arctusina</i> . <i>Bellerophon</i> , <i>Murchisonia attenuata</i> , <i>Pleurotomaria extensa</i> , <i>Platyceras</i> . <i>Antipleura bohemica</i> , <i>Lunulicardium omissum</i> , <i>Cardiola cornu copiae</i> . <i>Nucleospira inelegans</i> , <i>Petraia semistriata</i> .	Abweichende Facies, Korallenkalk: <i>Actinostroma interlineatum</i> , <i>Monticulipora petropolitana</i> , <i>Alveolites Labechei</i> , <i>Cyathophyllum angustum</i> .
Zone des <i>Orthoceras potens</i>	<i>Cheirus propinquus</i> , <i>Encrinurus Novaki</i> , <i>Bronteus</i> , <i>Arctusina</i> , <i>Cyphaspis</i> , <i>Phacops</i> , <i>Sphaerexochus</i> . <i>Orthoceras potens</i> , <i>originale</i> , <i>truncatum</i> , <i>dulce</i> , <i>Gomphoceras</i> , <i>Cyrtoceras</i> , <i>Trochoceras</i> . <i>Platyceras cornutum</i> , <i>Polytropis discors</i> , <i>Murchisonia attenuata</i> , <i>Natiria carinthiaca</i> . <i>Cardiola cornu copiae</i> , <i>persignata</i> , <i>Lunulicardium</i> , <i>Tiaraconcha</i> .	
	Aequivalente von E,	

2. Das Profil des Wolayer Thörls.

Für die Kenntniss des alpinen Obersilur und Devon bleibt das schon früher in der Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft (1887 S. 683) von mir beschriebene Profil des Wolayer Thörls und der darüber liegenden Kellerwand nach wie vor die Grundlage. Eine ununterbrochene versteinungsreiche Schichtenfolge ist von der Basis des Obersilur bis zum Oberdevon nachgewiesen; wenn dieselbe angesichts der Steilheit der devonischen Kalkwände nicht ohne Unterbrechung zugänglich ist, so kann doch über den Zusammenhang des Ganzen ein Zweifel nicht bestehen. Hier soll vorläufig nur von dem Obersilur und der Basis des Devon die Rede sein.

Die Veränderungen, welche die nachfolgende Beschreibung anweist, bestehen im Wesentlichen in Erweiterungen der palaontologischen Verzeichnisse.

Jedoch ist die „weisse Kalklage STACHE'S mit *Cheirurus Sternbergi*, *Rhynchonella princeps*, *convata*, *Spirifer secans* und *viator*“ aus der Schichtenfolge entfernt worden (l. c. S. 648). Ich hatte auf Grund der Angaben des genannten Forschers (Zeitschrift der deutschen geol. Ges. 1885 S. 337) die Vermuthung ausgesprochen, dass diese Kalklage irgendwo in den schwarzen Kalkschiefern läge und von mir übersehen worden sei. Nachdem ich jedoch im Ganzen zwölf Tage auf die geologische Untersnehmung des kleinen Gebietes verwandt habe, ohne die weisse Kalklage zu finden, halte ich diese Vermuthung für unwahrscheinlich; viel näherliegend ist die Annahme, dass die erwähnten Brachiopoden aus einem von der gegenüberliegenden Wand stammenden Kalkblock herrühren und dass die Bestimmung der beiden spezifisch obersilurischen Arten (*Sp. viator* E₂ und *Rh. convata* E₂) zu revidiren ist. Die drei anderen Arten sind im Wesentlichen unterdevonisch und erscheinen im höheren Obersilur in ganz vereinzelt Exemplaren. Die Grenzstellung zwischen E₁ und E₂, welche STACHE für die obige Kalklage annimmt, hat somit auch angesichts der unveränderten Bestimmungen des genannten Forschers etwas Gezwungenes. Auch sonst habe ich die von mir beobachtete Schichtenfolge nur ganz im



Abbildung 82. Nach einer photogr. Aufnahme von Professor K. Meller und Skizzen des Verfassers gez. von O. Berner.

Das Profil des Wolayer Thörl (2136 m).
(Obersilur. — Unterdevon)

Im Vordergrund die permirenden Firnsfelder, Zahlen der Schichten wie im Text. Im Vordergrund 3. Zone des Orthoceras silicea (unter Orthocerasstele). Am Abhang des Bauhoffels (N): 4. Rote Kramerskalk (100 m) mit sparsamen Orthoceren. 5. Unteres Devon. Kramerskalk mit *O. isozepidatus*. Ob. Thonschiefer (Sa. Grauwacke ist perspektivisch verdickt). 7. Graue massive Kalk. 8. Plattenkalk n. Thonschiefer mit *Strophomenella*. 9a. Mammifer grauer Kalk. 9b. Eisenstein. 10. Zone der Rhynch. Megara. 11. Unterdevontlicher Birkbach mit Brachiopoden etc., unten andeutlich geschichtet, oben massiv.

Allgemeines mit den Angaben STACHE'S in Einklang zu bringen vermocht und sehe daher von einem weiteren Eingehen auf dieselben ab.

Die Zahlen der Schichten stimmen mit dem früher veröffentlichten Profil sowie der Beschreibung überein. Die Schichtgruppen 1 und 2 finden sich im obersten Theile des Valentintales, die Lage der übrigen ist aus der Abbildung ersichtlich. Die Angaben über die Mächtigkeit beruhen auf blosser Schätzung.

1. Grauer und schwarzer Plattenkalk mit Hornsteinausscheidungen. Ca. 200 m. (Durch ein zu spät bemerktes Versehen ist auf der Profil-Tafel IV S. 76 dieser, dem nteren Obersilur zuzurechnende Kalk als ntersilurisch bezeichnet worden.) Unbestimmbare Orthoeren und Crinoidenstiele sind selten; wichtig für die Altersbestimmung ist ein *Cameroerinus*.

2. Zone des *Orthoceras potens*.

2a. Unterer Eisenkalk; ein knolliger, sehr fester dunkler Kalk, viel Rotheisenstein enthaltend und daher rostbraun verwitternd. 15—20 m.

Die Fauna ist an anderen Fndorten (vergl. unten) reicher als am Wolayer Thörl:

Cheirurus propinquus MSTR. (= *Quenstedti* BARR.). (E₂).

Orthoceras potens BARR. (E₂). Syst. Silur. t. 386, 386, 388, f. 4—6. t. 404, f. 1—3.

" *truncatum* BARR.

" *zonatum* var. *littoralis* BARR. (E₂).

" cf. *pelagium* BARR.

" sp.

Murchisonia aff. *attenuatae* LINDSTR.

Cardiola spuria MSTR. sp. (= *persignata* BARR. E₂).

2b. Grauer Plattenkalk mit schlecht erhaltenen Orthoeren. Ca. 30 m.

In den Schichtgruppen 1 und 2 herrscht steiles SW-Fallen, das nun nach S umbiegt (60—70°).

3. Zone des *Orthoceras alticola*. Unterer rother Orthoerenkalk, mit granem Kalke wechsellagernd. Die Schichten sind in einer Mächtigkeit von 15 m. ganz erfüllt von vortrefflich erhaltenen Orthoerearesten. Alle anderen Versteinerungen sind selten.

Harpes unguis BARR.? Syst. Silur. I t. 8. f. 2—6. Ein wegen ungünstiger Erhaltung nicht ganz sicher bestimmbares Bruchstück des Kopfes. E₂.

Enerinurus nov. sp. (verschieden von *Enc. Novaki*, welcher in der tieferen Zone vorkommt).

Bronteus sp.

Primitia sp.

Orthoceras alticola BARR. Die gemeinste Art. (Syst. Sil. Vol. II. t. 359 f. 1—5. Ztschr. der deutschen geol. Ges. 1887. S. 731. t. 29 f. 13—13 b.) E₂.

" *firmum* BARR. Recht häufig. (l. c. t. 397 f. 10—22. t. 426 f. 11—13.) E₂.

" *electum* BARR. var. Ziemlich häufig. (l. c. t. 260 besonders f. 18, 25); war früher als *O. intermittens* bestimmt. Bei den alpinen Exemplaren, die sämtlich nur geringe Grösse erreichen, sind die Kammerwände durchgängig etwas weiter von einander entfernt, als bei den böhmischesen.) E₁ E₂.

" *Michelini* BARR. Ziemlich häufig. (l. c. t. 381.) E₂

" *amoenum* BARR. Ein Exemplar. (l. c. t. 395 f. 11, t. 283.) E₁ E₂.

" *pleurotomum* BARR.? Ein Exemplar. (l. c. t. 296.) E₁ E₂.

" *subannulare* MSTR. bei BARR. Ein Exemplar. (l. c. t. 253, f. 11, t. 283.) E₁ E₂ und Elbersreuth.

" cf. *Neptunium* BARR. Selten. (l. c. t. 274.) E₂.

Bellerophon nov. sp. (Gruppe des *B. bilobatus*.)

Pleurotomaria sp.

Cardiola cornu copiae GOLDF. (= *C. interrupta* SOW. et auct.) E₂.

Lunulicardium omissum BARR. (l. c. Vol. VI. t. 237, f. IV.) E₂.

Antipleura bohemicum BARR. E₂.

Glussia oboratu SOW. bei BARR.? (l. c. Vol. V. t. 84 I, f. 5, 6, 7.) E₂—G.

Meristella tumida BARR. non DALM. (l. c. Vol. V. t. 11, f. 3, 4; die alpine Art stimmt mit der Abbildung BARRANDE'S

überein, welche letztere jedoch mit der bekannten
 Gotländer Form nichts zu thun hat.)

Petraia semistriata MSTR. E₂ und Elbersreuth.

4. Graue und rothe, zum Theil hellgefärbte, wohlgeschichtete Kalke, hier und da als echter Kramenzelkalk entwickelt, mit sparsamen Orthoceren. Ca. 100 m.

Ueber dieser 100 m. mächtigen Kalkmasse liegt höchst wahrscheinlich die Grenze von Silur und Devon, wie das Vorkommen zahlreicher Goniatiten in der nächsten Zone zeigt. (Vergl. das folgende Kapitel.)

5. Thonschiefer und Kramenzel(-Knollen)-Kalk; Zone des *Tornoceras inexpectatum* und *Cyrtoceras miles*. Tiefster Devonhorizont.

5a. Thonschiefer, z. Th. grauackennähnlich ausgebildet. 6 m.

5b. Grauer und rother Kramenzelkalk. 10 m. Die Aufschlüsse auf der Ostseite des Thörls sind weniger leicht zugänglich; auf der Westseite setzen die steil aufrichteten Kalke das ganze Nordgehänge des Thales zusammen, reichen bis zum Wolayer See hinunter und bilden die nördliche Begrenzung desselben. (Vergl. Taf. XV.) Versteinerungen sind keineswegs selten aber meist verdrückt und schlecht erhalten:

Beloceras nov. sp. Ein Bruchstück, welches die charakteristischen Suturen und die zusammengedrückte Form der Schale deutlich erkennen lässt.

Tornoceras Stoecki FRECH. (Zeitschrift der deutschen geolog. Ges. 1887. S. 733. t. 28, f. 9—11 a.)

„ *inexpectatum* FRECH. L. e. S. 733. t. 28, f. 10—10 b.

Anarcestes lateseptatus BEYR. Die häufigste Art. L. e. S. 732. t. 28, f. 12, 12 a.

Aphyllites sp.

Cyrtoceras miles BARR. Nicht selten.

Gomphoceras sp.

Orthoceras sp.

Crinoidenstiele.

6. Thonschiefer und Granwacke.

6a. Feste, dünnshiefrige Grauwacke mit einer Conglomeratbank. 6 m.

6b. Bläulicher, dünngeschichteter Thonschiefer, in der Mitte eine 2 m. mächtige Bank von Kieselschiefer. Wohl entwickelt auf dem Ostabhang des Thörls. 20 m.

7. Graue massige, von wenigen Schichtungsfugen durchzogene Kalke, versteinungsleer. 25 m. Dieselben treten auf der Höhe des Thörls (Fig. 82) und unter den Wänden des Seekopfs (Taf. XV) deutlich hervor.

8. Plattenkalk und Thonschiefer. 33 m.

8a. Grauer Plattenkalk; an der Basis mit einer Schicht, die aus kalihaltigem Wad und kalkhaltigem, braun verwitterndem Rotheisenstein (8x) besteht. In 8a *Cyrtoceras* (?) sp. mit eng gestellten Kammerwänden.

8b. Rother, versteinungsleerer Kramenzelkalk. 20 m. Am Thörl und unterhalb des Seekopfes (Taf. XV).

8c. Thonschiefer (wie 6b) nur am Ostabhange des Thörls und am Seekopf sichtbar. 5 m.

9. Massiger Kalk und Eisenoolith.

9a. Massiger, grauer Kalk, nur am Ostabhange des Thörls sichtbar. 10 m. Derselbe scheint nach dem Seekopf zu gänzlich auszuweichen; wenigstens ist am Nordabhange desselben keine Spur mehr sichtbar.

9b. Brauner, feinkörniger Eisenoolith mit Quarzkörnern. 5 m. Derselbe ist vorzüglich am Westabhange des Thörls aufgeschlossen und am Seekopf mit der folgenden Schicht unter einer Nummer zusammengefasst.

10. Zone der *Rynchonella Megaera*. Grauer, sehr dünn geschichteter Plattenkalk, nur am Westabhange des Thörls und am Seekopf sichtbar. 6 m. An der unteren Grenze, unmittelbar im Hangenden des Eisenoolithes liegt am Thörl die leicht wieder zu findende Bank von Crinoidenkalk mit Brachiopoden. Die Farbe dieses fast nur aus organischen Resten bestehenden Kalkes ist braun oder schwarz. Am häufigsten kommt *Rynchonella Megaera* und — auf eine bestimmte Lage beschränkt — *Retzia* (?) *umbra* vor. Ebenso




Seetopf und Wolayer See.

Der devonische Riffkalk (11) ist in seinem oberen Theile massig, in seinem unteren wesentlich geschichtet. Darunter lagern die aus Pittumkalk (10), Thonchiefer (8c), Krammalkalk (8b mit 9x Rothsestein) und (7) massigem grauem Kalk bestehenden tiefen Devonablagerungen. 5 Zone des Gem. Inaxspectätes.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Бережья ильа Волгал. геа



1881/82

№ 100



Photograph by Dr. H. H. H. H. H. H.

Seckkopf und Wolayer-See.
Deutscher Riffack.

Photograph by Dr. H. H. H. H. H.

finden sich die Orthoceren nur in einer dünnen Schicht. Andere Brachiopoden (*Atrypa*, *Athyris*, *Nucleospira*) sind ebenso wie Schnecken und Zweischaler selten. Das Verzeichniss der Versteinerungen findet sich in dem folgenden, das Devon behandelnden Kapitel.

11. Darüber folgt der unterdevonische Riffkalk, der in seinen unteren und oberen Theilen undeutlich geschichtet, im Uebrigen massig ist (Taf. XV). Nähere Angaben über die Gesteinsbeschaffenheit und Versteinerungsführung enthält das folgende Kapitel.

3. Die Fauna der Orthocerenkalke und ihre Verbreitung.

a) Zwischen Wolayer See und Oharnach-Alp.

Obersilurische Orthocerenkalke sind westlich von dem Wolayer Gebiet fossilführend nicht bekannt; allerdings ist es im höchsten Grade wahrscheinlich, dass in den stark metamorphosirten bunten Kalkphylliten der Paralba auch Vertreter dieses Horizontes versteckt sind. Nach Osten zu streichen die leicht kenntlichen Orthoceren-Schichten fast ununterbrochen bis zur Oharnach- und Meledisalp weiter, wo an den oben beschriebenen Querbrüchen die Trias und das Oberearbon erscheinen. Ein östlich gelegenes Verbreitungscentrum bildet der Kok und der Osternigg; doch wird auch hier das höhere Silur durch den grossen Längsbruch abgeschnitten, welcher spitzwinklig zu dem Streichen der älteren Schichten verläuft. Noch weiter östlich tauchen am Seebergsattel in den Karawanken oberilurische Orthocerenkalke auf, welche zweifellos mit den Karnischen übereinstimmen, aber nur unbestimmbare organische Reste geliefert haben.

In der unmittelbaren östlichen Fortsetzung des Wolayer Profils liegen die Orthocerenkalke des Cellonvorberges (Vergl. S. 84 u. 85), welche die Schichtenfolge des erstgenannten Vorkommens in verschiedenen Beziehungen ergänzen. Abgesehen von der deutlich ausgeprägten Verwerfung, welche das Obersilur des Vorberges von dem Devon des Hauptgipfels trennt und vor allem die Grenzschichten von Devon und Silur (Schicht 6—10 = 120 m.) abschneidet, findet sich noch eine Reihe von untergeordneten Störungen und Schichtenbiegungen;

dieselben sind jedoch für den Aufbau des Gebirges ohne besondere Bedeutung und wurden daher in dem tektonischen Theile nicht erwähnt.

Der Sockel des Vorherges besteht sowohl im Osten (Plöcken) wie im Norden (Valentintal) aus Thonschiefer; ich habe denselben in meiner früheren Darstellung mit dem unmittelbar östlich angrenzenden Calmschiefer des Angerthales vereinigt, glaube jedoch jetzt, dass derselbe noch zum Silur zu rechnen ist. Petrographische und palaeontologische Unterscheidungsmerkmale fehlen. Der Thonschiefer erstreckt sich weit nach Westen in das Valentintal hinein und die Annahme eines solchen Spornes jüngerer Gesteine zwischen Devon und Silur erscheint höchst unwahrscheinlich, während dagegen das Vorhandensein eines Querbruches sowohl im Norden wie im Süden der kritischen Stelle deutlich erkennbar ist. Die Lagerung des Schiefers (Streichen NW—SO saiger ganz unten; südliches Fallen weiter oben am Ostabhang) ist angesichts der zahlreichen Störungen ohne besondere Bedeutung.

Jedoch scheint — soweit die nicht sonderlich günstigen Aufschlüsse einen Rückschluss gestatten — der

1. hornsteinführende graue Kalk den Thonschiefer concordant zu überlagern. Diese Kalke, welche nur verkieselte Crinoidenstiele enthalten, entsprechen der ebenfalls mit 1 bezeichneten Schichtengruppe des oberen Valentintales (die Nummerierung bleibt auch weiterhin übereinstimmend). Die Kalke sind im Allgemeinen dickbaukiger als jene, stellenweise dolomitisch und hie und da von Thonschieferlagen durchsetzt. Sie erscheinen als deutliches, weithin sichtbares Band am Abhang. Unterhalb des Höhenpunktes 1610 m. wird das Einfallen flach und biegt nach ONO um, eine Aenderung, welche durch zahlreiche Schichtenbiegungen und kleine Brüche verdeckt wird. Auch die weiter im Hangenden folgenden Schichtengruppen lagern flach.

2. Oberhalb des Punktes 1610 m. findet man grauen Orthoererkalk mit undeutlichen organischen Resten = Zone des *Orth. potens*.

3. Darüber folgt rothbraun verwitternder Eisenkalk mit zahlreichen unbestimmbaren Orthoereren; ein weiter westlich gelegener Aufschluss mit besser erhaltenen Versteine-

rungen gehört wohl demselben Horizonte an. Hier wurde die Leitform *Orthoceras alticola* BARR. in grossen Mengen gefunden; ausserdem sammelte ich *Cheirurus propinquus* MSTR. (= *Quenstedti* BARR.) und *Brontcus* sp. Auch ein am Ostabhang lose gefundener Block von schwarzem Kalk enthielt — wenngleich weniger häufig — die bezeichnende Art *Orthoceras alticola* und ausserdem zahlreiche Exemplare von *Orthoceras pectinatum* BARR. (Syst. Silur I. t. 261, f. 8—13, t. 275, f. 14—19.)

Weniger häufig sind:

Arctusina Haueri FRECH (sonst in der Zone des *Orth. potens* am Kok).

Pleurotomaria extensa HEIDENHAIN var. (die karnische Form ist mit der evolventen Art des nordischen Graptolithengesteines nahe verwandt).

Platyceras nov. sp. (eine kleine, Strophostylus ähnliche Form mit einem Ansschnitt unter der Naht).

Murchisonia attenuata LINDSTR.

Nucleospira inelegans BARR.? (Syst. Silur. Vol. V. t. 85, f. 1).

Petraia sp.

Ausserdem fand sich am Cellon lose das Bruchstück eines *Trochoceras*, das den Windungsquerschnitt und die Sculptur von *Trochoceras pulchrum* BARR. besitzt. (Syst. Silur II. t. 28, f. 1—8. E₂.)

4. Ueber der Zone des *Orth. alticola* lagert:

4a. Thonschiefer (welcher am Thörl fehlt) in ziemlicher Mächtigkeit.

4b. Kramenzelkalk mit *Orthoceren*.

Derselbe bildet die höchste Erhebung des Vorberges und fällt flach nach NO ein. Hier schlug ich aus dem anstehenden Gestein ein gut bestimmtes *Orthoceras* mit perlchnurförmigem Siphon (*O. Richteri* BARR. l. c. Vol. II. t. 318, 322, 323. E₂).

Dass die oberen *Orthoceren*kalke 4b dem mit 4 bezeichneten Horizonte am Thörl entsprechen, kann keinem Zweifel unterliegen; weniger sicher ist die Entscheidung darüber, ob man für diese obere an sich hinlänglich mächtige (100 m.) Schichtengruppe eine besondere Zone annehmen darf. Die Auffindung einer besonderen *Orthoceras*-Art ist hierfür kaum hinreichend.

Der Devonkalk des Pollinigg und die denselben begrenzenden Dislocationen unterbrechen den Orthocerenkalk für eine kurze Strecke; am Elferspitz (Abb. 30 S. 78) setzt der letztere wieder auf. Nördlich von dem Steilabsturz derselben fand sich auf dem Würmlacher Alpl (S. 77) in den Eisensteinhalden eine kleine Fanna mit *Orthoceras potens* BARR. und *Orthoceras dulce* BARR.?, *O. transicus* BARR., *Marchisonia* sp. und *Phacops Grinburgi* FRECH? Welcher der beiden Zonen dieser ursprünglich in einem Gesehiebe gefundene Trilobit angehört, wird durch das vorliegende wegen ungünstiger Erhaltung nur annähernd bestimmbare Exemplar nicht sicher festgestellt.

Das weitere Fortstreichen der in verschiedene Züge gespaltenen Orthocerenkalke über den Hohen Trieb bis zu den östlichen Querbrüchen ist ebenso wie die eigentümliche Blattverschiebung auf S. 67—73 beschrieben worden. Die an der Oharnachalp zahlreich vorkommenden und schon von STUR erwähnten Orthoceren sind meist schlecht erhalten. Doch zweifle ich nicht, dass man bei hinlänglichem Zeitanfande auch in diesen schwer zugänglichen Gegenden gute palaeontologische Ergebnisse erzielen würde: Das Auftreten von *Orthoceras alticola*, *O. subannulare* und *Marchisonia attenuata* in einem Gesehiebe lässt das Vorkommen der gleichnamigen Zone in diesem Gebiete gesichert erscheinen. Das betreffende Stück wurde von mir zwischen dem Grossen Pal und dem Tischlwanger Kofel gesammelt und kann, da in der Umgebung Culm und höheres Devon ansteht, nur durch Gletschertransport vom Hohen Trieb hingeführt worden sein.

b) Die obersilurischen Korallen am Findenigkofel.

Von besonderem Interesse ist das Vorkommen obersilurischer Korallenkalke zwischen Findenigkofel und Torrente Cerevesa.

In meiner früheren Arbeit war als leicht wahrnehmbarer Localunterschied des Karnischen Unterdevon und Obersilur das Fehlen von Orthoceren bzw. Rifkorallen hervorgehoben worden. Das mehrfach beobachtete Erscheinen von *Petraia semistriata* MSTR. (Osternigg, Zone des *Orth. alticola*) bestätigte die Regel, insofern diese kleine Einzelkoralle auch in anderen

Horizonten an das Auftreten der Cephalopoden, also an pelagische Faunes gebunden ist.

Jedoch ist aneh die Hauptregel von einigen Ausnahmen durchbrochen worden, trotzdem dieselbe im Allgemeinen ihre Giltigkeit beibehält. Im Riffkalk des Unterdevon findet sich ein vereinzelt Vorkommen von Orthoceren und in dem obersten Horizonte des Obersilur erscheint am Südatang des Findenigkofels bei Paularo eine Kalkbank mit verkieselten Riffkorallen. In geringer Entfernung von diesem Fundorte sammelte ich an der Alp Peccol di Chial in einem graurothen Kramenzkalk ein vereinzelt Stück von *Monticulipora petropolitana* PAND., eine kleinzellige Form, wie sie mir in einem nicht unterscheidbaren Exemplar aus dem Wenlockkalk von Wenlock Edge vorliegt.

Die kleinen Korallenstücke aus dem Kiesalk dürften die ersten Ansiedelungen der Riffkorallen sein, welche zur Zeit des Devon so gewaltige Bauten aufgeführt haben. Für diese Anschauung spricht aneh der Umstand, dass die Obersilurformen generisch mit denen des Unterdevon übereinstimmen. Nur sind die letzteren reicher an Gattungen und Arten.

Die Namen der bisher bestimmten Arten sind:

Actinostroma intertextum NICHOLS. Brit. Stromatop. t. 13, f. 8—11 S. 138. (Wenlock limestone, Iron Bridge.)

Monticulipora petropolitana PAND. (etwas grosszelliger als die Untersilur-Form).

Heliolites decipiens M'COY. Wegen schlechter Erhaltung nicht ganz sicher bestimmbar.

Alveolites Labechei M. EDW. et H.

Cyathophyllum angustum LONSDALE.

„ „ sp.

Die typischen Obersilurformen wie *Goniophyllum*, *Stauria*, *Acerrularia*, *Omphyma* und *Ptychophyllum* fehlen also. Hingegen stimmen die Arten gut mit baltischen und englischen Formen überein, von denen Original Exemplare zum Vergleich vorliegen.

Eine Berücksichtigung der böhmischen Korallen ist nicht möglich, da die Herausgabe des betreffenden Bandes des Systems Silurien noch nicht erfolgt ist.

STACHE erwähnt einen durch SUESS am Schönwipfel (nahe dem Kok) gesammelten grauen-Kalk, in dem die Korallen in Form von halbverkieselten Auswitterungen hervortreten. Derselbe dürfte ebenfalls oberilurisches Alter besitzen.

e) Die Orthocerenkalke des Kok.

(Zone des *Orthoceras potens*.)

Die an gewaltigen Längsbrüchen eingesunkenen Massen triadischer Kalke biegen östlich vom Gartnerkofel und Schinnz wieder auf den Südahang der Hauptkette hinüber und in den so entstandenen flachen Ansbuchtungen finden sich Gesteine von oberilurischem und devonischem Alter. Durch Profile (S. 15 und 20, 21) und Beschreibungen (S. 22, 23) sind die geologischen Verhältnisse am Kok geschildert worden.

Da die höheren rothen, der Zone des *Orthoceras alticola* gleichzustellenden Kramenzelkalke ausser unbestimmbaren Orthoceren nichts geliefert haben, erübrigt es nur ein Verzeichniß der in dem tieferen Eisenkalke vorkommenden Arten zu geben. Ich habe auf der alten, palaeontologisch jetzt gänzlich ausgeboteten Halde neben dem Bergmannshäuschen (Abb. 8 S. 24) nur einige Versteinerungen gesammelt, um das Niveau zu bestimmen. STACHE bereitet seit längerer Zeit eine Monographie dieser Fauna vor und hat darüber in den Verhandlungen der Geologischen Reichsanstalt (1890 S. 121) eine vorläufige Mittheilung gegeben. Die nicht von mir herrührenden Bestimmungen sind im Folgenden mit (St.) bezeichnet.

Aus den eigentlichen dunkeln, das Rotheisensteinlager begrenzenden Orthocerenkalken sind zu nennen:

Chelururus propinquus MSTR. (= *Ch. Quenstedti* BARR.).

Archusina Haueri FRECH (Zeitschr. d. deutschen geolog. Ges. 1887. S. 736. t. 29, f. 11).

Eucrinurus Noraki FRECH. Die häufigste Trilolitenart. (l. c. S. 735. t. 29, f. 5—9.)

Bronteus sp.

„*Acidaspis, Cyphaspis, Ampyx, Proctus, Illacnus, Dionide, Sphaerocochus, Lichas, Phacops* und *Plumulites*“ (St.).

- Orthoceras poteus* BARR. (Mit dieser, an sich wohl begründeten Art dürften eine ganze Anzahl Barandescher Species zusammenfallen.)
- „ *truncatum* BARR.
- „ *pleurotomum* BARR. (Syst. Sil. II t. 296). E₁ E₂.
- „ *originale* BARR. (l. c. t. 267, f. 1—9.)
- „ *Micheliini* BARR. (l. c. t. 381.)
- Cyrtoceras patulum* BARR. (l. c. t. 110, f. 1—6, t. 26, f. 13—16, t. 204, f. 8—15; ein junges, seitlich stark comprimirtes Exemplar mit einfachen, horizontalen Anwachsstreifen, das jedoch wegen seiner geringen Grösse nicht ganz sicher bestimmbar ist. Uebrigens bedarf auch bei *Cyrtoceras* die Zahl der von BARRANDE benannten Arten einer erheblichen Verminderung.)
- Gomphoceras* sp. (aus rothem Kalk am Ostabhang).
- „*Trochoceras*, *Nautilus* und wahrscheinlich auch *Goniatites*, *Hyalithes*, *Conularia*, *Cornulites*“ (St.).
- Murchisonia attenuata* LINDSTR. (= *Lo. roucma*? *attenuatum* LINDSTRÖM, Silurian Gastropoda. t. 18, f. 3—5.)
- Polytropis discors* SOW. sp. (*Horiostoma* od. *Oriostoma* anet.); ein kleines Exemplar mit der charakteristischen Sculptur.
- Natiria cariniata* STACHE sp. (Die Unhaltbarkeit der KAYSER'schen Gattung *Spirina*, unter welchem Namen STACHE diese charakteristische Schnecke erwähnt, ist inzwischen von KOKEN nachgewiesen worden.)
- „*Pleurotomaria*, *Holopella*, *Naticopsis*“ (St.). Im Ganzen ca. 30 Arten von Gastropoden. (St.)
- Cardiola cornu copiae* GF. (= *interrupta* SOW. anet.)
- „ *gibbosu*, *signata*, *migrans*, *contrastans* BARR. etc. (St.)
- Præluccina* sp.
- „*Tiaraconcha* cf. *decurtata* BARR. sp. (= *Slava*¹⁾), *Matercula*.

¹⁾ In den devonischen Aviculiden, Abb. d. preuss. geol. Landesanstalt IX, 3, S. 249, 250, habe ich den Versuch gemacht, die czechischen Namen der böhmischen Zweischaler in einer der wissenschaftlichen Nomenclatur entsprechenden Weise zu verändern. In einem kurze Zeit darauf veröffentlichten posthumen Werke NEUMAYRS findet sich eine ausführliche Darstellungen der Palæococonchen, deren Namen ebenfalls in lateinischer

(= *Maminka*), *Lunulicardium*, *Hemicardium*, *Conocardium*.
 „*Orthis* aff. *humillima* BARR., *Strophomena* aff. *tristis* BARR.;
Dayia (*Atrypa*) *navicula* BARR.; *Atrypa* *canaliculata* BARR.:
Meristella *ypsilon* BARR.“ (St.)
 „*Mouograptus* aff. *prionon*, *Retiolites* n. sp.“ (St.)
Petraia *semistriata* MSTR.

Eine etwas verschiedene Fauna enthält der schwarze Kalk, welcher besonders durch den Reichtum an Beyrichien ausgezeichnet ist, sich aber wohl nur durch die Faciesentwicklung, nicht durch die stratigraphische Stellung von dem Orthocerenkalk unterscheidet. Derselbe enthält ausser den Ostracoden:

Platyceras *cornutum* HIS. sp.

Præluçina *resecta* BARR. sp. ? (*Dalila* BARR., Syst. Sil.
 Vol. VI, t. 49 und t. 353, f. 9).

Lunulicardium nov. sp. verwandt mit *L. undulatum* BARR.
 l. c. t. 240, f. I.

Carliola sp.

Leptynoconcha *bohemica* BARR. sp. (= *Tænka* BARR. — vergl.
 die vorhergehende Anmerkung — l. c. t. 217, f. I,
 13, 14.)

4. Vergleichenungen mit dem Obersilur anderer Länder.

Wie bereits in dem vorhergehenden Abschnitte bemerkt wurde, sind schiefrige, bezw. phyllitische Gesteine von silurischem Alter in den Ostalpen recht verbreitet. Dass neben den Vertretern des Untersilur auch obersilurische Schichten vorkommen, ist keineswegs unwahrscheinlich, aber nur an wenigen Orten durch Versteinerungen sicher erweisbar.

In erster Linie ist hier die Gegend von Vordernberg und Eisenerz in Steiermark zu nennen (STUR, Geologie der Steiermark S. 90—96; STACHE, Zeitschrift d. deutschen geolog. Ges. 1885. S. 286). Hier findet sich eine mächtige aus schiefrigen und kalkigen Gesteinen bestehende Schichtenfolge, deren Hangendes der zum Unterdevon (F—G) gehörende Sauberger

Form erscheinen. Z. Th. stimmen die von NEUMAYR und mir vorgeschlagenen Aenderungen überein: *Kralouca-Regina*, *Panenska-Puella*. (Abhandl. d. Wiener Akademie. Bd. 35, S. 24 ff.)

Kalk¹⁾ bildet. Im Liegenden dieses Kalkes erscheinen (von oben nach unten):

4. Obere körnige Grauwacke.
3. Schwarze Thonschiefer mit Eisenkies und Orthocerenresten.
2. Grauwackenschiefer, z. Th. gran., z. Th. grünlich, Talkschiefer ähnlich.
- 1b. Untere körnige Grauwacke.
- 1a. Halbkristalline Thonschiefer mit Einlagerungen von weissem körnigem Kalkstein und Chloritschiefer an der Basis.

Unter 1a liegt der Quarzphyllit.

Da eine Discordanz in den oberen Theilen dieser Schichtenfolge nicht beobachtet ist, so erscheint die Zurechnung eines allerdings nicht näher bestimmbareren oberen Theiles (etwa von 3 und 4) zum Obersilur unabweisbar.

Noch ähnlicher sind den Karnischen Gesteinen die dunklen Orthocerenkalke des Krumpalbi-Gebietes nordwestlich von Vordernberg, deren petrographische Uebereinstimmung von STACHE ausdrücklich hervorgehoben wird.

In der „nördlichen Grauwackenzone“ liegt das schon 1847 durch v. HAUER bekannt gewordene Dientener Obersilurvorkommen; doch haben die späteren Untersuchungen nur wenige neue Anhaltspunkte gegeben. Eine vollständige Uebersicht der durchweg zum Silur gerechneten Gesteine und ihrer Verbreitung hat STUR veröffentlicht (Geologie der Steiermark S. 96). Auch ich kann nur hervorheben, dass die schiefrigen, phyllitischen und kalkigen Gesteine, die ich in der Gegend von Steinaach-Irdning und Radstadt²⁾ gesehen habe,

¹⁾ Die neuerdings von VACEK aufgestellte und von HOERNES energisch bekämpfte Annahme, dass die Erzformation dem Perm zugehöre, ist für die vorliegende Frage belanglos, da VACEK die Erzformation von den Kalken mit ihren devonischen („obersilurischen“ l. e.) Versteinerungen trennt. Vergl. Verhandlungen der Geolog. Reichsanstalt 1886 S. 72 und HOERNES, Mittheilungen d. naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark 1887. S. A. S. 8.

²⁾ Heller Sericitphyllit bei Radstadt (erscheint in den Karnischen Alpen an der oberen Grenze des Quarzphyllites); blaue und grünliche Thonschiefer sowie grünliche glimmerhaltige Quarzitschiefer bei Filzmoos südlich von Radstadt.

durchaus mit den Manthener Schichten übereinstimmen; auch letztere übertreffen ja das Karnische Obersilur um das Drei- bis Vierfache an Mächtigkeit.

Bei Dienten beobachtet man nach LIPOLD und STACHE (l. c. S. 282) die folgenden Schichten von unten nach oben:

- I. Quarzphyllit, darüber
- II. Violette, dünnblättrige Glanzschiefer (den Uebergang zu I bildend).
- III. Versteinerungsführendes Obersilur: Schwarze Thon- und Kiesel-Thonschiefer, Kalke und eisen-späthige Dolomite.
 1. Unterer Schiefer:
 - a) Schwarzer, graphischer Schiefer.
 - b) Eisensteinlager mit Graphitschiefer, Pyritknollen und den Versteinerungen.
 - c) Fester schwarzer Schiefer.
 2. Feinblättriger Schiefer mit zwei Lagermassen von Eisenstein führendem Kalk.
 3. Schwarzer Grauwackenschiefer.

IV. Körnig-schiefrige Grauwacke.

STACHE hält die Dientener Fauna für eine Grenzbildung von E_1 und E_2 (oder für die Basis von E_2) und erwähnt auf Grund vorläufiger Bestimmungen die folgenden Arten (Verhandl. d. Geolog. Reichsanstalt 1890, S. 123.):

Orthocerus fasciolatum BARR., *Storulites* BARR., *Serrutulum* BARR., *Novellum* BARR., *Srmitaere* BARR., *Calter* BARR., *confraternum* BARR., *infundibulum* BARR.

Cardiola cornu copine GF., *fluctuans* BARR., *bohemica* BARR., *insolita* BARR. und einige neue mit böhmischen nahe verwandte Arten.

Doulina longiuscula und neue Arten, verwandt mit *D. sedens* BARR. und *annulosa* BARR.

Leptynoconcha (Trnka, vergl. die obige Bemerkung) n. sp., verwandt mit *T. bohemica* BARR. und *Goniophorella* (Spanila) nov. sp. verwandt mit *Sp. cardiopsis*.

Der alte Fundort liegt an der Nagelschmiede; doch fand GÜMBEL auch am Altenberg und am Kollmaunsee Reste von Trilobiten und *Cardiola* cf. *cornu-copine*. Weiter östlich ent-

deckte derselbe Forscher bei dem Niekelerzstollu im Schwarz-Leogangthale Spuren „anzweideutiger Alpeu“ sowie grade Monograptus-Formen; auch die Schichtfolge in der Gegend von Saalfelden und Kitzbühel besitzt nach ihm die grösste Aehnlichkeit mit dem Dientener Silur. (Verhandl. d. geolog. Reichsanstalt 1888, S. 189.)

Dass die obersilurischen Bildungen der Ostalpen die unmittelbare Fortsetzung des mittelböhmischen Silur bilden, ist eine bekannte Thatsache und auch in der vorhergehenden Darstellung mehrfach hervorgehoben worden. Jedoch herrscht keine vollkommene Uebereinstimmung der Faciesentwicklung, wengleich die Verschiedenheit weniger gross ist, als etwa zwischen der Stufe D und den Mauthener Schichten: Die Graptolithenschiefer in Böhmen viel mächtiger und von Diabas- und Tufflagern durchsetzt; auch die schwarzen versteinungsreichen Knollenkalke und Kalkschiefer, welche die obere Grenze von E₁ kennzeichnen, ähneln nur im Allgemeinen den schwarzen Plattenkalkeu am Wolayer Thörl. Von den beiden Hauptfacies, welche sich in der Stufe E₂ unterscheiden lassen, hat nur der hellgraue Cephalopodenkalk (u. a. au der Dlouha hora) der durch den Reichtum an Zweischalern ausgezeichnet ist, in den bunten Orthocerenkalkeu der Karniseu Alpen ein Analogon. Jedoch bestehen noch hinreichende palaeontologische Unterschiede; so fehlen z. B. die eigentümlichen dunklen Ostracodeenkalke in Böhmen, und die petrographische Beschaffenheit ist so abweichend, dass eine Aufzählung der Unterschiede unnötig erscheint.

Die rothen obersilurischen Orthocerenkalke stimmen in Bezug auf die Faciesentwicklung vollkommen mit den untersilurischen Vaginatenkalkeu des Balticum, den rothen Goniatitenkalkeu des Oberdevou (Martenberg, Cabrières), den bunten Hallstätter und den „bunten Cephalopodenkalkeu“ des Lias überein. Eine vollkommene Gleichheit besteht petrographisch zwischen den erwähnten Gebilden und der Zone des *Orthoceras alticola*; die Eisenkalke der Zone des *Orth. potens* sind fast durehweg dunkler gefärbt.

Von sonstigen Obersilurbildungen kenne ich nur ein einziges Vorkommen, welches mit den letztgenannten Kalkeu vollkommen übereinstimmt; es ist der Orthocerenkalk von

Elbersreuth im Fichtelgebirge. Ueber die stratigraphische Stellung desselben besteht noch immer Unklarheit. Graf MÜNSTER hat den Orthocerenkalk des genannten Fundortes und den Clymenienkalk von Schübelhammer getrennt und die Sonderung sowohl in der Beschreibung der Fauna wie der Etikettirung der Sammlung sorgfältig durchgeführt; GÜMBEL führt in seiner Beschreibung des Fichtelgebirges (S. 486 ff.) die Versteinerungen als aus demselben Horizonte stammend an.

Nach einer Durchsicht des in München und Berlin befindlichen Materials, desselben, welches MÜNSTER und GÜMBEL¹⁾ vorgelegen hat, kann ich mit voller Bestimmtheit die Ansicht aussprechen, dass die Elbersreuther und Schübelhammerer Kalke nicht eine einzige Art mit einander gemein haben. Hingegen kommt die grosse Mehrzahl der sicher bestimmbar (d. h. in vollständigen Exemplaren vorliegenden) Arten des ersten Fundortes auch in der Böhmisches Stufe E₂ und ein Theil in dem Karnischen Orthocerenkalk vor. Die Identität einiger Orthoceren (z. B. *Orthoceras subannulare* MSTR.) (Elbersreuth, E₂, Stufe des *Orth. alticola*) wurde bereits von BARRANDE erkannt. Dass bei den Trilobiten, Zweischalern und Brachiopoden dasselbe Verhältniss obwaltet, ist dem genannten Forscher entgangen. Ich habe mich seit einiger Zeit mit dieser Fauna beschäftigt, aber noch keine Gelegenheit gefunden, die Untersuchung zum Abschluss zu bringen. Wenn auch an dem oben angeführten geologischen Ergebnisse nicht gezweifelt werden kann, so erschwert doeh die verworrene Synonymik die Fertigstellung der palaeontologischen Einzeluntersuchungen.

Zur Erhärtung dieser Angaben möge die vollständige Synonymik von *Cheirurus propinquus* und die Namen von einigen wichtigen übereinstimmenden Arten folgen:

Cheirurus propinquus MSTR. sp.

1846. *Calymene propinqua* MSTR. Beitr. III, S. 38, t. 4, f. 6.

„ *Sternbergi* id. ibid. S. 37, t. 5, f. 5.

Paradorides brevimucronatus id. ibid. S. 40, t. 5, f. 12.

¹⁾ Gumbel hat nur die Münchener Exemplare untersucht.

1846. *Cheirurus Quenstedti* BARRANDE, Note préliminaire, S. 50.
 1847. " " CORDA, Prodrôme. S. 134.
 1852. " " BARRANDE, Système silnrien I, S. 790. t. 40, f. 13, 14; t. 42, f. 2—4.
 1879. *Cheir. propinquus* GÜMBEL, Fichtelgebirge. S. 491. t. f. 10, 11, 13, 14.
 1888. *Cheir. Quenstedti* mut. *praeursor*. FRECH, Z. d. deutschen geol. Ges. 1887. S. 735. t. 29, f. 2, 3.

Die Gruppe des *Cheirurus insignis* BEYR. (*Cheirurus* s. str. bei F. SCHMIDT) ist auf Unter- und Obersilur beschränkt; es gehören hierzu ausser der vorliegenden Art *Cheirurus exsul* BEYR. (Untersilur), *claviger* BEYR. (D) u. s. w. Ein einziges Mal ist bisher eine hierher gehörige Form auf der Grenze von Silur und Devon (Zone der *Ithyuch. Megæra*) gefunden worden. Bei der Benennung der letzteren habe ich einen an sich unerheblichen Irrtum begangen, indem gerade diese Form als zum echten *Cheirurus propinquus* (= *Quenstedti*) gehörig bestimmt wurde. In Wahrheit sind, wie eine wiederholte Untersuchung zeigte, die als mut. *praeursor* bezeichneten Exemplare mit den bei Prag und Elbersreuth vorkommenden ident; die Mutation aus der Zone der *Ithyuch. Megæra* ist demnach als mut. *deronica* zu bezeichnen. Der Name MÜNSTER's verdient trotz gleichzeitiger Veröffentlichung den Vorzug vor demjenigen BARRANDE's, der seine Beschreibung ohne Abbildung publicirte.

Bemerkenswerth ist die ausserordentliche horizontale Verbreitung der Gruppe. *Cheirurus insignis* BARR., eine mit der beschriebenen Art nah verwandte Form findet sich in England und in einer kaum unterscheidbaren Localform (*Ch. niagarensis* HALL) im Staate New York sowie in Wisconsin und Illinois.

2. *Acidaspis gibbosa* MSTR. sp. (GÜMBEL l. c. t. B, f. 33. S. 489. *Trinucleus* bei MÜNSTER.)
 = *Acidaspis mira* BARR. E₂.
3. *Harpes franconicus* GÜMB. (= *Trinucleus gracilis* MSTR.)
 = *Harpes vittatus* BARR. E₂ (der letztere Name ist beizubehalten, da ein *Harpes gracilis* von SANDBERGER schon beschrieben ist).

4. *Cardiola cornu copiae* Gr.
= *Cardiola interrupta*, Sow. BARR. et auct. E₂ und Karnische Alpen. (Hiernach ist auch die Formationsbezeichnung der Abbildung in ZITTEL Handbueh II, S. 50, deren Original von Elbersreuth stammt, zu berichtigen.)
5. *Cardiola spuria* MSTR. sp.
= *Cardiola persignata* BARR. E₂ und Zone des *Orth. potens* n. a. Zeitschr. d. deutschen geol. Ges. 1887, t. 29, f. 12.
6. *Petraia semistriata* MSTR. Auch in E₂ und in den Karnischen Alpen. Die Art wurde von mir früher als aus dem Oberdevon stammend beschrieben.
7. *Antipleura plicata* MSTR. sp.
= *Dualina tenuissima* BARR. E₂.
8. *Dualina? lata* MSTR. sp.
= *Dualina robusta* BARR. E₂.
9. *Dualina? interpunctata* MSTR. sp.
= *Dualina iners* BARR. E₂.
10. *Praelucina intermedia* MSTR. sp.
= *Paracardium amygdalum* BARR. E₂.
11. *Praelucina subsimilis* MSTR. sp.
= *Lunulicardium diopsis* BARR.
Leptynoconcha triangula MSTR. sp.
= *Tenka* BARR. (die Gattung nur im Obersilur).
12. *Pentamerus subcurvatus* MSTR. sp.
= *Pentamerus linguifer* BARR. n. s. w.

Das versteinungsarme thüringische Obersilur hat manche Beziehungen zu Böhmen und zu den Ostalpen. Die „unteren Graptolithenschiefer“ sind der Stufe E₁ zu parallelisieren, mit deren ältester Zone ja der Graptolithenschiefer des Osternigg vergleichbar ist. Der Ocker- oder Interrupta-Kalk entspricht E₂ bzw. den Orthoocerenkalken von Elbersreuth und Kärnten. Schlecht erhaltene Orthooceren sind auch in dem thüringischen Horizonte vorgekommen.

Die Fauna des südfranzösischen Obersilur ist noch zu wenig bekannt, um eingehendere Vergleiche hinsichtlich der Zonengliederung zu gestatten. Doch deuten die wenigen Formen, die ich dort sammelte und die etwas zahlreicheren

Arten, welche französische Forscher in den Pyrenäen, ferner in Nordfrankreich und Catalonien gefunden haben, durchaus auf Böhmen und die Ostalpen hin. Die Facies der bituminösen „schistes ampélitens“ mit ihren schwarzen Thonschiefern und Kalkknollen, mit ihren Orthoceren, Graptolithen und Palaeoconchen ist allerdings genau die gleiche, welche wir bei Dienten und an der oberen Grenze von E₁ bei Prag gefunden haben. Auch die Vorkommen der Sierra Morena, der Inseln Elba und Sardinien besitzen denselben Charakter. Für das Obersilur bestätigt sich also die Annahme einer mediterranen bis nach Mittelddeutschland reichenden Meeresprovinz, der „grande zone centrale“ BARRANDE'S.

In der Gegend des heutigen französischen Centralplateaus etwa bestand, wie die vollkommene Uebereinstimmung der betreffenden Ablagerungen in Nord- und Südfrankreich heweist, eine Verbindung mit dem nordischen, bis nach Amerika reichenden Silurmeer. Man kann daher schon a priori annehmen, dass die eingehendere Untersuchung der nordischen und mediterranen Obersilurfauna einige Beziehungen zu Tage fördern wird.

Von den nordischen Faciesbildungen hat das Graptolithengestein noch die meiste Aehnlichkeit mit unseren Orthocerenkalken und steht dem mittleren Theil derselben auch im Alter gleich. Einzelne Arten wie *Pleurotomaria extensa* HEIDENHAIN, *Murchisonia attenuata* LINDSTR., *Glossia obovata* SOW. und *Rhynchonella Sappho* BAUR. kommen sogar noch in den Alpen vor. Immerhin bleibt die Verschiedenheit der nordischen und mediterranen Schichten weit grösser als die Aehnlichkeit, wie die Vergleichung von beliebigen Gotländer oder englischen Sammlungen mit solchen aus der Prager Gegend einem Jeden heweisen wird. Es sei nur hervorgehoben, dass das forncureiche Heer der sogenannten Palaeoconchen mit verschwindenden Ausnahmen (*Cardiola*, *Lunulicardium*) in England fehlt. In neuerer Zeit ist von JAEKEL die Vermuthung ausgesprochen worden, die Annahme, dass in Böhmen und England eine ausserordentlich verschiedene Fauna lebte, „werde eine sehr bedeutende Einschränkung erfahren“. (JAEKEL, Zeitschrift der deutschen geolog. Gesellschaft 1889, S. 712.) Die Untersuchung der typischen Localitäten und ihrer Faunen hat mich zu der Ansicht geführt, dass die faunistische Verschiedenheit recht bedeutend ist.

IX. KAPITEL.

Das Devon.

Faciesentwicklung und Gesteine in den Karnischen Alpen und Karawanken.

Abgesehen von den Schichten der Grazer Gegend herrscht innerhalb des reich gegliederten südalpinen Devon eine bemerkenswerthe Einförmigkeit in der Ausbildung der Facies. Nur die unterste und oberste Zone besteht aus Cephalopodenkalken; sonst finden sich durchweg reine Korallenkalke, welche hie und da reich an Braehiopoden und Crinoiden sind. Auch in den oberen und unteren Grenzbildungen ist Kalk die vorherrschende Gebirgsart.

Nur vereinzelt kommen andere Gesteine vor; so die Schiefereinlagerungen an der unteren Grenze des Devon, eine quarzitische Lage am Pollinigg (Unterdevon) sowie dolomitische Kalke, welche in geringerer Ausdehnung am Pollinigg und der Hartkarspitz, als vorherrschendes Gestein an der Porze auftreten.

Unter den Kalkvarietäten herrscht ein hellgraner oder weisslicher Kalk in sämtlichen Devonhorizonten (mit Ausnahme des obersten und untersten) bei Weitem vor. Veränderungen werden vor allem durch dynamische Vorgänge bedingt; dieselben verursachen in erster Linie das Verschwinden der organischen Structur, insbesondere bei den Korallen; letztere treten zuweilen noch an angewitterten Flächen, nicht aber im Schliiff, als schattenhafte Umrisse hervor. Ein weiteres Stadium ist die Umkrystallisirung des Kalkes selbst, die jedoch niemals bis zu der rein körnigen Ausbildung vorschreitet. Am meisten umgewandelt sind die schmaleren Kalkzüge des Polndnigg-Osternigg, der Porze und der Königswand.

Von weiteren Kalkvarietäten ist ein schwarzer, durch zahlreiche Gastropoden gekennzeichneter Kalk im Unterdevon des Wolayer Thörl, ein schneeweisser Brachiopodenkalk im Oberdevon des Kollinkofels gefunden worden, während rothe Knollenkalke das tiefste Unterdevon (*Zone des Goniatites inc. spectatus*) kennzeichnen. Dieselben kommen in nicht umgewandelten Zustände nur am Wolayer Thörl vor. Doch sind die halbkristallinen Bänderkalke am Bladener Jöchl, vielleicht auch die Kalkphyllite des Torrente Chiarso und des Monte Palmolina (Porze, Val Visdende) umgewandelte Gesteine des gleichen Horizontes.

Eine etwas abweichende Beschaffenheit zeigen endlich noch die grauen wohlgeschichteten Plattenkalke des obersten, Clymenien führenden Devon.

Die Faciesentwicklung der Korallenkalke mit den localen Anhäufungen anderer Thierreste setzt weit nach Osten, bis in die Karawanken fort; die Lücke zwischen dem Osternigg und dem Seebergsattel ist nur durch Dislocationen oder Denudation der Devonkalke zu erklären. Ich habe früher die Ansicht vertreten, dass die, den verschiedenen Horizonten vom Obersilur bis Oberdevon angehörenden Kalkvorkommen der Gegend von Vellach als normale riffartige Einlagerungen der Schiefer und Phyllite aufzufassen seien. Auch FRIEDRICH TELLER hat in seinem Aufnahmebericht¹⁾ von „Lagermassen“ gesprochen, welche den Schiefen mit gleichem Fallen und Streichen untergeordnet wären, jedoch keine weiteren theoretischen Folgerungen versucht — was auch bei der Undeutlichkeit der Aufschlüsse der richtigste Ausweg war. Ich bin seitdem durch mündliche Besprechungen mit Herrn Dr. TELLER, vor allem aber durch die Untersuchung der, zahlreiche Vergleichspunkte darbietenden Gegend der Liköfl- und Königswand zu einer etwas abweichenden Auffassung gelangt.²⁾ Im Westen der Karnischen Alpen kann man an den dortigen vortrefflichen Aufschlüssen beobachten, dass die der Schieferserie eingelagerten Bänderkalke durch allmäligen petrographischen Ueber-

¹⁾ Verhandlungen der geologischen R. A. p. 268, 269.

²⁾ Eine erneute Untersuchung der Vellacher Gegend ist allerdings nicht erfolgt, würde auch bei der Unzulänglichkeit der in Betracht kommenden Aufschlüsse kaum von besonderem Erfolge gekrönt sein.

gang mit denselben verbunden sind, während sich an der Grenze der eingefalteten bzw. eingepressten devonischen Riffkalke stets mechanische Druekerscheinungen bemerkbar machen, die an den erstgenannten Stellen fehlen.

Es liegt nun jedenfalls nahe, die in einer gut aufgeschlossenen Gegend seither gewonnenen sicheren Ergebnisse auch auf die Karawanken zu übertragen und somit anzunehmen, dass nur die tiefste obersilurische Bänderkalkzone den Schiefen eingelagert sei, während die, zu den verschiedensten Devonhorizonten gehörigen Kalkmassen Einfaltungen darstellen. Die thatsächlichen geognostischen Beobachtungen können — bei ihrer Unzulänglichkeit — mit der einen wie mit der anderen Auffassung in Einklang gebracht werden. Auch der Aufsatz PENECKES steht dem nicht entgegen, da derselbe im Wesentlichen nur die auf einer gemeinsamen Exeursion gemachten Beobachtungen wiedergibt. (Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 1887.)

Die von PENECKE (l. c. S. 270) veröffentlichten Beobachtungen über die Riffböschung und die Riffsteine am Rappoldriff lassen jedenfalls eine abweichende Deutung zu und sind daher auch in meinem ersten Aufsätze nicht berücksichtigt worden. Die Blöcke nehmen mit der Entfernung vom Riffe an Grösse ab und verändern ihre mineralogische Beschaffenheit: „Der Kalk derselben wird immer mehr krystallinisch, reichlich von durch Metalloxyde gefärbter Kieselsäure durchtränkt und von Quarzadern durchzogen, und schliesslich ist in den kleinsten und vom Riff entferntesten Blöcken der Kalk ganz ausgeblüht und durch Kieselsäure ersetzt, so dass sie kaum oder gar nicht mehr von den in den Phylliten überall eingelagerten Quarzlinsen unterschieden werden können.“

Von der beschriebenen Pseudomorphose von Kieselsäure nach Kalk, habe ich mich an der betreffenden Stelle nicht überzeugen können, glaube hingegen, dass die fraglichen Quarze eben die Quarzlinsen der Phyllite sind. Im übrigen habe ich die Beschreibung deshalb wiedergegeben, weil dieselbe Wort für Wort auf jede mechanische Contactstelle zwischen Kalk und Schiefer in den Karnischen Alpen passt (Cellonkar, Rathhanskofel). Der einzelne Punkt könnte allerdings auch als eine durch Gebirgsbildung veränderte Riffböschung aufgefasst werden, weil eben eine kräftige Faltung alle ursprüngliche Struktur

zu verwischen vermag. Doch steht der Gesamtaufbau des Gebirges hiermit nicht in Einklang. Man darf somit annehmen, dass die Riffentwicklung in dem Kärntner Devon von der Königswand bis Vellach, also auf einer Strecke von mindestens 170 km. vorherrschte, ohne dass gleichzeitig thonige oder sandige Sedimente zum Absatz gelangten. Diese ausschliessliche Herrschaft des kalkigen Sediments ist keineswegs etwas Ungewöhnliches, sondern kennzeichnet u. a. das höhere Mitteldevon der Eifel.

I. Das tiefste Unterdevon.

(Die Zonen des *Goniatites inexpectatus* und der *Rhynchonella Megarra*.)

Das tiefste Unterdevon enthält Versteinerungen nur am Wolayer Thörl (vergl. die betreffenden Abschnitte); die metamorphosirten Gesteine des Bladener Jöchl und das seiner Altersstellung nach zweifelhafte Vorkommen des oberen Chiasso thals (S. 69) haben ihre ursprüngliche Structur vollkommen verloren. Aus den rothen Kramenzelkalken sind Thonfaserkalken und Kalkphyllite geworden. Oberhalb des Cañon des Torrente Chiarso erscheinen in unmittelbarem Zusammenhang mit den scheinbar sehr mächtigen Kramenzelkalken graue dichte Kalke, welche an die der Kellerwand erinnern aber leider nur unbestimmbare organische Reste enthalten. Das an sich nicht unwahrscheinliche Vorkommen von unterem Devon wurde daher kartographisch nicht ausgeschlossen.

Die durch neue Aufsammlungen etwas vermehrte Fauna der Zone des *Goniatites inexpectatus* besteht aus folgenden Arten:

Beloceras nov. sp. 1 Ex.

Tornoceras Stachei FRECH.

„ *inexpectatum* FRECH.

Anarcestes latescriptatus BEYR. (Die häufigste Art.)

Aphyllites nov. sp. aff. *Zorgensi* A. ROEM. (= *fecundus* BARR.)

Cyrtoceras miles BARR. (E₂) Mehrere Exemplare.

Gomphoceras sp.

Orthoceras sp.

Crinoidenstiele.

Die bemerkenswerthe Erscheinung in dieser kleinen Fauna ist das *Beloceras*, welches dem oberdevonischen *Beloceras multilobatum* zweifellos am nächsten steht. Die zahlreichen spitzen Loben sind an dem vorliegenden Bruchstück gut erhalten, über die Form der Schale lässt sich nur soviel sagen, dass dieselbe zusammengedrückt war und einen scharfen Rücken hatte. Ausserdem kommt für den Vergleich nur noch *Celaceras praematurum* BARR. aus dem böhmischen Unterdevon in Betracht.

Das Erscheinen dieser oberdevonischen Typen im Unterdevon verliert etwas von seinem Auffallenden, wenn man bedenkt, dass auch TSCHERNYSCHEW einen nahen Verwandten des *Goniatites intumescens*, *Mantioceras Stuckenbergi* aus dem tiefsten Devon des Ural (Belaja-Kalk) beschrieben hat. Derselbe kommt am Hüttenwerke Michailowsk zusammen mit einigen glatten eigentümlichen Merista-Arten (*Merista globus* und *prunum*) vor, welche vollkommen den Typus der am Rhein in der „Greifensteiner Faies“ (vgl. unten) vorkommenden Brachiopoden tragen.

Es liegen also jetzt aus dem Unterdevon bereits Vertreter von fast sämtlichen Goniatitengruppen vor, welche im Mitteldevon und nütren Oberdevon ihre Hauptentwicklung erfahren:

Beloceras (Wolayer Thörl).

Mantioceras (Ural).

Celaceras praematurum (G₂).

Tornoceras (Kärnten, Cabrières).

Macuoceras (Cabrières).

Mimoceras (Böhmen, F₂; bis zum Mitteldevon).

Pinacites (Böhmen F₂; bis zum Mitteldevon).

Aphyllites (Böhmen F₂; Wolayer Thörl bis zum Mitteldevon).

Anarcestes (Böhmen F₂; Wolayer Thörl bis zum Mitteldevon).

Macuoceras und *Tornoceras*, besonders aber *Mantioceras* und *Beloceras* dürften somit zu den „intermittirenden“ Typen zu rechnen sein; d. h. dieselben sind zur Mitteldevonzeit nach einem nicht näher bestimmbarcn Theile des alten Devonmeeres angewandert und später wieder zurückgekehrt.

Während in der unteren Zone die devonischen Typen — mit Ausnahme des *Cyrtoceras miles* — bei weitem vorwiegen,

enthält die höhere durch eine nicht sonderlich mächtige Folge von Schiefem, Granwacken und Kalken getrennte Zone eine „Spnerstienfauna“ von vorwiegend silurischem Gepräge:

Cheirurus propinquus BARR. mut. *deconica* nov. nom. 1 Ex.
(vergl. oben S. 241).

Orthoceras Argus BARR. Häufig.

Murchisonia Megaerae nov. nom.¹⁾

Platyeras cf. *naticoides* A. ROEM. bei Kays.

„ cf. *cornutum* HISING.

Modiolopsis sp.

Vlasta (?) nov. sp.

Atrypa marginalis DALM. 1 Ex.

Nucleospica pisum SOW. 2 Ex.

Athyris subcompressa mut. *progona* FRECH. Ziemlich häufig.

„ cf. *fugitiva* BARR. sp. Häufig.

„ *obolina* BARR. sp. Häufig.

Retzia? *umbra* BARR. sp. Sehr häufig.

Rhynchonella Megaera BARR. sp. Gemein.

„ *Zelia* BARR. sp. Häufig.

„ *Sappho* var. *hircina* BARR. sp. Häufig.

Petraia sp.

2. Das mittlere Unterdevon.

Ueber den beiden tieferen Grenzonen folgt am Wolayer Thörl der unterdevonische Riffkalk mit seinen reichhaltigen Anhäufungen von Brachiopoden, Gastropoden und Crinoiden. Schon früher habe ich ein Verzeichniss der Arten veröffentlicht; doch ergaben die fortgesetzten Ansammlungen an dem nur 1—2 Monate schneefreien Fundorte zwischen dem Thörl und dem See noch vieles Neue.

Für die nachfolgende Liste ist zu bemerken, dass die sicher bestimmbareren und genauer untersuchten Arten der leichteren Uebersicht wegen mit Manuscriptnamen bezeichnet werden. Leider konnte aus Mangel an Mitteln die Abbildung

¹⁾ So bezeichne ich die früher als *Murchisonia* cf. *attenuata* Lindstr. abgebildete Form. (Zeitschr. deutsche geol. Ges. 1887 p. 730 t. 28, f. 1.) Neu gesammeltes Material aus dem Karnischen Obersilur erwies sich als vollkommen übereinstimmend mit der Gotländer Art, während die vorliegende Form ein wesentlich höheres Gewinde besitzt.

nicht im Zusammenhang mit der geologischen Beschreibung erfolgen.

Die Bezeichnung *sp.* deutet auf die Unmöglichkeit näherer Bestimmung hin; *nov. sp.* bezeichnet solche Formen, deren Verschiedenheit von bekannten Arten nachweislich ist; *W.* bedeutet Wolayer Thörl, S. Seekopf-Thörl, V. obere Valentin alp.

Harpes venulosus CORD. W.

Cheirurus gibbus BEYR. W.

Bronteus sp. W.

Calymene reperta OEHL.? W. Bull. soc. géol. de France. [3.] Bd. 17. t. 18, f. 1. (Die oft genannte „*Calymene Blumenbachi*“ aus dem Unterdevon von Erbray); der vorliegende nicht sonderlich erhaltene Kopf stimmt in allen wahrnehmbaren Merkmalen mit der, durchweg in verdrücktem Zustande erhaltenen französischen Form überein.

Proetus sp. W.

Trochoceras nov. sp. W.

Orthoceras nov. sp. aff. deycuero BARR. W. Syst. Sil. Vol. II. t. 356, f. 1—6.

Cytoceras pugio id. ibid. t. 156, f. 18—23, t. 308, f. 13—16 (= *C. perornatum* id. ibid. t. 511, f. 1—5) F₁.

Pleurotomaria Grimburgi nov. sp. mser. W. Grosse evolte Form aus der Gruppe der *Pl. labrosa* HALL.

„ *nov. sp.* W. Eine Form aus der Gruppe der *Pl. delphinoloides* GF. mit niedrigem Gewinde und mit breitem Schlitzband.

„ *sp.* BARROIS, Faune d'Erbray. t. 15, f. 4. p. 214.

Marchisonia Daryi BARROIS W. (= *M. Verneuli* BARRANDE *mser.*; auch bei Konieprus (Subgenus *Coelocaulus* OEHL.).

„ *Lebescontei* OEHL. var. *alpina mser.* W. Unterscheidet sich von der nordfranzösischen Form (Bull. de la société d'études scientifiques d'Angers 1887. t. 7, f. 3) durch grössere Schlankheit des Gewindes.

Bellerophon pelops HALL var. *expansa* BARROIS W. Fossiles d'Erbray. t. 15, f. 14. S. 210.

- Bellerophon (Tropidocyclus) telescopus* nov. sp.
mscr. W. Eine breitrückige Form mit einem scharfen
Rande zwischen dem Rücken und dem offenen, alle
Umgänge zeigenden Nabel.
- Tremanotus fortis* BARR. W. F₂.
" *insectus* nov. sp. mscr. W. Eine grosse, auch
bei Konieprus vorkommende Form.
- Oxydiscus Delanoui* OEHLE. sp. W.
- Euouphalus carnicus* nov. sp. mscr. W. Verwandt mit
Eu. annulatus Gr.
- Trochus (Palaeotrochus) Annae* nov. sp. mscr. W.
" " *pressulus* TSCHERNYSCHUL. sp.
var. nov. *alpina* mscr. W. (Besitzt bei gleicher Grösse
einen Umgang weniger als die uralische Form „*Platy-*
schisma“ *pressulum* TSCHERN. Unterdevon.
- Macrochilos fusiforme* Gr. Mitteldevon.
- Callouema (? Macrochilos) Kayseri* OEHLE. W. (Bulletin
de la société d'étud. scient. d'Angers. 1887. t. 6, f. 1.)
- Loxonema subtilistriatum* OEHLE. ? W. (Bulletin de la
soc. d'études scientifiques d'Angers 1887. t. 7,
f. 1.)
" *ingens* nov. sp. mscr. S. Eine Riesenform mit
weit zurückgebogenen Anwachsstreifen, einer
deutlichen und einer undeutlichen Knotenreihe.
" ? *euantiomorphum* nov. sp. mscr. W. Eine
links gewundene, hochgetürmte Art ohne deutliche An-
wachsstreifen. Gattungsbestimmung daher unsicher.
- Holopea tumidula* OEHLE. W. Ibid. t. 6, f. 7.
- Polytropis lacta* BARR. sp. W. Konieprus (F₂) Ural
(= aff. *Turbo lactus* BARRANDE bei TSCHERNYSCHEW.
Die Art ist nahe verwandt mit *Cyclonema Guillevi*
BARROIS.)
- Polytropis involuta* BARROIS sp. ? W. *Horiostoma* BAR-
ROIS, Erbray t. 13, f. 8. S. 218.)
- Platyceras mons* BARR. W.
" = *plicatile* HALL.¹⁾ (Palaeontology of New

¹⁾ Die „Species“ von *Platyceras* bei Hall sind im Allgemeinen zu eng gefasst; es kann daher nur auf die Uebereinstimmung oder Aehnlichkeit

- York III. t. 59, f. 10; Shaly limestone der Lower Helderberg group.)
- Platyceras* aff. *retorso* HALL. W. (l. c. t. 59, f. 9, Shaly limestone).
- " *Sileni* OEHL. W. (Bull. soc. géol. de France [3]. Bd. 11. t. 16, f. 6, 7.
- " *cornutum* TSCHERN. W. (Unterdevon am Westabhang des Ural. t. 3, f. 29.)
- " 2 sp. W.
- Philhedra epigonus* nov. sp. msr. S. (Flache patellenartige Form, verwandt mit *Ph. radiata* KOKEN aus dem untersilurischen Brandstiefen von Kuekers.)
- Myalinoptera alpina* FRECH. W. (FRECH, Aviculiden des deutschen Devon. t. 18, f. 1, 1a. S. 139.)
- Avicula palliata* BARR. E₂ W.
- " *scala* BARR. mt. W.
- Amphicoelia europaea* nov. sp. msr. W.

Die aus dem amerikanischen Obersilur (Niagara group) beschriebene Gattung *Amphicoelia*, deren Selbstständigkeit ich früher für zweifelhaft hielt, stellt, wie einige Originalexemplare zeigen, eine wenig differenzierte Zwischenform von *Avicula* und *Myalina* dar. Die neue, am Wolayer See vorkommende Art ähnelt in der äusseren Gestalt den bei Chicago gefundenen Formen und ist mit feinen radialen Streifen bedeckt.

- Aviculopecten* sp. W.
- Gossetia*? nov. sp. W.
- Praeclucina insignis* BARR. sp. S. (= *Dalila insignis* BARR. Syst. Sil. VI. t. 354, f. 8, 11. F₁.)
- Conocardium artifex* BARR. W. F₂, Erbray (l. c. t. 199, f. II = *Conocardium Marsi* OEHL. bei BA-ROIS, Erbray t. 11, f. 4).
- " *nucella* BARR. W. F₂ l. c. t. 199, f. I.
- " *abruptum* BARR. W. F₂.
- " sp. S.

einzelner Formen mit der citirten Abbildung hingewiesen werden. Bei der oft schwierigen Gattungsbestimmung der Gastropoden habe ich mich des sachkundigen Beiraths von Herrn Prof. Dr. Koken zu erfreuen gehabt.

- Schizodus* ? nov. sp. W.
Orthonota nov. sp. aff. *perlatae* BARR. l. e. t. 256, f. 2.
Microdon discoideus BARR. sp. W. (*Astarte* BARR.)
Lunaticardium cf. *initians* BARR. sp.
Spirifer falco BARR. W. (l. e. t. 8, f. 17, 22.)
 " nov. sp. W. (verwandt mit *Sp. metuens* BARRANDE
 l. e. t. 2, f. 5).
 " *superstes* BARR. S.
 " cf. *superstes* BARR. W.
 " *Nerei* BARR. W. S.
 " *Thetidis* BARR. W. var.
 " *derelictus* BARR. W. V. (Syst. Sil. t. 74, f. 1,
 nahe verwandt mit *Spirifer viator* BARR. aus
 dem Obersilur.)
 " *infirmus* BARR. ? W. S. (l. e. t. 3, f. 11.)
 " *Najadum* var. *Triton* BARR. W.
Merista passer BARR. W. F₂. (Selten).
 " *herculea* BARR. W. F₂.
 " *securis* BARR. W.
 " *Hecate* BARR. ? W.
 " (? *Rhynchonella*) *Baucis* BARR. W. F₂. Greifen-
 stein.
Meristella Circe BARR. W.
Athyris subcompressa FRECH. S.
 " cf. *Philomela* BARR. V. W.
Retzia Haidingeri BARR. W.
 " *membranifera* BARR. sp. W.
 " nov. sp. W. (verwandt mit *R. decurio* BARR.).
Anoplothea ? nov. sp. (aff. *Retzia Dalila* BARRANDE, Syst.
 Silur. t. 36, f. III.)
Atrypa comata BARR. W. Häufig.
 " *reticularis* L. W. S.
Athyris Campomanesii Arah. Vern. W. Erbray (BAR-
 ROIS, Erbray t. 7, f. 6).
Karpinskia occidentalis nov. sp. inser. W.
Rhynchonella nympa BARR. W.
 " *nympa* var. *pseudolironica* BARR. W.
 (l. e. t. 153, f. XII, 3.)
 " *emaciata* BARR. W.

- Rhynchonella praecox* BARR. W.
 " *amalthea* BARR. W. S.
 " nov. sp. (verwandt mit *Rh. amalthea*). S.
 " *cognata* BARROIS. W. (Faune d'Erbray.
 t. 5, f. 5.)
 " *gibba* BARR. W. S. (*Rh. princeps* var. *gibba*
 BARR. — Subg. *Wilsonia*.)
 " *princeps* var. *surgens* BARR. W. V.
 " *Bureaui* BARROIS var. (Faune d'Erbray
 t. 5, f. 8. Subg. *Wilsonia*.)
 " nov. sp. (verwandt mit *Rh. fumula* var.
modica BARR. l. c. t. 35, f. X.)
- Pentamerus procerulus* BARR. W. (l. c. t. 119, f. 5.)
 " *procerulus* var. *gradualis* BARR. W. V.
 (l. c. t. 150, f. 4.)
 " *Sieberi* v. BUCH. V.
 " *Janus* BARR. F₂. S.
 " *optatus* BARR. W. F₂. (Es liegt die glatte
 und verhältnismässige schmale Form, Syst.
 Sil. t. 116, f. 6 sowie die breitere t. 22, f. 6
 vor.)
 " sp. V.
- Strophomena consobrina* BARR. var. nov. *carinthiaca*
 msr. W.
 " cf. *Phillipsi* BARR. S.
 " cf. *armata* BARR. W.
 " nov. sp. S.
 " (*Leptagonia*) *depressa* WAML. W. S.
- Orthis praecursor* BARR. W. (l. c. t. 5—8, f. 3.)
 " *palliata* BARR. W. S.
 " *occlusa* BARR. W.
 " *elegantula* DALM bei BARRANDE. W. (l. c. t. 65,
 f. III, 2.)
 " nov. sp. S. (verwandt mit *O. palliata*).
 " (*Platystrophia*) cf. *Bureaui* BARROIS. (Faune
 d'Erbray, t. 4, f. 13; die vorliegende Form unter-
 scheidet sich nur durch die geringere Anzahl der
 Rippen — 10 statt 14 — von der französischen Art.)

Orthis (Platystrophia) nov. sp. (verwandt mit *O. deperdita* BARROIS l. c. t. 4, f. 14 und „*Spirifer*“ *Peleus* BARRANDE l. c. t. 74, f. IV).

Streptorhynchus sp. (teste STACHE).

Von Crinoiden liegen ausser zahlreichen unbestimmbaren Stielgliedern Kelehe vor von:

Rhipidocrinus praecursor nov. sp. msr. W. (Die Art steht dem mitteldevonischen *Rh. crenatus* GF. nahe; den Hauptunterschied bildet die geringe Grösse der Parabasalia. Das dritte Interradiale in dem Analradium ist besonders dentlich.)

Heraerinus Rosthorni nov. sp. msr. W. (Eine auch bei Vellaeh vorkommende Art aus der Verwandtschaft von *H. pyriformis* SCHULTZE und *pateraeformis* SCHULTZE.)

Cyathocrinus nov. sp. W. (Verwandt mit dem ober-silurischen *C. longimanus* ANG.)

Dazu kommen zahlreiche Korallen, die der Masse nach alle übrigen organischen Reste überwiegen, und im Wesentlichen mit den noch immer unbeschriebenen böhmischen Arten übereinstimmen; dieselben gehören zu den Gattungen *Amplexus*, *Aspasmophyllum*, *Cyathophyllum* (mehrere Arten), *Endophyllum* (Cellonkofel, ein grosser Stock aus der Verwandtschaft von *End. hexagonum* FRECH), *Cystiphyllum*, *Favosites* (mehrere Arten, darunter eine im Unterdevon weit verbreitete, kleinzellige Form aus der Gruppe des *Favosites Goldfussi*), *Striatopora*, *Thecia*, *Aulopora*, *Heliolites*, *Monticulipora*, *Actinostroma*.

Von Korallen konnten bisher genauer bestimmt werden: *Aspasmophyllum tigersense* BARROIS sp. (= *Zaphrentis tigersensis* BARROIS, Faune d'Erbray, t. 3, f. 1 p. 32 = *Zaphrentis bohémica* BARRANDE msr.)

Cyathophyllum expansum M. EDW. et H. sp. (= *Ptychophyllum expansum* bei BARROIS l. c. t. 1, f. 3 p. 55 = *Cyathophyllum vezatum* BARRANDE msr.) Diese bisher nur in der Gehängescholle zwischen Gams- und Rauehkofel gefundene Art ist ein Vorläufer des mitteldevonischen *Cyath. helianthoides* und hat mit dem äusserlich ähnlichen, aber aus compacten Böden (ohne Blasengewebe) angebauten *Ptychophyllum* des Ober-silur nichts zu thun.

Die Anzahl der von mir bisher gesammelten Arten beträgt etwa 130.

Ausserhalb des versteinierungsreichen Wolayer Gebietes finden sich im Unterdevon der Karnischen Alpen fast nur Korallenreste, und zwar meist solche, die eine nähere Bestimmung nicht zulassen. Die bisher bekannt gewordenen Vorkommen sind Würmlaacher Alp, Mooskofel (*Alveolites* sp., *Monticulipora* sp.), Plenge (teste STUR, nach STACHE hier auch *Spirifer* cf. *togatus*), Hochweisstein (Durchschnitte von Korallen und Gastropoden in einem am Südabhang gefundenen Block), Hartkarstspitz (*Striatopora* sp.), Kalkzug der Königswand am Obstoanser See (teste STACHE).

Der letztgenannte Geologe hat auch aus dem Gebiete des Wolayer Sees noch einige weitere Namen unterdevonischer Arten veröffentlicht und zwar: *Atrypa lacerrata* BARR., *Atr.* cf. *Dormitzeri* BARR., *Rhynchonella cuneata* BARR., *Spirifer digitatus* BARR., *Strophomena Verneuili* BARR., ferner vom Seekopfkörl (Monte Canale) *Spirifer robustus* BARR., *Pentamerus integer* BARR. und *Conocardium prunum* BARR. Dass auch die obersilurische „weisse Kalklage“ mit *Spirifer secans*, *riator* und *Rhynchonella Niobe* mit grösster Wahrscheinlichkeit dem Unterdevon zufällt, wurde bereits erwähnt.

Das tiefere Unterdevon der Vellaacher Gegend, der fleischrothe Kalk des Pasterkfelsens und der Korallenkalk des Storzié steht den beschriebenen Bildungen der Karnischen Alpen gleich. Die Faciesentwicklung der ersteren ist etwas abweichend, da in dem Gestein Riffkorallen gänzlich fehlen. Trotzdem sind eine Anzahl von Arten mit Karnischen Formen ident:

Bronteus transversus BARR.

Platystoma naticopsis OEHL. var. *gregaria* BARR.

Platyceras Proteri OEHL. (Bull. soc. géol. de France [3]
Bd. 11. 1883. t. 16, f. 1—5 p. 608.

Euomphalus sp.

Præluccina sp.

Rhynchonella Latona BARR. (nahe verwandt mit *Rhynch.*
cmaciata).

„ *nympha* var. *pseudolivonica* BARR.

Rhynchonella princeps BARR.

Pentamerus optatus BARR.

Spirifer secans BARR.

Orthis cf. *palliata* BARR.

Strophomena pacifica BARR.

" cf. *bohemica* BARR.

Rhipidocrinus nov. sp. (verwandt mit *Rh. crenatus*, wie es scheint verschieden von *Rhip. praecursor*).

Hexacrinus Rosthorni nov. sp. mscr.

" nov. sp. (verwandt mit *Hex. exsculptus* GF.).

3. Das höhere Unterdevon.

Höheres Unterdevon, das zeitliche Äquivalent der böhmischen Stufen G₁ und G₂, ist in den mächtigen Rifffmassen der mittleren und westlichen Karnischen Alpen zweifellos vorhanden, aber nirgends versteinерungsführend bekannt. Aller Wahrscheinlichkeit füllt der obere graue Crinoidenkalk des Pasterkfelsens bei Vellach (Karawanken) diese Lücke aus.

Noch grösser ist die Uebereinstimmung bei den Korallenkalken, welche versteinерungsreich am SW Abhänge des Storsitsch anstehen und dort bereits von TIETZE und STACHE abgebetet wurden. Die wichtigsten von STACHE (l. c., S. 321) bestimmten Arten sind: *Phacops fecundus* BARR., *Calymene* sp., *Platystoma* cf. *naticopsis* var. *gregaria* BARR., *Conocardium prunum* BARR., *Con. quadrans* BARR., *Con. artifex* BARR., *Con. abruptum* BARR. und *Con. ornatissimum* BARR., *Rhynchonella nympha* BARR., *Pentamerus galeatus* DALM., *Pentamerus integer* BARR., *Streptorhynchus distortus* BARR. sp. u. s. w. Unter den von mir gesammelten Korallen befindet sich vor allem das weit verbreitete *Cyathophyllum expansum* M. EDW. et H. sp., *Favosites*-Arten aus der Verwandtschaft von *Favosites Goldfussi* M. EDW. et H. und *Fav. reticulatus* BLAINV, sowie *Striatopora* sp.

Die Hauptmasse des Kalkes am Seeländer Storsitsch vertritt wahrscheinlich den böheren (G₁) und tieferen (F₂) Horizont des Unterdevon. Herrschend sind — wie am Wolayer Thörl — graue Kalke mit Korallen und Crinoidenbröccien mit Brachiopoden, welche die Rifflücken ausgefüllt haben. Charak-

teristisch ist das Auftreten krystalliner Bänderkalke in unmittelbarer Verbindung mit den dichten Korallenbildungen.

Das nördlichste Vorkommen von Unterdevonkalk im Gebiete der Ostalpen liegt in der Gegend von Vordernberg-Eisenerz: Der „Sanberger Kalk“, der schon von älteren Autoren mit den Stufen F und G verglichen wurde, enthält *Favosites*, Pygidien von *Bronteus* (*Br. palifer* BEYR, *cognatus* BARR., *rhinoceros* BARR.) und *Cyrtina heteroclyta*.

Die Seeländer Crinoidenbreccie besteht vor allem aus massenhaften, wohl meist zu *Hexacrinus* und *Eucalyptocrinus* gehörenden Stielgliedern; weniger häufig sind die zugehörigen Kelche, Brachiopoden, Gastropoden und Korallen. Die Uebereinstimmung der Facies mit dem tieferen versteinungsreichen Unterdevon der Karnischen Alpen ist augenfällig und erklärt das Fortleben zahlreicher Arten in dem höheren Horizonte. Daneben finden sich andere Formen, die in Böhmen für G₁ bezeichnend sind. Die faunistische Verschiedenheit, welche hier zwischen den Horizonten F₂ und G₁ besteht, erklärt sich im Wesentlichen aus der heteropen Entwicklung derselben: In den dunkelen hornsteinreichen Knollenkalcken von G₁ treten Brachiopoden sehr zurück und Riffkorallen fehlen so gut wie gänzlich. Das Vorkommen zahlreicher Brachiopoden in dem mit G₁ verglichenen Horizonte der Karawanken bedingt die Ähnlichkeit desselben mit der böhmischen Stufe F₂.

Aus dem Crinoidenkalle des Pasterkfelsens bestimmte ich die folgenden Arten:

Phacops Sternbergi BARR. (G₁).

Cheirurus Sternbergi BARR. (F₂, G₁).

Proetus cf. *orbitatus* BARR. (F₂). Ein isolirtes Wangenschild.

Bronteus sp.

Acidaspis sp.

Orthoceras sp.

Bellerophon pelops var. *expansa* BARROIS? (wegen schlechter Erhaltung nicht ganz sicher bestimmbar).

Pleurotomaria sp.

Tremantodus involutus nov. sp. mscr. (durch grössere Involution von den beiden anderen Arten verschieden).

- Platystoma naticopsis* OEHL. var. *gregaria* BARR. (Ob. Unterdevon von Nordfrankreich und F₂).
- Platyceras Protei* OEHL.
 " *uncinatum* KAYS. (Unterer Wiederschiefer, Greifenstein, Cabrières).
- Loxonema? enantiomorphum* nov. sp. msr.
- Præluceina* sp.
- Conocardium prunum* BARR. (F₂).
- Spirifer Nerei* BARR. (F₂—G₁).
- " *derelictus* BARR. (F₂).
- " *falco* BARR. (F₂).
- " *superstes* BARR. (F₂—G₁).
- " sp.
- Merista herculea* BARR. (F₂—G₁).
- Meristella Circe* BARR. (F₂).
- Athyris mucronata* OEHL. (Ob. Unterdevon von Nordfrankreich).
- " sp.
- Atrypa comata* BARR. (F₂).
- " *semiorbis* BARR. (F₂).
- " *reticularis* L. Allgemein verbreitet.
- Rhynchonella Proserpina* BARR. (F₂).
- " *nympha* BARR. (F₂, G₁).
- " *nympha* var. *pseudolironica* BARR. (F₂).
- " sp.
- Pentamerus procerulus* BARR. (F₂).
- " cf. *spurius* BARR.
- " *Sieberi* v. BUCH var. *anomala* BARR. (F₂).
- " cf. *optatus* BARR. (F₂ und Mitteldevon der Eifel).
- Orthis subearinata* HALL (bei TSCHERNYSCHEW, Unterdevon des Ural. t. 7, f. 97).
- Strophomena Phillipsi* BARR. (F₂, G₁).
- " cf. *Stephani* BARR. (F₂).
- Hexacerinus Rosthorni* nov. sp. msr.
- Eucalyptoerinus* cf. *rosaceus* GF. (ein Keleh und zwei isolirte Basalpyramiden).
- Cyathophyllum* sp. div.
- Favosites* sp.
- Heliolites* sp.

4. Das Mitteldevon.

Das Mitteldevon bildet in dem Normalprofil Wolayer Thörl-Kellerwand die hangende Fortsetzung der ungeschichteten Riffmassen des Unterdevon und ist von diesem ebensowenig wie von dem darauflagernden Iberger Kalk durch bestimmte Grenzen getrennt. Es wiederholt sich hier die häufig gemachte Beobachtung, dass in mächtigen Korallenriffen die schärfere stratigraphische Scheidung aufhört. Ebensowenig wie in dem devonischen Kalk zwischen Rübeland und Elbingerode oder in den Dolomitriffen von Südtirol und Kärnten vermag man hier sichere Grenzen zu ziehen, trotzdem gerade am Kollinkofel und auf der Kellerwand die versteinungsreichen Nester häufiger auftreten als in anderen Riffgebieten.

Die petrographische Beschaffenheit bleibt sich in der gesamten Masse des Gesteins gleich. Es fehlen im Mittel- und Oberdevon schwarze Gastropodenkalk und Crinoidenbreccien; der graue Korallenkalk mit mehr oder weniger deutlichen Korallen und Brachiopoden ist überall die herrschende Felsart. Unterschiede werden weniger durch ursprüngliche chemische Abweichungen als durch dynamische Umwandlungen bedingt. Das allmähliche Verschwinden der organischen Struktur und die krystallinische Umwandlung des Kalkes lässt sich bis ins Einzelne verfolgen. Das beste Studienobjekt bildet das überaus häufig vorkommende *Actinostroma verrucosum*. Von der tadellosen, zur unmittelbaren photographischen Wiedergabe geeigneten Schliiffäche bis zur grauen indifferenten Kalkmasse, die nur hier und da noch undeutliche Reste der vertikalen oder horizontalen Skelettelemente erkennen lässt, finden sich alle denkbaren Uebergänge. Von dem letzteren Stadium ist zu dem gänzlich der organischen Struktur entbehrenden Gestein nur ein kleiner Schritt.

Wenn nicht die Beobachtungen an lebenden oder subfossilen Riffen hinreichende Belege für das Verschwinden der organischen Struktur lieferten, so könnte man diese alpinen Devonkalk als zweifellose Beweisstücke verwenden. Es kann nicht Wunder nehmen, dass z. B. in dem Kalkzuge Poludnigg-Osternigg nur an vereinzelten Stellen Korallenreste vorkommen, während der halbkrySTALLINE Kalk überwiegt. Man könnte

viel eher darüber erstannen, dass überhaupt noch irgendwo in dem stark dislocirten Gebiet der Karnischen Alpen erkennbare organische Struktur erhalten geblieben ist.

Man muss sich vorstellen, dass innerhalb einer, in dynamischer Umwandlung begriffenen Masse einzelne Theilchen infolge localer Staunungen, etwa durch gewölbartigen Zusammenschluss des umgebenden Gesteins ihre ursprüngliche Zusammensetzung bewahrt haben. So wird man sich die locale Erhaltung der Korallen in der stark zusammengepressten Kalkfalte des Osterniggzuges zu erklären haben.

Das tiefere Mitteldevon ist am Kollinkofel ebenso wie das obere Unterdevon fast versteinernungsleer. Bruchstücke eines *Aphyllites*, eines *Orthoceras* und *Favosites reticulatus* Gr., die ich im Eiskar unterhalb des Kollinkofels sammelte, erlaubten leider keine sichere Bestimmung.

Dass die tieferen, *Heliolites Barrandeii* führenden Korallenkalken des Pasterkriffes bei Vellaach (Karawanken) dem unteren Mitteldevon zuzurechnen sind, wurde schon früher bemerkt; dieselben enthalten *Cystiphyllum vesiculosum* Gr., *Heliolites Barrandeii* HOERN. und eine kleinzellige Varietät des *Favosites Golfussii*, die ausserdem in den Cultrijugatusschichten der Eifel, also in der tiefsten Zone des Mitteldevon vorkommt. (Ueber das Grazer Devon vergleiche man die unten folgende Tabelle.)

Vom Kämme Kollinkofel-Kellerwand, dem hesten Vorkommen des oberen Mitteldevon, liegen die nachfolgenden Arten vor:

Actinostroma verrucosum Gr. sp. (die häufigste Art des Mitteldevon, z. Th. in kopfgrossen Knollen).
 „ *clathratum* NICHOLS.? (Selten.)

Stromatopora concentrica Gr. s. str. einfach und in *Cannopora*-form. *Anopora repens minor* Gr. überwachsend. Beide Formen sind am Kollinkofel ziemlich selten, die *Cannopora* stimmt vollkommen mit einem Eifeler Exemplar überein, in dem dieselben beiden Arten vorkommen. Die allgemeine Verbreitung der eigenthümlichen commensalistischen Form in sämtlichen, mitteldevonischen Korallenkalken Europas von Devonshire bis Kärnten ist bemerkenswert. PENCKE citirt dieselbe noch als „*Cannopora placenta* PHILL.“ von Graz.

- Favosites polymorphus* GF. sp. Auf der höchsten Spitze des Kollinkofels in wenigen Exemplaren gefunden.
- " *Goldfussi* M. EDW. et H. Seltener.
- Alveolites suborbicularis* SAM. Häufig auf dem östlichen Vorgipfel des Kollinkofels.
- " *reticulatus* STEIN. Selten.
- " nov. sp.
- Cyathophyllum caespitosum* GF.
- " *verniculture* GF. var. *praecursor* FRECH.
- " *bathycalyx* FRECH? Sämtliche Cyathophyllen liegen nur in einzelnen Exemplaren vor.
- Orthis Goeschens* FRECH. (Zeitschrift d. deutschen geol. Ges. 1891. t. 44, f. 2a—2 E. S. 680.)
- Atrypa reticularis*. L.
- " *desquamata* SOW.
- " *desquamata* var. nov. *alticola*. (Ibid. t. 44, f. 1a—1 e. S. 680.)
- " *aspera* BRONN.
- Athyris concentrica* v. B.?
- Uncites gryphus* SCHL.?
- Pentamerus globus* BRONN. (Ibid. t. 44, f. 4—4 b. S. 679.)
- Waldheimia Whidbornei* DAV.?
- Stringocephalus Burtini* DEFR. (Ibid. t. 44, f. 3a—3 d. S. 679.)
- Die Brachiopoden finden sich wie die Gastropoden und Cephalopoden meist in einzelnen Exemplaren. Nur *Stringocephalus Burtini* ist auf der Spitze des Kollinkofel häufig, und *Atrypa desquamata* var. *alticola* erfüllt nnterhalb des Kellerwandgipfels eine Lücke des alten Riffs.
- Holopella piligera* SANDB.
- Platyceras (Orthonychia) conoideum* GF. sp. (Ibid. t. 44, f. 6—6 e. S. 678.)
- Macrocheilus arcuatum* SCHL. (Ibid. t. 44, f. 5. S. 679.)
- Gomphoceras* sp.

Die vorstehende Liste bestätigt die schon früher ausgesprochenen Ansichten über die Stellung des karnischen Mitteldevon. Die ganze Fauna hätte ebensogut irgendwo in der Eifel oder in Westfalen gefunden sein können; es ist sogar bemerkenswert, dass der äusserst geringe Procentsatz von

Localformen (3 unter 27) von manchen rheinischen Fundorten z. B. Villmar und Soetenieh bei Weitem übertroffen wird.

Die sonstigen Mitteldevonfundorte Kärntens haben fast ausschliesslich Korallen geliefert; nur unter dem im oberen Pasterkriff bei Vellach gesammelten Material fand sich nachträglich noch ein kleiner *Spirifer simplex*, dessen Schlossrand anfallend kurz ist. Die übrigen Arten, welche bei Vellach im unteren Theile des Rapold-Riffs (Maller Riegel) sowie in den höheren ungeschichteten Theilen des Pasterkriffes vorkommen, verweisen ebenfalls auf einen unmittelbaren Zusammenhang mit dem karnischen Mitteldevon. Der weisse Riffkalk ist ganz erfüllt von *Alveolites suborbicularis* sowie von *Cyathophyllum caespitosum* in geringerer Menge. Ausserdem finden sich *Favosites polymorphus* GF., *Favosites reticulatus* GF., *Cyathophyllum verruculare* GF. var. *praecursor* FRECH und *Amplexus hercynicus* A. ROEM.

Am Südabfall des Kollinkofels fand ich in einer zaekenartig in den Kulm vorragenden Kalkmasse an der Casa Monuments *Eudiphyllum acanthicum* FRECH und *Cyathophyllum* cf. *conglomeratum* SCHLÜT., welche beide auf höhere Schichten des Mitteldevon hinweisen.

Eine Anzahl verschiedener Mitteldevonkorallen sammelte ich auf der Hochfläche und dem Nordabhang des kleinen Pal oberhalb des Plückeupasses:

Monticulipora fibrosa GF.?

Alveolites suborbicularis LAM. grosszellig.

Favosites Goldfussi M. EDW. et H.

„ *reticulatus* GF.

Cyathophyllum Lindströmi FRECH.

„ *caespitosum* GF.

Auch diese kleine Fauna erinnert mehr an oberes als an unteres Mitteldevon.

In dem östlichen Zuge des Mitteldevon zwischen Osternigg und Poludnigg sind infolge der weiter vorgeschrittenen dynamometamorphen Umwandlung der Kalke Korallenreste nur an wenigen Punkten gefunden worden. Der von mir im Jahre 1885 entdeckte Fundort auf dem Ostabhang des Osternigg (unmittelbar am Ende des Kalkzuges) ist bisher das reichhaltigste geblieben.

Am häufigsten sind hier (Zeitschr. der d. geol. Ges. 1887. S. 678):

Alveolites suborbicularis GF.

Favosites Goldfussi M. EDW. et H.

„ *reticulatus* GF.

Etwas seltener wurden gefunden:

Cyathophyllum vermiculare GF. var. *praecursor* FRECH.

„ *helianthoides* GF.

„ *caespitosum* GF.

„ *hexagonum* GF.

Hallia aff. *callosae* LUDW. sp.

Columnaria? sp.

Alveolites nov. sp. (aff. *reticulatus* STEIN).

Striatopora vermicularis M'COY.

Heliolites vesiculosus PEN. (wohl kaum verschieden von *Hel. Barrandei* R. HOERN.).

Aulopora minor GOLDF. erwachsen von *Actinostroma* (so genannte *Cyanopora placenta*).

Die in den folgenden Jahren aufgefundenen Vorkommen erweisen die durch geologische Beobachtung gewonnene Ueberzeugung von der Einheitlichkeit des Kalkzuges auch durch palaeontologische Gründe, bieten aber in der letzteren Hinsicht nichts Neues. Am Lomsattel finden sich undeutliche Spuren von Korallen und Crinoiden. Am Ostabhang des Poludnigg sammelte ich *Favosites polymorphus* und *Heliolites Barrandei* HOERN., am Westabhang desselben Berges die beiden genannten Arten und *Favosites reticulatus* GF., *Cyathophyllum vermiculare* mut. *praecursor* FRECH, sowie *Actinostroma* sp. Der hier vorkommende *Heliolites* stimmt am besten mit der bei Graz und in den Karawanken vorkommenden Art überein. (PENECKE, Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft 1887. t. 20, f. 1—3). Jedoch ist die Verschiedenheit desselben von *Heliolites vesiculosus* PEN. (ibid. t. 20, fig. 4, 5) zum mindesten zweifelhaft.

Die in meinen früheren Arbeiten (diese Zeitschrift 1887. S. 122 ff.) ausgesprochenen Ansichten über die geographische Verschiedenheit des Steirischen und Kärntner Mitteldevon haben sich im Allgemeinen bestätigt. Allerdings wird




Abb. 83.

Die Aussicht vom Osternig nach Osten.

Nach einer photogr. Aufnahme des Verf. ges. von O. Bernar.

Mit besonderer Deutlichkeit treten die beiden parallelen Devonkalke des Starhand-Poludnig und des Sagran hervor.

dieser Gegensatz durch den Umstand verschärft, dass Diabasdecken und -Tuffe, welche bei Graz in grosser Mächtigkeit auftreten, dem Devon der Karnischen Alpen und Karawanken vollkommen fehlen. Es besteht also hier derselbe Unterschied wie zwischen dem Lahnggebiet und der Eifel oder Süd- und Norddevonshire.

Allerdings sind durch die neueren Forschungen PENECKE'S auch bei Graz weitere rheinische Arten, vor allem *Calceola sandalina* aufgefunden; aber die Verschiedenheit bleibt trotz alledem noch wahrnehmbar genng, nmsomehr, als fast jede ans dem Karnischen Gebiet neu bestimmte Art die Anzahl der westdeutschen Formen vermehrt.

Dass die Schichten des Kollinkofels dem mittleren Stringocephalenkalk entsprechen dürften, wurde schon früher bemerkt; auch den Korallenkalk des Osternigg rechnete ich früher demselben höheren Horizonte zu; jedoch dürfte das Vorkommen des bei Graz sehr niveanbeständigen *Helialites Burrandei* wohl eher auf nnteres Mitteldevon hinweisen.

Unter den näher gelegenen mitteldevonischen Vorkommen, deren ehemaliger Zusammenhang durch die Uebereinstimmung der Faunen erwiesen wird, zeigen Olmütz und Schirmeek in den Vogesen verhältnissmässig geringe Uebereinstimmung. Beide dürften etwas tieferen Zonen des oberen Mitteldevon entsprechen.

Die Schichten des Brenschtales bei Schirmeek (Vogesen) sind der Crinoidenzone der Eifel unmittelbar zu vergleichen. Hierauf deutet das Zusammenvorkommen von *Stringocephalus Burtini* und *Calceola sandalina*, sowie die charakteristischen Leitformen *Retzia longirostris* und *Cupressocrinus abbreviatus*.

Die grösste Uebereinstimmung mit dem höheren Korallenkalk der Karnischen Alpen zeigt in facieller und stratigraphischer Hinsicht der sogenannte Massenkalk Westfalens und noch mehr die Gegend von Elbingerode, wo ebenfalls mittel- und oberdevonischer Riffkalk antrennbar mit einander verbunden sind. Auch in Belgien, sowie in Torqnay (Süd-Devonshire) finden sich ähnliche mittel- und oberdevonische Riffkalke.

Der Korallenkalk des Mittel- und Oberdevon der Karnischen Alpen stimmt vollkommen mit den gleich-

alten Bildungen in Mittel- und Süddeutschland (Vogesen, Belgien und England) überein; im unteren Mitteldevon (mit *Heliolites Barrandeï*) sind schon in den Karnischen Alpen einige unbedeutende faunistische Abweichungen vorhanden, die sich im Osten, bei Graz stärker geltend machen. Bemerkenswert ist dagegen die weite Verbreitung von *Stringocephalus Burtini* und *Macrocheilos subcostatum*, einem nahen ebenfalls in Deutschland vorkommenden Verwandten von *Macrocheilos arcuatum*. Beide Arten finden sich im oberen Mitteldevon des Ural, fehlen aber sowohl in Steiermark als in Languedoc.

5. Der Brachiopodenkalk des unteren Oberdevon.

Das untere Oberdevon wird durch Brachiopodenkalke vertreten, welche am Ostabhang des Kollinkofels dem meist ungeschichteten, mitteldevonischen Riffkalk unmittelbar auflagern. Eine Abgrenzung konnte daher nicht durchgeführt werden. Die vorliegenden Gesteine sind ein dunkelgrauer und ein schneeweisser, z. Th. halbkristalliner Brachiopodenkalk. Korallen, welche mit Sicherheit zum Oberdevon zu rechnen wären, sind bisher nicht gefunden worden. Möglicherweise gehören hierher die Kalke mit *Alveolites suborbicularis*, welche den Vorgipfel des Kollinkofels zusammensetzen; die genannte Koralle kommt bekanntlich im Mittel- und Oberdevon vor.

Weiter östlich in den Karawanken hat K. A. PENECKE am Christophfels bei Vellach einen Riffkalk mit *Phillipsastraea Hennabi*, *Cyath. heterophylloides* FRECH und anderen oberdevonischen Korallen aufgefunden (Zeitschrift der deutschen geolog. Gesellschaft 1887. S. 270).

Die am Kollinkofel vorkommenden oberdevonischen Brachiopoden sind:

- Productella Herminae* FRECH.
 „ *forojuliensis* FRECH.
Orthis striatula SCHL.
Spirifer Urvii FLEMM.
Athyris globosa A. ROEM.
 „ „ var. nov. *elongata* FRECH.

- Rhynchonella cuboides* Sow. sp.
 „ *pugnus* MART. sp.
 „ *acuminata* MART. sp.
 „ *Roemeri* DAMES (Z. d. deutschen geol. Ges.
 1868. t 11, f. 2a—d) var. nov.
plana.¹⁾
 „ „ var. *obesa* FRECH.

Die eingehende Beschreibung der meisten Formen habe ich in der Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft 1891 gegeben. (t. 45, 46, 47. S. 673—677.)

Die vorstehend genannten Arten finden sich mit Ausnahme der gesperrt gedruckten Localformen sämmtlich in dem Korallenkalk des unteren Oberdevon wieder, welcher bei Rübeland und Grund im Harz seit langem bekannt ist. Auf das Vorkommen einiger Localformen ist kein besonderer Werth für die Unterscheidung zu legen. Dieselben sind sämmtlich mit den Hauptformen nahe verwandt (*Prod. forojuliensis* mit *Prod. subaculeata*) und gehören grossentheils zu Arten, welche die bei Brachiopoden häufig beobachtete, starke Neigung zum Variiren besitzen.

Man wird daher auch die oberdevonischen Schichten des Kollinkofels unbedenklich als Iberger Kalk bezeichnen können.

Ausser den Harzer Fundorten ist der Kalk von Oberknnzendorf in Schlesien (mergelreicher Korallenkalk) Langenau- bach in Nassau, verschiedene Bildungen aus Belgien (Frasnien) und Süd-England (Torquay) mit den alpinen Vorkommen zu vergleichen. Auch in Nordfrankreich (Cop-Choux), Russland (Centrale Theile und Ural) sowie in Nord-Amerika (Tully-limestone) finden sich alters- und faciesgleiche Bildungen.

¹⁾ E. KAYSER hat in einem Referat — mit Recht — auf die bisher nicht veröffentlichte Beobachtung hingewiesen, dass *Rh. contraria* A. ROEM. aus dem Kohlenkalke und nicht aus dem Oberdevon (wie A. ROEMER und DAMES angeben) des Iberges stamme. Der Vergleich mit der citirten Abbildung bei DAMES beweist das Vorhandensein einiger Formunterschiede, welche die Bezeichnung der alpinen Rhynchonellen als Varietäten rechtfertigen; var. *plana* ist die von mir zuerst als *Rh.? contraria* bezeichnete Form. l. c. t. 46, f. 7—10b.

6. Der Clymenienkalk.

Das obere Oberdevon bildet einen verhältnissmässig wenig ausgedehnten Zug auf dem Nordabhang der Pal-Antiklinale zwischen Oberer Promosalp und Plöckenpass; dasselbe erstreckt sich auf dem Südgehänge eine kurze Strecke weit in der Richtung nach Tischlwang. Das Gestein ist ein deutlich geschichteter, dichter, plattiger Kalk, der stellenweise (Plöckenpass, Freikofel, obere Promosalp) Durchschnitte von Clymenien aber nur an einer Stelle eine reichere Fauna enthält. Dieselbe findet sich am Südgehänge des Gross-Pal-Rückens im oberen Theile des Palgrabens, in unmittelbarer Nähe einer auf der Generalstabkarte angegebenen, aber nicht mit Namen belegten Alphütte. Der von mir zu wiederholten Malen angegebene, auf der Landesgrenze belegene Fundort ist nun so leichter wiederzufinden, als die Versteinerungen bisher ausschliesslich 2 m. im Liegenden der Culmschichten und zwar dort vorgekommen sind, wo ein etwa N—S gerichtetes „Blatt“ die Clymenienkalke nach S verwirft. Die Plattenkalke enthalten in den hangenden und liegenden Theilen dünnere Schichten, in der Mitte hingegen Bänke von grösserer Mächtigkeit. Das Vorkommen von Schwerspath auf Gängen ist bemerkenswerth, da derselbe auf diese Schichten beschränkt ist.

Es wurden bisher die folgenden Arten bestimmt; die eigentlichen Localformen sind gesperrt gedruckt.

- Phacops (Trimeroccephalus) carintiacus* nov. sp. mser.
(verwandt mit *Ph. anophthalmus* nov. nom. von Kiefel und Ebersdorf). Ziemlich häufig. (Vergl. unten.)
- Clymenia (Gonioclymenia) speciosa* MSTR. Selten.
" " nov. sp. aff. *speciosae*. Selten.
" (*Cyrtoclymenia*) *lucrigata* MSTR. Die häufigste Art.
" " *cingulata* MSTR. Selten.
" " *Dunkeri* MSTR. Selten.
" " *binodosa* MSTR. Ein Exemplar.
" " nov. sp. aff. *binodosae*. Selten.
" (*Oxyclymenia*) *undulata* MSTR. Sehr häufig.
" " *striata* MSTR. Häufig.
Parodoceras sulcatum MSTR. sp. Häufig.

- Tornoceras falciferum* MSTR. sp. Ziemlich häufig.
 „ *planidorsatum* MSTR. sp. Zwei Exemplare.
 „ *Escoti* FRECH. (Die bei Cabrières vorkommende Art zeichnet sich durch den Besitz eines wohl ausgebildeten runden Nathlobns aus.)
 „ nov. sp.
 „ nov. sp.
Prolobites delphinus SDBG. sp. Ziemlich selten.
Orthoceras sp. Selten.
Porcellia nov. sp. (verwandt mit *P. primordialis* SCHL.).
 Ein Exemplar.
Posidonia venusta MSTR. Ziemlich häufig.
Posidonia venusta var. *curintiaca* FRECH. Selten.
 (FRECH. Avieniden des deutschen Devon. S. 71. t. 14, f. 16.)
Cardiola (Buchiola) retrostriata v. B. Häufig.
Lunulicardium sp. (verwandt mit *L. subdeussatum* MSTR.).
 Selten.

Camerophoria sp.
 Crinoidenstiele.

Clathrodictyon philoclymenia FRECH. (Ein Exemplar der seltenen, auch am Enkeberg vorkommenden Spongie.)

Die Zahl der den Karnischen Alpen eigentümlichen Formen ist auffallend gering, bemerkenswerth hingegen das Fehlen einiger verbreiteter Typen des Clymenienkalkes, wie *Cymaclymenia*, *Sellaclymenia*, *Discoclymenia* und *Cycloclymenia*, vor allem das des überall häufigen Goniatitengeschlechtes *Sporadoceras* (*Sp. Bronni* etc.).

Das zunächst gelegene Vorkommen von Clymenienkalk ist dasjenige von Graz, die Fundorte des Fichtelgebirges von Schlesien, Languedoc sind weiter entfernt. Die weite Verbreitung der gleich gearteten pelagischen Fauna des oberen Oberdevon vom Ural bis Südfrankreich und Devonshire ist bemerkenswerth; das plötzliche Auftreten und Verschwinden einer reichen und mannigfach differenzirten Ammonitidengruppe hatte bisher etwas halbwegs Unerklärliches.

Das neuerdings durch CLARKE im Staate New York festgestellte Vorkommen von typischen Clymenien in einer

Schicht, die man wegen des häufig auftretenden *Gephyroceras* und *Tornoceras* als unteres Oberdevon bezeichnen muss, wirft jedoch ein neues Licht auf die Verbreitungsgesetze der devonischen Cephalopoden.

Anhang: Ueber die oberdevonischen Arten der Untergattung *Trimeroccephalus*.

Ueber die Artbestimmung der zur Untergattung *Trimeroccephalus* gehörenden Phacopiden mit fehlenden oder redneirten Augen besteht seit längerer Zeit Unklarheit in der Litteratur. Der ursprünglich von EMMERICH aus dem Oberdevon von Sessacker beschriebene *Phacops cryptophthalmus* besitzt ohne Zweifel an der Vorderecke der Wange einen kleinen Augenhöcker mit Facetten. Hiertüber lassen die Angaben der Litteratur keinen Zweifel und ein von EMMERICH bestimmtes Original des Berliner Museums, ein grosses breites Kopfschild, zeigt trotz der Steinkernerhaltung den Augenhöcker vollkommen deutlich.

Dagegen haben F. ROEMER und E. TIETZE darauf hingewiesen, dass die im Clymenienkalk von Kielce (Polen) bezw. Ebersdorf vorkommenden Formen der Augenhöcker und Facetten vollkommen entbehren. Beide Forscher haben auch bereits die spezifische Selbstständigkeit dieser Form vermuthet. Die Untersuchung des vollständigen und wohl erhaltenen Materials des Berliner Museums bewies, dass über die Verschiedenheit beider Formen kein Zweifel bestehen kann. Die augenlose Art, die man passend als *Ph. (Trimeroccephalus) anophthalmus* nov. nom. bezeichnen könnte, besitzt, abgesehen von dem Hauptunterschied der Augenlosigkeit, ein schmaleres, stärker gewölbtes Kopfschild; die Granulation, welche bei *Phacops cryptophthalmus* allgemein verbreitet ist, erscheint bei *Phacops anophthalmus* auf den Vorderrand der Glabella beschränkt.

Als dritte Form kommt der im Clymenienkalk des Pal vorkommende Trilobit hinzu, der sich schon wegen des vollkommenen Fehlens der Augen zunächst an *Phacops anophthalmus* anschliesst. Jedoch ist die Glabella viel flacher, zugespitzter und wie bei *Phacops Bronni* ziemlich weit vorstehend;

ferner ist der Randsaum, welcher die Wangen seitlich umgiebt, wesentlich breiter als bei den beiden anderen Arten.

Es kommen demnach 3 Formen im Clymenienkalke vor:

1. *Phacops (Trimeroccephalus) cryptophthalmus* EMMR. s. str.
(hierher n. a. f. 2 auf Tafel 16 bei TIETZE, Ebersdorf, Palaeont. IX).
 2. *Phacops (Trimeroccephalus) anophthalmus* nov. nom.
= *Phacops cryptophthalmus* F. ROEM. non EMMR.
Zeitschr. deutsch. geol. Ges. 1866. t. 13, f. 6, 7 und
TIETZE, t. 16, f. 1.
 3. *Phacops (Trimeroccephalus) carintiacus* nov. sp. n. ser.
-

Das alpine Devon im Vergleiche mit dem anderer Gebiete.

1. Allgemeines.

Die Bedeutung, welche die unzweideutigen Anfschlüsse des Wolayer Thörl für die vielmstrittene Hereynfrage besitzen, ist bereits in meiner ersten Arbeit hervorgehoben und seitdem auch von anderen Seiten anerkannt worden. Die Erweiterung, welche unsere Kenntnisse in dem vorliegenden und in anderen Gebieten seitdem erfahren haben, lassen eine ernente übersichtliche Behandlung des Gegenstandes gerechtfertigt erscheinen.

Ueber die Grenzbestimmung zwischen Silur und Devon bestehen nur noch untergeordnete Meinungsverschiedenheiten, die am Schlusse dieses Abschnittes kurz besprochen werden sollen. Es erscheint somit auch überflüssig, den Namen „Hereyn“ fernerhin beizubehalten; derselbe entspricht jedenfalls keiner stratigraphischen Einheit wie Tithon oder Rhaet, sondern ist gleichbedeutend mit einer eigentümlichen Entwicklung des Unterdevon bzw. (in sehr geringem Masse) des Mitteldevon.

Beruhet nun diese Abweichung von dem „normalen“ d. h. von dem zuerst genau beschriebenen Unterdevon auf physikalischen oder auf geographischen (heteropen oder heterotopen) Verschiedenheiten? BEYRICH und nach ihm die überwiegende Mehrzahl der Forscher haben die Frage in ersterem Sinne beantwortet. E. SUESS ist hingegen der Meinung, dass die hereynische Stufe die südliche (bzw. mediterrane) Entwicklungsform des Unterdevon darstelle. (Antlitz der Erde. II. S. 288 „Im nördlichen Europa sieht man die hereynische Stufe nicht.“)

Diese Anschauung entspricht den neueren Erfahrungen nicht: Die inmitten des normalen rheinischen Devon gelegenen

Vorkommen von Greifenstein und Günterod enthalten — wie man auch über ihre genauere Horizontirung denken mag — doch eine typisch „hereynische“, d. h. fremdartige, mit böhmischen Schichten übereinstimmende Devon-Fauna; endlich hat WOODBORNE aus dem englischen Mitteldevon, d. h. dem nördlichsten marinen Devongebiete Europas, neuerdings eine ganze Anzahl von Arten beschrieben, deren nächste Verwandte im böhmischen F vorkommen (z. B. *Phacops batracheus* verwandt mit *fecundus*, Arten von *Proetus*, *Lichas*, *Bronteus* [*Thysanopeltis*], *Aristozoe* u. s. w.).

Die ursprüngliche, von KAYSER ausgeführte Auffassung BEYRICHS, dass das Hereyn eine verschiedene Facies des historischen Unterdevon darstelle, ist vollkommen zutreffend; wenn allerdings KAYSER die Hereynbildungen einfach als die „in tieferem Meere abgelagerten Aequivalente“ der sandig-schieferigen Localbildung auffasst, so wird diese Ansicht der grossen Mannichfaltigkeit der Thatsachen nicht mehr gerecht, welche seit dem Erscheinen des grundlegenden Werkes (1878) bekannt geworden sind. Man wird beispielsweise nicht annehmen können, dass ein Brachiopodenkalk des nütteren Helderberg sich unter wesentlich anderen Bedingungen gebildet habe, als ein, dieselben Brachiopodengattungen enthaltender Schiefer der Coblenzschichten. In dem einen Falle überwog die Zufuhr thonigen Sediments den auf organischem Wege gebildeten Kalk; aber die Meerestiefe, Küstennähe, Temperatur waren dieselben. Noch weniger können die Korallenriffkalke, welche im sogenannten Hereyn eine bedeutende Rolle spielen, als Bildungen des tieferen Meeres angesehen werden.

Wie gross die Faciesverschiedenheiten innerhalb des „hereynischen“ Unterdevon sind, zeigt die Thatsache, dass in Nordfrankreich, im Ural und im Staate New York (Lower Helderberg, Oriskany) die Goniatiten, in den Karnischen Kramenzelkalken die Brachiopoden, bei Greifenstein, Cabrières und in den genannten Knollenkalken die Riffkorallen fehlen; die Capuliden, welche meist zu den bezeichnendsten und häufigsten Formen gehören („Capulien“ BARROIS), treten bei Cabrières und Greifenstein in den Hintergrund; Trilobiten finden sich im böhmischen Gebiet in ansserordentlicher Menge und gehören in den Alpen zu den grössten Seltenheiten u. s. w.

Die angeführten Beispiele, welche sich leicht ins Unendliche vermehren liessen, führen zu dem Ergebniss: „Das Hereyn umfasst die Gesamtheit aller Unterdevonbildungen¹⁾, welche von dem historischen Unterdevon verschieden sind; Bildungen des tieferen Meeres sind im Hereyn häufig, treten aber keineswegs ausschliesslich an. Historisches Unterdevon und Hereyn stehen also zu einander etwa in demselben Verhältniss, wie der mitteldeutsche Kenper zu den mannigfaltigen Faciesbildungen der oberen alpinen Trias (Juvavisch-Karnische Stufe). Auch die letzteren wurden früher sämmtlich für „Tiefseebildungen“ gehalten, bis man sich überzeugte, dass n. a. die Korallenbildungen und Megalodon(-Daelstein)kalke im flachen Wasser entstanden sind.

Um dem Verständniss der Meeresverhältnisse zur Zeit des Unterdevon näher zu kommen, ist eine systematische Darstellung der Faciesbildungen das naheliegendste; dieselbe soll im Nachfolgenden versucht werden. Eine zusammenhängende Darstellung der schwierigen „Greifensteiner“ und Korallenkalke bildet den ersten, eine halbtabellarische Uebersicht der sämmtlichen Facies den zweiten Theil.

2. Die „Greifensteiner Facies“ und die Korallenkalke des Unterdevon.

Bei einer früheren Gelegenheit habe ich die in den eigenthümlichen „Greifensteiner Facies“ entwickelten Unterdevonfaunen (= „Hereyn“) eingehend mit einander verglichen (Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft 1889. S. 264—274). Dieselben kommen auch bei Cabrières und Koniéprns vor und sind ausgezeichnet durch das Fehlen der Riffkorallen und die Vergesellschaftung bestimmter Brachiopodengattungen mit Goniatiten (*Aphyllites*, *Anarcestes*, *Pinacites*, *Mimoceras*) und Tiefseekorallen (*Petraia*, *Amplexus*, *Romingeria*). Unter den Brachiopoden wiegen vor die glatten Arten wie *Spirifer indifferens* und vor allem die glatten theils zu *Merista* theils zu *Athyris* (?) und anderen Gattungen, z. B. *Rhynchonella*) gehörigen Formen; n. a. *Merista passer*, *securis*;

¹⁾ sowie einige zum Mitteldevon zu stellende Vorkommen, welche eine wenig veränderte Superstitenfauna enthalten (Glinterod, Basselfelde, Illubocep).

Merista (? *Rhynchonella*) *Bancis*, *Athyris Thetis* und andere stark in der äusseren Gestalt variirende Typen; weit verbreitet ist auch die glatte *Orthis tenuissima*. Unter den Trilobiten sind vor allem für die Greifensteiner Facies bezeichnend: *Phacops fecundus major* BARR.¹⁾ (der dem Riffkalke fehlt), *Lichas* (*Arges*) *Haueri* und Verwandte, *Bronteus* (*Thysanopeltis*), die Gruppe des *Proëtus eremita* BARR. und *planicandu* BARR. (letzterer mit Pygidialstacheln wie die Gruppe des *Br. thysanopeltis*), ferner die Formenreihe der *Acidaspis* (*Traplocera*) *vesiculosa* BARR., die Gattung *Cyphaspides* NOVÁK; endlich die Gruppe des *Orthoceras raphanistrum* (mit Rippen und Querstreifen).

Andrerseits fehlen die grossen, dickschaligen, im Riffkalke häufigen Gastropoden (darunter die bezeichnende *Platygostoma naticopsis*, *Tremanotus*, *Polytropis*, die Gruppe der *Pleurotomaria delphinuloides* n. a.), die gerippten und gestreiften Spiriferen (Gruppe des *Spir. paruloxus*, *Nerei* und *togatus* mit geringen Ausnahmen), die Formenreihe der *Rhynchonella nymphe* und *princeps* (*Wilsonia*²⁾), die gerippten Orthisarten (*Platystrophia* und Gruppe der *Orthis palliata*²⁾), die Gruppen des *Pentamerus opatus*, des *Pent. acutolobatus* und der *Strophomena Stephani*, endlich die Gattungen *Retzia* (die weit verbreitete *R. Haidingeri*), *Meristella* (*M. Circe*), *Atrypa* (*A. reticularis* und *eomata*), *Streptorhynchus*, *Cyrtina* und *Chonetes* (Gruppe des grobrippigen *Chonetes Verneuli*).

Von den Trilobiten sind für die Riffkalke bezeichnend nur die Gruppen des *Bronteus palifer* und die überall (Erbray, Konicprus, Wolayer Thörl), wenn auch nur als Seltenheit vorkommende *Calymene*. Trilobiten sind in den eigentlichen Riffkalcken, vor allem in den Alpen, bei Erbray (Loire Inférieure) sowie im Ural selten und kommen auch in Böhmen nur in geringer Mannichfaltigkeit vor. Die Menge der Individuen ist allerdings bei einigen Brontensarten (vor allem bei *Bronteus*

¹⁾ KAYSER benennt die hier vorkommende Art neuerdings *Phacops Potieri* BAYL., was ich nach Untersuchung meines umfangreichen, grösstentheils selbst gesammelten Materials nicht als zutreffend anerkennen kann. — Uebrigens handelt es sich um minutiöse Unterschiede.

²⁾ Mit Ausnahme eines einzigen kleinen, bei Cabrières gefundenen Exemplars.

³⁾ Mit Ausnahme von *Orthis lenticularis* bei Greifenstein.

palifer und *campanifer*) bedeutend, aber die Riffbildungen, die schneeweissen Kalke von Konieprus sind doch mehr durch die mannichfaltige Entwicklung der Brachiopoden (vergl. oben) gekennzeichnet.

Es ist wohl ferner nicht als Zufall zu betrachten, dass unter den Brachiopoden der Greifensteiner Facies gerippte und gestreifte Formen fast gänzlich fehlen; andererseits finden sich unter den Trilobiten mehrere Gruppen mit stacheltragendem Pygidium, während die übrigen zu den betreffenden Gattungen gehörenden Arten ein glattrandiges Schwanzschild besitzen. Es sind dies die Gruppen des *Proetus* (*Phaëtonellus*) *planicauda* BARL., des *Bronteus* (*Thysanopeltis*) *speciosus* CORDA und die Gattung *Cyphaspides*, welche sich von *Cyphaspis* ebenfalls durch die in Spitzen ausgezogenen Seitenrippen unterscheidet.

Die biologischen Gründe, welche die betreffenden Trilobiten zur Ausbildung von Schwanzstacheln veranlassten und die Entwicklung berippter Brachiopoden verhinderten, sind selbstredend nicht mehr festzustellen. Jedenfalls sind gerade derartige Beobachtungen geeignet, die schärfere Unterscheidung verschiedener Faciesbildungen zu ermöglichen.

Es lässt sich durch statistische Darlegungen erweisen, dass die Faciesbildungen des Palaeozoicum nur zum Theil Analoga in jüngeren Formationen und in den heutigen Meeren haben, wie z. B. die Greifensteiner Schichten ganz eigenartig entwickelt sind. Eine ausführlichere Erörterung würde hier zu weit führen.

Die Riff-Facies ist — abgesehen von den Korallen — gekennzeichnet durch die genannten gerippten Brachiopodengruppen¹⁾, verhältnissmässig zahlreiche grosse und dickschalige Gastropoden, ferner durch das Zurücktreten der Trilobiten und das gänzliche Fehlen der Goniatiten. Auch Nautiliden erscheinen nur vereinzelt.

Die Hänfigkeit der Crinoiden ist nicht sonderlich bezeichnend, weil Stielglieder derselben auch bei Greifenstein in Masse vorkommen.

Die typischen Vertreter der Korallenfacies sind die weissen Kalke von Konieprus, die gesammten Riffkalke der

¹⁾ *Merista passer* und *Brucis* etc. erscheinen im karnischen Riffkalke nur in ganz vereinzelt Exemplaren, während sie in der Greifensteiner Facies oft geradezu gestelnsbildend auftreten.

Karnischen Alpen und Karawanken, die Hauptmasse der Ober-Helderberg-Gruppe und der bläuliche Korallenkalk von Erhray. Ferner gehören hierher die Kalksteine der unteren Belaja im Ural, die zwar durch die geringere numerische Entwicklung der Riffkorallen ausgezeichnet sind, aber in Bezug auf Gastropoden und Brachiopoden mit den übrigen Vorkommen übereinstimmen. Auch einige Fundorte der nnteren Wieder Schiefer des Harzes sind hierher zu stellen.

Um Missverständnissen vorzubeugen, sei bemerkt, dass Korallenfacies und Riffbauten keineswegs gleichbedeutend sind. Riffkorallen konnten mit ihren bezeichnenden Begleitern in grösserer oder geringerer Häufigkeit auch an Stellen vorkommen, die für die Bildung mächtiger stockförmiger Massen ungeeignet waren.

Die Korallenkalke gehören — im Gegensatz zu den oben erwähnten Greifensteiner Schichten — zu denjenigen Bildungen, welche unverkennbare Analoga in den mesozoischen und jüngeren Formationen besitzen und somit genauere Erwägungen über die Art ihrer Entstehung ermöglichen.

Die Mächtigkeit der bedeutendsten devonischen Riffe (Kellerwand S. 89) beträgt noch jetzt 1000—1200 m.; auch an der Paralba (S. 115) handelt es sich um ähnliche Massen. Wenn man bedenkt, dass auch an den verhältnissmässig wohl erhaltenen Kalkbildungen die obersten Theile durchgängig abgetragen sind, so gelangt man zu noch bedeutenderen Zahlen. Die Entstehung derartiger Massen durch die Thätigkeit organischer Wesen bildet eines der anziehendsten Probleme der Geologie und der vergleichenden Erdkunde.

Die Schwierigkeit der Erklärung beruht vor Allem darauf, dass die pacifischen Korallenriffe eine Höhe von Hunderten von Metern über dem Meeresboden erreichen, während die riffbildenden Korallen nicht unter 37 m. im Meere hinabgehen. Einzelte Exemplare sind lebend zwar noch aus einer etwa doppelt so grossen Tiefe herausgeholt worden, aber weiter unten werden nur abgestorbene Bruchstücke gefunden. Da die Annahme untermeerischer Vulkane oder selbstständiger Höhenzüge nur in vereinzelten Fällen möglich ist, wird man für die Erklärung mächtiger Riffbauten immer noch auf die von Darwin aufgestellte Theorie zurückgreifen müssen. Derselbe nahm

bekanntlich an, dass ein angedehnter Theil des Meeresbodens in beständiger Senkung begriffen sei, und dass das Höhenwachsthum der Korallen in gleichem Verhältnisse wie die Senkung fortschreite. Die verschiedenartigen Formen, welche die lebenden Riffe unter diesen Umständen annehmen, sind für die Erklärung der uralten Riffbildungen ohne wesentliche Bedeutung, hingegen ist der Umstand wichtig, dass nur für dünnere, krustenartige Riffe die Möglichkeit einer Entstehung auch unter anderen Bedingungen (bei sinkendem oder unverändertem Meeresspiegel) nachgewiesen ist.

Für die Bildung mächtiger Kalkriffe, wie wir sie aus verschiedenen Abschnitten der geologischen Vergangenheit der Alpen kennen, ist kaum eine andere Erklärung möglich, als die allmälige Vergrößerung des Abstandes zwischen Meeresboden und Wasseroberfläche.

Allerdings könnte man vermuthen, dass die vorweltlichen Korallen nicht dieselbe Lebensweise besessen hätten wie ihre lebenden Verwandten, oder mit anderen Worten, dass die geologisch alten Riffe aus grosser Tiefe unmittelbar an die Oberfläche emporgewachsen wären. Jedoch lässt sich aus der Art des Vorkommens fossiler Korallen eine Uebereinstimmung der Lebensweise mit den Bewohnern der heutigen Meere nachweisen. Die Riffe der Jetztwelt sind durch die Häufigkeit von abgerollten Korallenstöcken gekennzeichnet, welche von den Wogen innerhalb der Lücken des Riffs oder am Fusse desselben zusammengetragen werden. Gerundete Rollsteine, die in alten Riffen ebenso häufig vorkommen, wie in denjenigen der Jetztwelt, können nur durch die Thätigkeit der Brandungswelle gebildet werden. Ein weiterer Transport derselben mittelst der Strömungen des Meeres erscheint so gut wie ausgeschlossen. Man wird also aus dem Vorhandensein von zahlreichen abgerollten Korallenstöcken in älteren Bildungen stets auf die Nähe einer Brandung und somit auch auf das Gebundensein der Korallen an die oberen Meeresschichten schliessen dürfen.¹⁾ Diese Kalksteine finden sich am Wolayer Thörl,

¹⁾ Es wäre noch der Einwand möglich, dass die gerollten Korallen aus älteren Riffen stammen könnten; dann müssten die Rollsteine andere Arten enthalten als der kompakte Riffkalk, was in den zahlreichen vom Verfasser untersuchten Fällen nicht zutrifft.

sowie in ganz besonderer Häufigkeit in den Riffkalken von Conieprus, wo *Cyathophyllum expansum* in allen möglichen Stadien der Abrollung vorkommt. Ferner habe ich besonders in den oberdevonischen Riffkalken von Grund und Langenaubach abgerollte Korallenreste beobachtet n. s. w.

Die gleiche Folgerung ergibt sich aus den Formen des Wachstums der aus verschiedenen Individuen bestehenden Korallenkolonien. Dasselbe wird bedingt einerseits durch das Bestreben, eine möglichst grosse Fläche zum Zwecke der Nahrungsaufnahme zu entwickeln, andererseits durch die Nothwendigkeit, dem Anprall der Wogen kräftigen Widerstand entgegenzusetzen. Je nach der Stelle, welche die Korallenkolonien auf dem Riffe einnehmen, entwickeln sich Platten, unregelmässige Knollen, Pilze, Dome, mehr oder weniger zierlich verzweigte Bäumchen, Rasen, aus parallelen Sprossen bestehend, und endlich vorspringende Konsolen. Dazu kommen noch inkrustirende Rinden, welche das Gebäude in sich verfestigen.

Es ist nun eine bemerkenswerthe Thatsache, dass die Riffbildner der palaeozoischen Aera und der jüngeren Zeitalterschnitte, welche zu ganz verschiedenen zoologischen Gruppen gehören, trotz aller Abweichungen des inneren Baues eine ansserordentliche Aehnlichkeit der äusseren Form besitzen. Man wird zur Erklärung dieses Umstandes das Vorhandensein gleichartiger mechanischer Einflüsse annehmen müssen. Die alten Riffkorallen können also nicht in den wenig oder gar nicht bewegten Regionen der Tiefsee gelebt haben, sondern waren ebenfalls der Einwirkung einer Brandung ausgesetzt.

Ein anders gearteter, immer wiederholter Einwurf gegen die Riffnatur älterer Kalkmassen gründet sich auf das vielfach beobachtete Fehlen von organischer Structur im Kalke. Zwar liefert die Untersuchung lebender oder subfossiler Riffe hinreichende Belege für das Verschwinden der organischen Structur, aber auch die Erforschung der Karnischen Devonkalke bietet einige beachtenswerthe Fingerzeige. An Pneten, wo die gewaltige Mächtigkeit der Kalke oder andere Ursachen eine weitergehende dynamometamorphe Umwandlung des Gesteines verhindert haben, ist die organische Structur der Versteinerungen noch gut erhalten. In den um vieles schmäl-

leren¹⁾, tief eingefalteten Kalkzügen wie Osternigg-Poludnigg (Mitteldevon), Pollinigg, Hartkarspitz und Porze-Königswand sind dagegen kann noch Andeutungen von Versteinerungen an vereinzelten Punkten wahrnehmbar.

Eine dynamische Umwandlung in weitergehendem Maassstabe kann allerdings in den, nur durch Brüche dislocirten Trias-Dolomiten von Südtirol, Venetien und Kärnten nicht stattgefunden haben. Aber nach den neueren Beobachtungen WÄNTERS bildet auch bei diesen das Fehlen bzw. die Seltenheit von Korallenresten keinen Beweis gegen die Riffnatur. Die weissen liassischen Kalkmassen des Sonnwendgebirges in Nordtirol, welche mit rothen Liaskalken wechsellagern, stimmen in Bezug auf Lagerungsverhältnisse mit den korallenarmen Triasdolomiten überein, sind aber an vielen Stellen von den Resten riffbauender Korallen (*Thecosmilia* = *Lithodendron* anet.) erfüllt und somit als echte Riffbildungen anzusprechen.

„Eine Reihe von Structurerscheinungen, welche aus den Dolomitgebieten Südtirols beschrieben wurden, findet sich auch im Sonnwendgebirge wieder: Das Ansteilen der an manchen Stellen sehr mächtig entwickelten Kalkmassen, Uebergusschiehtung, Wechsellagerung mit den gleichzeitig gebildeten Sedimenten grösserer Meerestiefen“ (insbesondere an den ansteilenden Enden der Riffmassen). Es ist jedenfalls von Wichtigkeit, dass derartige Lagerungsverhältnisse, welche schon früher zum Theil aus theoretischen Gründen als für Korallenriffe bezeichnend angesehen wurden, einmal bei zweifellosen Korallenbanten nachgewiesen werden können.

Wie schwierig die Beurtheilung der Frage sei, was man als fossiles Riff ansprechen darf und was nicht, lehrt ein Blick auf die durch die eigenartige „Atollhypothese“ DUPONT'S bekannten Vorkommen Belgiens. Der äussere Umriss des alten Riffs ist selbstredend in einem gefalteten und stark denudirten Gebiete nicht mehr nachzuweisen; dagegen kann die Thatsache, dass ein grosser Theil der devonischen und carbonischen Kalke Belgiens von Korallen angebaut wurde, durch die Untersuchung jeder beliebigen aus belgischem Marmor bestehenden

¹⁾ Der ebenfalls schmale Kalkzug des Pal stellt, wie oben ausgeführt wurde, eine verhältnissmässig wenig dislocirte Antiklinale dar.

Tischplatte in der unzweideutigsten Weise bestätigt werden. Ueber die Riffnatur scheint neuerdings eine gewisse Einigung zwischen den belgischen Geologen erzielt zu sein. Danach kommen keine, den pacifischen vergleichbare Korallenriffe im Carbon vor, vielmehr sind die gesteinsbildenden Stromatoporida riesige, bis 15 m. mächtige Fossilien, die in einzelnen Horizonten besonders verbreitet sind und „gegen welche die übrigen Schichten gelegentlich abstossen“.¹⁾ Mit den letzten Worten haben die betreffenden Beobachter (LOHEST und DE LA VALLÉE POUSSIN) eine vortreffliche Definition für fossile Riffe gegeben. Das Abstossen der heteroplen Bildungen an dem Korallenbau ist das wesentlichste Kennzeichen derselben; ob diese Korallenbauten nur riesige Fossilien von einigen Metern Dicke oder Gebirgsmassen von bedeutenderer Mächtigkeit sind, berührt das Wesen der Sache nicht.

Die Vergleichung der devonischen Riffe bietet, wie BARBOIS²⁾ hervorhob, noch manche ungelöste Probleme; allerdings enthält auch die von ihm gegebene Zusammenstellung einige Ungenauigkeiten. Es giebt z. B. im Unterdevon des Harzes ebensowenig Korallenriffe (*récif*) wie bei Cabrières; in dem erstgenannten Gebiete sind vereinzelte Exemplare von Riffkorallen, in dem anderen nur ein einziges Bruchstück eines Favositen gefunden worden. Die Kalke beider Fundorte sind zwar wahrscheinlich organischen Ursprungs aber jedenfalls nicht durch Riffkorallen aufgebaut. Auch das Vorkommen der „*récifs*“ bei Erbray (S. 325) lässt sich nicht mit der Angabe S. 341 in Einklang bringen: „*les calcaires d'Erbray ne sont pas des constructions coralliennes proprement dites, on n'y trouve pas les grandes agglomérations de polypiers composés*“.

3. Uebersicht der devonischen Faciesbildungen.

Die Wichtigkeit einer sachgemässen Berücksichtigung der Faciesentwicklung für theoretische Deutungen und für die praktischen Anforderungen der Feldgeologie geht aus den vorstehenden Andeutungen hervor. Die folgende Uebersicht enthält in halbtabellarischer Form die wichtigsten Facies des Devon:

¹⁾ Annales de la soc. géol. de Belgique. T. XVI, S. CV.

²⁾ Faune d'Erbray S. 334.

I. Korallenkalke.

a) Ungeschichtete, reine Korallenkalke und Dolomite.

Die Masse des Gesteins besteht aus Korallen und deren zerriebenen Resten, welche wie in lebenden Riffen an Menge das organisch struirt Gestein übertreffen. In den unterdevonischen Riffen sind Tabulaten (Favositen) und Stromatoporen, in den mitteldevonischen Stromatoporidaen, Favositiden und massige Cyathophyllen, in den oberdevonischen Phillipsastraeen, Stromatoporidaen und Favositiden, im Carbon Stromatoporidaen die hauptsächlichsten Riffbildner. Daneben finden sich Brachiopoden, Gastropoden, Crinoiden und Zweischaler in einzelnen Exemplaren oder nesterartigen Anhäufungen. Nautiliden sind durchweg selten; das Vorkommen von Goniatiten am Iberg bei Grund ist eine einzig dastehende Ausnahme. Die Vertheilung der genannten, weniger wichtigen Gruppen ist in den Brachiopodenschichten (II) etwa die gleiche wie in I. Beispiele: Unterdevon: Karnische Alpen und Karawanken, Koniepnns. Mitteldevon: Kollinkofel, Osternigg, Vellaeh, Eifel (Dolomitentwicklung bei Gerolstein und Prüm), Paffrath, Belgien (Givetien), Westfalen, Elbingerode. Oberdevon: Vellaeh, Grund und Rübeland, Harz, Langenaubach (Nassau), Torquay (Devonshire).

b) Geschichtete Korallenkalke.

Die Riffkorallen treten hinter dem sonstigen zum Theil mergeligen Sediment etwas zurück, sind aber immer noch die vorherrschende Thierklasse; daneben werden die Brachiopoden häufiger. Diese Bildungen sind bei Graz, in Westdeutschland, Belgien, England und Südfrankreich (Cabrières) die verbreitetste Facies des Mitteldevon; in Nordfrankreich und Amerika (Upper Helderberg von New York bis Ohio) finden wir dieselben vor allem im oberen Unterdevon.

II. Brachiopodenschichten.

a) Brachiopodenkalke,

meist mergelig, unterscheiden sich von der Facies Ib, mit der sie durch vielfache Uebergänge verbunden sind, durch das Vorwiegen der Brachiopoden und gehören in sämtlichen Devongebieten u. a. im Mittel- und Oberdevon von Deutschland, Russland

und in der Lower Helderberg group, zu den verbreitetsten Bildungen. Im allgemeinen nimmt — wie in den heutigen Meeren — mit der Zunahme thoniger Bestandtheile die Häufigkeit der Korallen ab; Ausnahmen von dieser allgemeinen Regel sind selten (Korallenmergel im Mitteldevon bei Gerolstein und im Oberdevon bei Aachen). Nicht hierher zu rechnen sind die Brachiopodennester, welche im Karnischen und Böhmischem Gebiet lediglich Lücken im Riff ausfüllen. Trilobiten erscheinen in II durchgängig häufiger als in I.

b) Brachiopodenmergel und -Schiefer

sind von IIa nicht scharf getrennt und nur durch grössere Häufigkeit der Brachiopoden und abweichende Beschaffenheit des Sedimentes zu unterscheiden; Rifffkorallen sind meist nur in einzelnen Exemplaren vorhanden und fehlen zuweilen gänzlich: Unterdevon von Nordfrankreich, Asturien, Bosphorus und Nordamerika; Schiefer der oberen Coblenzschichten (Olkenbach, Haiger). Im Mitteldevon allgemein verbreitet (z. B. Calceolamer gel in der Eifel und bei Torquay, Calceolaschiefer des Oberharzes, Hamilton group u. a. am Cayuga See, Russland). Im Oberdevon der Eifel (dolomitische Mergel von Büdesheim), Belgien (Famennien), Nordamerika (Chemung group), Russland.

Local finden sich in dieser Facies Anhäufungen von Crinoidenstielen (Crinoidenschicht von Gerolstein und Kerpen in der Eifel), Hamilton group (Encrinural limestone) von New York.

c) Spiriferensandstein

Dieser alte Name des Rheinischen und Harzer Unterdevon ist wohl am besten als Faciesbezeichnung für diejenigen Sandstein- und Granwacke-Schichten beizubehalten, in denen Brachiopoden durchans vorwiegen, Zweischaler, Crinoiden und Tentaculiten einigermaßen häufig sind, Gastropoden sehr zurücktreten, Cephalopoden und Rifffkorallen nur in höchst vereinzelt Exemplaren vorkommen. Die Trilobitengattung *Hemalotus* ist fast überall für die vorliegende Facies bezeichnend. Das Unterdevon in Westdeutschland, Belgien, Süd-Devonshire, in den Pyrenäen und am Bosphorus, der Oriskany-Sandstein in Nordamerika, das Famennien Belgiens z. Th., endlich das gesammte Devon von Nord-Devonshire gehören hierher.

Als besondere Ausbildungen lassen sich unterscheiden:

- a) Spiriferensandstein s. str. Die Gattung *Spirifer* waltet vor. Im ganzen Unterdevon überaus verbreitet.
- β) Choneteschichten. Bestehen fast nur aus Choneten. Coblenzschichten, Siegener Granwacke, unteres Mitteldevon von Graz.
- γ) Quarzite. Meist fossilleer (Quarzit-Dolomit von Graz und Languedoc, Ogdenquarzit in Utah). Wo wie im Taunus- oder Coblenzquarzit, eine Fauna vorkommt, erscheinen die Formen des Spiriferensandsteins in besonderem Reichtum an Individuen und grosser Artenarmuth.
- δ) Ctenocrinusbänke. Vereinzelt in den unteren und oberen Coblenzschichten.
- ε) Ostracodenschiefer. Anhäufungen von Ostracoden (*Primitia* nebst seltenen Beyrichien) und Brachiopoden. Nur im tiefsten Unterdevon Belgiens.

III. Zweischalerfacies.

Die hierher gerechneten Bildungen sind nur locale Entwicklungsformen des Spiriferensandsteins und mit diesem durch ähnliche unmerkliche Uebergänge verbunden wie Korallenkalk und Brachiopodenkalk. Die Bedeutung der Vorkommen liegt darin, dass im Devon¹⁾ die Zweischaler wenigstens local die Brachiopoden in den Hintergrund drängen. Hierher gehören die folgenden einzelnen Vorkommen.

- a) Pterinaeensandstein von Ems. (Miellen) und Grupont (Belgisch Luxemburg); obere Coblenzschichten mit massenhaften Pterinaeen, selteneren Gosseletien und Brachiopoden. Sandige Hamiltonschichten der Gegend von Albany (New York); die Aehnlichkeit der letzteren mit den geographisch und geologisch abweichenden Coblenzschichten ist bemerkenswerth.
- b) Gosseletiensandstein (*Goss. deronica* BARROIS) aus dem oberen Mitteldevon von Asturien.

¹⁾ Schon im Obersilur Gotlands kommen Sandsteine mit *Pterinea retroflexa*, *Aricula* und *Ariculopecten* vor.

- e) Schiefer mit *Myalina bilsteinensis* aus dem Mitteldevon (Lenneschiefer) von Bilstein und Schwelm in Westfalen.
- d) Porphyroidschiefer von Singhofen (Nassau) mit Avienliden und Dimyariern.
- e) Schichten vom Nellenköpfchen bei Coblenz, eine Anhäufung von Dimyariern in den unteren Coblenzschichten.
- f) Sandsteinbänke mit *Dolabra (?) Hardingi*, Einlagerungen im Oberdevon von Belgien (Famennien) und Nord-Devonshire.

Die bisher betrachteten Bildungen sind sämtlich an der Küste bzw. in flachen Meerestheilen gebildet worden, die folgenden sind als Absätze einer tieferen See bzw. als pelagische Sedimente aufzufassen. Berechnungen der absoluten Tiefe, in welcher einzelne Schichten abgelagert sind, halte ich vorläufig noch für wenig aussichtsvoll.

IV. Hunsrückschiefer und verwandte Bildungen

(etwa als Palaeoconchifacies zu bezeichnen).

a) Die Verschiedenheit der Hunsrückschiefer von der Masse des Spiriferensandsteins und die Entstehung desselben in tieferen Meerestheilen wird von allen Beobachtern hervorgehoben. Bezeichnend für den Hunsrückschiefer und die mit demselben verglichenen Bildungen ist das Auftreten grosser, dünnschaliger Muscheln (*Praelucina* [*Dalila*], *Puella* [*Panenka*] *Lunulicardium*, *Hemicardium*, *Cardiola*). Daneben finden sich Cephalopoden (Orthoeren, Cyrtoceren und Goniatiten) sowie Tentaculiten. Brachiopoden stehen nach Zahl der Arten und Individuen zurück, Die Dünnschaligkeit der Bivalven ist für diese an Cephalopoden reiche Facies bezeichnend; nur hier finden sich die eigentümlichen „Palaeoconchen“, während in den Sandsteinen, den Brachiopoden- und Korallenkalken dickschaligere Muscheln (z. B. *Megalodon*, *Myalina crassitesta* und *bilsteinensis*, *Pterinea*, *Gosseletia*) vorwiegen.

Die Hunsrückschiefer im engeren Sinne sind besonders durch die locale Anhäufung der in anderen palaeozoischen

Bildungen seltenen Seesterne und Crinoiden gekennzeichnet. Ein in mancher Hinsicht vergleichbarer Horizont der Pyrenäen (Schiefer von Cathervielle) ist besonders durch Trilobiten wie *Thysanopeltis*, *Dalmanites*, *Phacops fecundus* u. a.) ausgezeichnet; Vertreter der beiden letzteren Gruppen kommen auch am Rheine vor.

b) Tentaculitenschichten. Auch die durch das Vorkommen von Orthoceren ausgezeichneten Tentaculitenschiefer, welche im rechtsrheinischen Mitteldevon, in Thüringen (Knollenkalk des oberen Unterdevon), Böhmen (G₂, mit zahlreichen Goniatiten) im Unter- und Oberdevon von New York (Tentaculitenkalk) und am Bosporus eine wichtige Rolle spielen, sind am besten hier anzuschliessen. Ueber ihre pelagische Entstehung hat wohl nie ein Zweifel bestanden. Es sei daran erinnert, dass die Tentaculiten und Styliolen der in Rede stehenden Schiefer von den im Spiriferensandstein vorkommenden Arten¹⁾ dreierlei verschieden sind. Die schwarzen Kalklinsen der Nassauer Schiefer mit den Wissenbacher Goniatiten und Trilobiten sind schon eher in die folgende Gruppe, die eigentlichen Cephalopodenschichten, zu stellen.

c) Endlich schliessen sich die schwarzen, in mancher Hinsicht eigentümlich entwickelten Plattenkalk der böhmischen Stufe F₁ und der Harzgeröder Zieglhütte am besten hier an. (Novák, zur Kenntniss der Etage F₁, Prag 1886.) Das massenhafte Auftreten von dünnshaligen Palaeoconchen, Cephalopoden (*Orthoceras*, *Cyrtoceras*, erstes Vorkommen von *Gyroceras*), die Häufigkeit von Tentaculiten (*Tent. aenarius*) und Trilobiten erinnern durchaus an die vorher erwähnten Facies. Sehr bezeichnend für den Tiefseecharakter der böhmischen Bildungen ist endlich noch die Anhäufung von Hexactinellidennadeln (*Acanthospongia*), welche ganze Schichten zusammensetzen, erwähnenswerth die etwas grössere Häufigkeit kleiner Brachiopoden.

Das Auftreten des eigentümlichen Capulidengeschlechtes *Hercynella* sowie das Fehlen der Goniatiten in F₁ sind

¹⁾ Der die Basis des Lower Helderberg bildende Tentaculitenkalk dürfte zu dieser letzteren Gruppe gehören und — entsprechend dem Charakter der unmittelbar angrenzenden Schichten — im flachen Meere abgelagert sein.

als Merkmale von stratigraphischem Werthe anzusehen. Die in faeeller Hinsicht verschiedenartig gedeuteten Posidonien-schiefer des Cnlm stehen ebenfalls den besprochenen Bildungen nahe und dürften in tieferen Meerestheilen abgelagert sein. In diesem Zusammenhange könnten auch die zweifelhaften Graptolithenschiefer des Harzes erwähnt werden.

V. Die Greifensteiner Facies

wurde oben ausführlicher besprochen. Das Vorwiegen von den (im Devon sonst niemals massenhaft vorkommenden) Trilobiten, sowie von bestimmten glattschaligen Brachiopoden, ferner die Vergesellschaftung von Goniatiten, Orthoeceren, Crinoiden, Tiefseekorallen und Tentaeniliten sind bezeichnend; kleine Gastropoden und Zweischaler sind selten. Ausser den erwähnten unterdevonischen Vorkommen von Greifenstein, Cabrières, Knieprns und Michailowsk dürfte der Rotheisenstein von Brilon und vom Bücheuberg bei Wernigerode hierher zu rechnen sein (ob. Mitteldevon). Derselbe zeigt einige Anklänge an die gewöhnlichen Brachiopodenkalke.

VI. Die Cephalopodenschichten

zeigen trotz mancher petrographischer Verschiedenheiten grosse fannistische Uebereinstimmung. Cephalopoden sind unbedingt die herrschende Thierklasse und das Vorwiegen der einen oder anderen Gruppe (Orthoeratiten, Goniatiten oder Clymenien) ist wesentlich von dem Alter der betreffenden Schichten abhängig. Daneben finden sich Zweischaler (*Cardiola retrostriata*, *Posidonia venusta* und *Lunulicardium*) und Riffkorallen (*Petraia*, *Cladochonus*, *Amplexus*, durch Häufigkeit in verschiedenen Oberdevon-Horizonten ausgezeichnet), seltener Trilobiten (*Trimerocoephalus*), Brachiopoden (*Camerochoria* häufig in einzelnen Goniatitenschiefern) und Gastropoden. Ein weiteres Vorwiegen der dünnschaligen Muscheln bedingt ein Hinneigen zu den, unter IV beschriebenen Faciesbildungen; die schwarzen oberdevonischen Knollenkalke von Altenan (Harz), Wildungen und Cabrières, die Knollenkalke von Ilmböcep und Hasselfelde mit zahlreichen Arten von *Puella* [*Paucuka*] und *Regina* [*Kralowna*] stehen genau

in der Mitte und würden, falls dies noch nöthig wäre, die pelagische Entstehung der „Palaeoconchen-Facies“ erweisen.

Wesentlich nach petrographischen Gesichtspunkten lassen sich die nachfolgenden Subfacies unterscheiden:

a) **Bunte Cephalopodenkalke**; dichte, meist roth gefärbte, vielfach eisenhaltige Plattenkalke mit wohl erhaltenen Cephalopoden. Unteres Oberdevon: Martenberg und Cabrières, Eisenkalke und Rotheisensteine von Dillenburg. Mittleres Oberdevon: Cabrières. Clymenienkalk: Ebersdorf in Seblesien, Fichtelgebirge (Mehrzahl der Fundorte), Gross-Pal, Naples-Beds von New York.

b) **Kramenzelkalke**. Bunte und graue Knollen- oder Nierenkalke mit schlecht oder nur einseitig besser erhaltenen Steinkernen. Unterdevon: Karnische Alpen. Unt. Oberdevon: Saalfeld in Thüringen. Clymenienkalk: Mehrzahl aller Fundorte (Cabrières, Enkeberg, Wildungen etc.).

e) **Cephalopodenschiefer und -Mergel**, fast stets dunkel gefärbt, mit Versteinerungen in Eisenkies-Erhaltung. Die Goniatiten, Gastropoden und Brachiopoden sind fast sämmtlich durch geringe Grösse der Individuen ausgezeichnet. Mitteldevon: Orthocerasschiefer der Rheinlande und des Harzes. Unteres Oberdevon: Büdesheim, Cabrières, rothe Schiefer von Torquay. Mittl. Oberdevon: Nehden, Cabrières, Kéronezsee bei Brest. Diese Facies geht ohne schärfere Grenze in die Tentaculitenschiefer über, (denen Orthocerasschiefer und Kalklinsen eingelagert sind). Ebenso stellen die in Nassau, Thüringen und Süddevonshire mächtig entwickelten Cypridinenschiefer des Oberdevon nur eine besondere Ausbildung dar, oder genauer gesagt, sowohl die Nehdener Goniatitenschichten als die Kramenzelkalke (z. Th.) sind nur Einlagerungen der Cypridinenschiefer.

d) Die schwarzen schiefrigen Kalke mit Kalkknollen, welche durch Häufigkeit der Goniatiten und dünn-schaligen Muscheln ausgezeichnet sind, schliessen sich ebenfalls hier an. (Unt. Oberdevon von Südfrankreich und Westdeutschland.

VII. Die Old Red Sandstone-Facies,

ein Absatz aus riesigen Binnenseen mit Panzertischen, Landpflanzen, Eurypteren und Anodonta-ähnlichen Zweischalern sei

endlich zur Vervollständigung der Uebersicht erwähnt: ein mariner Ursprung derselben ist unwahrscheinlich.

Einem ersten Versuche, wie dem vorliegenden haften natürlich eine Reihe von Unvollkommenheiten an. Vor allem ist, wenn irgendwo so hier die systematische Eintheilung ein *grano salis* anzufassen. Wie auf dem Grunde der heutigen Meere die verschiedenen Sedimente und die Absätze ungleicher Meerestiefen in einander übergehen, ebenso war es auch in der Vorzeit der Fall. Man muss sich somit stets darüber klar bleiben, dass die aufgezählten Typen nur eine relative Bedeutung besitzen.

Es liesse sich z. B. wenig dagegen einwenden, wenn man die Palaeocoenhschichten und die Greifensteiner Faecies den Cephalopodenbildungen, die Zweischalerschichten dem Spiriferensandstein unterordnen wollte. Der numerische Uebergang von Korallen- und Brachiopodenschichten wurde bereits betont. Trotzdem zeigen, wie in den petrographischen Reihen, so auch hier die Endglieder bedeutsame Unterschiede.

Gewissermassen die Probe auf die Richtigkeit der gemachten Unterscheidungen würde durch die Wiedererkennung derselben innerhalb eines andersgearteten geologischen Bereiches gemacht werden können. Die alpine (mediterrane) Entwicklung des Lias enthält ganz ähnliche Faecies wie das Devon. Die geschichteten und massigen Korallenriffkalke (I) sind am Rofan und Sonnewaldjoeh petrographisch sehr ähnlich entwickelt.

Die im flachen Meere gebildeten Brachiopoden- und Zweischalerbänke der Grestener Schichten sind unseren gleichnamigen Gruppen II und III vergleichbar; auch die „Grauen Kalke“ von Südtirol zeigen entferntere Beziehungen. (Doch ist den genannten Bildungen der litorale Charakter viel schärfer aufgedrückt als den devonischen, in einem flachen, ausgedehnten Meere zum Absatz gelangten Sedimenten.) Am deutlichsten ist die Uebereinstimmung bei den Cephalopodenbildungen ausgeprägt. Die „bunten Cephalopodenkalke“ sind eine von WÄNNER¹⁾ für die tiefsten Adnetter Schichten (und die Hallstätter Kalke) aufgestellte Faecies-Bezeichnung, die, wie mir die Untersuchung

¹⁾ Zur heteropischen Differenzirung des alpinen Lias. Verhandl. d. geol. Reichsanstalt 1866, 7, 8.

des typischen alpinen Vorkommens erwies, ohne weiteres auf die Devonkalke übertragbar ist. Die Kramenzelkalke entsprechen den eigentlichen Adneter Knollenkalken (und den Pötschenkalken der norischen Stufe), die Cephalopodenmergel endlich den Fleckenmergeln des Allgäu. Die letzteren gelten allgemein als Absätze eines tieferen Meeres, die Knollenkalke mit Cephalopoden werden von MOJŠISOVIČ als umgelagerte Seichtwasserbildungen gedeutet, während WÄHNER mit Recht darauf hinwies, dass die Oberseite der Adneter Ammoniten stets corrodirt oder auch gänzlich zerstört sei. Er schloss daraus auf eine chemische Zersetzung des Gehäuses, welche nur in grösseren Meerestiefen vor sich gehen könne. Auf eine Vergleichung der Greifensteiner Facies mit den Hierlatzkalken verweist schon die überraschende Aehnlichkeit des Gesteins. Brachiopoden, und zwar hier wie dort stark variirende Formen, herrschen in beiden Facies vor; Cephalopoden und Gastropoden treten wesentlich zurück, bilden aber doch einen charakteristischen Bestandtheil der Fauna. Der Hauptunterschied zwischen der eigentlichen Cephalopodenfacies sowie den Hierlatz- und Greifensteiner Kalken besteht in der geringeren Häufigkeit der Cephalopoden. Das eigentümliche Vorkommen des Hierlatzkalkes in Klüften und Taschen des rhaetischen Dachsteinkalkes hat sich zwar bei der Greifensteiner Facies nicht nachweisen lassen; aber eine Aehnlichkeit besteht insofern, als auch die letztgenannten Ablagerungen überall geringe Ausdehnung besitzen und vollkommen aus organischen Resten zusammengesetzt sind. Am Pic de Cabrières, wo ansgedehntere Aufschlüsse zu beobachten sind, besteht leider die Masse des Gesteins aus schichtungslosen, versteinungsleeren Kalk; es muss unentschieden bleiben, ob die Versteinungsanhäufungen Ausfüllungen von Klüften oder nicht-umgewandelte Partien innerhalb einer durch Gebirgsdruck krystallin gewordenen Masse sind.

4. Stratigraphische Vergleiche.

a) Das Grazer Devon.

Ueber die Altersstellung des Grazer Devon habe ich vor kurzer Zeit einige Mittheilungen veröffentlicht, in denen ausgeführt war, dass der Kalk von Steinbergen durchaus dem

Clymenienkalk entspricht und dass der von STACHE verschiedenen Horizonten zugeweilte Korallenkalk dem Mitteldevon allein gleich zu stellen ist. Der Kalk des Hochlantsch (an dessen Untersuchung ich durch schlechtes Wetter verhindert war), wurde dort in Uebereinstimmung mit Herrn Professor HOERNES dem Korallenkalk zugetheilt. (Mittheilungen des naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark für 1887.) Bemerkenswerth ist bei dieser Altersdeutung die Rückkehr zu den früheren, wesentlich auf F. ROEMERS Bestimmungen beruhenden Ansichten über das Grazer Devon.

Seitdem hat K. A. PENECKE durch palaeontologische Untersuchungen sowie durch geologische Beobachtungen die Kenntniss des Mitteldevon in erfreulicher Weise erweitert. (Dieselben Mittheilungen für 1887, S. 17.) Zu den wichtigeren Ergebnissen gehört die Auffindung von *Calceola sandalina* auf der Tyrnaner Alp, sowie der Nachweis, dass der Hochlantschkalk nicht mit dem Korallenkalk der näheren Umgegend von Graz zu vereinigen ist, sondern dem höheren Mitteldevon entspricht. *Stringocephalus Bartini* ist jedoch nicht gefunden worden.

Die Gliederung des Grazer Mitteldevon und die Vertheilung der wichtigeren Versteinerungen sind auf der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Die beiden Columnen rechts veranschaulichen die Altersdeutung PENECKE'S und meine in einem Punkte abweichende Auffassung. K. A. PENECKE rechnet die Kalke mit *Heliolites Barrantei*, d. h. den eigentlichen (historischen) Korallenkalk der Umgegend von Graz zum oberen Unterdevon, weil die darüber liegenden Kalkschiefer und Calceolakalke angeblich die Fauna des tiefsten rheinischen Mitteldevon enthalten. Derselbe hat hierbei die Zusammenstellungen unberücksichtigt gelassen, welche E. KAYSER und ich für die verticale Vertheilung der Brachiopoden und Korallen des rheinischen Devon gegeben haben. Hiernach entspricht die Fauna der alpinen Calceolakalke nicht den westdeutschen Calceolaschichten in toto sondern nur deren oberstem Theile. Von den namhaft gemachten Versteinerungen kommen *Cyathophyllum plumum*, *Endophyllum elongatum* und *Favosites polymorphus* erst von den oberen Calceolaschichten, *Spirifer undiferus* erst von der Crinoiden-

schicht an aufwärts vor; auch *Heliolites porosus* und *Pentamerus globus* haben ihre Hauptverbreitung erst von den oberen Calecolaschichten an und finden sich tiefer nur als grosse Seltenheit. Die in der Tabelle nicht nummerirten Versteinerungen sind allgemein verbreitet.

Ebenso wenig spricht die z. Th. recht eigenartige (*Pentamerus Petersi* und *Clari*) Fauna der Barrandeischichten für eine Zurechnung zum Unterdevon. Die im Verzeichniss PENECKES mit 1—8 bezeichneten Arten sind sämmtlich nur aus dem Mitteldevon bekannt, so vor allem *Spirifer speciosus*, die Gattung *Copressocrinus* und *Orthocras victor* BARR.; auch die Zone G₃, der die letztgenannte Art entstammt, wird jetzt fast allgemein zum Mitteldevon gerechnet. Als unterdevonische Typen sind nur die zweifelhaften und schlecht erhaltenen Dalmaniten zu nennen. Vier weitere von mir bestimmte mitteldevonische Arten (so *Cyath. Lindströmi*) scheint PENECKE für abweichende neue Formen zu halten. Ein endgiltiges Urtheil hierüber ist selbstverständlich vor dem Erscheinen der Abbildungen unmöglich. Doeh habe ich mich an einer Art (*Cyath. Frechi* PENECKE, die wir gemeinsam am Osternigg gefunden haben) überzeugt, dass PENECKE den Artbegriff zu enge fasst. Die genannte Koralle stimmt vollkommen mit *Cyath. verniculari* var. *praecursor* FRECH überein. Wenn die abweichenden Formen l. c. als „Stammformen“ mitteldevonischer Arten angesehen werden, so kann man an Stelle dieses Ausdruckes mit demselben Rechte „vicariirende Formen“ einsetzen.

Die Berufung PENECKES auf die ebenfalls gemeinsam gemachte Entdeckung des Vorkommens von *Heliolites Barrandei* bei Vellaeh in den Karawauken ist ohne überzeugende Kraft. Allerdings befinden sich die Kalke mit *Heliolites Barrandei* hier im Liegenden der Riffmassen, welche *Alcolites suborbicularis* führen und dem Stringoecephalenkalk entsprechen; doeh ist die Stellung der F-Kalke mit *Spirifer secans*, *Bronteus transversus*, welche nach PENECKE das unmittelbare Liegende des Barrandei-Horizontes bilden sollen, einigermaßen unsicher. Denn die genannten F-Versteinerungen sind bisher nur in losen Blöcken gefunden worden. Hingegen erscheint an der fraglichen Stelle — wahrscheinlich unmittelbar im Liegenden der Barrandei-Kalke — ein Crinoidenkalk mit *Phacops*

Sternbergi, der dem oberen böhmischen Unterdevon (G₁) entspricht. (Vgl. oben und Zeitschrift d. deutschen geolog. Ges. 1887. S. 670.) Die Verhältnisse von Vellach erweisen also grade die Unrichtigkeit der Anschauungen PECKES.

| Horizonte | Wichtigere Versteinerungen | nach PECKE | Deutungen nach FIECHT |
|---|---|-------------------------------------|---|
| Clymenienkalk mit | <i>Clymenia lacrigata</i> , <i>undulata</i> , <i>speciosa</i> | | Oberes Oberdevon |
| Lilke | | | |
| Hochlautschalk mit | <i>Cyathophyllum quadrigranatum</i> | | Stringocephalus-Schichten |
| Calceola-Kalke mit | 1. <i>Cyath. planum</i> , 2. <i>Endoph. elongatum</i> ,
3. <i>Favosites polymorphus</i> , 4. <i>Spirifer un-</i>
<i>defensus</i> , 5. <i>Pentamerus globus</i> , <i>Calceola</i>
<i>sarantiana</i> , <i>Heliolites porosus</i> , <i>Cystiphyllum</i>
<i>vesiculosum</i> , <i>Antopora tubaeformis</i> , <i>Alreo-</i>
<i>lites suborbicularis</i> | Calceola-Schichten | Crinoiden- und obere Calceola-schichten |
| Kalkschiefer des Hu-
benhalt mit | <i>Heliolites porosus</i> , <i>Endophyllum elongatum</i> ,
<i>Alreolites suborbicularis</i> „ <i>Catophyllum</i> “
<i>Stachei</i> , <i>Favosites</i> , in der Varietät des Bar-
randelhorizontes | Cantrijugatus-Schichten | |
| Horizont des <i>Hel.</i>
<i>Barrandei</i> (Korallen-
kalk von Graz) mit | 1. <i>Spirifer speciosus</i> , 2. <i>Orthiscerus victor</i> ,
<i>Copressocrinus</i> sp., 4. <i>Streptorhynchus</i>
<i>nubeculum</i> , 5. <i>Favosites reticulatus</i> , 6. <i>Stro-</i>
<i>matopora concutrica</i> , 7. <i>Antopora minor</i> ,
<i>Heliolites Barrandei</i> , <i>Canopora placenta</i> ,
<i>Murchisonia</i> cf. <i>bifurcata</i> , <i>Pentamerus</i>
<i>Petersi</i> , <i>Pentamerus Clari</i> | Oberes Unterdevon = G.
BARRANDE. | Untere Calceolenschichten etwa = G ₂ |
| Diabas | | | |
| Quarzit-Dolomitstufe | Crinoiden-
arste | | Unteres Unterdevon = F.
BARRANDE. |
| Semiraiher Schiefer. | | | |

b) Vergleich mit Böhmen.

Die devonischen Korallenriffe der Ostalpen stimmen in Bezug auf die Entwicklung der Fauna und Faecies vollkommen mit den weissen Kalken von Konieprus überein; allerdings besitzen die letzteren viel geringere Mächtigkeit und sind auch in ihrer stratigraphischen Stellung auf den oberen Theil der Stufe F₂ beschränkt (der untere Theil wird von rothen Plattenkalken der Greifensteiner Faecies eingenommen).

Bei einem Vergleich der vorliegenden böhmischen und ostalpinen Fauna ist selbstredend davon auszugehen, dass die erstere bei weitem eingehender erforscht ist und dass somit das Fehlen einzelner Gruppen in den Ostalpen auf die Lückenhaftigkeit unserer Kenntnisse zu schieben ist. Ferner sind die Gastropoden, Crinoiden und Korallen der Prager Gegend noch nicht bearbeitet worden. Es bleiben also für den eingehenderen Vergleich Trilobiten, Zweischaler und Brachiopoden übrig, deren Uebereinstimmung in Bezug auf Gattungen und die Mehrzahl der Arten augenfällig ist. Das Vorkommen neuerartiger Formen in den Alpen ist selbstredend anders zu beurteilen wie der umgekehrte Fall; aber auch in dieser Hinsicht sind die Abweichungen gering: Bezeichnenderweise hat die eine der eigentümlichen Gattungen, das Atrypidengeschlecht *Karpinskia* TSCHERNYSCH, seine Verwandten im Ural, die andere, *Myalinoptera* FRECH (zu den Avienliden gehörig) in Nordfrankreich. *Amphicoelia*, deren nächste Verwandte im amerikanischen Obersilur leben, ist in Europa anderweitig nicht gefunden worden.

c) Nordfrankreich.

Die Unterdevonkalke von Nordfrankreich stellen in faciemer Beziehung die Mitte zwischen den Harzer und den böhmischen Vorkommen dar. Das Devon der Loire-Inférieure ist durch BARROIS in einer geradezu unsterblichen Localmonographie¹⁾ genauer untersucht worden und besteht aus einer ca. 1000 m. mächtigen Masse von Thonschiefeln, welcher Kalkbildungen von verschiedener Dicke und verschiedenem Alter (Unter- bis Oberdevon) eingelagert sind. Die in erster Linie bedentsamen Unterdevonkalke sind in drei palaeontologisch

¹⁾ Faune du cataire d'Erbray, Lille 1889.

untersehbare Zonen gegliedert und besitzen eine Mächtigkeit von über 100 m. (während die Kalklinsen des Harzes selten mehr als 10 m. erreichen und stets rasch auskeilende, linsenförmige Massen darstellen).

Der Charakter der Fauna innerhalb des Unterdevonkalkes ähnelt nach der Beschreibung von BARROIS am meisten dem der Vellacher Gegend; Crinoidenbreeeen wiegen vor, in anderen Bänken gewinnen Brachiopoden, Korallen oder Bryozoen die Oberhand (letztere sind in den Alpen sehr selten, bei Konieprns hingegen sehr häufig). Stets ist in einer bestimmten Bank eine Tiergruppe durch besondere Häufigkeit ausgezeichnet. Eigentliche Korallenriffe werden nicht beobachtet.

Nach der Tabelle sind die Rifffkorallen in der unteren Zone am häufigsten und treten in der mittleren mehr zurück. Hier (und in der oberen Abhebung) findet sich die sonst für Cephalopoden-Facies bezeichnende Gruppe des *Orthoceras* (*Jovellania*) *triangularis* (G., Hasselfelde, Bieken). Im übrigen stellen die oben (S. 274) bei der Schilderung der Korallenfacies genannten, bei Konieprns, in den Alpen und im Harz häufigen Brachiopoden und Gastropoden den Hauptbestandtheil der genannten Fauna dar. Die geographischen Unterschiede sind im Allgemeinen unbedeutend. Die glatten von Erbray beschriebenen Terebratuliden *Centronella* und *Cryptonella* sind in Böhmen wahrscheinlich unter anderen Gattungsuamen (vor allem wohl unter dem eigentümlichen Collectivbegriff *Merista* BARRANDE non auct.) versteckt geblieben. Die möglicherweise hierher gehörenden Kärntner Brachiopoden sind ungünstig erhalten.

Die in schönen Exemplaren abgebildete *Meganteris* verbreitet sich bis zum Ural, fehlt aber in Böhmen und Kärnten. Die eigentümliche Aviculidengattung *Myalinoptera* ist bisher aus Böhmen und dem Ural noch nicht beschrieben worden. Die einzigen, dem Westen eigentümlichen Formen scheinen die gerippten, stark verbreiterten Athyrisarten (Gruppe der *Ath. Esquerra*) zu sein; doch finden sich diese als Seltenheit wenigstens in den westdeutschen Coblenzschichten; auch *Athyris Campomanesi* (Wolayer Thörl) dürfte hierher gehören. Dagegen ist das Fehlen der Zweischalergattungen *Puella* (= *Panenka*) und *Cardiola* erwähnenswert.

In stratigraphischer Hinsicht deutet BARROIS — wesentlich auf Grund palaeontologischer Analogien — die Kalke von Erbray als tiefstes Unterdevon. Eine besondere Wichtigkeit wird hierbei dem Vergleich von *Spirifer Decheni* KAYS. mit *Sp. primaevus* KOCH beigegeben. (S. 275).

BARROIS geht von der unrichtigen Annahme aus, dass der *Spirifer Decheni* der Wieder Schiefer auch im Taunusien vorkäme.¹⁾ Vielmehr bildet *Sp. Decheni* die Zwischenform von *Sp. primaevus* (tieferes Unterdevon) und *Sp. cultrijugatus* (mit. Mitteldevon), spricht also grade für ein intermediäres Alter der Kalke von Erbray. Auch der l. e. genannte *Spirifer Daousti* kommt anderwärts im oberen Unterdevon vor. Ebenso wenig könnten etwa die beiden von Erbray beschriebenen ?Hercynellen für die Horizontirung als tieferes Unterdevon angeführt werden, da dieselben wohl besser als *Platyceerasarten* von flacher Form zu bestimmen sind. Auch führt E. KAYSER neuerdings *Hercynella* aus dem Mitteldevon von Günterod an.

Grösseren Werth als auf die einzelnen Arten legt BARROIS mit Recht auf die Uebereinstimmung der Fauna von Erbray mit dem unteren Wieder Schiefer, den er im Sinne der älteren, später verlassenen Anschauung als tiefstes Unterdevon deutet. Der Hauptquarzit soll den Coblenzschichten im Ganzen und die unteren Wieder Schiefer dem tiefsten Unterdevon (Gédinnien) entsprechen. Jedoch ist das Liegende der Coblenzschichten nicht das Gédinnien, sondern die Siegener Grauwacke und der Hauptquarzit entspricht nicht den gesammten Coblenzschichten sondern nur dem allerobersten Theile derselben. Man wird somit schon auf Grund dieser Erwägung die unteren Wieder Schiefer und die Kalke von Erbray etwa mit den unteren Coblenzschichten bezw. mit dem unteren G oder dem oberen Unterdevon von Vellach vergleichen können.

Seither ist auch OENLERT²⁾ auf Grund eingehender stratigraphischer Beobachtungen zu einer übereinstimmenden Auf-

¹⁾ *Spirifer Beaujani* BÉCLARD aus der Siegener Grauwacke (= Taunusien) von St. Michel in Belgien stimmt nicht, wie BARROIS annahm, mit *Spirifer Decheni*, sondern — wie ich durch Untersuchung der Original-exemplare von BÉCLARD feststellen konnte — mit *Spirifer primaevus* überein.

²⁾ Sur le Dévonien des environs d'Angers, Bull. soc. géol. de France [3], t. 17, p. 742 ff. 1896.

fassung über das Alter des Kalkes von Erbray gelangt. Die Kalkfaeies unterliegt nach ihm kleineren Schwankungen in ihrer stratigraphischen Stellung und geht auch in noch höhere Schichten des Unterdevon hinan, da z. B. bei Laval der Kalk von Erbray im Hangenden der Schichten mit *Athyris undata* auftritt. Die folgende kleine Tabelle giebt der neueren Auffassung Ausdruck.

| Böhmen Harz | | | | |
|--|---------------------|---|----------------|------------------------|
| Kalk von Erbray (Loire Inférieure), St. Malo und Fourneaux (Angers) Chassegrin (Sarthe) St. Germain le Fouilloux (Mayenne) | Untere Coblenzstufe | | G ₁ | Untere Wieder Schiefer |
| Sandstein von Gahart mit <i>Orthis Mounieri</i> | „Tannuslen“ | Siegener Grauwacke Taunusquarzit und Huntrückschiefer | F | Tanner Grauwacke |
| Quarzit von Plougastel | Gédinnien | Ältere Taunusgesteine | | |

In Bezug auf die Stellung des böhmischen „Hereyn“ besteht immer noch eine Meinungsverschiedenheit zwischen deutschen und französischen Forschern; F, G, H soll auch nach OEHLEKT'S Ansicht ganz oder zum Theil dem „Silnrien“ erhalten bleiben.

Der Einwand, den derselbe gegen die in Deutschland herrschende Auffassung macht, ist allerdings leicht zu widerlegen: Der französische Forscher vermisst in Böhmen die Äquivalente für die mächtigen und palaeontologisch wohl charakterisirten Sandsteine von Gahart und die Quarzite von Plougastel. Wenn jedoch, wie OEHLEKT selbst nachgewiesen hat, die Erbray-Kalke dieselbe hohe Stellung im Unterdevon einnehmen, wie die Wieder Schiefer, so vertritt naturgemäss die böhmische Stufe F die nordfranzösischen Quarzite und Sandsteine. Die Faieiesentwicklung ist allerdings ngeniecin verschieden.

d) Vergleich mit den Wieder Schiefern des Harzes.

Bei einem Vergleich mit den Kalken der unteren Wieder Schiefer im Harze ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass in

der Monographie KAYSERS die Grundfrage der Zugehörigkeit zum Silur oder Devon im Vordergrund stand und dass somit den verschiedentlichen faciiellen und stratigraphischen Verschiedenheiten der einzelnen Kalkklinsen nicht hinreichend Rechnung getragen werden konnte. Auch abgesehen von den Hauptgruppen der Graptolithenschiefer, Brachiopoden- und Cephalopodenkalken lassen sich noch verschiedenartige Unterscheidungen machen.

Betreffs der erstgenannten Bildungen ist daran zu erinnern, dass Graptolithen — abgesehen von einem in Böhmen an der unteren Grenze von F_1 gefundenen Reste und einem ebenfalls vereinzelt Exemplar in der Lower Helderberg group¹⁾ — in anderen Devon-Gebieten niemals in grösserer Zahl aufgefunden sind.

Die Harzer Graptolithen, welche eine vollständige kleine Fauna darstellen, werden — was das Auffallende ihres Erscheinens noch vermehrt — von der oberen Grenze des Unterdevon angeführt. Von englischen und schwedischen Forschern wurden der Annahme eines devonischen Alters der Graptolithen bisher nur Zweifel entgegengebracht.

Unter den Cephalopodenkalken sind drei Gruppen zu unterscheiden:

- a) Die Plattenkalken von Hasselfelde mit ihrer mitteldevonischen Fauna, die zwischen G_3 (Prag) und Wissenbach vermittelt.
- b) Die Kalken von Joachimskopf bei Zorge und Sprakelsbach mit *Aphyllites zorgensis* A. ROEM. sp. (= *Goniatites excavus* KAYS., non BUCH = *Gon. fecundus* BARR. ex parte) einer Art des oberen Unterdevon Böhmens (G_1 G_2).
- c) Die schwarzen Kalken der Harzgeröder Ziegelei ohne Goniatiten, aber mit zahlreichen Orthoceren (darunter *Orthoceras dulce* BARR. aus E_2), Hereynellen und Praelucinen (= *Cardiola* bei KAYS. = *Praelucina* + *Dalila* bei BARR.).

Schon KAYSER wies auf die Ähnlichkeit dieses Fundortes mit den schwarzen Plattenkalken von Butowitz (F_1) hin, welche

¹⁾ Dieses von Herrn Prof. BEECHER in New Haven gefundenes Stück ist noch nicht näher bestimmt.

dieselben Thiergruppen enthalten. Es ist nicht sicher, dass diese Schichten auch wirklich die ältesten versteinерungsführenden Bildungen der Wieder Schiefer sind; aber die Wahrscheinlichkeit spricht dafür.

Der Brachiopodenfacies gehören die meisten Kalkvorkommen des Harzes an und zeigen, soweit diese vorherrschende Thierklasse in Betracht kommt, grosse Aehnlichkeit mit den Konieprnser Riffkalcken (oberer Theil von F₂): Gerippte Rhynchonellen, Spiriferen und Pentameren wiegen dorehans vor, während die bezeichnenden Vertreter der Greifensteiner Fauna so gut wie gänzlich fehlen; nur *Phacops fecundus* besitzt einige Verbreitung. Auch Riffkorallen kommen, wenn auch nicht besonders häufig, an den Hauptfundorten der Brachiopodenkalcke vor: Mägdesprung, Schneckenberg, Zorge und Radebeil. Die unter verschiedenen, meist aus anderen Gründen hinfalligen (*Dania*) Namen beschriebenen Tabulaten *Dania*, *Emmonsia* und *Beaumontia* gehören sämmtlich in die Gruppe des *Favosites Goldfussi*.¹⁾ Eigentliche Korallenkalcke fehlen hingegen und damit auch die grossen dickschaligen Gastropoden wie *Trematolus*, *Pleurotomaria*, *Bellerophon*, *Loxoneura*. Formen aus der Verwandtschaft des *Platystoma naticopsis* finden sich hier wie bei Vellach auch in Brachiopodenkalcken ohne Korallen; die Harzer Arten *Platystoma naticoides* und *Giebeli* vertreten die böhmische *Platystoma naticopsis* var. *gregaria* BARR. sp.²⁾ (= *Natica gregaria* BARR.).

Unter den Brachiopodenkalcken nimmt der Scheerenstieg bei Mägdesprung eine etwas vereinzelt Stellung ein. Die Riffkorallen fehlen gänzlich; dafür findet sich allein hier

¹⁾ *Petraia* findet sich auch hier im Cephalopodenkalcke (Sprakelsbach).

²⁾ Die sonstigen *Platyceras*arten finden sich in den Korallenschichten, den Brachiopodenkalcken und in der Greifensteiner Facies. Ihre Häufigkeit im „Hereynischen“ Unterdevon ist bemerkenswerth, aber vielfach, besonders von BARROIS überschätzt worden. *Platyceras*arten finden sich z. B. in den Granwacken der unteren Coblenzstufe, im oberen Mitteldevon von Cabrières und im Mitteldevon der Eifel recht häufig; in der Crinoidenschicht bei Gerolstein erscheinen diese Formen in solcher Masse, dass man diese Schichten mit demselben Rechte wie das Hereyn als „Capulien“ bezeichnen könnte.

Meganteris; auch *Dalmanites (Odontochile) tuberculatus* A. ROEMER ist beinahe auf dieses Vorkommen beschränkt. Beide Thiere deuten auf höheres Unterdevon: *Odontochile* kennzeichnet vor allem die Stufe G_1 und *Meganteris* findet sich am Rhein nur in den Coblenzschichten. Doch soll nicht behauptet werden, dass diese Schichten einen von den übrigen verschiedenen Horizont einnehmen. Auch für die normalen Brachiopodenkalke ergibt sich aus den oben geäußerten allgemeinen Gründen eine Stellung im oberen Unterdevon (G_1); der Umstand, dass die Fanna mehr an F als an G erinnert, ist ebenso zu erklären, wie der Charakter der Vellacher Kalk mit *Phacops Sternbergi*: In den Karawanken wie am Harz erscheint die für das böhmische F_2 bezeichnende Faies in höheren Schichten. Auch die Unterschiede der typischen Brachiopodenkalke (mit Favositen) und der Cephalopodenschichten von Sprakelsbach und Joachimskopf (am letzteren Orte kommen daneben auch Brachiopodenkalke vor), können recht gut durch die Annahme heteroper Verhältnisse innerhalb des oberen Unterdevon erklärt werden. Hingegen ist für die Vorkommen von Hasselfelde und Harzgerode eine höhere beziehungsweise tiefere stratigraphische Stellung sehr wahrscheinlich.

e) Vergleich mit dem Unterdevon des Ural.

Im Ural entsprechen, wie die vortrefflichen Arbeiten von TSCHERNYSCHEW zeigen, die Kalksteine der oberen Belaja der Stufe F_2 und den Korallenkalcken der Karnischen Alpen.

Die Faiesentwicklung erinnert am meisten an die vereinzelt bei Vellach vorkommenden korallenarmen Brachiopodenkalke. Auch am Ural finden sich neben spärlichen Riffkorallen die bezeichnenden Brachiopoden der Korallenfaies, die gerippten Rhynchonellen und Spiriferen, *Pentamerus optatus*, eine Localform des *Pentamerus acutolobatus*, *Strophomena Stephani*, ein Verwandter von *Streptorhynchus distortus*, ausserdem zahlreiche grosse Gastropoden, u. a. *Trochus pressulus* TSCHERN. sp., *Platystoma* und *Polytropis* („Turbo“ *lactus* BARRANDE vom Ural ist eine vicariirende Form von „Cyclo-

nema“ *Guilleri*, welche Art bei Erbray und am Wolayer Thörl vorkommt). Bemerkenswerth ist das (im Westen nicht beobachtete) Zusammenvorkommen von *Hercynella* mit den genannten Brachiopoden und Gastropoden.

Orthoeren scheinen am Ural etwas häufiger zu sein als es sonst in derartigen Faiesbildungen der Fall zu sein pflegt; Trilobiten treten vollkommen zurück. Das untergeordnete Vorkommen der Greifensteiner Faies wurde schon erwähnt.

X. KAPITEL

Das Carbon.

Die Discordanz, welche in Nordeuropa, Südfrankreich und Spanien das obere Carbon von den tieferen Schichten scheidet ist auch innerhalb der Karnischen Alpen in ausgesprochenstem Maasse vorhanden. Nach der Ablagerung der älteren Steinkohlenschichten erfolgte eine Faltung und Aufwölbung der gesammten älteren Bildungen; die beiden Carbon-Abtheilungen sind somit am leichtesten und einfachsten nicht durch die, in dem Untercarbon nur spärlich auftretenden Versteinerungen, sondern durch die Lagerungsverhältnisse zu unterscheiden. Weugleich die obercarbonischen Bildungen von zahlreichen Brüchen, Abbiegungen und Kniekungen durchsetzt sind, so ist doch die Lagerung der petrographisch überaus mannigfachen Schichten flach (Taf. XVI) oder unter geringen Winkeln geneigt, nur ansahmsweise (Garuitzenhöhe) steil aufgerichtet; die unteren carbonischen Bildungen stehen hingegen mit geringen Ausnahmen saiger.

Der scharf ausgeprägten Discordanz entspricht die Verschiedenheit der organischen Reste. Die beiden Abtheilungen des Carbon haben in unserem Gebiet kaum eine einzige Art gemein, und auch die Gattungen weisen bemerkenswerthe Verschiedenheiten auf. Ebenso ist der allgemeine Charakter der Fauna in wesentlichen Punkten abweichend, trotzdem in der Faciesentwicklung viele Aehnlichkeit besteht: Der Hauptunterschied ist das Erscheinen von Fusuliniden, sowie der Brachiopodengattung *Enteles* und der Gruppe des *Spirifer fasciger* in der oberen Abtheilung.

I. Das Untercarbon.

Das Untercarbon wird durch zwei Formationen vertreten, welche räumlich von einander getrennt und ihrer Bildungsweise nach von einander verschieden sind: Im Norden des Gailflusses, westlich vom Dobratsch, nördlich von Nötsch, stehen die Nötscher Schichten (nov. nom.) an, welche eine marine Fauna mit *Productus giganteus* enthalten und vorwiegend aus Granwacken und Conglomeraten bestehen. Auf der Südadachung der Karnischen Hauptkette findet sich typischer Culm, welcher Landpflanzen führt und vorherrschend aus Thonschiefer besteht. In beiden Gebieten spielen deckenförmig auftretende Diabase nebst den dazu gehörigen Tuffen eine wichtige Rolle. Das lagerförmige Auftreten der Eruptivgesteine wird dadurch erwiesen, dass dieselben von der mitteleuropäischen Faltung in gleicher Weise wie die normalen Sedimente mit betroffen wurden.

a) Die Nötscher Schichten mit *Productus giganteus*.

Ein besonderer Name für die Nötscher Schichten erscheint notwendig, weil das Auftreten der Fauna mit *Productus giganteus* einen wesentlichen Unterschied von den südlichen, durch Landpflanzen gekennzeichneten Culmbildungen bedingt und weil die Bezeichnung „Kohlenkalk“ für ein äusserst kalkarmes, aus Grauwacke, Conglomerat und Schiefer bestehendes Gebilde nicht wohl angängig ist.

Die vorherrschenden Gesteine der Nötscher Schichten sind Grauwacke bzw. Grauwackenschiefer und Quarzconglomerat; der eigentliche Thonschiefer tritt zurück und enthält nur ausnahmsweise — in den versteinungsreichen Bänken — etwas kohlenanreichen Kalk. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass das Material dieser klastischen Gesteine zerstörter Quarzphyllit ist; besonders treten in den Conglomeraten die weissen Quarzkiesel — die abgerollten Fasern des Phyllits — in der dunklen Grundmasse deutlich hervor.

Den normalen Sedimenten eingelagert sind zwei Grünsteinzüge, welche in dem Durchschnitte des Nötschgrabens ihre grösste Mächtigkeit erreichen und nach W zu in den Grauwacken auskeilen. Die beiden Eruptivlager des Nötschgrabens

sind nicht als Theile derselben Syn- oder Antiklinale bezw. als getrennte „Schuppen“ aufzufassen, da die petrographische Verschiedenheit sehr ausgeprägt ist. Andererseits kann die Altersverschiedenheit beider nur unerheblich sein, da die Schichten mit *Productus giganteus* sowohl zwischen beiden Lagern wie nördlich derselben vorkommen.

Der nördliche Zug besteht aus grünen Schalsteinconglomeraten, die besonders durch das Vorkommen weisser oder rosafarbener, vollkommen marmorisirter Kalkgeschiebe ausgezeichnet sind. Dieselben erreichen bis zu 1 m. Durchmesser und sind wohl als umgewandelte Devon- und Silurkalke aufzufassen, die von dem ausbrechenden Diabas mit emporgerissen wurden. Das gröbere krystalline Gefüge lässt diese contactmetamorphen Gebilde auf den ersten Blick von den Gesteinen unterscheiden, welche in den Karnischen Alpen auf dynamometamorphen Wege aus einer, wahrscheinlich gleichartigen Grundmasse gebildet wurden. (Vergl. im übrigen den petrographischen Anhang oben.) Die in Verbindung mit den Schalsteinen auftretenden grünen Granwacken sehen dichten Eruptivgesteinen so ähnlich, dass erst durch die mikroskopische Untersuchung (vgl. oben S. 179) die wahre Natur dieser Gebilde ermittelt werden konnte.

In dem südlichen Zuge des Nötsehgrabens finden sich fast anschliesslich körnige, dioritische Gesteine, während Tuffe und Schalsteine gänzlich fehlen. Die Diorite sind an der Dislocationsgrenze gegen den Quarzphyllit deutlich geschiefert. (Vergl. oben S. 176.)

Die Fauna der Nötseher Schichten ist bereits im Jahre 1873 von DE KONINCK monographisch beschrieben worden.¹⁾ Leider sind die Abbildungen nicht sonderlich gelungen, insbesondere sind die Zweischaler (Taf. III) z. Th. wahre Zerrbilder; jedoch unterscheidet sich die Bearbeitung vortheilhaft von den letzten Monographien des belgischen Forschers, welche die bekannte Confusion auf dem Gebiete der Kohlenkalkversteinierungen zur Folge gehabt haben. In der Arbeit ist nur der reichere, seit langem bekannte Fundort beim Oberhöher

¹⁾ Recherches sur les animaux fossiles 2. Monographie des fossiles carbonifères de Bleiberg en Carinthie. Bruxelles und Bonn 1873.

bertücksichtigt; die im Thorgraben entdeckte kleine Fauna stimmt — abgesehen von dem Zurücktreten der Zweischaler und Schnecken sowie der grösseren Häufigkeit der Korallen — mit der ersteren überein. Die Brachiopoden und unter diesen die Producten (*Pr. latissimus*, *giganteus* und *punctatus*) bilden den bei weitem vorwiegenden Bestandtheil der Fauna. Crinoidenstiele sind beim Oberhöher, Reste von Riffkorallen im Thorgraben häufig (*Lonsdaleia rugosa* McCoy in typischen Exemplaren, welche von denen des niederschlesischen Kohlenkalkes nicht zu unterscheiden sind). Zweischaler und Schnecken treten der Zahl der Individuen nach zurück, wenngleich die Menge der Arten nicht unerheblich ist. Cephalopoden und Trilobiten gehören zu den grössten Seltenheiten. Vereinzelt kommt auch der den Culm der südlichen Karnischen Alpen kennzeichnende *Archaeocalamites radiatus* A. Bronn. vor. Der gesammte Charakter der Fauna, vor allem die Häufigkeit dickschaliger Gehäuse (*Productus latissimus*, Spiriferen, *Edmondia Haidingeriana*, *Euomphalus catillus*) weisen auf eine Flachsee hin, in welcher durch die Massen von thonigem und sandigem Sediment die Entwicklung der Riffkorallen gestört wurde.

Ueber die Gleichstellung der Nötscher Schichten mit der oberen Zone des belgischen Kohlenkalkes (Calcaire de Visé) kann angesichts der grossen Anzahl übereinstimmender Arten ein Zweifel nicht bestehen. Es sei daran erinnert, dass die viel umstrittene Gliederung des belgischen Kohlenkalkes in neuerer Zeit durch die Forschungen von DE LA VALLÉE POUSSIN¹⁾ und DEWALQUE eine wesentliche Vereinfachung erfahren hat. Die 6 „assises“ sind danach ebenso wenig als selbstständige stratigraphische Einheiten anzunehmen wie die 3 Gruppen von Tournai, Waulsort und Visé. Die mittleren Schichten (von Waulsort) sind nur als Korallenfacies der oberen bzw. unteren Zone aufzufassen und fehlen stellenweise gänzlich. Es bleibt somit nur die untere Zone von Tournai und die obere von Visé übrig.

Die Fauna der Nötscher Schichten findet sich in ähnlicher Entwicklung u. a. in Languedoc (Cabrières), in Niederschlesien, bei Altwasser und im Fichtelgebirge wieder. Nur sind an beiden

¹⁾ Ann. Soc. géol. de Belgique. XVI. S. CV. Ref. von HOLZAPFEL im N. J. 1891 I, S. 408.

Orten die Gesteine kalkig, und infolge dessen treten auch die Riffkorallen mehr hervor.

Die Fauna der kalkigen Schiefer des Oberhöher besteht nach den DE KONINCK'schen, in einigen Punkten berichtigten Liste aus den folgenden Arten: (Die gesperrt gedruckten Formen gehen in das Karnische Oberearbon hinauf.)

Zaphrentis intermedia DE KON.

Lonsdaleia rugosa M'COY.

Syringopora sp. (nur im Thorgraben).

Crinoidenstiele.

Archaeopora nexilis DE KON.

Fenestella plebeia M'COY.

Dipteropora regularis DE KON.

Productus giganteus MART. } auch im Thorgraben.

" *latissimus* SOW. }

" *lineatus* MART. (Cora bei DE KON.)

" *semireticulatus* MART.

" *Medusa* DE KON.

" *Flemingi* SOW.

" *scabriculus* MART.

" *pustulosus* PHILL.

" *punctatus* MART.

" *Buchianus* DE KON. (fällt wahrscheinlich mit *Prod. punctatus* zusammen).

" *imbriatus* SOW.

" *aculeatus* MART.

Chonetes Buchianus DE KON.

" *Laguessianus* DE KON.

" *Koninekianus* SEMENOW?

Orthotetes erenistria PHILL.

Orthis resupinata MART.

Rhynchonella pleurodon PHILL.

" sp. („*acuminata*?“ bei DE KON.)

Camerophoria sp. (von mir gesammelt).

Athyris ambigua SOW.

" *planosulcata* PHILL.

Spirifer (Reticulario) lineatus MART.

" (*Martinia glaber* MART.

" *oralis* PHILL.

- Spirifer bisulcatus* SOW.
 " *pectinoides* DE KON.
 " *Hauerianus* DE KON.
Terebratulina (Dielasma) sacculus MART.
Edmondia Haidingeriana DE KON.
 " *sulcata* PHILL.
Cardiomorpha? tenera DE KON.
 " *concentrica* DE KON.
 " ? *subregularis* DE KON.
Scaldia cardiiformis DE KON.
Sanguinolites parvulus DE KON.
 " *undatus* PORTL.
Pleurophorus intermedius DE KON.
Astartella Itussiana DE KON.
Niobe luciniformis DE KON.
 " *nuculoides* M'COY.
 " *elongata* DE KON.
Leila carinata? DE KON. (Falsche Bestimmung.)
Tellinomya M'Coyana DE KON.
 " *gibbosa* FLEM.
 " *rectangularis* M'COY.
Macrotolus? antirugatus DE KON.
 " *plicatus* DE KON.
Ariculopecten decoratus PHILL.
 " *antilineatus* DE KON.
 " *concentricostriatus* M'COY.
 " *Barrandianus* DE KON.
 " *Purtschianus* DE KON.
 " *Fitzingerianus* DE KON.
 " *Hoernesianus* DE KON.
 " *intortus* DE KON.
 " *arenosus* PHILL.
 " *Haidingerianus* DE KON.
 " *subfimbriatus* DE KON.
 (Die übermässig grosse Anzahl von *Ariculopecten* wird sich durch eine Revision erheblich verringern.)
Limatulina intersecta DE KON.
 " *Haueriana* DE KON. sp.
Pecten (Pseudamussium) Bathus D'ORB.

- Bellerophon (Euphemus) decussatus* FLEM.
Bellerophon (Euphemus) Uri FLEM.
 " *tennifasci* SOW.
Plenrotomaria debilis DE KON.
 " *naticoides* DE KON.
 " *acuta* DE KON.
Euomphalus cotillus MART.
Macrocheilus sp. (Ein *M.* kommt beim Oberhöher in typischen Exemplaren vor; der l. e. t. 4, f. 9 abgebildete Steinkern ist unbestimmbar.)
Loxonema constrictum MART.
 " *simile* DE KON.
Naticopsis Stnri DE KON.
 " *plicistriit* PHILL.
Nautilus (Discites) subsulcatus PHILL.
Phillipsia? sp.

b) Der Culm.

Auf der Südseite der Karnisehen Alpen, zwischen Paularo und Forni Avoltri breitet sich ein ausgedehntes, theilweise auf den Hauptkamm hinübergreifendes Gebiet untercarbonischer Schichten aus, welche sich von den gleichalten Bildungen der Nordseite vor allem durch das gänzliche Fehlen mariner Thierreste unterscheiden. Nur Abdrücke von Landpflanzen kommen als äusserste Seltenheit vor und werden bereits von STIR erwähnt; von der oberen Promosalp liegen einige nicht näher bestimmbare Spuren, vom Ostabhange des Kollinkofels zwei Stammstücke von *Archaeocalamites* vor; letzterer erscheint, wie erwähnt, auch in den Nötseher Schichten.

Die Lagerungsverhältnisse der südlichen Culmbildungen stimmen hingegen mit denen der Nötseher Schichten vollkommen überein. Dieselben sind in steile Falten gelegt und von den älteren palaeozoischen Bildungen durch gewaltige Brüche getrennt (eine Ausnahme bildet nur die an wenigen Punkten beobachtete Auflagerung auf Clymenienkalk). Der Grödener Sandstein lagert im Norden und Süden horizontal auf den abradirten Falten des Unterearbon.

Die petrographische Beschaffenheit des Culm stimmt im Grossen und Ganzen mit der der Nötseher Schichten überein;

jedoch bilden in dem südlichen Gebiete dunkle, ebenflächige Thonschiefer das weitans vorherrschende Gestein. Darin finden sich sehr häufig Einlagerungen von schwarzem Kieselschiefer, der selten eine hell- bis dunkelblaugrüne Farbe annimmt. (Tischlwang, Collina, Fontana fredda.) Weniger häufig als der Kieselschiefer sind dunkle, glimmerhaltige Grauwacken (S. Daniele bei Paluzza, unteres Manranthal, Monte Paularo, Mieli bei Rigolato). Etwas grössere Verbreitung besitzen dunkle conglomeratisehe Bänke, deren Rollsteine schwarze, aus dem Silur stammende Kieselschiefer sind, während die weissen Quarzkiesel der Nötscher Schichten fehlen. Thonfaserkalke finden sich in geringer Ausdehnung südlich von Mieli.

Angedehnte Lager von Eruptivgestein mit Tuffen und Schalsteineconglomeraten sind im Gebiete des Monte Dimon und in dem Cañon des Torrente Chiarso bei Paularo aufgeschlossen. Die Schalsteineconglomerate (vgl. oben) finden sich typisch westlich vom Gipfel des Monte Dimon und enthalten an dem Joeh zwischen der Promos- und Cerevesa-Alp zerquetschte (nicht marmorisirte) Kalkgeschiebe von wahrscheinlich silurischem Ursprung. Die Schalsteine waren wohl ursprünglich sämmtlich grün, verwittern aber oft roth und gehen in unmerklicher Abstufung durch grüne Thonschiefer und Wacken in die normalen Culmsedimente über. Die kartographische Abgrenzung wird dann oft überans schwierig.

Unter den eigentlichen Eruptivgesteinen wiegen spilitische Mandelsteine bei weitem vor; viel seltener finden sich Porphyrite (Fontana fredda) oder umgewandelte Diabase (Torrente Chiarso; vgl. oben den petrographischen Anhang).

2. Das Oberearbon.¹⁾

Das Oberearbon der Karnischen Alpen ist eine vorwiegend marine Bildung und nimmt ein rings von Brüchen begrenztes, in der Längsaxe der Hauptkette gelegenes Gebiet nordwestlich von Pontafel ein; ausserdem finden sich in der Gegend von Tarvis einige dislocirte Schollen (oder Fetzen) von geringem Umfang inmitten des Schlierdolomites. Doch treten noch weiter im Osten in den Karawanken und der Fortsetzung

¹⁾ Vergl. E. SCHELLWIEN, Die Fauna des Karnischen Fusulinienkalces I. Palaeontog. XXXIX, 8, 1—16.

derselben in Steiermark (Weitensteiner Gebirge und Wotschdorf nweith Rohitsch) Gesteine dieses Alters auf.

Der Carbonische Längshorst des Monte Pizzul bei Panlaro ist nur durch eine schmale triadische Grabenscholle von dem Hauptgebiet getrennt und ist in stratigraphischer Hinsicht insofern von Wichtigkeit, als das Oberearbon hier die Diabasmandelsteine des Culm überlagert (Profil-Tafel III, S. 58). Die Annahme einer discordanten Auflagerung ist so gut wie selbstverständlich, da das Unterearbon stets in steile, meist saigere Falten gelegt ist, während das Oberearbon flach lagert und nur local von Bröhlen dislocirt wird. Doch konnte in dem von Schnitt und Vegetation bedeckten Quellgebiet des Torrente Rafuseo nirgends ein deutlicher Durchschnitt beobachtet werden.

Der westlichste Punkt, an welchem in unserem engeren Gebiet bzw. in den Alpen überhaupt marines Oberearbon gefunden wird, ist der Kreuzberg bei Sexten; hier kommen in dem Conglomerat an der Basis der Grödnner Sandsteine zahlreiche Gerölle von röthlichem Fusulinenkalk vor, der — entsprechend dem massenhaften Auftreten des Gesteines — in der Nähe des heutigen Vorkommens einmal angestanden haben muss.

Das vorherrschende Gestein des Oberearbon ist besonders in den tieferen Theilen Granwaekenschiefer, der theils in gröbere Granwacke, theils in schiefrige, glimmerige Gesteine und in Thonschiefer übergeht. Der letztere findet sich in allen möglichen Farbenabstufungen und verschiedenartiger Feinheit des Korns, er enthält in einigen (höheren) Lagen Pflanzenabdrücke, in anderen Brahiopodensteinkerne. Wichtig ist ferner Quarzconglomerat mit weissen, aus zerstörtem Urgebirge stammenden Kieseln, die meist weiss, seltener grün oder schwarz gefärbt sind. Die Fusulinenschichten sind theils als kalkiger Thonschiefer, theils als grauer Dolomit, theils als echter Kalk, meist von schwarzer, seltener von heller oder rosa Farbe entwickelt. Der Kalk ist für die obere Abtheilung des Oberearbon bezeichnend. Kleine Anthracitflötzen kommen vor und überrindender Brauneisenstein ist an manchen Punkten sehr häufig. Der Brauneisenstein dürfte meist aus zersetztem Schwefelkies entstanden sein. Vielleicht veranlasst dies Mineral auch den Schwefelgehalt der (chemisch noch nicht genauer untersuchten) Quelle auf dem Nassfeld bei Pontafel.

Ueber die mannigfache petrographische Ausbildung des Oberearbon könnte man Seiten voll schreiben. Ein anschaulicheres Bild gewinnt man durch die Wiedergabe einiger Profile, deren Aufnahme durch die flache Lagerung und die zahlreichen Gesteinsverschiedenheiten erleichtert wird.

STACHE hat in der Nähe des an erster Stelle zu beschreibenden Kronenprofils eine angebliche Transgression der jüngeren flach gelagerten Schichten über dem älteren steil stehenden Unterearbon angenommen. SUESS beobachtete dagegen an der gleichen Stelle nur eine untergeordnete Dislocation — eine Anschauung, die auch meiner Meinung nach allein den geologischen Verhältnissen entspricht. Ferner ist der angebliche, von STACHE bestimmte *Prod. giganteus* bisher weder dort noch in dem angrenzenden Gebiet wiedergefunden worden. Die aus den dislocirten Bänken stammenden Producten gehören nach den Bestimmungen von Herrn Dr. SCHELLWIEN meist zu *Prod. semireticulatus*; ausserdem fand sich dort *Prod. longispinus* und vor allem mehrere Producten die nur in höheren Carbonschichten vorkommen: *Productus semireticulatus* var. *bathycolpos* SCHELLWIEN, *Prod. lineatus* WAAGEN (Salt Range), *Prod. caucasiniformis* TSCHERN. (Russisches Oberearbon) und *Marguifera pusilla* SCHELLW.

SUESS schildert die stratigraphischen Verhältnisse zwischen der Ofenalp und dem Beginn des normalen Kronenprofils folgendermassen:

„Man beobachtet zuerst blaugrauen und gelben Schiefer mit harten Knollen (Fallen 60° N), dann mehrere Meter starke Bänke von Conglomerat, die steil aufragend den verworfenen und abgesenkten Theil des Berges von der normalen Schichtenfolge trennen. Bei genauerer Betrachtung beobachtet man, dass nur der südlichste Theil des Abhangs dislocirt ist.

Die Schichtenfolge des verworfenen Stückes ist von N nach S: 1) Conglomerat 10—12 m; 2) knollige, graue Sandsteinbank, ca. 0,2 m. Darauf einige Schürfe von schwarzem Schiefer; dann das fast senkrechte, dünne und vielfach verdrückte Anthracit-Flötchen, auf welches zwei Schürfe über einander angelegt sind. Von Culm keine Spur. Im oberen Schurfe streicht das Flötz NNO und steht senkrecht. Oestlich,

unmittelbar neben dem Flötz, steht eine 0,7 m. mächtige, schwarze knollige Lage mit zerquetschten Producten an — STACHE'S Zone des *Prod. giganteus*. Sie ist durch einen etwa 0,5 m. starken Keil von eingezwängtem, abweichenden Gestein von dem Flötzchen getrennt, scheint dasselbe aber weiter unten zu berühren Ueber der vorderen südlichen Flanke der Krone sieht man demnach flach gelagerte Schichten, die aber mit einer Transgression nichts zu thun haben“.

Das normale Kronenprofil beginnt erst weiter abwärts; man geht über die Conglomeratbank nach der Ofenalp zu hinunter und beobachtet dann, wieder aufwärts steigend, die folgenden von Herrn Dr. SCHELLWIEN (l. c. S. 7) näher untersuchten Schichten:

1. Quarzeonglomerat, sehr mächtig.
2. Harter Quarzit 1 m.
3. Schiefer mit härteren Knollen, mild, lichtgrau; etwa 5 m. über der Sohle der Schicht fand SUSS: *Pecopteris oreopteridia* BUGT.¹⁾ (wohl nicht dieselbe Pflanze, die SCHLOTHEIM *Filicites oreopteridius* nannte).
4. Dünne Lagen von glimmerigen Sandsteinplatten.
5. Schiefer wie 3, aber dunkler.

Ziemlich viel bedeckter Boden, stellenweise dunkler glimmerreicher Schiefer (5). Wir erreichen eine flache Einsattelung, die uns vom eigentlichen Kronengipfel trennt und gehen in der Schicht gegen den Sattel der Strasse „Am Abrauf“, in STACHE'S Profil als Sattel zwischen beiden Thälern bezeichnet. Es ist nicht ganz sicher, ob das Profil gegen die Bretterhütte hinab unmittelbar an das Kronenprofil angeschlossen werden darf.

6. Mächtige Folge von mildem Schiefer mit Sandsteinleisten, übergreifend zum Strassensattel. Oben mit dünnen Lagen von kalkigem, geschiefertem Sandstein mit massenhaften Braehiopoden, deren Arten mit denjenigen der abgerollten Blöcke unter der Garnitzenhöhe (Spiriferenschicht) zum grössten Theil übereinstimmen. Aus dieser noch nicht genügend ausgebeuteten Schicht liessen sich bestimmen:

¹⁾ Die Bestimmungen der Pflanzen rühren sämmtlich von Herrn Professor VON FRITSCH her.

- Phillipsia scitula* MEEK.
Camerophoria alpina SCHELLWIEN.
Spiriferina coronae SCHELLWIEN.
Spirifer Fritschi SCHELLWIEN.
Spirifer carnicus SCHELLWIEN.
Spirifer Zitteli SCHELLWIEN.
Sp. (Martinia) semiplanus WAAG.
Sp. (Martinia) Frechi SCHELLWIEN.
Sp. (Reticularia) lineatus MART. sp.
Euteles Kayseri WAAG.
Orthis Pecosii MARCOU.
Derbyia Waageni SCHELLWIEN.
Orthoetes semiplanus WAAG.
Chonetes lobatus SCHELLWIEN.
Chonetes latesinuatus SCHELLWIEN.
Productus aculeatus MART. var.
Productus gratiosus WAAG. var. *occidentalis* SCHELLWIEN.
Productus longispinus SOW.
Productus semireticulatus MART. var. nov. *bathycolpos*.
Productus lineatus WAAG.
Marginifera pusilla SCHELLWIEN.

7. Conglomerat, hauptsächlich an der Wand hervortretend.
 8. Dunkler Schiefer mit Farn-Trümmern, schlecht aufgeschlossen.

9. Starke Conglomeratbank mit grossen, schlecht erhaltenen Pflanzenstämmen.

10. Wechsel von milden Schiefen mit Pflanzenstämmen und Farnen, und pflanzenführenden Sandsteinschichten. Aus dieser Schicht stammen aller Wahrscheinlichkeit nach die von mir gesammelten Annularien:

Annularia stellata SCHLOTTH. sp., häufig. *Annularia sphenophylloides* ZENK. sp., einzelne Blattrossetten ohne grössere zusammenhängende Stücke, daher ganz einwandfreie Bestimmung nicht ausführbar.

11. Conglomerat, wenig mächtig.

12. Kalkbank (z. Th. bedeckt vom Bach) mit Montienliporiden, *Bellerophon* (s. str.) sp., *Conocardium* nov. sp., *Spirifer* sp.

13. Dünne, söhlige Platten mit sog. Regentropfen.

14. Mit 13 eng verbunden, gelbe Sandsteinplatten mit vorzüglich erhaltenen Exemplaren von *Productus lineatus* WAAG., *Euteles Kayseri* WAAG., *Euteles Suessii* var. *acuticostus* SCHELLENWIEN, Crinoiden. Der Sandstein ist rhomboedrisch zerklüftet. Auf der obersten Bank an einer Stelle eine Rinde von Brauneisenstein mit *Penturinus*.

15. Dünnplattiger, glimmerreicher Sandstein, z. Th. mit Kreuzschichtung, ziemlich mächtig. Hier fand sich:

Asterophyllites equisetiformis SCHLOTH. sp.

Annularia stellata SCHLOTH. sp.

Alethopteris oder *Callipteridium* sp., dicht gedrängte, im rechten Winkel von der Spindel abgehende, 4—6 mm. breite, 17—21 mm lange Fiederblättchen mit sehr starkem Mittelnerv und sehr feinen, gedrängten Secundärnerven, die sich gabeln und ziemlich schräg zum Rande endigen.

Alethopteris oder *Callipteridium* sp., dicht gedrängte, im rechten Winkel zur Spindel stehende, 7 mm. breite, 10 mm. lange Fiederblättchen, die einen deutlichen Mittelnerv besitzen, sonst aber die Nerven nur undeutlich zeigen.

Alethopteris Serlii BRGT.

" cf. *aquilina* SCHL.

Pecopteris unita BRGT.

" *oropteridia* BRGT. (nicht die SCHLOTHEIM'sche Art).

" *Caudolleana* BRGT.

" *arborescens* SCHLOTH. sp.

" *Miltoni* ARTIS (einschliesslich *P. polymorpha* BRGT.).

" *pteroides* BRGT.

" *Biotii* BRGT.

" *Pluckenkii* SCHLOTH. sp. (oder sehr ähnliche Art; hier nur sehr kleine Laubtheile).

" vielleicht (?) *Sternbergii* GÖPP. = *truncata* GERM. [*Asterotheca*], zu genauer Bestimmung mangelnd.

Goniopteris emarginata STERNB. (*longifolia* BRGT.), = *Diplazites emarginatus* GÖPP.

Neuropteris tenuifolia BRGT.

" cf. *microphylla* BRGT.

Odontopteris alpina STERNB.

" cf. *britannica* GUTH.

Rhytidodendron bez. *Bothrodendron* sp.

16. Conglomerat, 2 m mächtig.

17. wie 15. Schlecht angeschlossen. z. Th. bedeckt durch Kalk aus Schicht 19.

18. Gelbbrauner Sandstein mit Spuren von Muscheln.

19. Schwarzer Fusulinenkalk, 6—7 m entblösst, wahrscheinlich mächtiger, mit Fusulinen und Archaeocidariten, reiner und härter als in der Conocardien-Schicht.

20. Glimmerreicher Schiefer mit gelb verwitternden Klüften und einigen Bänken von hartem Sandstein, grossen Theils von 21 überdeckt.

21. Conocardienschieht, unten schwarz und knotig, oben mit glatten blänlichen Rutschflächen. Fauna genau übereinstimmend mit derjenigen der Conocardienschieht am Auernigg (n):

Platycheilus (*Trachydomia* DE KON.) aff. *Wheeleri* SHUM.

aff. *caudiculatus* GEM.

Euomphalus (*Phymatifer*) *pernodosus* MEEK. = *caudiculatus* TRIV.

Euphemus sp.

Bellerophon (s. str.) sp.

Pleurotomaria aff. *Mariaui* GEM.

Murchisonia sp.

Helminthochiton sp.

Conocardium uralicum VERN.

Conocardium. 2 nov. sp.

Rhynchonella gruudirostris nov. sp.

Spirifer trigonalis MART. var. *lata* SCHELLW.

Spirifer fasciger KEYSERL.

Spirifer (*Martinia*) *curintiacus* SCHELLW.

Archaeocidaris sp.

Amplexus coronae FRECH (inset.).

Amblysiphonella sp.

22. Gelber Sandstein, ea. 8 m, bildet den vorderen (südlichen) höchsten Gipfel der Krone.

23. Conocardienschieht = 21, gegen N sich sofort auflagernd, ea. 5 m. mächtig. Bildet den unteren Rücken des Gipfels, auf dem wenig Sandstein, aber viel Kalk (aus der

Conocardienschicht) vorkommt. Gegen N erscheint auf der Höhe noch einmal Schicht 22, und der nördliche Gipfel besteht aus 21.

Die tieferen Schichten an der Ofenalpe und unter denselben sind, wie oben erwähnt, durch Vegetation und Gehäuseschnitt der Beobachtung entzogen. Es muss zweifelhaft bleiben, ob die Gesteine, welche weiter unten, nach der Tratten zu, im Bachbett anstehen, von den Schichten des oben wiedergegebenen Profiles concordant überlagert werden und so die normale Fortsetzung desselben nach unten bilden. Beim Aufstieg in dem Bette des genannten Baches, von der Stelle aus, wo er oberhalb Tratten an den alten Fahrweg von der Krone herantritt, beobachtete Schellwien:

1. Thonschiefer, meist etwas grünlich, sehr mächtig.
2. Quarzconglomerat, dunkelgrün gefärbt, ca. 5 m.
3. Grauwackenschiefer, ca. 30 m.
4. Quarzconglomerat, wie 2, ca. 2 m.

5. Grauwackenschiefer, sehr mächtig. Bis hierher fallen die Schichten auf der westlichen Seite des Baches, in dessen Bette eine Störung verläuft, ca. 45° NNO; dann folgen, nachdem eine Schuttmasse die Schichten auf eine kurze Strecke verdeckt hat, in fast sölliger Lagerung:

6. Quarzconglomerat, hell, wie in den höheren Lagen.
7. Sehr dünnbankige Fusulinenkalken mit Korallen, ca. 25 m.

8. Dunkelgrüne und violette, sehr fein spaltende Thonschiefer mit sog. *Spirophyton*. STUR'S *Physophycus Suessi*, ein zwar an manche Rhacophyllen erinnernder, aber besser mit sog. *Tauourus (Cancellophyces)* zu vergleichender Körper, der selbstredend mit Algen nichts zu thun hat. Die von ungleichseitigen concentrischen Rippen bedeckten Abdrücke erreichen einen Durchmesser von 30—40 cm.

9. Grauwackenschiefer, ca. 15 m.
10. Quarzconglomerat, wie 6, mit Anthracit.

Nun folgen die Schuttmassen, welche den Anschluss an das Kronenprofil unmöglich machen. In geringer Entfernung von Beginn dieser Schichtenfolge fanden sich auf dem Rücken zwischen zwei Bächen, dicht am Kronenwege, Blöcke eines charakteristischen, schiefrigen, sandig-mergeligen Kalkes von grauer Farbe, welche eine grosse Zahl der von SCHELLWIEN

beschriebenen Brachiopoden geliefert haben und l. e. als „Spiriferenschieht“ zusammengefasst sind. Die Ursprungsstelle der Blöcke wurde nicht aufgefunden, doch kann es keinem Zweifel unterliegen, dass dieselbe aus den vielfach gestörten Schichten des Südabhanges der Garnitzhöhe stammen. Das leicht erkennbare Gestein hat sich weder unter den Schichten des Kronenprofils, noch unter denjenigen des Aerniggprofils, noch an anderen Stellen des Carbon-Gebietes nachweisen lassen, auch nicht als Geschiebe. Einen sicheren Anhalt für die Altersbestimmung hat die Untersuchung der Fauna unseres Gesteins gewährt. Von den 31 vorkommenden Brachiopoden-Arten finden sich 16 in der Schicht 6 des Kronenprofils wieder, und zwar gerade bezeichnende, anderweitig nicht vorkommende Species, wie *Enteles Kayseri* WAAG., *Prod. graciosus* WAAG. var. *occidentalis* SCHELLWIEN, *Spirifer semiplanus* WAAG. und *Orthis Pecosii* MARCOU. Auch *Phillipsia scitula* MEEK ist beiden Lagen gemein. Der scheinbar grössere Artenreichtum der Spiriferenschieht dürfte darauf zurückzuführen sein, dass dieselbe sehr viel besser ausgebeutet ist als die Kronenschieht. Bei dieser Uebereinstimmung der Faunen, in denen übrigens die Gastropoden gänzlich zu fehlen scheinen, dürfte die Annahme berechtigt sein, dass die Spiriferenschieht nur eine andre Ansammlung der erwähnten Bank des Kronenprofils ist.

In der unmittelbaren tektonischen und stratigraphischen Fortsetzung des Carbon der Krone liegt der Auernigg, an dessen Abhang ich das im Folgenden beschriebene und vorstehend abgebildete Profil aufgenommen habe. Das Hochmoor des Nassfeldes bildet den Ausgangspunkt und der zurückgelegte Weg führt in etwa SW—NO-Richtung zuerst steil am Westabhang des Auernigg empor und dann auf der Höhe in der Richtung der Garnitzhöhe weiter.

Um die Vergleichung mit dem Kronenprofil zu erleichtern, habe ich die Schichtgruppen mit Buchstaben bezeichnet. Die Mächtigkeitsangaben beruhen durchweg auf Schätzung. Auch hier sind die genaueren Versteinerungsbestimmungen der Thierreste (abgesehen von den Korallen) durch Herrn Dr. SCHELLWIEN ausgeführt, der auch die Schichten s und t dem Profil angereicht und die Aufsammlungen vervollständigt hat.

Man beobachtet die folgenden Schichten:

- a) Quarzconglomerat mit Grauwaacke und Granwaackenschiefer, ca. 60 m.
- b) Granwaackenschiefer und Thonschiefer, ca. 30 m., sanfter Anstieg.
- c) Gröberes und feineres Conglomerat, eine kleine Wand bildend, ca. 12 m; Krenzschiebung tritt deutlich hervor.
- d) Feingeschichtete Granwaackenschiefer, ca. 30 m, Einfallen flach, ca. 20° NO, oben mit undentlichen Thier- und Pflanzenresten.
- e) Conglomerat, ca. 3 m, Absatz im Gehänge.
- f) Granwaackenschiefer, ca. 15 m.
- g) Fusulinenkalk, schwarz, in der Verwitterung hellgran, ca. 6 m, einen deutlichen Absatz bildend. Im oberen Theil erscheint eine schiefrige Bank mit vielen Fusulinen. Hier, auf dem Westabhang des Anergigg verläuft eine kleine Verwerfung von ca. 15 m Sprunghöhe; die beiden leicht kenntlichen Schichten e und g sind durch diese in gleiche Höhe gebracht. Der Auernigggipfel ist stehen geblieben, der nordwestlich gelegene Theil um den erwähnten Betrag abgesunken.

In einem als Geröll im Bombaschgraben vorkommenden Gesteine, das petrographisch völlig demjenigen der erwähnten schiefrigen Bank gleicht, fanden sich:

Orthotheses semiplanus WAAG.

Spirifer (Martinia) Frechi SCHELLWIEN.

Productus semireticulatus MART. sp.

Productus lineatus WAAG.

Chonetes latesinuatus SCHELLWIEN.


Fusulina cf. longissima FISCH.

- h) Feingeschichtete Thon- und Granwaackenschiefer mit *Productus lineatus* WAAG., ca. 7 m.
- i) Knolliger, dünngeschichteter Kalk mit Fusulinen, schwarz, gran verwitternd, ca. 6 m. Hier die eigenthümlichen, hohlen Monticeliporiden.
- k) Dickbankige Conglomerate, oben, unten, sowie in der Mitte Grauwaackenschiefer, in letzterem häufig schlecht erhaltene Calamiten-Stämme, ca. 30 m.



Photographie a. Bruck. II. Aufbruch 4. u. 5. J. 1871

Prof. R. Müller, phot.



Der Auernigg (1846 m.) bei Pontal von Westen.

Die punktierten Schichten kennzeichnen die Quarzconglomerate, g und i sind Fusulinenkalk. Die Grauwacken- und Thonschiefer sind nicht besonders bezeichnet. Die Buchstaben entsprechen dem im Text beschriebenen Profil.

- l) Fester, schwarzer Fusulinenkalk mit den Monticuli-
poriden (wie in i), ca. 8 m. Gut erhaltene, z. Th. aus-
gewitterte Durchschutte von Fusulinen, ausserdem:
Platycheilos sp. (zahlreiche Steinkerne).
Macrocheilos aff. *subulitoides* GEM.
Naticopsis sp.
Marchisonia sp.
Loroxema sp.
- *Bellerophon* (s. str.) sp.
Dielasma ? *Toulai* SCHELLWIEN.
Dielasma ? *carintiacum* SCHELLWIEN.
Athyris ? cf. *planosulcata* PHILL.
Spirifer (*Reticularia*) *lineatus* MART. sp.
Spirifer (*Martinia*) *carintiacus* SCHELLWIEN.
- m) Grauwacke, ca. 8 m. Unten sehr feinkörniger, wohlge-
schichteter Schiefer, oben gröbere Granwacke.
- n) Conocardienschieht, mergeliger Fusulinenkalk. 10 m.
Steht auf dem eigentlichen, mit einem Holzkreuz ver-
sehenen Gipfel an. Mit:
Platycheilos (*Trachydomia* KON.) aff. *Wheeleri* SHUM.
Euomphalus (*Phymatifer*) *pernodosus* MEEK.
Bellerophon (s. str.) sp.
Marchisonia sp.
Eutalis sp.
Conocardium uralicum VERN.
Conocardium n. sp.
Rhynchonella grandirostris SCHELLWIEN.
Spirifer (*Martinia*) *carintiacus* SCHELLWIEN.
Spirifer trigonalis MART. var. *lutu* SCHELLWIEN.
Spirifer fasciger KEYS.
Archacocinurus sp.
Lonsdaleia floriformis FLEM. mnt. *carnica* MISER.
Amblysiphonella sp.
- Nach einer Einsenkung, welche dem NO-Fallen der
Schichten entspricht, folgt:
- o) Grauwackenschiefer, ca. 5 m.
p) Knolliger, feingeschichteter Fusulinenkalk, ca. 5 m.
q) Conglomeratbänke, an der Basis Grauwackenschiefer und
Grauwacke, ca. 20 m.

- r) Bläulicher, typischer Thonschiefer, mit Pflanzen und Grauwackenschiefer, letzterer sehr feinkörnig und dünn-geschichtet, zum Th. von pappenartiger Beschaffenheit, mit vielen Wurzelspuren, ca. 12 m, enthaltend:

Calamites, zwei unbestimmbare Stücke, bez. Trümmer von solchen, vielleicht zu *C. varians* GERM. und *C. Cistii* BRGT. gehörig.

Calamites (*Eucalamites* WEISS) sp., Glieder von wechselnder Länge (16, 13, 11, 8, 9, 14, 26, 67 mm) bei 25—27 mm Breite.

Stemmatopteris sp. (oder *Caulopteris* sp.).

Pecopteris cf. *oreopteridia* BRONGN. (nicht die SCHLOTHEIM'sche sp.).

Pecopteris pteroides BRONGN.

Pecopteris Miltoni ARTIS (einschliesslich *P. polymorpha* BRGT.).

Sigillaria sp. — schlecht erhaltener Rest aus der Verwandtschaft der *S. elongata* BRGT., und *S. canaliculata* BRGT.

Sigillarien-Blatt.

- s) Dunkeler, braun verwitternder Kalk mit massenhaften, vorzüglich herausgewitterten Fusulinen, ca. 8 m.

Phillipsia scitula MEER.

Conocardium n. sp.

Acanthocladia sp.

Fenestella sp.

Fusulina cf. *cylindrica* FISCH.

- t) Grauwackenschiefer, ca. 5 m.

Weiter nach Norden zu sind die Grauwackenschiefer erodiert und der Kalk s kommt zum Vorschein. Hier endet das Profil an einem senkrechten Bruch, der weiter westlich schon die Thonschiefer abgeschnitten hat. Ueberall besteht die nördliche Scholle aus Conglomeraten, die mit 45° nach O einfallen; über den Conglomeraten folgt Grauwackenschiefer und weiter im Hangenden eine graue, sonst nicht beobachtete Kalkschicht, die im wesentlichen aus dicken Crinoidenstielen (? *Platyerinus*) besteht, aber keine Brachiopoden enthält.

Westlich, jenseits der mit Torfbildung bedeckten Depression des Nassfeldes treten die Carbonschichten am Madritscheng

wieder zu Tage. Von charakteristischen Horizonten fand sich hier die Conocardienbank mit zahlreichen Exemplaren von *Euomphalus (Phymatifer) pernodosus* MEEK und Granwackenschiefer mit *Spirifer* cf. *striatus* MART.

Rings um die Trias-Masse des Trogkofels, die in ihren nütteren Partien aus geschichtetem rötlichen Kalk besteht, tritt ein sonst nur als häufiges Geröll beobachteter blasserother Kalk auf, in welchem am Rüdriker Sattel Fusulinen und zahlreiche Crinoiden vorkommen. Im Geröll des Oselitzen- und Rattendorfer Grabens enthält dieser Kalk: *Dielasma* sp., *Icticularia lineata* MART., *Spirifer fasciger* KEYS., *Spirifer supramosquensis* NIK., *Enteles Suessii* SCHELLW. und neben wenigen Fusulinen massenhafte Crinoiden.

Im Lanzenboden herrschen wie anderwärts flach gelagerte Grauwacken- und Thonschiefer mit untergeordneten Kalkbänken vor, während die letzteren weiter nach NW hin gewaltig anschwellen und die Schiefer fast ganz verdrängen. Dieser etwa 300 m mächtige Complex setzt den Schulterkofel und den sich an seinen Süddabhang anschliessenden, gegen Osten, nach der Rattendorfer Alm hin, stufenweise absinkenden Zug der „Ringmauer“ zusammen und besteht fast ausschliesslich aus wechselnden Bänken von dunklem Fusulinenkalk und hellgrauem Dolomit. Der feste Kalk, der petrographisch völlig der Schicht I des Auernigg gleicht, führt ausser spärlichen Fusulinen und Crinoiden nur wenige kleine Brachiopoden (*Athyris* cf. *planosulcata* PHILL.), der Dolomit ist ganz versteinerungsleer. Das mächtige Anschwellen dieses Dolomites ist die einzige facielle Differenzierung, welche das Obercarbon erkennen lässt.¹⁾

Die westliche Partie unseres Gebietes zeigt im wesentlichen ebenfalls flach gelagerte Schichten, in denen ich unweit der Straninger Alp im Thonschiefer: *Derbya Waageni* SCHELLWEIN (oben S. 58 als *D. aff. senili* bezeichnet) und *Edmondia aff. tornacensis* RYCKH. sammelte.

¹⁾ Tafel III auf S. 56 giebt das landschaftliche Bild dieser obercarbonischen Kalke und Dolomite in bezeichnender Weise wieder, während die zahlreichen Abbildungen und Profile S. 39—58 mehr den morphologischen Unterschied von Carbon und Trias erkennen lassen.

Aus dem Geröll der von den Höhen des Carbon-Zuges nach dem Gail- und Fella-Thale abfliessenden Bäche liegen die nachstehenden Fossilien vor:

Aus dem Vogelbaelgraben:

- Lima* aff. *retifera* SHUM.
Ariculopecten aff. *affinis* WALCOTT.
Edmondia aff. *sculpta* KON.
Spirifer carnicus var. nov. *grandis*.
Derbyia Waageni SCHELLWIEN.
Prod. longispinus SOW.
Marginifera pusilla SCHELLWIEN.

Aus dem Bombasehgraben (abgesehen von den oben erwähnten Stücken, welche aus Schicht g des Auernigg zu stammen scheinen):

- Euphemus* sp.
Orthothetes semiplanus WAAG.
Prod. semireticulatus MART.
Calamites sp. Unbestimmbares, walzenförmiges Steinkernstück, vielleicht zu *C. Suekowitzii* BRUG. gehörig.

Aus dem Oselitzengraben (ausser den oben genannten Formen des rothen Fusulinenkalkes):

- Naticopsis* aff. *plicistria* PORTL.
Lima aff. *retifera* SHUM.
Edmondia aff. *sculpta*.
Productus punctatus MART.
Productus cf. *cora* ORB.

Ausserdem fanden sich in einem schwarzen, schiefrigen Kalk vor der Lochalpe, der dort in grossen flachgeneigten Tafeln blossgelegt ist, jedoch ohne dass man etwas von dem Hangenden oder Liegenden beobachten könnte:

- Phillipsia scitula* MEEK.
Nautilus aff. *nodoso-carinatus* F. RÖM.
Euomphalus (Phymatifer) pernodosus MEEK.
Spirifer trigonalis MART. var. *lata* SCHELLWIEN.
Spirifer carnicus SCHELLWIEN.
 „ *supramosquensis* NIKIT.
Acanthocladia sp.
Cyathophyllum arietinum FISCH.

Im Schuttkar des Südabhanges der Garnitzenhöhe wurde gesammelt:

Cordaites principalis GERM. sp.

„ (*Pseudocordaites*) sp., vielleicht zusammengerolltes Laubstück von *Ps. paluaefornis* GÖPP.

Neuropteris sp. Nach Gestalt, Grösse und Nervatur besser mit *N. Rogersii* LESQ. als mit *N. auriculata* BRGT. übereinstimmend.

? *Callipteris conferta* STERNB. sp. — Zur sicheren Bestimmung unzureichendes kleines Laubstück, doch des geologischen Interesses wegen erwähnenswerth.

Im Folgenden sind nach SCHELLWIEN die beiden wichtigsten Profile, dasjenige der Krone nach SUCESS und das von mir aufgenommene Auernigg-Profil neben einander gestellt. Auch das von STACHE im Jahrbuch der Reichsanstalt vom Jahre 1874 veröffentlichte Kronenprofil ist zum Vergleich mit der SUCESS'schen Aufnahme hinzugefügt. Die am besten erkennbaren Horizonte: Die Conoeardienschicht, die Schicht mit *Productus lineatus*, die hauptsächlichsten Kalkbänke und Pflanzenhorizonte zeigen die völlige Uebereinstimmung beider Profile, auffallen muss es jedoch, dass auch die Conglomeratbänke regelmässig durchstreichen. Doch dürfte die geringe Entfernung beider Localitäten (ca. 2,8 km) diese Erscheinung erklärlich machen.

Krone

nach STACHE

nach SUSS

Auernigg

Verf.

326

- t Grauwackenschiefer ca. 5 m | SCHELLER- |
- s Fusulinenkalk ca. 8 m | WIEN. |
- r Pflanzenschiefer ca. 12 m.
- q Conglomerat ca. 20 m.
- p Knolliger Fusulinenkalk ca. 5 m.
- m Grauwackenschiefer ca. 5 m.

- n Conocardienschicht ca. 10 m.

- 23. Conocardienschicht
ca. 5 m
- 22. Sandstein ca. 8 m
- 21. Conocardienschicht

- 20. Sandstein
- 19. Korallenkalk
- 18. Sandstein u. Korallenkalk
m. Fusulinen
- 17. Fusulinenkalk
- 16. Conglomerat (?)
- 15. Grenzthonschiefer
- 14. Conglomerat

- 20. Glimmerreiche Schiefer m Grauwacke ca. 8 m.
- 19. Fusulinenkalk l Fusulinenkalk ca. 8 m.
- 18. Sandstein k₃ Grauwackenschiefer
- 17. Schiefer k₃ Conglomerat
- 16. Conglomerat ca. 2 m k₃ Grauwackenschiefer
- 15. Glimmer. Schiefer m. Pflanzen
zeu zieml. mächt. k₁ Conglomerat

ca.
30 m.

- 13. Zone d. *Pecopt. orcopteridia*

- 14. Sandstein m. *Prod. lineatus* WAAG.
- 13. Platten m. sogen. Regentropfen, wenig mächt.

- h Glimmer. Thonschiefer u. Grauwacke mit
Prod. lineatus WAAG. ca. 7 m.

- | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| ? | 12. Fusulinenkalk ca. 1 m | g Fusulinenkalk ca. 6 m. |
| 12. Conglomerat | 11. Conglomerat, wenig mächt. | < f Grauwackenschiefer ca. 12 m. |
| 11. Mergelthon u. Sandstein- | 10. Pflanzenschiefer | e Conglomerat ca. 3 m. |
| schiefer | 9. Conglomerat, zieml. mächt. | d Grauwackenschiefer m. Pflanzen ca. 30 m. |
| 10. Conglomerat | 8. Schiefer m. Pflanzen | e Conglomerat ca. 12 m. |
| 9. Sandstein m. Pflanzen | 7. Conglomerat, sehr mächt. | b Grauwacken- u. Thonschiefer ca. 30 m. |
| 8. Mergelth. u. Sdtschiefer. | 6. Grauwackenschiefer m. Bra- | a Conglomerat ca. 60 m. |
| 7. Anthracit m. Pflanzen | chiopoden, sehr mächt. | |
| 6. Conglomerat | 5. Schiefer = 3. | |
| 5. Mergelthon u. Sandstein- | 4. Glimm. Sandsteinplatten, | |
| schiefer | dünne Lage. | |
| | 3. Grauwackenschiefer m. <i>Proc.</i> | |
| | <i>oreopteridia.</i> | ↓ |
| | 2. Quarzit ca. 1 m. | |
| 4. Conglomerat | 1. Conglomerat, sehr mächt. | |
| 3. Anthracit | nach Stuess und dem Verf. ver- | |
| 2. „Zone d. <i>Prod. gigonensis</i> “ | worfene Schichtenfolge. | |
| 1. „Culm“ | | |

* Die Mächtigkeitangaben des Auenigoprofils beruhen nur auf Schätzung, diejenigen des Kronenprofils sind bei Stuess lückenhaft, während sie bei STACHE ganz fehlen.

Von der Bearbeitung der Fauna des Karnischen Fusulinenkalkes, welche Herr Dr. E. SCHELLWIEN auf meine Veranlassung unternommen hat, sind bisher die Brachiopoden erschienen; die beiliegende Tabelle, welche gegenüber der Zusammenstellung von E. SCHELLWIEN nur geringe Veränderungen aufweist, enthält noch die sonst bekannten Fundorte der betreffenden Arten.

Die wenigen bisher gefundenen Korallen gehören nach meinen Bestimmungen zu folgenden Arten:

1. *Cyathophyllum urictianum* FISCH., grosse massige Einzelkoralle aus der Verwandtschaft des *Cyath. Stachburgi*, zuerst von Moskau beschrieben. Weg von Pontafel zur Loehalpe.
2. *Lousdaleia floriformis* FLEM. nnt. *carnica* (mscr.) Conoardienschicht, Aernigg.
3. *Lophophyllum proliferum* M'CHESNEY sp. (WHITE, 100 Par. S. 101. t. 66. f. 4, E. KAYSER in v. RICHTHOFFEN China IV. S. 194. t. 29. f. 7—10). Diese in China und Nordamerika verbreitete kleine Einzelkoralle fand sich auf der Tratten unterhalb der Krone.
4. *Anplexus corouae* FRECH mscr. Krone Schicht 21.

Ueber die Bildungsweise der oberearbonischen Schichten.

Eine kurze Besprechung erheischt der häufige, mindestens siebenmalige Wechsel zwischen klastischen Bildungen mit Landpflanzen und Kalken mit rein mariner Fauna. Die Schichten mit Landpflanzen und diejenigen mit marinen Thieren stellen heteromische Bildungen dar; die einen sind im Meere, die anderen in Lagunen oder Haffen zum Absatz gelangt. An der Thatsache eines scharf ausgeprägten Wechsels mariner und terrestrischer Verhältnisse kann um so weniger gezweifelt werden, als eine Mischung von Meeresorganismen und Landpflanzen nirgends beobachtet wurde. In der alten Strandzone sind gewisse feinkörnige Sandsterne und Grauwackenschiefer (d und r des Aerniggprofils) abgesetzt, welche reich an Kriechspuren von Würmern und anderen Thieren sind, im übrigen aber keine organischen Reste enthalten.

E. SCHELLWIEN.

| Vorkommen | | | anderweitiges Vorkommen | | | | | | | Europäischer
Zechstein | |
|-----------------------|--------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|--|-------------------|--|---------------------------|------|
| Spürfaren-
schicht | Krone
Schicht a | Stache's | Obercarbon (Permocarbon) | | | | | | | | |
| | | | Ar-
insk | Spitz-
ber-
gen | China
Lo
Ping | Afrika
Uadi el
Arabah | Nord-
Amerika
Low &
Middle
Coal- | Upper
Measures | Indien
Prod. Limestone
Low. Mid. Up. | | |
| + | + | Stache's | a | — | — | ? | — | — | a | a | — |
| + | — | Auernigg | i | ef. | — | — | — | — | i | i | i |
| — | — | Oselitzen | ef. | — | — | — | — | ef. | ef. | ef. | ef. |
| + | — | Stache's | i | a | — | — | — | a | i | a | a |
| + | — | Stache's | i | i | i | i | i | i | i | a | — |
| + | + | Stache's | i | i | i | i | i | i | i | i | — |
| + | + | Stache's | — | i | i | ? | i | i | — | var. | var. |
| + | + | Oselitzen | i | — | var | — | — | i | i | — | — |
| + | — | Stache's | a | var | — | — | — | — | — | — | — |
| + | — | Stache's | a | ef | — | — | — | i | i | — | — |
| + | + | Bombase | a | — | — | — | — | a | a | — | — |
| + | + | Bombase | a | — | — | — | — | — | — | — | i |
| + | + | Stranitz | — | — | — | a | — | — | a | — | — |
| + | + | Stache's | — | — | a | — | — | i | i | i | — |
| + | + | Stache's | — | — | i | — | — | i | i | i | — |
| + | — | Oselitzen | — | — | — | — | — | — | — | a | — |
| + | — | Krone St | — | — | — | a | — | — | — | a | — |
| + | + | Auernigg | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
| + | + | Stache's | i | i | i | — | — | — | a | i | — |
| — | + | Bombase | — | — | — | — | — | — | a | — | — |
| — | — | Auernigg | — | — | — | — | — | — | — | a | — |
| — | — | Madritsch | i | — | — | ? | — | — | i | i | — |
| — | + | Conocard | a | — | — | i | — | — | a | i | i |
| — | + | Im Loch | — | — | — | — | ef. | — | — | — | — |
| + | + | Im Loch | — | — | — | — | a | — | a | — | — |
| — | — | Vogelbau | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | Conocard | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| + | + | Stache's | — | — | — | — | — | a | a | — | — |
| + | + | Stache's | — | a | — | — | — | a | a | — | — |
| — | + | Auernigg | ef | — | — | — | — | — | ef. | — | — |
| + | + | Pasterk | — | — | — | — | — | — | — | a | a |
| — | — | Pasterk | — | — | — | — | — | — | — | — | a |
| + | — | Auernigg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| + | — | Auernigg | — | — | — | — | — | — | a | — | — |
| + | — | Auernigg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

Bei der Erklärung ist anzugehen von der in ungleichem Maasse fortschreitenden Abrasion der alten carbonischen Hochgebirge, deren Vorhandensein durch die in ganz Mitteleuropa beobachtete, stark gestörte Lagerung der älteren palaeozoischen Schichten (vom Cnlm abwärts) erwiesen wird. Das massenhafte Vorkommen von Conglomeraten und die Häufigkeit der Landpflanzen im Oberearbon beweist, dass die alte Küstenlinie überaus nahe war. Man könnte nun darüber im Zweifel sein, ob der Wechsel mariner und terrestrischer Bildungen durch locale tektonische Bewegungen, oder aber durch örtliche Verschiebung der Küstenlinie infolge von Anhäufungen fluviatiler Sedimente, oder endlich durch allgemeine Oscillationen des Meeresspiegels herbeigeführt wurde.

Der unmittelbare Einfluss tektonischer Umwälzungen an Ort und Stelle ist wohl auszuschliessen; denn ein mindestens siebenmaliges Auf- und Abwippen des Landes erscheint selbst in einer von tektonischen Bewegungen betroffenen Gegend wenig wahrscheinlich. Veränderungen durch locale Anschwellungen, wie sie heute an der Nord- und Ostsee sowie an der Adria beobachtet werden, haben zwar in gewisser Weise mitgewirkt, sind aber nicht als alleinige Ursache anzusehen. Es bleibt also eine allgemeine Veränderung des Meeresspiegels als Grundursache, die durch locale Anschwellungen modificirt wurde. Auch gegen diese Annahme könnte die häufige Wiederholung heteromesischer Bildungen angeführt werden. Jedoch ist der Umstand bedeutsam, dass gerade während des letzten Abschnittes der eigentlichen Carbonzeit die grossen Hochgebirge in Mittel- und Westeuropa abradirt wurden. Mag man sonst über die Theorie von STUSS getheilte Meinung sein, der die „eustatischen“ (= fortdauernden) „positiven“ Bewegungen der Strandlinie auf die Erhöhung des Meeresbodens durch festländische Sedimente zurückführt: In der jungcarbonischen Zeit, für welche die Bedeutsamkeit der Abrasion und Sedimentation durch zahlreiche Beobachtungen festgestellt ist, wird der Einfluss dieses Factors auf die Meeresverschiebungen nicht hoch genug veranschlagt werden können.

Es wurde also gleichzeitig durch die in der ganzen Nord-

hemisphäre erfolgende Zufuhr von Sediment und die Erhöhung des Meeresbodens ein Vorschreiten des Meeres bedingt und durch locale, an der Karnischen Küste besonders bedeutende fluviatile bzw. litorale Anschwemmungen vorübergehend ein kleinerer Bezirk dem Meere wieder abgewonnen. Besonders befördert wurde die gelegentliche Ansehnung des Landes durch die Anhäufung mächtiger Conglomeratbänke; dieselben sind wohl nur zum kleineren Theile als unmittelbares Ergebnis der Brandungswirkung anzusehen, im Wesentlichen durch Flüsse und Wildbäche aus dem Gebirge heransgetragen und durch die Gezeiten sowie Küstenströmungen auf dem Meeresboden ausgebreitet.

Ein allgemeines Vorschreiten des oberearbonischen Meeres ergibt sich für unser Gebiet schon aus der Thatsache, dass Fusulinen-Kalke mit marinen Versteinerungen nur im höchsten Theile der oberearbonischen Schichtenfolge vorkommen. In der Entwicklung dieser Kalke ist eine gewisse Differenzirung in horizontalem Sinne zu beobachten. Die Fusulinenkalke des Anergigg und Madritscheng werden im Westen in der Gegend des Schnitterkofel und Hoehwipfel dolomitisch und schwellen gleichzeitig mächtig an, so dass die eingelagerten Schiefer als dünne Zwischennittel erscheinen (Taf. III S. 56).

Ein Wechsel mariner und terrestrischer Schichten, wie er in den Karnischen Alpen beobachtet wurde, ist in Bereiche der Steinkohlenformation nicht ungewöhnlich. Die von Barrois beschriebenen Schichten von Leña in Asturien, welche dem tieferen Oberearbon angehören (= Moskaner Stufe mit *Spongioceras mosquensis* = Millstone grit = Ostran-Waldenburger Schichten), stimmen in Bezug auf die Faciesentwicklung vollkommen mit dem Karnischen Oberearbon überein. Das Gleiche gilt für die am Donetz entwickelten Steinkohlenbildungen, in denen nur das Vorkommen abbauwürdiger Flütze einen kleinen Unterschied bedingt.

Im nordamerikanischen Carbon herrscht bekanntlich eine einheitliche Faciesentwicklung derart, dass im Osten terrestrische, im Westen marine Absatzbedingungen während der ganzen Bildungsdauer der Formation vorwalteten. In einzelnen Zwischengebieten, so in Nevada (Eureka), wo eingeschwemmte

Landpflanzen und Inngenathmende Schnecken gefunden sind, vor allem aber in Texas finden wir einen Schichtenwechsel, welcher dem alpinen in vieler Hinsicht zu vergleichen ist. Der zweite Jahresbericht der geologischen Landesaufnahme von Texas enthält eine Reihe schöner Profile (Pl. XVI. S. 372), deren Betrachtung ein klares Bild von der Entwicklung der Steinkohlenformation gewährt. Untercarbonische Bildungen fehlen; das in eine Reihe von Localgruppen gegliederte Obercarbon besteht aus abwechselnden Lagen von Sandstein und Schieferthon (nebst zahlreichen Uebergangsgesteinen), die an Masse überwiegen; eingeschlossen kommen Kohlenflötze vor. Fusulinenkalk deutet auf das intermittirende Vorwiegen mariner Bedingungen, Conglomerate auf gelegentliche Abrasionen, Gyps und Gypsthon auf eindampfende Lagunen. Der Wechsel der verschiedenen Gesteine ist äusserst hunt und in jedem Durchschnitt verschieden. Ein regelmässiges Alterniren ist nirgends zu beobachten und eine bestimmte Tendenz der Strandverschiebung somit nicht erkennbar. Das Land bildete während der Bildung des gesammten Oberearbon den Uebergang zwischen dem westlichen Ocean und den Binnenseebecken des östlichen Nordamerika.

In dem im Vorstehenden genannten Vorkommen wiegen entweder die marinen Schichten vor (ob. Theil des Karnischen Oberearbon) oder es tritt der umgekehrte Fall ein (Texas) oder es sind beide im Gleichgewicht ausgebildet. Das Analogon zu den Vorkommen des Enreka-Districtes, wo einzelne Landorganismen in marinen Kalken gefunden werden, bilden die bekannten Einschaltungen mariner Schichten in den terrestrischen Steinkohlenbildungen.

Die Vorkommen des schottischen Calciferous sandstone (tiefstes Carbon), erinnert noch am meisten an die besprochene Entwicklung des Oberearbon; hier erscheinen in einer fast 4000' mächtigen, klastischen Schichtenfolge vorherrschend Kohlenflötchen und Landpflanzen, die zum Theil an Ort und Stelle gewachsen zu sein scheinen, daneben aber 18 verschiedene Lager mit marinen Thierresten. Viel seltener sind diese marinen Einlagerungen im nuteren productiven Carbon (Waldenburger Horizont und Gannister beds) in der bekannten Zone, welche von Oberschlesien durch Westfalen und Belgien nach

England hinüberzieht. Selbstverständlich braucht man zur Erklärung dieser Vorkommen noch weniger an Oscillationen der Erdrinde oder des Meeresspiegels zu denken, als in den bisher erörterten Fällen. Geht man davon aus, dass die Steinkohlenflöze nebst ihren Sandsteinen und Thonen in weiten in oder unter dem Meeresniveau liegenden Inlandbecken gebildet wurden, so liegt die Erklärung nahe. Wenn in einer solchen in der Nähe der Küste gelegenen „paralischen“ Niederung von aussen durch Brandung oder Sturmfluth der trennende Landstreifen durchbrochen wurde, so trat eine marine Ueberfluthung ein, die jedoch stets nur locale Bedeutung besass. Denn bekanntlich sind die im Inneren des europäischen Continents gelegenen „limnischen“ Steinkohlengebiete (Saarbrücken, Französisches Centralplateau, Schwarzwald, Niederschlesien, Böhmen) frei von marinen Zwischenlagen.

3. Ueber die Verbreitung des Carbon in den Ostalpen.

Die eigenthümliche aus marinen Kalken und Landpflanzenschiefern gemischte Entwicklung des Karnischen Obercarbon setzt aus dem näher beschriebenen Hauptgebiet weit nach Osten fort. Die westlichen Karawanken bestehen, wie erwähnt, aus silurischen und permo-triadischen Schichten. Aber schon südlich von Klagenfurt treten im Feistritzdurchbruch bei Nenmarkt Einsulinenkalke und Quarzconglomerate auf (vergl. unten bei der Besprechung der Uggowitzer Breccie). Weiterhin tauchen in der Gegend von Eisenkappel an den gewaltigen Längsbrüchen, welche die Karawanken so gut wie die Karnischen Alpen durchziehen, neben dem Devon auch obercarbonische Gesteine empor. STRESS (Aequivalente des Rothliegenden S. A. 1868 S. 33) hat dieselben bereits eingehender beschrieben und hebt hervor, dass dieselben dem oberen Kohlenkalke von LIPOLD und FOETTERLE angehören. Die Gesteine dieses Vorkommens stimmen vollkommen mit den Karnischen überein, und von den noch nicht näher untersuchten Versteinerungen scheint dasselbe zu gelten. (Eine eigenthümliche Bedeutung als Amniete besitzen die beim Pasterkbauer nweit Vellach südlich von Eisenkappel vorkommenden Steinkerne zweier Camerophorien, *C. Sancti Spiritus* SCHELLWIEN und *C. latissima* SCHELLWIEN,

früher als *Rhynch. pentatoma* bezeichnet. Die ein undeutliches Kreuz bildenden Zahnstützen und Mediansepten scheinen die religiöse Verehrung dieser „Heilig-Geist-Stoandln“ zu erklären.)

Weiter östlich in Untersteiermark treten in der Fortsetzung des Karawankenzuges noch mehrfach Oberearbonegesteine inmitten von Trias-Gebilden hervor, so vor allem in dem von TELLER beschriebenen Weitensteiner Gebirge und bei Wotsehdorf unweit Rohitsch Sauerbrunn. Sowohl das tektonische Vorkommen an grossen Längsrücken, wie die Beschaffenheit der Gesteine stimmen vollkommen mit den westlicheren Vorkommen überein. „Nur ausnahmsweise hat sich“, wie TELLER¹⁾ über das Weitensteiner Gebirge bemerkt, „der antikinale Bau der Anbruchswelle soweit erhalten, dass er Gegenstand einer profilmässigen Darstellung werden kann; in den meisten Fällen haben energische seitliche Stannungen die der Oberfläche zunächst liegenden Partien der carbonischen Sedimente in der Weise zusammengepresst und emporgedrängt, dass nur mehr eine Gesteinszone mit steil gestellten, regellos bald nördlich, bald südlich einschliessenden Schichten zur Beobachtung gelangt, die zwischen jüngeren Gebilden eingeschlossen, fast geradlinig über Berg und Thal hinzieht.“ Aus der Gegend von Wotsehdorf²⁾ ist das Vorkommen der bezeichnenden Gesteine, Schiefer, Conglomerate und Kalke mit *Schwagerina* zu bemerken. Ferner scheint der Umstand erwähnenswerth, dass die hellen Dolomite, welche man früher (wie STACHE die entsprechenden Gesteine bei Pontafel) für palaeozoisch hielt, zur oberen Trias gehören.

Derselben marin-terrestrischen Entwicklungsform des Obercarbon gehören die Pflanzenreste an, welche aus Schiefen des Spatheisensteinbergbaus Reichenberg bei Assling in Oberkrain von STUR³⁾ beschrieben wurden; *Pecopteris arguta* BRÖT., *Pecopteris pteroides* BRÖT. und *Cordaites* sp. Der genannte Verfasser hebt hervor, dass sowohl die Pflanzen dieses Fundortes, wie diejenigen des Steinacher Joches, der Stangalp und der östlichen Karnischen Alpen auf die jüngste Schichten-

¹⁾ Verhandl. G. R. A. 1859. S. 10.

²⁾ F. TELLER, Verhandl. G. R. A. 1892. S. 281.

³⁾ Verhandl. der geolog. Reichsanstalt 1886. S. 384.

reihe des Oberearbon“ hinweisen. Auch Herr Professor von FRITSCH hat auf Grund der von ihm an anderem Material ausgeführten zahlreichen Bestimmungen (s. o.) die Richtigkeit dieser Auffassung bestätigt.

Im Mediterrangebiet und im Innern Russlands besitzt das marine Oberearbon eine grosse Ausdehnung; wir kennen vereinzelt Vorkommen aus Asturien (BARROIS), dem nördlichen französischen Centralplateau (MORVAN) und dem westlichen Kleinasien. Hingegen ist weiter im Norden und Nordwesten der Karnischen Hauptkette keine Spur von typischem marinem Oberearbon (Fusulinenkalk) bekannt geworden. Die von England bis Oberschlesien verbreiteten marinen Einlagerungen im unteren productiven Carbon (Gannister beds, Saarbrücker Schichten von Westfalen u. s. w.) sind von localer Bedeutung und entbehren jedenfalls der bezeichnenden Fusulinen. Die geringe palaeontologische Uebereinstimmung, welche diese oberschlesischen Vorkommen mit dem Karnischen Fusulinenkalk besitzen, beruhen wohl nur z. Th. auf dem höheren Alter der ersteren, denn bei ungestörter mariner Entwicklung des Oberearbon (Russland) pflegt etwa die Hälfte der Arten den beiden Stufen gemein zu sein. Abgesehen von der Verschiedenheit der Facientwicklung (vergl. unten) sprechen auch wohl Gründe geographischer Trennung mit: Im Gebiete der hentigen Centralkette erscheint ausschliesslich die terrestrische Entwicklung des Oberearbon. Es sind, wie STUR nachzuweisen bemüht war, die obere und untere Stufe des productiven Carbon an verschiedenen Fundorten vertreten; aber überall finden wir ausschliesslich Landpflanzen, nirgends die Spur eines marinen Restes. Die erwähnten marinen Einbrüche in das carbonische Lagunengebiet sind also aus einem nördlich oder nordöstlich gelegenen Meere erfolgt, haben aber das mediterrane Meer des Oberearbon nicht erreicht. Das letztere dehnte sich in oberearbonischer und permischer Zeit von Asturien bis Aegypten (Uadi el Arabah) und Indien aus. Der Umfang dieses Meeres selbst unterlag den mannigfachsten Schwankungen. So herrschte in Asturien nur während des unteren Oberearbon (Stufe von Leña mit *Sp. mosquensis*) ein Wechsel mariner und terrestrischer Sedimente, während der dem Karnischen Fusulinen-

kalk und den oberen Ottweiler Schichten äquivalente Horizont von Tineo nur Landpflanzen enthält.

Von den centralalpinen Carbonvorkommen gehören die Fundorte des Steinacher Joeh (mit ihrer östlich des Brenner gelegenen Fortsetzung) sowie das ausgedehntere Gebiet Stangalp-Turrach-Fladnitzer Alp zum oberen Oberearbon. Hingegen ist STUR geneigt, den die Centralalpen im Norden begleitenden Zug krystalliner Schiefer mit den Pflanzenfundorten Wurm alp (bei St. Michael ob Leoben) und Klamm bei Payerbach dem mittleren Oberearbon, den Schatzlarer Schichten zuzuwenden. In der betr. Arbeit (Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt 1883 S. 187) bezeichnet STUR die fraglichen Bildungen als „untercarbonisch“; es entspricht dies der wenig empfehlenswerthen Ausdrucksweise des Verf., der als „Carbon“ nur das productive Oberearbon bezeichnet. Von Klamm werden citirt: *Calamites Suckowii* BOT., *Neuropteris gigantea* STBG., *Lepidodendron* cf. *Goepfertii* PRESL., *Sigillaria* sp.; von der Wurm alp hat derselbe Autor bestimmt: *Calamites ramosus* ARTIS, *Pecopteris louchitica* BOT., *P.* cf. *Mantelli* BOT., *Lepidodendron phlegmaria* STBG., *Sigillaria* cf. *Horowskyi* STUR.

Sichere Äquivalente des pflanzenführenden Culm sind in den Ostalpen abgesehen von den oben beschriebenen Vorkommen nicht nachgewiesen, man müsste denn einen Theil der Thonglimmersehiefer diesem Horizonte zuweisen wollen; doch lässt sich diese Ansehannng weder beweisen noch widerlegen.

Auch in den Westalpen ist das Oberearbon — ältere Schichten scheinen zu fehlen — ausschliesslich durch terrestrische Bildungen vertreten. Die Steinkohlenpflanzen der Tarentaise, von Wallis, vom Titlis und vom Tödi entsprechen in der Hauptsache den unteren Ottweiler Schichten, so *Odontopteris Brardi*, *Neuropteris flexuosa* und *Sphenopteris nummularia*; zum Theil kommen dieselben auch etwas tiefer, in den oberen Saarbrücker (= Schatzlarer) Schichten vor, so *Odontopteris heterophylla*. Die letzteren würden also etwa den Vorkommen von St. Michael und Payerbach entsprechen. Ein fremdartiges, an das Rothliegende erinnerndes Element bildet allerdings *Walchia piniformis*, welche jüngeren Schichten entstammen dürfte.

XI. KAPITEL.

Das Perm (Dyas).

Die grossen Schwierigkeiten, welche in anderen Gebieten die gegenseitige Abgrenzung und Gliederung von Carboon und Perm in anderen Gebieten macht, sind in den Ostalpen nicht vorhanden. Eine zweimalige Transgression, die des oberen Obercarbon und der mitteldyadischen Grödener Schichten bedingt eine natürliche Eintheilung; die „mittlere Lückenhaftigkeit“, das Fehlen des unteren Obercarbon und älteren Rothliegenden, erleichtert nicht nur die Uebersicht der Formationen in dem engeren Gebiete, sondern auch die Vergleichung mit anderen Ländern, wo eine lückenlose Entwicklung stattfand. Die mächtig entwickelte Dyas¹⁾ der südlichen Ostalpen besteht aus zwei concordant gelagerten Gebirgsgliedern, den Grödener Schichten („Verrucano“ und Grödener Sandstein) und dem Bellerophonkalk. Der erstere überlagert transgredirend alle älteren Bildungen und wird gleichförmig von Bellerophonkalk bedeckt.

I. Der Grödener Sandstein und der sogenannte Verrucano.

Im Westen unseres Gebietes, in der Gegend von Bozen, wird das tiefste Glied der dyadischen Schichtenreihe von der Platte des Bozener Quarzporphyrs gebildet. Weiter östlich erscheinen nur noch isolirte Stromenden dieses Gesteins in-

¹⁾ Als „anglocentrisches“ Curiosum mag hier der Ausspruch eines im Uebrigen sehr verdienstvollen englischen Lehrbuches der Geologie (von J. Phillips, 1885 neu herausgeg. v. R. Etheridge) über das alpine Perm angeführt werden. Pt. II S. 312 steht geschrieben: „In the Alps the Permian strata are scarcely, if at all represented.“

mitten der Grödener Sandsteine und Conglomerate. Einige Vorkommen zwischen Sexten und Comelico (Danta und Kreuzberg) sind schon von R. HOERNES kartirt, ein weiteres liegt im unteren Lessaechthal nördlich von Maria Luggau, das östlichste Vorkommen findet sich am Wege von Kötsehaeh zum Janken.

Im Allgemeinen wird der Quarzporphyr im Osten durch ein Transgressionseonglomerat vertreten, welches wahrscheinlich das gesammte Gebiet der heutigen Karnischen Hauptkette überkleidet hat. Hierfür spricht die vollkommene Gleichheit der Faciesentwicklung im Norden und Süden sowie der Umstand, dass einzelne Fetzen auf tiefen Grabenspalten inmitten der Hauptkette erhalten geblieben sind; solche Ueberreste treffen wir am Achonitzer Berg und am Gartnerkofel, zwischen Paularo und dem Hoehwipfel sowie im Angesicht der Croda Bianca auf der Bortaglia-Alp.

Die petrographische Beschaffenheit des Grödener Sandsteines und des engverbundenen sogenannten Verneano ist am besten an der neuen Strasse zwischen dem Kreuzberg und Comelico zu studiren. Untrennbar mit der Masse der rothen oder grauen Sandsteine, Glimmersandsteine, Letten und Thone verbunden liegt an der Basis der Grödener Schichten-Gruppe ein Conglomerat, dessen Rollsteine oft wenig gerundete Kanten zeigen. Doch wäre es unzutreffend, dasselbe als Breecie bezeichnen zu wollen; es ist fast überall ein Uebergang in ein Gestein mit abgerundeten Rollstücken nachzuweisen. Die letzteren stammen zum grössten Theile aus dem Quarzphyllit und bestehen somit meist aus weissem Quarz, seltener aus Phyllitstücken. Local findet man Anhäufungen von Fusulinenkalkgeröllen (vergl. den Abschnitt über die Uggowitz Breecie). Die Mächtigkeit des Conglomerates wechselt ungemein; überall wird durch Vorwiegen des rothen Bindemittels und Zerkletern der Rollsteine ein Uebergang in den normalen Sandstein vermittelt. Dem entsprechend ist das Conglomerat im Hangenden des Phyllites zuweilen nur 1 m mächtig, während in geringer Entfernung Wände von 25 m Höhe angeschlossen sind (Wasserfall unterhalb des Kreuzberges).

Dies Conglomerat pflegt von den österreichischen Geologen

allgemein als Verrucano bezeichnet zu werden. Es kann keinen Zweifel unterliegen, dass der Name vielfach in rein petrographischen Sinne für rothe Sandsteine und Conglomerate des Mediterrangebietes angewandt worden ist, deren genaueres Alter nicht festzustellen war; auch könnte eine weitere Verwendung des Namens für Schichtengruppen incertae sedis nicht beanstandet werden. In allen Fällen, wo man den fraglichen Bildungen einen bestimmten Platz in der Schichtengruppe anzuweisen vermag, erscheint eine Ausmerzung der alten Verlegenheitsbezeichnung um so mehr geboten, als an dem carbonischen Alter des eigentlichen Verrucano von Verrucina bei Pisa nicht zu zweifeln ist.

In der lehrreichen Zusammenstellung, welche L. MÜLLER ganz neuerdings über die wechselnde Auffassung des Verrucano gegeben hat¹⁾, erscheint besonders das Citat von DE STEFANI bemerkenswerth: „Le Verrucano typique appartient done au Carbonifere supérieur“ (op. c. S. 85 u. Tabelle).

Der ostalpine Verrucano, der an der Basis des Grödener Sandsteines liegt und auf das engste mit diesem verbunden ist, würde somit am einfachsten als „Conglomerat der unteren Grödener Schichten“ oder kürzer als „Grödener Conglomerat“ zu bezeichnen sein. Es liegt ferner nahe, den Namen „Grödener Schichten“ für die ostalpinen Aequivalente des deutschen Rothliegenden in der Weise anzuwenden, dass demselben das Grödener Conglomerat als tieferes und der Grödener Sandstein als höheres Glied untergeordnet wird. Wir haben also:

- 1) Grödener Conglomerat (= Verrucano anet.) den Bozener Quarzporphyr z. Th. vertretend, z. Th. Ausläufer desselben umschliessend.
- 2) Grödener Sandstein mit untergeordneten Mergeln, Letten, Thon und schichtförmig angeordneten Dolomitknollen.²⁾ Am Dobratsch erscheint ausnahmsweise

¹⁾ Beiträge zur Kenntniss des Verrucano. Leipzig 1897. S. 1—93 mit Tabelle.

²⁾ Die rothen glimmerreichen Sandsteine unterscheiden sich von den ähnlichen Gesteinen des alpinen Buntsandsteins durch ihre Grobkörnigkeit und Diebkörnigkeit, vor allem aber durch das Fehlen der Muscheln, welche in dem jüngeren Gestein regelmässig und häufig auftreten.

blauer thoniger Kalk und Gyps in Verbindung mit Grödenener Sandstein.

Die vorgeschlagenen Aenderungen sind, wie kaum bemerkt zu werden braucht, rein nomenclatorischer, nicht sachlicher Art.

Eine kartographische Auscheidung des Conglomerates ist an den Stellen normaler Auflagerung überaus einfach, indem dort etwa das untere Drittel der gesammten Schichtengruppe demselben zufällt. An den grösseren dislocirten Schollen würde eine sehr eingehende Begehung nöthig sein, die aus Zeitmangel nicht überall durchführbar war. In den schmälern „Graben-spalten“, die in dem Gebiete der Karte am häufigsten mit dem untersten Transgressionsgestein erfüllt sein, sind Sandsteine und Conglomerate meist derart mit einander verquetscht, dass eine Abgrenzung in dem Maasstabe der Karte unndrehführbar ist.

Ueber die stratigraphische Stellung der Uggowitzer Breccie, welcher von STACHE ebenfalls permisches Alter zugeschrieben wurde, ist weiter unten ausführlicher die Rede. Die Schlerndolomite der Pontafeler Gegend und der oberste Theil der Fusulinenkalke, welche beiden Horizonte von STACHE ebenfalls ganz oder theilweise als permisch angesehen werden, gehören, wie aus der unten folgenden Darstellung hervorgeht, nicht hierher.

Organische Reste sind in den Grödenener Schichten der Karnischen Hauptkette bisher nicht gefunden worden; doch erlauben die in angrenzenden Gebieten entdeckten Pflanzenreste eine ziemlich genaue Horizontirung der in Rede stehenden Schichtengruppe. Die älteste hierher gehörige Flora wurde schon vor Jahren von E. SUSS im Val Trompia zwischen einem unteren Porphyrlager und einer höheren Conglomeratbank entdeckt und enthält die folgenden von GEINITZ bestimmten Pflanzen des Deutschen (mittleren) Rothliegenden:

Walchia piniformis SCHL. sp.

„ *filiciformis* SCHL. sp.

Schizopteris fasciculata var. *zwickariensis* GUTB. (unt. Abtheilung des mittleren Rothliegenden in Sachsen).

Sphenopteris oxydata GOEPP.

„ *Suessi* GEIN.

Eine etwas höhere Stellung scheinen die bituminösen, Pflanzen führenden Schiefer von Tergioro im Pesararathal¹⁾ einzunehmen. Dieselben bilden nach VACEK zwischen dem tiefsten, im Hangenden des denudirten Porphyrs auftretenden Conglomerat und dem Grödener Sandstein eine an der stärksten Stelle ca. 200 m mächtige linseförmige Einlagerung und enthalten nach STUR:

Walchia piniformis SCHL. sp.

„ *filiciformis* SCHL. sp.

Ullmannia frumentaria SCHL. sp.²⁾

„ cf. *slaginoïdes* BRONG. sp.

Schizopteris (Fucoides) digitata BRONG. sp. (*Baieria* bei HEER).

Für deutsche Verhältnisse wäre das Zusammenvorkommen von *Ullmannia* (Kupferschiefer) und *Walchia* (Rothliegendes) undenkbar. Allerdings sind hier die Floren des mittleren Rothliegenden und des Kupferschiefers durch versteinungsleere Trausgressionsgebilde wie Oberröthliegendes und Zechsteinconglomerat von einander getrennt. In den Alpen fehlen diese scheidenden Glieder, welche mit als Aequivalente des Grödener Sandsteines anzusehen sind, und ein Zusammenfließen der Floren wäre somit nicht ausgeschlossen. Andererseits ist die Bestimmung der einzelnen Ueberreste von Coniferen keineswegs so einfach, um Irrthümer auszuschließen.

Noch jünger, an den deutschen Kupferschiefer (unt. Zechstein) erinnernd, ist die von GUMBEL³⁾ zwischen Neumarkt und Mazzon entdeckte Flora, welche sich in den hangendsten Theilen des Grödener Sandsteines, nicht sehr tief unter dem Kalke findet, der als Aequivalent des Bellerophonkalkes anzusprechen ist. „Am häufigsten sind ansser den Zapfen Zweige von *Voltzia hungarica* Hr., dazu kommt *Baieria digitata* (HEER), *Ullmannia Bromii* und *U. Geinitzi*²⁾ (nach HEER's Auffassung), eine Anzahl der abgebildeten *Carpolithus*, ein Faruwedel, *Calamites* oder *Equisetites*, einzelne Fischschuppen und eine *Lingula*.“

¹⁾ Verhandl. G. R. A. 1882. S. 43.

²⁾ Nach Graf SOLMS sind die Unterschiede zwischen den einzelnen von älteren Autoren aufgestellten Arten von *Ullmannia* sehr zweifelhaft.

³⁾ Verhandl. G. R. A. 1877. S. 25.

Besser erhalten ist die von HEER beschriebene Flora von Fäufkirchen in Ungarn, welche mit der Neumarkter vollkommen übereinstimmt:

- Voltzia hungarica* HR.
 „ *Böckhina* HR.
Baeria digitata BROSG. sp.
Ullmannia Geinitzi HR. 1)
Schizolepis permianensis HR.
Carpolithus Klockeanus GEIN. sp.
 „ *hunnicus* HR.
 „ *foveolatus* HR.
 „ *Eisclianus* GEIN. sp.
 „ *libocedroides* HR.
 „ *Geinitzi* HR.

Fast die Hälfte der Arten stimmt nach MOJSISOVICs mit solchen des deutschen Kupferschiefers überein, und besonders bemerkenswerth ist das Vorkommen der sonst nur aus rhaetischen Schichten bekannten Gattung *Schizolepis*.

2. Der Bellerophonkalk.

Zwischen dem dyadischen und triadischen Sandstein liegt in normaler Lagerung ein aus Kalk, Dolomit und Gyps bestehendes, meist recht mächtiges Gebirgs- glied, das längere Zeit unbeachtet blieb, bis die Auffindung durch MOJSISOVICs und seine Mitarbeiter erfolgte. Der Bellerophonkalk ist eine streng mediterrane Bildung; er fehlt nicht nur in den ganzen Nordalpen, sondern auch in dem nach nordalpinen Art entwickelten Gailthaler Gebirge. Hier (Profil- tafel VII) wie dort verschmelzen dann die Grödener und Werfener Schichten zu einer schwer zu gliedernden Sandstein- formation, und auf Grund dieser nordalpinen Beobachtungen hat man lange auch den Grödener Sandstein zur Trias gestellt.

Das normale Gestein in unserem Gebiet ist ein graner oder schwarzer meist wohlgeschichteter Kalk, der häufig dolomitische Beschaffenheit annimmt. Bezeichnend für den Horizont ist vor allem die bedeutende Entwicklung von Rauchwacke und dolomitischer Asche, sowie die oft mäch-

1) S. Anmerkung 2 S. 340.

tigen Anhäufungen von weissem Gyps. Während Rauchwacke auch z. B. im Buntsandstein nicht selten ist, kann Gyps sowohl wegen seiner Mächtigkeit als wegen seiner grossen horizontalen Verbreitung geradezu als Leitfossil des Bellerophonkalkes angesehen werden. Die mächtigste Entwicklung zeigt derselbe in der italienischen Carnia zwischen Panlaro und Palizza, wo die Bäche tiefe Höhlungen hinein gefressen haben. Etwas weiter südlich zwischen Arta und Cercivento beobachtet man eine mächtige Entwicklung der Rauchwacken, welche der Verwitterung nur geringen Widerstand zu leisten vermögen und somit zu gewaltigen Abrutschungen und Mühren Veranlassung geben. Die Rauchwacke enthält als echter „Stinkstein“ einige bituminöse Substanzen und vor allem Schwefelwasserstoff; die zu Heilzwecken benutzten Schwefelquellen von Arta bei Tolmezzo, von Malborget und Lussnitz bei Pontafel entspringen sämtlich aus diesem Gestein. Die Aehnlichkeit mit dem mittleren deutschen Zechstein ist somit auch in petrographischer Hinsicht augenfällig.

Von Südtirol her verbreitet sich der Bellerophonkalk durch das Comelico und die Carnia, wo er die Oberfläche auf weite Strecken zusammensetzt (Sutrio, Arta) bis in die Gegend von Pontafel.

Weiter östlich findet sich noch ein kleines Vorkommen im Liegenden der Werfener-Schichten in dem Einschnitte des Schwefelgrabens bei Lussnitz. Man beobachtet vom Eingang des Grabens aufwärts gehend in den unter ca. 20° nach SSW einfallenden Schichten

- 1) Hellen wohlgeschichteten Kalk mit Bänken voll unbestimmbarer Zweischaler;
- 2) Rauchwacke und Asche (mit etwas Gyps);
- 3) Schwarzen Kalk mit *Bellerophon (Stachella)* und nach STACHE¹⁾ mit *Spirifer cultus*, *Spirifer megalotis* und *Athyris janiceps*;
- 4) Darüber liegen kalkige Werfener Schichten mit bezeichnenden Versteinerungen.

¹⁾ Verhandl. G. R. A. 1888. S. 321.

Der Bellerophonkalk hat wahrscheinlich, wie die älteren Dyasseichten das ganze Gebiet der hentigen Karnischen Hauptkette bedeckt. Wenigstens lassen die verschiedentlich gegenüber der Croda Bianca (Abb. 45, 46 S. 105), am Hochwipfel (Taf. III S. 56) und an der Reppwand beobachteten isolirten Schollen diesen Rückschluss natürlich erscheinen. Die Nordgrenze der Verbreitung dürfte eine etwa dem hentigen Gailfluss folgende Linie gewesen sein.

Besonders mächtig ist der Bellerophonkalk als ein meist ungeschichteter graner Kalk in dem schönen beifolgend, wiedergegebenen Profil der Thörlhöhe (Reppwand) entwickelt. Im



Abb. 84. **Profil der Thörlhöhe (Reppwand d. G. St. K.).**
Vom Guggenberg (N) gesehen; etwas schematisirt.

5 Bunte Kalkconglomerate auf der Spitze der Thörlhöhe. 4 Rothe Glimmersandsteine und Schiefer. 3 Graue wohlgeschichtete Plattaukalk. 2—3 Muschelkalk. 2 Werfener Schichten; rothe Schiefer. 1 Bellerophonkalk; massiger, oben unendlich geschichteter heller Kalk, hier und da mit Rauchwacke.

Osten der Karnischen Hauptkette scheint der Bellerophonkalk ganz zu fehlen; in den zahlreichen und eingehenden Mittheilungen F. TELLER's über die Ostkarawanken wird derselbe nirgends erwähnt.

Die Fanna des Bellerophonkalkes ist in unserem Gebiete fast nur durch das nicht sonderlich reiche Vorkommen des Schwefelgrabens vertreten. Ausserdem fand ich unbestimmbare Zweischaler bei dem Uebergang von Pontafel nach Paularo.

Die interessantesten, wesentlich an das Palaeozoium erinnernden Thierreste sind von STACHE¹⁾ untersucht worden und stammen fast sämmtlich aus dem östlichen Südtirol.

Man wird kaum daran zweifeln können, dass der Bellerophonkalk ein Aequivalent des höheren deutschen Zechsteins ist, dessen Verschiedenheiten auf geographischer Trennung der Meere beruhen. Letzterer fehlt in Süddeutschland fast ganz; die Ansläufer finden sich in der Pfalz, in der Gegend von Heidelberg und den nördlichen Vogesen. Die räumliche Trennung ist also vorhanden und die Verschiedenheit der Faunen immerhin so gross, dass abgesehen von dem Vorkommen einiger allgemein verbreiteter Zweischaler (*Bakewellia* cf. *ceratophaga*, *Schizodus* cf. *truncatus*) kaum nähere Beziehungen im einzelnen vorhanden sind. Auf mittleren oder oberen Zechstein verweist das Zurücktreten der Producten (*Prod. cadoricus* als Seltenheit) in den Alpen. — Der bekannte *Productus horridus* kennzeichnet durch sein massenhaftes Auftreten den unteren Zechstein und in der mittleren Abtheilung erscheint als letzter Ansläufer *Productus Housi* KXG. — Zu dem gleichen Schlusse führt die Beobachtung, dass der obere Gröden Sandstein noch die Flora des Kupferschiefers enthält.

3. Die Stellung der sogenannten Uggowitzer Breccie.

Der von dem Dorfe Uggowitz auf die gleichnamige Alp führende Weg beginnt in weissem Dolomit und betritt ziemlich bald das Gebiet der bunten Conglomerate und Breccien, deren Material zumeist aus rothen Kalken vom Alter des Orthoceren- und Fusulinenkalkes besteht. Nach STACHE (Verhandlungen der geol. Reichsanstalt 1878 S. 311) liegt die unterste Schicht des Dolomits „Schichtfläche auf Schichtfläche“ auf der obersten der Breccienbänke. Auf Grund genauer Beobachtung und wiederholter Untersuchung der Stelle kann ich mit Bestimmtheit behaupten, dass die vermeintliche Schichtfläche eine auffallend glatt und regelmässig verlaufende, sehr steil nach Süden einfallende Verwerfung ist. Zwischen dem Dolomit und dem an der Grenze ausgebleichten

¹⁾ Jahrbuch G. R. A. 1877, 1878. Vergleiche auch v. MOZISOVIC'S Dolomitriffe S. 85.

Conglomerat liegt eine 1,90—2 m mächtige Zone von vollkommen zerquetschtem und wieder verfestigten „Gangkalk“ und der Dolomit selbst zeigt deutliche, glänzend polirte Rutschflächen. (Vergleiche das Profil Taf. I. S. 15.)

Die Auffassung STACHES, nach der Dolomit und Conglomerat in einander übergehen, erklärt sich daraus, dass das letztere nach Süden zu weiss und feinkörnig wird. In dem topographischen Theile ist der ausführliche Nachweis geführt worden, dass der „Längshorst“ des bunten Conglomerates rings von Störungen umgeben wird.

An und für sich könnte die von STACHE angenommene normale Ueberlagerung der beiden Gesteine meiner Auffassung nur günstig sein, da das triadische Alter des Dolomites durch zahlreiche Versteinungsfinde (*Diplopora*, *Daouella*, *Thecosmia*, *Posidonia wengensis*) erwiesen wird, während das Vorkommen der dem Dolomit angeblich eingelagerten Fnsulinenkalk auf der unrichtigen Dentung dislocirter Carbonfetzen beruht.

Auch die stratigraphischen Annahmen STACHE'S, welche das permische Alter des Schlerndolomites erweisen sollen, sind sehr anfechtbar. „Dass der Complex von hellen, zum Theil stark dolomitischen Kalken und Dolomiten, in welchen das Canalthal eingeschnitten ist, von der Buntsandsteinzone überlagert wird, welche bei Pontafel in die Thalsohle tritt, ist ausser Zweifel.“ (l. c. S. 312)

Da in der Gegend von Leopoldskirchen das Alluvium des Thales Dolomit und Buntsandstein trennt, kann sich die (nicht näher auf eine bestimmte Oertlichkeit präcisirte) Angabe STACHES nur auf das Profil des Bombaschgrabens beziehen, wo thatsächlich die Werfener Schichten das hangende des Dolomits bilden. Aber zwischen Werfener Schichten und Dolomit liegen hier Kalkbänke, welche schon von HAUER für Guttensteiner Kalk erklärt wurden, und die, wie die wiederholte Untersuchung des Profiles bewies, alle petrographischen Kennzeichen dieses Horizontes besitzen. Erst jenseits (nördlich der Guttensteiner Kalke) liegt der von STACHE als permisch angesprochene Schlerndolomit. Die Schichtenfolge ist also einfach überkippt.

Da nun zudem bunte Kalkeconglomerate ein bekanntes

und häufig beschriebenes Glied des unteren Muschelkalkes der Südalpen bilden, und da ferner die Conglomerate von Uggowitz vollkommen mit typischen Südtiroler Vorkommen (z. B. denen von Bad Ratzes und der Pufelser Schnecht) übereinstimmen, so liegt nicht die mindeste Veranlassung vor, dieselben für permisch zu halten.

Dass das Vorkommen abgerollter Fusulinen in einer ausgesprochenen Conglomeratbildung für die Altersdeutung keine besondere Bedeutung besitzt, braucht kaum besonders betont zu werden. Jedoch sei daran erinnert, dass die kalkigen Fusulinengehäuse sich aus dem umgebenden Schieferthon meist leicht herauslösen.

Die Conglomerate treten in unseren engeren Gebiete nicht nur in dislocirten Fetzen sondern mehrfach, so an der Nordseite des Gartnerkofels und an der Strasse Tarvis-Kaltwasser in ihrer normalen Stellung zwischen Werfener Schichten und triadischem Dolomit auf.

Leider hat die mit grosser Sicherheit ausgesprochene Ansicht STACHE'S über das Alter der Uggowitzer Conglomerate verbunden mit dem Umstande, dass in dem echten Grödener Conglomerat zuweilen (z. B. am Kreuzberg) Fusulinenkalke in grösserer Anzahl vorkommen, mancherlei Verwirrung zur Folge gehabt.

Eine derartige permische Kalkbreccie, welche petrographisch an die Uggowitzer Gesteine erinnert, aber eine wesentlich verschiedene stratigraphische Stellung besitzt, beschreibt STACHE selbst in der bereits angeführten Mittheilung „über die Stellung der Uggowitzer Kalkbreccie“ (Verhandlungen der geol. R.-A. 1878 S. 312):

In dem Durchschnitte des Feistritzflusses in den Karawanken bei Nenmarkt südlich von Klagenfurt beobachtet man von Nord nach Süd:

- 1) Eine mächtige Folge steilgestellter Bänke von Quarzit und Quarzconglomerat.
- 2) Sandsteine mit dünnen Bänken von Quarzconglomerat und dunklen Thonschiefern mit Lager von Kalksandstein und Kalkknollen. Darin Fusulinen.
- 3) Eine mächtige Folge von lichtgrauen Kalken und dunklen Kalken bildet das oberste Glied des Carbon.

In dem oberen Niveau dieser Kalke kommen grosse kugelige Fusulinen (Schwagerinen) vor. Die Kalke sind wie die tieferen Bildungen steil aufgerichtet (60° — 70° S Fallen) und werden bei Nenmarkt von dem Feistritzfluss in der sog. Teufelssehneht durchbrochen. Ueber dem Ober-Carbon, an dessen Uebereinstimmung mit dem gleichartigen Horizonte der Karnischen Alpen nicht zu zweifeln ist, folgt (concordant oder discordant? — nähere Angaben fehlen):

- 4) das Perm, gegliedert in
 - a) eine mächtige klotzige Kalkbank, welche durch zahlreiche Quarzkörner und grosse Quarzgerölle bereits stellenweise einen conglomeratischen Charakter zeigt,
 - b) bunte Kalkbreccie, unten noch mit zahlreichen Quarzgeröllen, durch rothe sandsteinartige oder schiefrig thonige Zwischenmittel gegliedert,
 - c) rothgefärbtes Quarzconglomerat mit rothen Sandsteinbänken, welche
 - d) mit rothem Sandstein- und Thonschieferlager wechseln; letztere nehmen nach oben überhand.
- 5) Helle zum Theil dolomitische Kalkschichten.

Die unter 4 b—d) beschriebenen Bildungen stimmen so vollkommen mit den Grödener Quarz- und Kalceonglomeraten, sowie den Sandsteinen und Mergeln des Kreuzberges bei Sexten überein, dass man die Beschreibung unmittelbar übertragen könnte. Die petrographischen Verschiedenheiten von den Uggowitzer Schichten ergeben sich ebenfalls aus der obigen fast wörtlich wiedergegebenen Beschreibung STACHE ohne weiteres. Dass die Kalke 5) den Bellerophon-schichten entsprechen, ist sehr wahrscheinlich; doch könnte es sich auch um eine tiefere kalkige Abtheilung der Werfener Schichten handeln.

Etwas weiter östlich, im Vellachthale (Seelandsattel), liegen ebenfalls an der Grenze des Oberearbon gegen die Werfener Schiefer bunte Kalkbreccien, welche in ihren Einschlüssen sowohl wie in dem kalkig-sandigen Cement Fusulinen führen (TELLER, Verhandlungen 1889 N. 16) und ebenfalls von STACHE mit den Uggowitzer Gesteinen verglichen wurden.

Auch in den Ostkarawanken, im Gebiete von Weitenstein (Untersteier) hat TELLER (l. c.) dieselben Schichten in intermediärer Stellung zwischen Obercarbon und Werfener Schichten nachgewiesen. „Anfallend ist auch hier der grosse Reichthum an Einschlüssen von rosenrothen bis fleischrothen Kalksteinen, mit Fusulinendurchschnitten, für deren Herkunft gegenwärtig in dem ganzen Gebiet kein Substrat vorliegt.“ Derselbe Ausspruch würde auch auf die Schichten des Krenzberges passen. „Einzelne dieser rothen Kalkblockmassen besitzen so beträchtliche Dimensionen und zeigen so scharfkantige Umrisssformen, dass man unmöglich an einen Transport aus grösserer Ferne denken kann. Die Breccie trägt mehr den Charakter einer Strandbildung, welche eine an Ort und Stelle als riffähnlichen Küstensaum zum Absatz gelangte Kalksteinbildung verarbeitet hat.“

Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich

- 1) Die „Uggowitzer Breccie“ STACHE's sensu strictissimo gehört zum Muschelkalk.
- 2) Innerhalb der tieferen Grödener Schichten (sog. Verrucano) finden sich von den Grenzen Tirols bis Steiermark Kalkconglomerate, welche petrographisch den Muschelkalkconglomeraten zum Theil ähnlich werden, und wie diese aus der Zerstörung und Umlagerung von rothen Fusulinen- und Orthocerenkalken hervorgegangen sind; man könnte diese „Pseudo-Uggowitzer Conglomerate“ im Gegensatz zu dem verbreiteteren Quarzconglomerat als Kalkconglomerat der Grödener Schichten bezeichnen.

Die Stellung des Karnischen Carbon und Perm in der allgemeinen Schichtenfolge.

In dem Karnischen Culm, den Nötseher Schichten und dem Karnischen Obercarbon haben wir die beiden Hauptabtheilungen der Steinkohlenformation in mariner und nicht mariner Entwicklung vor uns. Im Untercarbon sind die heteromesischen Ausbildungsformen räumlich getrennt, im Obercarbon durch Wechsellagerung unmittelbar verbunden.

Man könnte darüber im Zweifel sein, ob einer der genannten Horizonte nicht mit dem alten Namen „Gailthaler Schichten“ zu benennen sei. Jedoch wurden unter dieser Bezeichnung, welche in vieler Hinsicht ein Analogon des „Alpenkalkes“ bildet, bekanntlich alle palaeozoischen Schichtgesteine — sogar mit Einschluss einiger Triasbildungen! — zusammengefasst. Die Beschränkung des Namens Gailthaler Schiefer etwa auf das Obercarbon würde somit immer zu Missverständnissen Anlass geben, welche die oben gewählten Bezeichnungen gänzlich angeschlossen.

Das Zusammenvorkommen der beiden palaeontologisch scharf charakterisirten Faciesbildungen auf kleinem Ranne legt eine Vergleichung mit anderen Gegenden nahe, in welchen das gegenseitige Verhältniss dieser Entwicklungsformen weniger geklärt erscheint.

Eine vergleichende Stratigraphie der Carbon- und Permbildungen gehört bekanntlich zu den dringendsten Erfordernissen der Stratigraphie überhaupt. Noch im Jahre 1887 musste einer der hervorragendsten Fachmänner hervorheben, dass wir hier trotz der überwältigenden Menge von Einzelbeobachtungen „an den allerelementarsten Grundzügen herumtasteten.“¹⁾

¹⁾ Neumayr, Erdgeschichte II. S. 182.

Die Uebersicht, welche E. STUSS seitdem in dem die Palaeozoischen Meere behandelnden Abschnitt des Antlitzes der Erde (II. S. 294 ff.)¹⁾ gab, zeigt zwar in der Darstellung der Steinkohlenbildung die unerreichte Meisterschaft des berühmten Geologen, lässt aber in dem, die allgemeine Gliederung und die Transgressionen behandelnden Theile den vollkommenen Mangel von wissenschaftlich befriedigenden Vorarbeiten erkennen.

Diese letztere Lücke ist zwar seitdem durch die Zusammenstellungen, welche WAAGEN in der Schlusslieferung seiner Saltrange-Monographie²⁾ gab, theilweise ausgefüllt. Aber ganz abgesehen davon, dass durch einige in jüngster Zeit veröffentlichte Schriften amerikanischer und russischer Forscher wesentliche Ergänzungen und Veränderungen nöthig werden, ist in der grossen Uebersichtstabelle gerade die Darstellung des Karnischen Carbon recht unbefriedigend, — woraus selbstredend dem Verfasser derselben kein Vorwurf erwächst. Eine vergleichende Uebersicht der gesammten Formation³⁾ dürfte hier um so weniger am Platze sein, als — nach Einführung einiger allerdings nicht unwesentlicher Aenderungen — auf die Eintheilung WAAGEN'S verwiesen werden kann.

Die Grundlage der Gliederung wird auch in der Steinkohlenformation die Anfeinanderfolge der marinen Faunen bilden müssen — schon um die Möglichkeit der Vergleichung mit anderen Formationen nicht zu verlieren; für die Vergleichung der Landfaunen mit dem marinen Normalschema liegen jetzt glücklicherweise hinreichend zahlreiche Anhaltspunkte vor.

I. Das Untercarbon und seine Verbreitung.

a) Mittel- und Westeuropa.

An der Basis der carbonischen Schichtenfolge liegen in Westeuropa und Russland Schichten mit einer gemischten

¹⁾ Von irgendwelcher Polemik glaubte ich um so mehr absehen zu müssen, als die Abweichungen der nachfolgenden Darstellung durch die wesentliche Erweiterung unserer Kenntnisse veranlasst ist.

²⁾ Palaeontologia Indica. Ser. XIII Salt Range Fossils Vol. IV Part. 2. Das Heft trägt zwar die Jahreszahl 1891; das Erscheinen erfolgte aber wie bei sämmtlichen Lieferungen des grossen Werkes infolge der Verzögerung des Druckes ganz wesentlich später als die Abfassung.

³⁾ Die Erörterung beschränkt sich durchaus auf die Nordhemisphäre.

Devon-carbonischen Brachiopodenfauna (die Pilton beds in England, Calcaire d'Etroenngt in Belgien, Kalk von Malöwka-Murajewnia in Russland). Man rechnet dieselben meist zum Devon; doch haben sich in älterer und neuerer Zeit auch Stimmen für ihre Zurechnung zum Carbon ausgesprochen. In diesem, an sich sehr unwahrscheinlichen Falle würden dieselben als eine besondere Zone an der Basis des Carbon zu betrachten sein.

Besonders hat HOLZAPFEL in neuerer Zeit die Zurechnung der Pilton beds¹⁾ und des Calcaire d'Etroenngt²⁾ zum Carbon befürwortet. Wenn es sich einfach darum handelte, eine nicht durch bestimmte Merkmale gekennzeichnete Zwischenfauna der höheren oder tieferen Formation zuzuweisen, würde eine eingehendere Erörterung der formellen Frage überflüssig sein. Jedoch beansprucht im vorliegenden Falle die Vergleichung abweichender Faciesbildungen auch sachliches Interesse. In den Gebieten, welche durch das Auftreten der genannten Localfaunen gekennzeichnet werden, fehlt der eigentliche Clymenienkalk und es liegt kein Grund vor, die Pilton beds und den Kalk von Etroenngt nicht als heterope Äquivalente desselben aufzufassen. Man müsste andernfalls annehmen, dass Bildungen, welche der erwähnten wohl charakterisirten Stufe vergleichbar wären, hier vollkommen fehlten, und dies ist bei der concordanten Form der Lagerung nicht eben wahrscheinlich.

Vor allem spricht die Fauna mehr für Devon; wenigstens enthalten die Pilton beds von Nord-Devonshire, welche ich aus eigener Anschauung kenne, neben wenigen carbonischen

¹⁾ Palaeontologische Abhandlungen von DAMES und KAYSER. Neue Folge I. 1, S. 14.

²⁾ Ibid. S. 10. Der hier angeführte theoretisch richtige Grund, dass das Auftreten „einer neuen Fauna“ die Grenze zwischen zwei Formationen kennzeichne, ist im vorliegenden Falle nicht zutreffend. Denn einige wenige neue Brachiopodenarten, deren Abstammung von devonischen Formen kaum zu bezweifeln ist, können natürlich als „neue Fauna“ bezeichnet werden. Nur wenn neue Gattungen — wie die Ammoniten der Artinskischen Stufe sich aus älteren Formen entwickelt haben, oder eine fremdartige Thiergesellschaft (Goniatiten im Unterdevon, Clymenien etc) einwandert, kann von einer neuen Fauna gesprochen werden.

Formen (*Streptorhynchus crenistria*, *Productus praelongus*) eine bei weitem grössere Anzahl devonischer Arten: *Athyris concentrica*, *Strophalosia productoides*, *Chonetes hardrensensis*, *Spirifer Verneüli* und vor allem auch die Gattung *Phacops*; letztere ist sonst nirgends im Carbon gefunden worden. Aus dem Calcaire d'Étrocnngt werden vereinzelt Clymenien von HÉBERT citirt; eine Veranlassung, diese Angabe anzuzweifeln (HOLZAPFEL l. c. S. 11) liegt wohl kaum vor, da es sich um zwei schwer zu verkenne Formen handelt.

Endlich ist noch hervorzuheben, dass alle Forscher (mit Ausnahme von DEWALQUE), welche die erwähnten Localbildungen aus eigener Anschauung kennen, dieselben zum Devon rechnen. Wir betrachten dieselben daher ebenfalls, ebenso wie den korallenreichen Kalk von Malöwka-Murajewnia als litorale Aequivalente des pelagischen Clymenienkalkes und lassen das Carbon mit den tiefsten Lagen des Culms und Kohlenkalkes beginnen.

Der Culm gilt herkömmlicherweise als litorale, der Kohlenkalk als hochmarine Bildung. Doch haben HOLZAPFEL und KAYSER neuerdings mit Recht darauf hingewiesen, dass Riffkorallen, dickschalige Gastropoden, Brachiopoden und Zweischaler, sowie eine spärliche Cephalopodenfauna unmöglich als Kennzeichen pelagischer Facies anzusehen seien. Für eine solche würden viel eher die zahlreichen Goniatiten, Orthoceren und dünnchaligen Muscheln (*Posidonia*) sprechen, welche die Schiefer des Culm kennzeichnen.

Immerhin ist die grosse bei echten Tiefseebildungen niemals vorkommende Mächtigkeit der Culmschiefer und die enge Verknüpfung derselben mit den Landpflanzen führenden Grauwacken nicht eben für Tiefseebildungen bezeichnend. Wenn auch einmal durch einen vielbesprochenen und in seiner Bedeutung wohl etwas überschätzten Dredge-Zug in mittelamerikanischen Meeren grosse Mengen von Landpflanzen aus tiefer See herausgefischt wurden, so wird man darauf hin noch nicht eine Ausnahme zur Regel erheben und das Vorkommen von Landpflanzen als bezeichnend für Tiefseebildungen erklären können. Schon die Ausdehnung, welche der typische Culm in Europa besitzt (Schottland — Portugal — Ostalpen — Schlesien) ist viel zu

bedeutend, um eine allgemeine Verbreitung der Landpflanzen in einer Tiefseebildung naheliegend erscheinen zu lassen. Gerade die Kieselschiefer, welche man wegen des Vorkommens von Radiolarien als bezeichnende Tiefseebildungen angesehen hat, sind in den Karnischen Alpen besonders mächtig und gerade hier wurden bisher nur Landpflanzen in ihrer Begleitung gefunden. Wie in den heutigen Meeren die Schalen von Pteropoden, *Spirula* oder *Argonauta* in flache Gewässer getrieben werden, ebenso kann dies auch früher den pelagischen Seethieren widerfahren sein.

Darans, dass man bisher fälschlich den Kohlenkalk mit seinen Korallenriffen als Bildung des tiefen Wassers angesehen hat, folgt noch nicht die Richtigkeit des umgekehrten Satzes, dass nun der Culm die Stellung des ersteren als abyssisches Sediment einnehmen müsse. Vergewenwärtigen wir uns die un-gemeine Mannichfaltigkeit der devonischen Flachseebildungen (oben I—III), so ergibt sich, dass in vollkommen naturgemässer Weise Kohlenkalk, Nütseher Schichten und Culm als verschiedenartige Faciesbildungen nebeneinander in flachen Meerestheilen abgelagert werden konnten. Die mächtige Ablagerung klastischen Sediments auf weiten Gebieten spricht für alles andere als Tiefseeablagerungen; aber auch die von HOLZAPFEL in den Vordergrund gestellte Häufigkeit von Goniatiten und Orthoeren ist im vorliegenden Falle nicht ganz zu einwandfreien Schlussfolgerungen geeignet. Bekanntlich ist der untere Theil des productiven Carbon in England (Coalbrook Dale, Gannister beds), Belgien (Chokier), im Ruhrgebiet und in Oberschlesien (Untere Waldenburger Schichten) reich an Einschaltungen mit rein marinen Resten. Unter diesen fehlen nun die eigentlichen litoralen Typen, wie sie etwa die Nütseher Schichten auszeichnen, d. h. dickschalige Bivalven, grosse Gastropoden und Brachiopoden ganz oder sind, wie die letztgenannten, nur spärlich vertreten. Dafür finden sich in Menge Goniatiten, grosse Nautiliden und Orthoeren, kleine Gastropoden und dünnshalige Bivalven, also Organismen, die man sonst unbedenklich als pelagisch bezeichnet. Das ist die Fanna des Culmschiefers. Die Schichten liegen eingeschlossen zwischen Kohlenflötzen und Landpflanzen führenden Bildungen, können

also unmöglich in den Tiefen des offenen Oceans abgesetzt worden sein. Die andere Möglichkeit, dass Goniatiten und Nautiliden zur Carbonzeit Flachseebewohner gewesen seien, erscheint angesichts der aus älteren (Devon-) und jüngeren (Trias-) Bildungen vorliegenden Beobachtungen wenig wahrscheinlich. Es bleibt also nur die Möglichkeit, dass durch plötzliche Ereignisse, etwa Sturm- oder Erdbebenfluthen, die Bewohner des hohen Meeres in Süßwasser-Lagunen und Sümpfe (Gannister beds) oder in Küstengewässer (Cnlm) gespült wurden und hier in Masse ankamen (Prod. Carbon) oder trotz ungünstiger Lebensbedingungen noch einige Zeit fortlebten (Cnlm). Geologische Kataklysmen sind ja in letzter Zeit sehr in Misseredit gerathen; aber die Mitte der Carbonzeit, in welcher eine Menge tektonischer und erosiver Umwälzungen durch Beobachtung sicher gestellt ist, dürfte in dieser Hinsicht eine Ausnahme machen.

Die Ausdehnung der eigentlichen Tiefseesedimente zur Carbonzeit war nach dem Vorangehenden allerdings sehr geringfügig: Der Marble Griotte in Asturien und den Pyrenäen, sowie der Goniatitenkalk von Indiana sind wahrscheinlich die einzigen, auf das tiefste Untercarbon beschränkten Bildungen, deren Entstehung in grösseren oceanischen Tiefen schon durch den Vergleich mit den isopren devonischen Goniatitenkalken sicher festgestellt erscheint. Eine im wesentlichen übereinstimmende Entstehung dürften die Goniatitenkalke von Erdbach-Breitscheid in Nassau besitzen, deren räumliche Ausdehnung jedoch eine überaus beschränkte ist.

Die Tiefseebildungen des Palaeozoicum vom Typus der Paradoxides-, Olenus-, Graptolithen- und Cephalopodenschiefer¹⁾, welche bei häufigem Wechsel der Fauna äusserst geringe Mächtigkeiten besitzen, fehlen im Carbon nach unseren bisherigen Erfahrungen gänzlich. Jedoch lässt sich in der gesammten Schichtenfolge der Erdrinde dieselbe Erfahrung machen, dass gewisse Facies, so rothe Sandsteine, Korallenriffe, Steinkohlen und Erdölvorkommen, in ihrer

¹⁾ Z. B. Oberdevon von Bledesheim, Nehden, Wildungen (schwarze Kalkknollen). Cephalopodenkalke dürften stets nach den Erfahrungen der heutigen Tiefseeforschung (Globigerinenschlamm — Red clay) eine höhere bathymetrische Stellung einnehmen.

Hauptentwicklung an bestimmte Formationen gebunden zu sein scheinen. Wahrscheinlich hängt diese Thatsache weniger mit Charaktereigenthümlichkeiten der betreffenden Formationen als mit unserer beschränkten räumlichen Kenntniss der Erdrinde zusammen. Die Tiefseebildungen des Carbon z. B. liegen wahrscheinlich im Bereiche der heutigen abyssischen Regionen. Die „Unveränderlichkeit der Festlandssoekel“ ist eine Hypothese wie viele andere, und wenn man neuerdings das Vorkommen tertiärer Hai- und Fischzähne in den abyssischen Tiefen als Beweis für dieselbe anführt, so vergisst man, dass hierdurch nur die Persistenz der Meerestiefen für die Tertiärzeit bewiesen wird. Dass die Culmgrauwacken, welche Landpflanzen (*Lepidodendron*, *Archaeocalamites*) führen und gelegentlich Kohlenflötze enthalten (Grossbritannien; Horton series in Neu-Schottland), in flachen Meeresbecken oder Lagunen zum Absatz gelangten, ist niemals bezweifelt worden. Innerhalb des Goniatiten führenden Culm (England, Westdeutschland) konnten bisher verschiedene Faunen nicht unterschieden werden. Die Posidonien und Goniatiten (*Glyphioceras sphaericum*, *Pronorites microlobus*, *Brancocheras*, *Prolecanites*) stammen jedoch, wie es scheint, durchweg aus höheren Horizonten des Culm, stehen also stratigraphisch den oben verglichenen Gannister beds näher. Die liegenden Kiesel- und Adinolschiefer, die in Nassau, Westfalen und im Harz weit verbreitet sind, scheinen fossilfrei zu sein.¹⁾

In England, wo ein allmäliger Uebergang zwischen den höchsten Theilen des marinen Devon (Devonshire) bezw. des Old red sandstone und dem Carbon zu beobachten ist, wurde die Fauna dieser tieferen Bildungen bisher nur ungenügend studirt. Hierher gehört der tiefere Theil der ausserordentlich kalkreichen Culmbildungen von Devonshire, die sogenannten Lower limestone shales von South Wales, Gloucester, Somerset und Devonshire mit mariner Fauna.²⁾ Hingegen sind weiter nördlich die Thedean beds von Northumberland und noch mehr der Calciferous sandstone von Schottland, welche den Old red sandstone überlagern, reich an Landpflanzen und nichtmarinen Thierresten. Marine Versteinerungen, welche im Calciferous

¹⁾ HOLZAPPEL l. c. S. 9.

²⁾ H. B. WOODWARD, *Geology of England* p. 153.

sandstone nicht fehlen, treten als eingeschwemmte Reste in einzelnen Lagen ähnlich wie im Obercarbon auf.

Die bisher erwähnten Bildungen sind nur zum kleinsten Theile rein mariner Entstehung. Facies von dieser letzterem Zusammenfassung fehlen ebenfalls nicht ganz, sind aber verhältnissmässig wenig häufig. Es ergibt sich somit, dass im Vergleich zum Oberdevon die Ansehning des untercarbonischen Meeres in der Nordhemisphaere abgenommen hat.

In Belgien, dessen subcarbonische Schichtenfolge zu so zahlreichen Discussionen Veranlassung gegeben hat, ohne bisher vollkommen geklärt zu sein, ist das tiefste Carbon durch den Kalk von Tournai mit *Spirifer tornacensis*¹⁾ vertreten. Die massigen Kalke von Waulsort, welche u. a. bei Dinant fehlen, stellen die Riffacies des unteren und des oberen Horizontes (Visé) dar, und enthalten, abgesehen von den gebirgsbildenden Stromatoporidaen, anschliesslich korallophile Formen.

Der Kalk von Tournai besteht aus Crinoidenkalken („petit granite des Écansines“) und Kalkschiefern. Von besonderem Interesse ist das Vorkommen einzelner Goniatiten, deren weite Verbreitung für die Vergleichung der Horizonte von Wichtigkeit ist. Die betreffenden Arten von *Prolecanites* und *Glyphioceras* finden sich in wenig abweichenden oder identen Arten im Kalk von Erdbach-Breitscheid in Nassau, im Marbre Griotte von Asturien und im „Goniatite limestone“ von Indiana wieder. Die höhere Stufe des Untercarbon, der Kalk mit *Productus giganteus* (Calcaire de Visé, Nötscher Schichten S. 303) besitzt in mariner Entwicklung eine grössere Verbreitung als der tiefere Horizont. Auf die Einzelheiten der Verbreitung einzugehen, würde zu weit führen; doch sei so viel bemerkt, dass auf beiden Seiten des Nord-Atlantischen Oceans eine Oscillation des Meeres im positiven Sinne zu beobachten ist. Die Uebereinstimmung der Fannen ist schon im Oberdevon so gross, dass wir zur Annahme eines

¹⁾ Die Verwechslung von *Spir. tornacensis* (Unt. Untercarbon) und *Spir. mosquensis* (Unt. Obercarbon) hat bekanntlich lange Zeit eine genauere Horizontirung der marinen Carbonbildungen unmöglich gemacht.

nordatlantischen Continentes gedrängt werden. Die palaeontologische Uebereinstimmung des Tully limestone und des Iberger Kalkes (Unteres Oberdevon) bildet die erste Andeutung. Noch bezeichnender ist die nahe Verwandtschaft der Flachseebildungen des höheren Oberdevon, wo dieselben in gleicher Facies auf beiden Hemisphaeren entwickelt sind (Chemung group — Oberdevon von Nord-Devon, Famenien in Belgien). Nur eine fortlaufende Küstenlinie oder eine zusammenhängende Inselreihe vermag die Uebereinstimmung der auf die Litoralregionen beschränkten Zweischaler¹⁾ in Amerika und Europa zu erklären. Im obersten Devon kennzeichnet das Auftreten der Old-Red-Facies in New-York und im Osten der britischen Besitzungen (Catskill group) die weitere Ansehnung terrestrischer Verhältnisse auf altem Meeresboden.

Noch bezeichnender für das Vorhandensein eines nordatlantischen Continentes ist die vollkommene Uebereinstimmung, welche die organischen Reste und die Gliederung von Carbon und Dyas in Europa einerseits und auf Neu-Schottland sowie der Prince-Edwards-Insel andererseits erkennen lassen. Dem Glengarriff grit von Süd-Irland und dem Calciferous sandstone von Nord-Schottland, welcher in wesentlichen terrestrischen Ursprungs ist und neben zahlreichen Landpflanzen und Kohlenflütchen nur einzelne marine Lagen enthält, entspricht die Horton series der Neuen Welt, in der die ältere Carbonflora (*Stigmaria ficoides* und *Cyclopteris*) sowie Kohlenflütze vorkommen. All diese Sandsteinablagerungen, welche die unmittelbaren Fortsetzungen des ebenfalls nichtmarinen Old red sandstone bilden, werden von dem marinen Kohlenkalk mit *Productus semireticulatus* bedeckt. Die gewaltige Ansehnung der Platte des Kohlenkalkes auf der grünen Insel ist bekannt; in Amerika bezeichnet man die gleichalten Schichten als Kalk von Windsor.²⁾

¹⁾ Eine Zusammenstellung findet sich in meiner Arbeit über die Aviculiden des deutschen Devon. S. 243—245.

²⁾ Die weitere Schichtenfolge ist in Neu-Schottland von unten nach oben: 3) Sandstein mit *Dadoxylon acadicum* = Millstone grit. 4) Coal Measures = Saarbrücker Schichten. 5) Rothe Sandsteine = Ottweiler Schichten bezw. rothes Oberearbon von Wettin. 6) Rothe Sandsteine mit *Walchia* und

Das Bild, welches der heute vom nordamerikanischen Continent eingenommene Erdraum während der älteren Carbonzeit darbot, lässt sich mit ziemlicher Sicherheit wiederherstellen. Im Norden und Osten finden wir Festland, in der Mitte und im Westen Meer, an der Grenze beider Gebiete sowie im Süden einen eigentümlichen Wechsel von Lagunen, Sümpfen und flachen Meereshuchten, wie wir ihn heute etwa im Mississippi-Delta beobachten. Die Kohlenflöze und landpflanzenreichen Ablagerungen des Ostens kennzeichnen den Rand des grossen atlantischen Festlandes, dessen allmähliges Hervortreten schon während des Endes der vorhergehenden devonischen Zeit zu beobachten ist. Die Ränder desselben können wir von Cape Breton im Norden der appalachischen Ketten bis weit hinab nach Süden verfolgen. Am besten bekannt sind dieselben in Pennsylvanien. Die grössten Gerölle, welche die Flüsse dem Meere zuführten, sanken noch in den Lagunen des Festlandes oder unmittelbar neben denselben in der flachen Strandregion zu Boden und häuften sich hier, zusammen mit den feineren plastischen Bildungen, Sandstein und Schiefer zu gewaltigen Massen an (Pottsville conglomerate); schliesslich wurde die erhöhte Strandregion in Land verwandelt. Nach dem Inneren und nach Westen zu nimmt die Grösse der Gerölle allmählig ab und an Stelle der Sande und Schiefer beginnen sich Kalklagen allmählig einzuschieben. Am schärfsten bestimmbar und am besten wahrzunehmen ist dieser Uebergang in den tiefsten Schichten des Untercarbon, deren Entwicklung und Benennung äusserst mannigfaltig ist, deren gleiches Alter aber durch das Auftreten im Hangenden des Oberdevon (Chemung) gesichert erscheint. Die mannigfach entwickelten und mit vielen Namen¹⁾ belegten sandigen Schichten von Pennsylvanien enthalten im wesentlichen die Landpflanzen des europäischen Culm (*Lepidodendron*, *Palaecopteris*, *Triphylopteris*); jedoch kommen schon hier ein-

Pecopteris arborescens = Rothlegendes. 7) Dolomitische Kalke mit *Schizodus Schlotheimi* und *Pseudomonotis Hausmanni* = Zechstein (Magnesian limestone).

¹⁾ Vespertine series der ersten Survey von Pennsylvanien (Rogers); Pocono sandstone der zweiten Survey (Lesley); Greenbrier von Stevenson. Genaueres bei H. S. WILLIAMS, Correlation papers. Devonian and Carboniferous. S. 94 ff.

gelagert kalkige Bänke¹⁾ mit marinen Arten vor, welche weiter im Westen wiederkehren. In dieser Richtung fortschreitend treffen wir in Michigan die Marshall group und in Ohio die Waverley-Schichten, marine Bildungen, die fast ausschliesslich aus Sandstein bestehen. Erst in Indiana (Goniatite limestone von Rockford), Illinois (Kinderhook group), Iowa und Missouri (Chontean limestone) herrschen Kalksteine vor. Ebenso ist im ganzen Osten der Rocky Mountains, in Idaho, Utah, Colorado, Neu-Mexiko und Arizona der untere marine Kohlenkalk ein im Gebirgsbau und im Charakter der Landschaft scharf hervortretendes Schichtglied, meist das mächtigste des ganzen Palaeozoicum. In Utah hat der 7000—8000' mächtige Kalk seinen Namen von dem gewaltigen Wahsatchgebirge erhalten, umschliesst aber in seinen tiefsten Theilen noch Aequivalente des Devon. Weiter südlich im grossen Cañon (Arizona) bildet der massige, schneeweisse, aber oberflächlich roth überlaufene Kalk des „Red Wall“ ein scharf nach oben und unten abgegrenztes Gebirgsmitglied. Die wild zerklüfteten Thürme und Pfeiler gemahnen an die Formen der Tiroler Dolomiten. Aber weiter westlich und südlich, in Nevada und Texas, beweisen die geologischen Durchschnitte schon wieder die Nähe eines carbonischen Festlandes.

2. Das Obercarbon und seine Verbreitung.

Bekanntlich wurden früher in unrichtiger Verallgemeinerung der westeuropäischen Verhältnisse die marinen Schichten als bezeichnend für das untere, die Kohlenflötze als eigentümlich für das obere Carbon angesehen. Wenn man auch später mächtige marine Kalke im Obercarbon kennen gelernt hat, so bleibt doch von der älteren Ansicht so viel übrig, dass terrestrische Bildungen und Kohlenflötze für das Untercarbon eine verhältnissmässig geringe Bedeutung besitzen (vergl. oben). Ferner ist die Thatsache erwähnenswerth, dass die productiven

¹⁾ Im Petroleumgebiet von West-Virginia unterscheidet WURTE über dem Oberdevon 1) Pocono sandstone (öffnend), 2) Kohlenkalk (bis 30 m mächtig), 3) Mauch Chunk shale (cf. Culm), 4) Pottsville Conglomerate (= Millstone grit), 5) Lower Coal Measures, 6) Barren Coal Measures, 7) Upper Coal Measures, 8) Perm (in terrestrischer Entwicklung). Bull. geol. soc. of America. Vol. III. Pl. 6.

Steinkohlenbildungen der Südhemisphäre, besonders diejenigen Australiens schon der Dyas angehören; dies „Kohlenrothliegende“ fehlt bekanntlich auch in Deutschland nicht.

Ueber der vergleichenden Stratigraphie des Carbon sebhweht ein gewisser Unstern. Zuerst wurde durch die weite Fassung des Artbegriffes bei DE KONINCK und DAVIDSON die palaeontologische Abgrenzung der einzelnen marinen Horizonte fast unmöglich gemacht. Nachdem durch mühevollc Untersuchungen, deren Hauptverdienst WAAGEN zufällt, dieser Uebelstand behoben war, wurde durch einen — allerdings mehr formellen als sachlichen — Missgriff STUR's die Unterscheidung der nichtmarinen Carbonabtheilungen in ähnlicher Weise erschwert.

In den zahlreichen, die Carbonflora und ihre Stratigraphie behandelnden Arbeiten des genannten Forschers findet sich durchgehend eine Auffassung über die Abgrenzung der beiden Hauptabtheilungen, welche mit der historischen Entwicklung unserer Kenntnisse ebenso wie mit den geologischen und palaeontologischen Beobachtungen im Widerspruch steht. Die Waldenburger (= Ostraner) Schichten Schlesiens werden ebenso wie ihr englisches Aequivalent, der Millstone grit, als Culm II zum tieferen Carbon gestellt. (U. a. im Jahrb. d. geol. R. A. 1880. S. 16; allerdings trägt die Abhandlung den bezeichnenden Titel „Momentaner Stand meiner Kenntnisse über die Steinkohlenformation Englands“). Da man nach der längst eingehürgerten, auch auf dem Continent vielfach üblichen englischen Bezeichnung Culm und Millstone grit als zwei durch Versteinerungsführung und petrographischen Charakter scharf geschiedene Bildungen ansieht, kann man nicht wohl den Culm s. str. als Culm I und den Millstone grit als Culm II bezeichnen. (Mit demselben Rechte würde man etwa den Schlerndolomit und Hauptdolomit als Schlerndolomit I und II neu benennen können.)

Aus stratigraphischen Gründen ist die Aenderung STUR's so unglücklich wie möglich. Die wichtigste Discordanz, welche sich in den palaeozoischen Schichten Europas zwischen Schlesien (DATHE¹⁾, dem Harz und Spanien, zwischen Frankreich und Kärnten findet, liegt zwischen den Waldenburger Schichten und dem Culm. Alle späteren, das Ober-

¹⁾ Geologische Beschreibung der Umgegend von Salzbrunn. Abh. d. preuss. geol. Landesanstalt. Neue Folge. H. 13. S. 131—138.

carbon und Perm betreffenden Discordanzen besitzen mehr locale Bedeutung. In phytopalaeontologischer Hinsicht ist die Ansicht STUR's stets von einem der hervorragendsten Kenner fossiler Pflanzen, von WEISS bekämpft worden und nach den eignen Arbeiten des Wiener Forschers ist die Zahl der in „Culm I“ und „Culm II“ vorkommenden Arten nicht bedeutend. Ganz allgemein gesprochen können Aenderungen des historisch gewordenen Formationschemas nur dann Aussicht auf allgemeine Annahme haben, wenn nachweisbar richtige Parallelsirungen — wie in der „Herenfrage“ — mit untergelaufen sind. Vor ganz kurzer Zeit hat TIETZE — in wesentlicher Uebereinstimmung mit den obigen Ausführungen — auf die Unhaltbarkeit der Ansicht STUR's hingewiesen. Da mir die betr. Notiz erst nach Niedersehrift obiger Bemerkungen zu Gesicht gekommen ist, habe ich dieselben unverändert gelassen.

Die Vergleichung der verschiedenen Vorkommen des Rothliegenden und Obercarbon wird fast überall dadurch erschwert, dass dieselben zum grossen Theile den Charakter einzelner Beckenansfüllungen tragen. Legen wir für eine Vergleichung der terrestrischen Carbonbildungen Europas die Forschungen STUR's mit der besprochenen Abweichung zu Grunde, so lässt sich in Europa und dem Osten von Nordamerika fast überall eine Dreitheilung erkennen; die beiden älteren Floren zeigen eine wesentlich gleichförmigere Verbreitung als die jüngere.

I. Das unterste Schichtenglied umfasst die Ostrau-Waldenburger Schichten, die Flötze von Hainichen, Chemnitz, den flötzleeren Sandstein von Westfalen, das „Terrain honiller non exploité“ (Belgien) und den Millstone grit; dasselbe ist nach Osten bis zum Donez, ja bis zum West- und Ostabhang des Ural verfolgt worden und enthält auch hier bezeichnende Landpflanzen wie *Lepidodendron Veltheimianum* STUR. und *Volkmannianum* STUR., *Calamites approximatus* BRGT. und *Stigmaria inaequalis* GOEPP.¹ Ja von Spitzbergen, vom Robertthal in der Reeherehe-Bay hat HEER eine Flora beschrieben, die sowohl nach Ansicht des hochverdienten Schweizer Forschers wie nach STUR²) dem unteren Horizonte angehört.

¹) STUR, Verhandl. G. R. A. 1878. S. 217 ff. ²) Ibid. G. R. A. 1877. S. 81.

Das Vorkommen bekannter mitteldentscher Arten wie *Lepidodendron Sternbergi* BRGT., *Sphenopteris distans* STRB. und *Cordaites borassifolius* STRB. spricht hierfür. Andererseits dürfte das vollkommene Fehlen von *Calamites* nebst *Asterophyllites*, von Annularien, Neuropteriden und Pecopteriden kaum, wie HEER annimmt, auf Mangelhaftigkeit der Aufsammlungen zurückzuführen sein, sondern wohl eher auf geographische bezw. klimatische Verschiedenheiten hindeuten. Im Osten Amerikas stimmen das Pottsville conglomerate (Pennsylvanien) und der Sandstein mit *Dadoxylon acadicum* (Neu-Schottland) stratigraphisch und facieell vollkommen mit dem Millstone grit überein.

II. Die Verbreitung der nächsten Flora der Saarbrücker-Schatzlarer Schichten beschränkt sich bereits auf ein weniger ausgedehntes Gebiet. Es gehören hierhin die technisch wichtigsten Vorkommen Europas, die grosse Mehrzahl der englischen, nordfranzösischen (Valenciennes), belgischen und Saarbrückerer Flöze, ferner die ganze productive Schichtenfolge des Ruhrgebietes und ein sehr bedeutender Theil der Schichtfolgen des böhmisch-niederschlesischen und oberchlesisch-polnischen Beckens. Auch die Kohlenflöze am Donez gehören zum Theil hierher, wie das häufige Vorkommen der wichtigen Leitpflanze *Neuropteris gigantea* STRB. ergibt. Jedoch sind genaue Florenäquivalente aus dem fernen Norden oder Osten nicht bekannt. Die Kohlenflöze von Neu-Schottland liegen ebenfalls in diesem Horizont, aber die Gliederung des productiven Carbon in Pennsylvanien ist verschieden.

Während dieser beiden früheren Abschnitte des Obercarbon wurden die europäischen Steinkohlenschiefer und Flöze in gewaltigen dem Meere benachbarten („paralischen“) Niederungen und Lagunen abgelagert, die von gelegentlichen Ueberfluthungen aus dem nordöstlich gelegenen Ocean (s. o.) heimgesucht wurden.

III. Indem etwa gleichzeitig die Auffaltung der carbonischen Hochgebirge in Mittel- und Westeuropa stattfand, erfolgte (zur Zeit der Ottweiler Schichten) durch den Wechsel der geographischen Bedingung eine Spezialisierung der einzelnen Local-Floren, welche, wie es scheint, in

den kleinen böhmischen Becken ihre höchste Entwicklung erreicht. Jede dieser Steinkohlenbildungen lagert — ähnlich wie die Vorkommen des französischen Centralplateaus — discordant auf einem Grundgebirge von meist archaischem Alter. Die Ablagerung in „limnischen“ Gebirgsseen und Tiefebene ist für die meisten Vorkommen wahrscheinlich und in Frankreich durch den genauen Nachweis der „structure torrentielle“ des carbonischen Wildbachteltas bei Commeny zur Gewissheit erhoben worden. Es ist daher kein Wunder, wenn STUR für seine „Miröschaner, Radnitzer, Zemech- und Wiskauer Schichten“ im Westen vergebens nach Äquivalenten gesucht hat.¹⁾ Denn überall auf der Linie Swansea, Bristol, Forest of Dean, Forest of Wyre, Shrewsbury lagert das limnische Obercarbon in isolirten Partien discordant über viel älteren Gesteinen. Dasselbe gilt für die zahlreichen Steinkohlenbecken des Centralplateaus und diejenigen der unteren Loire. Auch für die vier, dem obersten Carbon (ob. Ottweiler Stufe) angehörigen Vorkommen des Schwarzwaldes²⁾ hebt SANDBERGER hervor, „dass sie in keinem Zusammenhang mit einander gestanden haben können, da sie fast keine Art mit einander gemein haben.“ Ausser in der genannten Gegend lagert auch in Thüringen (Wettin), Sachsen und im Banat das oberste Carbon discordant auf älteren Gesteinen. Die Vorkommen von Saarbrücken und Niederschlesien (Waldenburg), welche eine ununterbrochene nichtmarine Schichtenfolge von der Mitte des Carbon bis zum oberen Rothliegenden zeigen, sind seltene Ausnahmen.

Dass die kleinen im Alter der Saarbrücker und besonders der Ottweiler Stufe entsprechenden Vorkommen der Centralalpen durchaus mit den isolirten mitteleuropäischen Becken übereinstimmen, braucht kaum besonders bemerkt zu werden. Ueber das Vorhandensein eines Hochgebirges, welches zur Carbonzeit an der Stelle der heutigen südlichen und centralen Ost-Alpen lag, besteht kein Zweifel; zum Ueberfluss erweist es noch

¹⁾ Jahrb. G. R. A. 1889. S. 1 ff. bes. S. 14. Nur die Rossitzer (obere Ottweiler Schichten) sind vertreten.

²⁾ Hohengeroldseck, Hinterohlsbach, Baden-Baden, Oppenau. Vergl. SANDBERGER, Jahrb. G. R. A. 1890. S. 90.

der häufige regellose Wechsel von Conglomeraten, Sandstein und Schiefer die Deltaausfüllung alter Seen.

Die Mächtigkeitsverhältnisse der einzelnen Stufen stehen mit der eben entwickelten Verschiedenheit der paralytischen und limnischen Entstehung in bestem Einklang. Der flötzleere Sandstein und seine englischen Aequivalente sind auf sinkendem Meeresboden in einem flachen Meere zum Absatz gelangt und verdanken ihr Material der massenhaften Sedimentzufuhr der Flüsse. Die Sandsteine besitzen daher die gewaltige Mächtigkeit (in England bis 5000') und Versteinerungsarmth, welche derartigen Bildungen häufig eigentümlich ist.

Ganz andere Absatzbedingungen herrschten zur Zeit des mittleren Oberearbon, nachdem durch die Ablagerung des mächtigen Sandsteines ausgedehnte Gebiete dem Meere abgenommen waren. In den weiten flachen Inlandsbecken, in welchen die Kohle wohl meist an Ort und Stelle, seltener durch Zusammenschwemmung gebildet wurde, und in welchen Seen und Sümpfe bestanden, ging die Sedimentirung viel langsamer vor sich. Trotz der bedeutenden Dicke der Flötze ist die Gesammtmächtigkeit der Saarbrücker Schichten sowie ihrer steinkohlenreichen Aequivalente nicht so bedeutend wie die des flötzleeren Sandsteins oder des obersten Carbon. Während der Ablagerung der letztgenannten Schichtengruppe war die Flötzbildung auf die Seebecken und Niederungen im Inneren der neuentstandenen Gebirge beschränkt; die local sehr bedeutende Mächtigkeit, welche infolgedessen hier zu beobachten ist, ist ebenfalls bezeichnend für die unter solchen Verhältnissen gebildeten Schuttkegel und Deltas.

Was für das oberste Carbon gilt, trifft fast durchweg auch für die isolirten terrestrischen Vorkommen der nächstjüngeren Formation, des „Kohlenrothliegenden“ zu, das ja früher wegen des Vorkommens abbaufähiger Kohlenflötze noch dem Carbon zugerechnet wurde (Mauebach in Thüringen).

Im obersten productiven Carbon scheinen marine Einschaltungen, wie sie für die tieferen Schichten durchweg bezeichnend sind, vollkommen zu fehlen. Hingegen gewinnt zu dieser Zeit ein rein marines Schichtenglied, der Fusulinenkalk, in dem mediterranen Gebiet der alten Welt

d. h. zwischen Asturien und Indien grosse Bedeutung. Ausgedehnte Ablagerungen dieser Formation sind aus Japan und China bekannt und die fannistische Verwandtschaft macht einen Zusammenhang mit Indien nicht unwahrscheinlich.

Von den einzelnen Vorkommen des Fusulinenkalkes sowie von dem Abwechseln desselben mit terrestrischen Bildungen war bereits die Rede; es sei daher hier nur hervorgehoben, dass die Ausdehnung des Kalkes in Gebieten, welchen ältere Meeresbildungen fehlen, die Annahme einer localen Transgression gestattet. Die oben geschilderte Zunahme der kalkigen Sedimente im obersten Theile des Karnischen Obercarbon führt zu demselben Rückschluss. Inshesondere ist aus dem östlichen Mittelmeergebiet und dem westlichen Indien von mittleren palaeozoischen Bildungen nur das Unterdevon des Bosphorus und das höhere Devon von Kleinasien und Armenien bekannt. Fusulinenkalk liegt vor aus dem nordwestlichen Kleinasien (Balía in Mysien), von Chios, von Wadi el Arabah (Arabische Wüste von Aegypten), sowie aus der Salzkette — vorausgesetzt dass man die unteren Productuskalke hierher rechnet. Von einer grossen, allgemeinen Transgression kann um so weniger gesprochen werden, als gleichzeitig mit dem Vorrücken des Meeres im Osten im westlichen Mittelmeergebiet der entgegengesetzte Vorgang eingetreten ist. In Asturien lässt sich dies am deutlichsten verfolgen: Das untere und mittlere Obercarbon (Schichten von Leña und Lama) bestehen aus einem Wechsel mariner und terrestrischer Schichten; das oberste Obercarbon, die Schichten von Tineo enthalten nur Landpflanzen. Ebenso gehören die zerstreuten Reste, welche man aus Languedoc, den Seealpen, Sardinien und Toscana kennt, der obersten Stufe des terrestrisch entwickelten Carbon an.

Woher die östliche Transgression gekommen ist, lässt sich im einzelnen schwer nachweisen, um so weniger, als bei den drei Vorkommen des östlichen Mittelmeergebietes noch nicht festgestellt ist, ob oberer (Gshel-Stufe) oder unterer Fusulinenkalk (Moskauer Stufe) vorliegt.

Doch kann man immerhin so viel sagen, dass die von STROSS¹⁾ befürwortete südliche Herkunft der Transgression deshalb wenig Wahrscheinlichkeit für sich hat, weil älteres

¹⁾ Antlitz der Erde II. S. 213.

Carbon in mariner Entwicklung aus den in Frage kommenden Gegenden (Nordafrika, Arabien und Südindien) nicht bekannt ist. Die von STACHE aus der westlichen Sahara beschriebene Fauna ist zwar carbonisch, zeigt aber einen geographisch fremdartigen Charakter, der eine eingehendere Vergleichung mit europäischen Horizonten nicht zulässt. Die von STACHE angenommene Zurechnung zur Stufe des *Productus giganteus* kann nicht als sicher angesehen werden.

Das Fehlen altcarbonischer Marinbildungen im Süden könnte selbstverständlich durch spätere Abrasion bedingt sein; aber es liegt näher, die Transgression des mediterranen Fusulinenkalkes aus anderen Gegenden herzuleiten, umso mehr als der Zusammenhang der Faunen des Unter- und Oberearbon mit grosser Sicherheit nachweisbar ist. (Bekanntlich erschwerte gerade die nahe Verwandtschaft der meisten ober- und untercarbonischen Arten die genaue Unterscheidung der beiden Abtheilungen). Die Zahl der neuen Gattungen ist äusserst gering (*Enteles*, *Meckella*, *Bothrophyllum*, *Petalaxis*, *Gshelia*) und ihre Ableitung von älteren Formen ohne Schwierigkeit möglich. Letzteres gilt auch für die Fusulinen.

Für die Herleitung der oberearbonischen Transgression des östlichen Mittelmeergebietes kommen in erster Linie der Westen und der Nordosten in Betracht. Im Westen ist der typische Kohlenkalk mit *Productus giganteus* aus Asturien und Languedoc bekannt. Wenn auch aus Deutschland (von Niederschlesien her) Ausläufer des carbonischen Meeres bis in die südlichen Ostalpen (Bleiberg) hinabreichten, so schneidet doch gerade die Bildung der carbonischen Hochgebirge einen Zugang von dieser Richtung her ab. Hingegen herrschten im grössten Theile des mittleren (Moskan) und östlichen Russlands vom Beginne des Carbon an ununterbrochen marine Absatzbedingungen und an diese Gegend ist wohl für die Ableitung der mediterranen Transgression des Oberearbon in erster Linie zu denken.

Mit Sicherheit lässt sich im hohen Norden von Russland selbst eine kleinere selbstständige Transgression für die in Frage stehende Periode feststellen: Am Timan liegt nach TSCHERNYSCHEW das untere Oberearbon (mit *Sp. mosquensis*) unmittelbar auf devonischen Bildungen.

3. Das Perm (Dyas) und seine Abgrenzung vom Carbon.

Die Lösung der Frage nach der Selbstständigkeit des sogenannten Permischen Systems bzw. die Abgrenzung desselben vom Carbon ist durch eine ganze Reihe sachlicher und formeller Schwierigkeiten und Irrtümer erschwert worden.

In allgemeinerer Weise ist zuerst das Problem der „Zwischenschichten“ (z. B. Tithon, Rhät) kurz zu erörtern, deren Vertreter im vorliegenden Falle das Permo-Carbon der russischen Geologen (nicht das Permo-Carbon bei LAPPA-RENT¹⁾ u. a.) ist. Die Lücken der geologischen Schichtenfolge in England und Deutschland haben bekanntlich eine allmähliche Ergänzung gefunden und bei jedem dieser neu hinzutretenden Formationsgliedern erhob sich naturgemäss die Frage nach der Zugehörigkeit. Man liest vielfach die Meinung, so u. a. in der vortrefflichen Arbeit KARPINSKY'S über die Artinskischen Ammonoiten,²⁾ dass derartige Bildungen „einfach als Uebergangsschichten zwischen den Systemen zu bezeichnen, nicht aber unbedingt in einem derselben unterzubringen seien“. Zur Begründung dieser Anschauung pflegt man die Künstlichkeit unserer stratigraphischen Eintheilung hervorzuheben. Dieser letztere Umstand ist jedoch so sehr als feststehende Thatsache anzusehen, dass — falls nicht ein anderes Eintheilungsprincip zu Grunde gelegt werden kann —, lediglich die Gründe historischer Priorität und äusserer Zweckmässigkeit für die Abgrenzung der Systeme oder Formationen in Anwendung zu bringen sind.

Vom Standpunkte der Zweckmässigkeit kann es jedoch keinem Zweifel unterliegen, dass die allgemeine Einführung von „Zwischenschichten“ das an und für sich künstliche System um kein Haarbreit natürlicher, wohl aber unbequemer und unübersichtlicher machen würde. Wir hätten dann die doppelte Zahl von Formationsnamen zu lernen, ohne dass sachlich irgend etwas gebessert wäre. Ferner würden, nachdem auf diese Weise der Grundsatz historischer Priorität verlassen ist, die formellen Streitigkeiten über die Zurechnung der einzelnen

¹⁾ Derselbe fasst Perm und Carbon zu einem System zusammen, das er „Permocarbonifère“ benennt. Schon wegen dieser recht erheblichen Vieldeutigkeit ist die betr. Bezeichnung am besten ganz anzumerzen.

²⁾ Mém. de l'Acad. de St. Pétersbourg. Sér. 7. T. 37. S. 95.

Stufen kein Ende nehmen. Denn die Reihe der „Zwischensehichten“ ist bereits ziemlich vollständig: Ordovician, Hereyn oder Ubersilar, Permoearbon, Rhaet, Tithon, Liburnische Stufe.

Eine Aenderung des Eintheilungsprinzips dadurch, dass im Sinne von SUSS und NEUMAYR die grossen Verschiebungen von Festland und Meer, sowie etwa noch die Perioden der Gebirgsbildung in den Vordergrund gestellt würden, erscheint für die mesozoische Aera discentirbar. Für die palaeozoische Zeit ergeben unsere bisherigen Kenntnisse trotz ihrer Lückenhaftigkeit schon so viel, dass die erwähnten Veränderungen durchweg locale Bedeutung besitzen und daher für allgemeine Eintheilungen unanwendbar sind. Zuweilen hat sogar eine in einem Welttheil nachgewiesene grosse Transgression gar keinen bezw. einen negativen Einfluss auf die Verbreitung der Organismen. Die Paradoxidessehichten (Mitteloambrium) enthalten in Europa und im östlichen Nordamerika eine in allen wesentlichen Beziehungen übereinstimmende Fauna. Im Oberambrium bedeckt eine ausgedehnte Transgression das heutige Nordamerika; aber in dieser Zeit ist von einer faunistischen Uebereinstimmung mit Europa keine Rede mehr. Auch die in Mittel- und Westeuropa überall nachgewiesene mittelearbonische Gebirgsbildung hat weder in Russland noch in Nordasien und Nordamerika irgendwelche Spuren hinterlassen.

Man wird daher auf absehbare Zeit bei dem „künstlichen“ System verbleiben und sich bemühen müssen, dasselbe durch eine geschickte Abstufung der Gliederung und umsichtiges Parallelsiren möglichst übersichtlich zu gestalten. Die vielumstrittenen Zwischensehichten ordnen sich meist derart ein, dass durch ausgedehntere Forschungen die Gleichstellung der heterogenen Bildungen möglich wird, deren verschiedenartige Ausbildung anfangs nur durch Altersunterschiede erklärbar schien. Dies wenigstens war die Entwicklung der Hereyn- und Tithon-Frage, während in der Rhaetischen Stufe eine thatsächliche Uebergangsbildung vorliegt.

Ungewöhnlich complicirt ist infolge ursprünglicher Beobachtungsfehler¹⁾ und unglücklich gewählter viellidentiger Bezieh-

¹⁾ Der Artinskische Sandstein, der Hauptvertreter des pelagischen Perm (bezw. Permoearbon) wurde anfänglich von Murchison an die Basis des Obercarbon (Millstone grit) versetzt.

nungen die vorliegende „permocarbonische“ Frage. Die sachliche Schwierigkeit der Parallelisirung mariner und Landpflanzenführenden Schichten erscheint für Europa gehoben, seitdem die Wechsellagerung des oberen Fusulinenkalkes (Gshel-Stufe) mit den Pflanzen führenden Aequivalenten der oberen Ottweiler Schichten feststeht. (Gleich alt sind ferner der Lower Productus limestone (Amb) im Penschab und die Upper Coal measures von Nordamerika; vergl. unten.)




Abb. 85. *Productus semireticulatus* var. *bathycolpos*
SCHELLW. (*Pr. boliviensis* auct.)
Ob. Obercarbon.

Die beiden oberen Exemplare aus der Spiriferenschicht, das untere Exemplar aus Schicht 6 der Krone. (Nach SCHELLWIEN.)

Die Gshelstufe überlagert im Moskaner Gebiet den Kalk von Mjatschkowa (unteres Obercarbon; Moskaner Stufe bei NIKITIN) und bildet somit den jüngsten obercarbonischen Horizont. Bei einem Vergleich mit den Karnischen Alpen ist angesichts der weiteren verticalen Verbreitung sehr zahlreicher Arten besonderer Werth auf das Vorkommen von *Euomphalus*

pernodosus MEEK (= *canaliculatus* TRAUTSCHOLD) und *Spirifer supramosquensis* NIK. (jüngere Mutation des *Spir. mosquensis* = *Spir. Fritschii* SCHELLWIEN) zu legen. Beide Arten sind sowohl dem unteren Obercarbon wie der marinen Dyas (Artinskische Stufe) fremd. Auch die von NIKITIN als *Prod. boliviensis* D'ORB. bezeichnete tiefeingebuchtete Mutation des *Productus semireticulatus* kommt bei Moskan und Pontafel vor. (Vergl. S. 370.) Die Verwandtschaft der beiden Faunen würde noch mehr hervortreten, wenn der Erhaltungszustand der russischen Fossilien günstiger und die Faciesentwicklung der Gshelstufe der alpinen ähnlich wäre: Die Stufe von Gshel besteht jedoch aus reinem Dolomit mit Versteinerungen in Steinkernerhaltung, die Karnischen Brachiopoden stammen aus Kalk, Schieferkalk und Schiefer.

Andrerseits enthalten die mit den marinen Schichten eng verbundenen pflanzenführenden Horizonte des Karnischen Obercarbon nach der übereinstimmenden Ansicht von v. FRITSCH und STUR die Leitformen der oberen Ottweiler (= Radowenzer) Schichten. Eine Parallelisirung der sonst schwer vergleichbaren marinen und terrestrischen Carbon-Permbildungen erscheint somit nach unten wie nach oben ermöglicht: In erster Linie wird hierdurch die schon von russischen Forschern (besonders KRASSNOPOLSKY) vermuthete Homotaxie der marinen Artinskischen Stufe mit dem deutschen Rothliegenden (Cuseler und Lebacher Schichten mit Landflora und Süßbezw. Brackwasserthieren) zur vollen Gewissheit erhoben. Die Artinskische Stufe überlagert am Ural den oberen Fusulinenkalk, welcher mit der mittelrussischen Stufe von Gshel so gut wie ident ist (NIKITIN); andererseits liegen die Cuseler und Lebacher Schichten bei Saarbrücken über der Ottweiler Stufe und die gleiche Aufeinanderfolge Landpflanzen führender Bildungen findet sich im Waldenburger Gebiet in Schlesien (DATHE). Weniger leicht ist die Vergleichung des marinen unteren Obercarbon (Moskaner Stufe von Mjatschkowa) mit den Schatzlarer bezw. Saarbrücker und den Waldenburger Schichten (= Flötzleerer Sandstein in Westfalen = Millstone grit).¹⁾ Da jedoch der obere Kohlenkalk mit *Productus*

¹⁾ Man vergleiche TSCHERNYSCHEW, Note sur le rapport des dépôts carbonifères russes avec ceux de l'Europe occidentale. Ann. soc. géol. du Nord. Bd. 17. 1890. Ref. im N. J. 1892. I. S. 542.

gigantens das Liegende der Moskauer Stufe einerseits, des „Flötzleeren“ und des Millstone grit andererseits bildet, so wird sich gegen eine ungefähre Gleichstellung nicht viel einwenden lassen. Festzuhalten ist jedoch daran, dass die Grenze zwischen dem unteren und dem oberen marinen Oberearbon keineswegs der Abgrenzung in den gleichaltrigen terrestrischen Bildungen entspricht: Man vermag im Oberearbon auf Grund der marinen Fauna zwei, auf Grund der Landflora drei Stufen von allgemeinerer Verbreitung festzuhalten. Nur die Grenze gegen das Unterearbon und das Perm ist deutlich und unzweifelhaft.

Die reichhaltigste und wichtigste Marinf fauna der Dyasformation liegt in dem indischen Productuskalke, und eine kurze Besprechung desselben ist schon mit Rücksicht auf die neueren russischen Untersuchungen nothwendig.

Durch die wichtigen Beobachtungen KRASSNOPOLSKY'S¹⁾ werden einige Ausführungen WAAGEN'S über die Altersverhältnisse der dyado-carbonischen Grenzbildungen richtig gestellt. Der letztgenannte Forscher musste aus den unvollkommeneren, damals vorliegenden geologischen Angaben über den Ural den Schluss ziehen,²⁾ dass hier eine erhebliche Schichtenunterbrechung vorliege. Dieser Lücke sollen die wichtigen glacialem „Boulder beds“ der Salzkette mit ihrer australischen Meeress fauna entsprechen; die Artinskischen Sandsteine werden infolgedessen mit der unteren Zone des Productus-Kalkes (Amb und Katta beds) einerseits, mit den Lebacher Schichten (Mittl. Rothliegendes) andererseits in Parallele gestellt.

Thatsächlich fand jedoch in dem alten uralischen Meer keine Unterbrechung des Absatzes, sondern nur ungleichmässige Sedimentation und Faciesentwicklung statt.¹⁾ Die Artinskische Stufe bildet also das marine Aequivalent des unteren Rothliegenden (Cuseler Schichten) und ist andererseits mit den mittleren Horizonten des Productuskalkes zu vergleichen. Die Brachiopodenfauna der Artinskischen Schichten stimmt allerdings mit der des oberen Fusulinenkalkes in den meisten Beziehungen überein; ein neues Element

¹⁾ Allgem. geologische Karte von Russland (Bl. 126 Perm-Soliansk). Vol. XI. 1. S. 506 ff. Vgl. unten.

²⁾ Salt Range fossils. Vol. IV. Part 2 (Geological results). S. 177.

der Fauna bilden jedoch die Ammonoiten mit ihrem ausgeprägten mesozoischen Habitus: *Mellicottia*, *Propinacoceras*, *Popanoceras*, *Thalassoceras*. Die palaeozoischen goniatitenartigen Typen wie *Glyphioceras*, *Gustrioceras* und *Pronorites* treten zurück.

Die Ammonoiten des Productuskalkes, welche der zweithöchsten Zone (Jabi beds) angehören, lassen einen palaeozoischen Charakter kaum mehr erkennen; Formen wie *Mellicottia*, *Popanoceras*, *Xenodiscus*, *Sageceras*, *Arcestes*, *Cyclolobus* erinnern vielmehr an triadische Formen. Eine unmittelbare Gleichstellung der oberen Productushorizonte mit den Artinskischen Schichten erscheint somit ausgeschlossen. Ob man an die mittleren oder die unteren Horizonte der Salzkette denken darf, ist auf diesem Wege nicht wohl festzustellen, da Ammonoiten in denselben gänzlich fehlen.

Hingegen hat TSCHERNYSCHEW auf Grund eines eingehenden Studiums der Artinskischen Brachiopoden den Nachweis geführt, dass dieselben die nächste Verwandtschaft mit der Fauna der mittleren Productuskalke zeigten (Mém. du Comité géologique III. No. 4).

Hiernach würde sich für den unteren Productuskalk (Boulder beds¹⁾ und Amb beds = Speckled sandstone) ein oberearbonisches Alter ergeben. WAAGEN hat diese Anschauung früher (1887) vertreten, ist aber neuerdings wesentlich auf Grund der Annahme der erwähnten Schichtenunterbrechung am Ural zu einem abweichenden Resultate gelangt; er hält seine gesamte Productus-Serie für jünger als das europäische Oberearbon. Die neuesten (nach WAAGEN's letzter Arbeit erschienenen) Arbeiten russischer Forscher sind der älteren Ansicht günstiger. Vor allem hebt NIKITIN²⁾ hervor, dass die Perm- und Carbonablagerungen Russlands

¹⁾ Als gleich alt mit den nordindischen Boulder beds werden gewöhnlich die Eocen-schichten und die Dwykaconglomerate in Südafrika, die Talchirschiefer der ostindischen Halbinsel und die Baccharmarshschiefer von Australien angesehen. Alle diese Bildungen führen geschnaunte und geschliffene Geschiebe, deren glacialer Ursprung von der Mehrzahl der Forscher angenommen wird. Die indischen Boulder beds enthalten eine australische Fauna. Vergl. u. a. WAAGEN Jahrb. d. G. R. A. 1887. S. 170 und Salt Range fossils. IV. Tabelle. S. 238.

²⁾ Mém. comité géologique V, 5.

lückenlos, ohne jede Unterbrechung abgelagert seien. Ferner ist nach den neuesten Mittheilungen von NIKITIN über die Fauna des oberen Moskauer Fusulinenkalkes (Stufe von Gshel) und den älteren Angaben von TSCHERNYSCHEW über die gleichalten Schichten des Ural die Zahl der auch im unteren Productuskalk vorkommenden Arten recht erheblich (22). Zu den 13 von WAAGEN angeführten Arten (Bd. IV, S. 164), welche im oberen russischen Fusulinenkalk und im Productuskalk in Indien vorkommen, treten noch hinzu:

Spirifer fusciger KEYS. (= *musukhclensis* DAV.)

Spir. semiplanus MAKR.

Spiriferina ornata WAAG. (ob. Prod. K.)

Athyris pectinifera SOW.

Retzia grandicosta DAV.

Camarophoria Pardonii DAV. (mittl. Prod. K.)

Diclasma elongatum SCHL.

Productus semireticulatus var. *bathycolpos* SCHELLW.

(= *P. boliviensis* bei NIKITIN, S. o.)

Fusulina longissima MOELL.

Ueber die angeblichen, von WAAGEN in den Vordergrund seiner Beweisführung gestellten Discordanzen im russischen Carbon und Perm macht KRASSNOPOLSKY (l. c.) die folgenden Angaben: Im nördlichen und östlichen Theile des europäischen Russland wird der Fusulinenkalk von marinem Perm unmittelbar überlagert. Bei Beginn des Perm wölbte sich die dem heutigen Ural entsprechende Inselkette zu einem Gebirge an. Im mittleren Ural ging die Erhebung rasch vor sich; hier lagern sandige Meeressedimente der Artinskischen Stufe, welche auf eine nahe liegende Küste hindeuten, über dem Fusulinenkalk. Im südlichen Ural vollzog sich das Ereigniss langsamer, denn hier finden sich über dem Oberearbon sandige Kalksteine und Mergel, welche in grösserer Entfernung von der Küste abgesetzt wurden. Im eigentlichen russischen Becken fand keine Erhebung statt; hier wird der rein marine Fusulinenkalk von Artinskischen Schichten mit einer pelagischen Ammonoitenfauna überlagert.

Abgesehen von der scharf ausgeprägten Erhebung des Ural (welche eine gelegentliche, für die Chronologie nicht

ins Gewicht fallende Discordanz der Artinskischen Stufen über dem Fusnlinenkalk bedingt) fand während der Permzeit ein langsames Zurückweichen des Meeres statt. Am Schlusse derselben befindet sich im Osten von Russland ein geschlossenes mittelländisches Becken.

Gleichzeitig mit der Gebirgserhebung erfolgte in den pelagischen Gewässern des mittleren Ural eine theilweise „Umprägung“ der Thierwelt. Man findet noch einzelne auf dem Goniatiten-Stadium verbliebene carbonische Typen (*Gastrioceras*, *Pronorites*) zusammen mit den Ammonoeeen von permotriadischem Habitus und den Vorläufern der Zeehsteinfauuna wie *Modiolopsis Pallasi*, *Pseudomonotis speluncaria*, *Bakewellia ceratophaga*, *Cythere cartha*, *Kirkbya permiana*. Die letztgenannten Zweischaler und Ostracoden sind Seichtwasserbewohner, welche in den litoralen Theilen des Meeres lebten, während gleichzeitig in der tieferen See die Ammonoeeen-Fauna gedieh. Eigentliche terrestrische Bildungen fehlen; aber die Pflanzen des Artinskischen Sandsteines tragen bereits permischen Character.

In den früheren, den Karnischen Fusnlinenkalk behandelnden Arbeiten STACNE'S wurden die geologischen Verhältnisse des Amerikanischen Westens, insbesondere die Schichten von Nebraska city mit Vorliebe zum Vergleich herangezogen. Die Uebereinstimmung einzelner Mollusken und Braehiopoden kann nicht Wunder nehmen, seit in dem Productuskalk und der Artinskischen Stufe der enge Zusammenhang der Marinfannen von Perm und Carbon entdeckt worden sind. Die geologische Schichtenfolge ist jedoch in dem mir durch eigene Anschauung bekannten „Far West“ gänzlich verschieden von den in den Alpen beobachteten und stimmt andererseits in vielen wesentlichen Punkten mit der des Ural überein. In den Alpen finden wir zwei nicht unerhebliche Discordanzen, während in den beiden anderen Gebieten eine ununterbrochene Meeresbedeckung vom Carbon bis zum oberen Perm zu beobachten ist. Abweichungen im Einzelnen, so das Einschleiben einer mächtigen Sandsteinbildung an der Basis des Obercarbon (Aubrey sandstone des Colorado-Cañon) sind nicht selten, vermögen aber die überraschende Aehnlichkeit der geologischen Entwicklung nicht zu beeinträchtigen. Auch aus

Texas ist neuerdings die pelagische Fauna der Artinskischen Stufe bekannt geworden. Die Wichita beds, welche das oben besprochene Oberearbon unmittelbar überlagern, enthalten u. a. *Medlicottia Copei* WURTE und *Popanoceras Walcottii* WURTE, so dass jedenfalls eine ungefähre Altersgleichheit mit der besprochenen russischen Stufe anzunehmen ist. Gegen Ende des Perm zeigte auch in Amerika die Ablagerung bunter gypsreicher Mergel und Sandsteine (cf. Kupfersandstein in Russland), die nur ganz ausnahmsweise spärliche Zweischalerreste enthalten, einen langsamen Rückzug des Meeres an.

Von den sonstigen vereinzelt gefundenen permischen Ammonoitenfaunen besitzt, wie KARPINSKY¹⁾ ausführt, diejenige von Darwas in Buchara gleiches Alter mit der Artinskischen, während die versteinungsreichen Schichten des Finne Sosio in Sicilien etwas jünger sind. Es sei gestattet, hier die wenig beachtet gebliebene Thatsache hervorzuheben, dass die erste Feststellung des Alters der Siosiokalke das Verdienst von MOJ-SISOVIC²⁾, nicht das von GEMMELLARO ist.

Anhang.

Ueber das Vorkommen von untercarbonischen Nüttscher Schichten im Veitschthal (Mürzgebiet, Steiermark).

Während des Druckes geht mir durch die Liebenswürdigkeit des Herrn Bezirksgeologen Dr. Kocu (Berlin) eine kleine Sammlung von Versteinerungen zu, die derselbe 1892 in den mit Kalken wechselnden Schiefen des Grossen Veitschthal gefunden und im Wesentlichen bereits richtig gedeutet hatte. Eine genauere Bestimmung der nicht sonderlich günstig erhaltenen, meist verdrückten Steinkerne ergab das Vorkommen folgender Arten:

Productus semireticulatus MART. Zwei gut erhaltene, sicher bestimmbare Exemplare. (Visé)

Productus scabriculus MART.

Productus punctatus MART. (= *Pr. Buchianus* DE KON. Bleiberg t. I. f. 17, 17a entspricht kleinen, etwas verdrückten Exemplaren von *Pr. punctatus*.)

¹⁾ Ueber die Ammonoiten der Artinsk-Stufe. Mém. Ac. St. Pétersbourg. Tome XXXVII. No. 2. p. 91. ²⁾ Verhandl. G. R. A. 1882. S. 31.

- Orthis resupinata* MART. Zahlreiche kleine Steinkerne.
 DAVIDSON Carbon. Braeh. Monogr. T. 30. f. 3, 5
 (ventral valve gut übereinstimmend). (Visé)
- Orthothetes crenistria* PHILL.
- Orthothetes* sp.
- Spirifer octoplicatus* Sow. (Visé)
- Enomphalus* sp.
- Bryozoenreste.
- Crinoidenstiele (in grosser Menge).
- Cladochonus Michelini* M. EDW. et HAIME.
- Reste von *Calamites*.

Ueber die Altersbestimmung der Kalke und Schiefer des Grossen Veitschthals kann nach der obigen Liste ein Zweifel nicht obwalten: Sämmtliche Arten kommen in der oberen Abtheilung des Unterearbon, der Stufe von Visé mit *Productus gigantens* vor, die hierdurch zum ersten Male im Norden der Centralkette festgestellt ist. Oberes Carbon, das durch Funde von Landpflanzen hier bereits verschiedentlich nachgewiesen wurde, liegt nicht vor; das Vorkommen der sicher bestimmten Arten *Orthothetes crenistria*, *Spirifer octoplicatus*, *Orthis resupinata*, *Productus scabriculus* und *Cladochonus Michelini* ist durchans bezeichnend für die tieferen Schichten. Insbesondere geht die Gattung *Cladochonus* nicht in das Obercarbon hinauf.

Für einen Theil der bisher dem Silur bezw. dem Obercarbon zugerechneten „nördlichen Grauwackenzone“ wird somit eine zuverlässige Altersbestimmung als Unterearbon gegeben. Die facielle Entwicklung stimmt in allen wesentlichen Beziehungen mit der der südalpiner Nötscher Schichten überein; nur sind in den letzteren die Conglomerate weit häufiger, während die Schichten des Veitschthales sich als kalkreicher erweisen und der Eruptivbildungen entbehren. Auch hier haben wir es mit einer schiefrigen Entwicklung des Unterearbon zu thun, welche nicht als Ulnm zu bezeichnen ist.

In nördlicher Richtung vorsehreitend finden wir gleichalte untercarbonische Schichten erst bei Altwasser in Schlesien und im Fichtelgebirge. Das Vorkommen des Veitschthales bildet also die Vermittelung zwischen diesen Vorkommen und Kärnten.

In tabellarischer Form lässt sich das Altersverhältniss des Karnischen Carbon incl. Perm (vergl. Cap. XI Schluss) zu der normalen marinen oder terrestrischen Entwicklung folgendermassen veranschaulichen:

| Marine Entwicklung | Nichtmarine Entwicklung | Karnische Alpen |
|--|---|--|
| Djulf, Oberer Zechstein
Araxes | | Bellerophon-Kalk |
| Productus-Kalk der Salzkette (obere Horizonte) | Rothe, fast versteinerte Mergel. Texas, Russland. | Gründer Sandstein und Conglomerat („Verrucano“) |
| Mittl. Zechstein
Unterer Zechstein | | Transgressions-Lücke |
| Productus-Kalk (untere Horizonte)
Artinskische Stufe
Darwas (Bachara)
Wichita Beds (Texas) | (Oberthiliegendes ohne organische Reste)
Lebacher Schichten
Kuseler Schichten | |
| Productus-Kalk (untere Horizonte)
Gabel-Stufe, oberer Fusulinen-Kalk m. <i>Sp. supranosyensis</i> | Ottweiler Schichten
(= Schwadlowitzer und Radowenzer Sch.)
Saarbrücker Sch.
(= Schatzlarer Sch.) | Obercarbon: Fusulinen-Kalk und Schichten m. Landpflanzen im Wechsel |
| Unterer Fusulinen-Kalk (Moskauer Stufe) m. <i>Sp. mosyensis</i> | Waldenburg-Ostrauer Sch.
(= Flitzleerer St. = Millstone grit) | Transgression und Gebirgs-Faltung |
| Kohlen-Kalk von Visé mit <i>Productus giganteus</i> | Califerons sandstone (Schotland) | Nöfcher Schichten m. |
| Stufe von Tournai mit <i>Sp. formosensis</i>
Marbe Griotte
Kalk von Erdbach | Culm mit marinen Resten und Landpflanzen
Horton series (New-Schottland) | Culm mit Landpflanzen
Vetschthal
<i>Prod. giganteus</i> im Gailthal und Vetschthal |
| Devon: Clymenien-Kalk | Old red sandstone | Clymenien-Kalk |

Perm (Dyas)

Obercarbon

Untercarbon

XII. KAPITEL.

Die Trias.

Die alpine Trias bildet die Fortsetzung der permischen Bildungen und ist mit diesen durch concordante Lagerung und petrographische Uebergänge eng verbunden.

Wenn die Ostalpen mit Recht als das klassische Land der rein marinen Triasentwicklung angesehen werden, so bildet das Gebiet der Karnischen Hauptkette in gewisser Hinsicht eine Ausnahme. Einmal fehlen denselben die gesammten Bildungen von den Raibler Schichten an aufwärts, und ferner ist die Versteinerungsarmuth der meisten Schichten eine derartige, dass der Schlerndolomit sowohl in der Karnischen Kette wie in den Karawanken wiederholt als Kohlenkalk bezw. Perm gedeutet werden konnte („Gailthaler Dolomit“ der älteren Beobachter, „permischer Dolomit“ bei STACHE.).

Trotzdem ist die Bedeutung der Karnischen Hauptkette für die geologische Geschichte der Alpen zur Triaszeit unverkennbar: Die Grenzlinie der nord- und südalpiner Entwicklung der Trias folgt der Kammlinie des heutigen Gebirges und verläuft auf der Südseite der Karawanken weiter nach Osten. Diese Thatsache ist mit besonderer Betonung der verschiedenartigen Entwicklung der Raibler Schichten schon von früheren Beobachtern hervorgehoben worden, aber erst bei der geologischen Einzelaufnahme mit aller Schärfe hervorgetreten. (Vergl. die Besprechung der Raibler Schichten Abschn. 6.) Die besprochene Grenzlinie ist um so wichtiger, als die Unterscheidung einer juvavischen und mediterranen Triasprovinz, welche früher den Ausgangspunkt für die geographische Gliederung der Alpentrias bildete, als unzutreffend nachgewiesen worden ist.

Im Norden des Gailthales fehlen die Bellerophon-schichten wahrscheinlich vollkommen; die Entwicklung der Werfener Schichten, des Muschelkalks und Schlerndolomits¹⁾ ist vielfach übereinstimmend; nur das Fehlen der bunten Kalkeonglomerate und Schiefer des Muschelkalks im Norden ist bemerkenswerth.

Am schärfsten erscheint die Verschiedenheit in der Entwicklung der Raibler Schichten und der Aquivalente des Hauptdolomits ausgeprägt. In der Rhaetischen und oberen Karnischen Stufe ist die Facies der Kössener Schichten und der dunkelen, hornsteinreichen Plattenkalke auf den Norden, die des Dachsteinkalkes mit *Megalodus* im Wesentlichen auf den Süden beschränkt; Hauptdolomit findet sich im Norden und Süden.

1. Die obere Trias und ihre Gliederung.

a. Die neueren Ansichten über die Benennung der Hauptstufen.

Die Gliederung und Eintheilung der unteren Trias ist seit längerer Zeit unverändert geblieben; hingegen sind durch eine vor kurzem veröffentlichte Mittheilung von MOJSISOVIC²⁾ die Anschauungen über die Gliederung und Parallelisirung der oberen alpinen Triashorizonte in wesentlichen Beziehungen umgestaltet worden. Eine kurze Erörterung der neuen Anschauungen erscheint um so mehr geboten, als A. BRITZER³⁾, ohne die Ansicht von MOJSISOVIC²⁾ sachlich zu bekämpfen, in formeller Hinsicht wesentlich abweichende Vorschläge für die Benennung der verschiedenen Hauptstufen gemacht hat.

Die veränderte Auffassung von MOJSISOVIC²⁾ lässt sich dahin zusammenfassen, dass die Hallstätter Kalke nicht eine continuirliche Folge über den korallenreichen Zlambach-

¹⁾ Ich verstehe unter diesem durch Kürze und gute Begründung ausgezeichneten stratigraphischen Namen — etwa im Sinne der ursprünglichen Definition von RICHTHOFFEN'S — die Dolomit-Kalk-Entwicklung der Schichten zwischen Muschelkalk einschliesslich und Raibler Horizont ausschliesslich.

²⁾ Die Hallstätter Entwicklung der Trias. Sitz.-Ber. d. K. Akademie d. Wissensch. Bd. 101. Abth. I. S. 796.

³⁾ Was ist Norisch? Jahrb. G. R. A. 1892. S. 357—396.

schichten bilden; letztere liegen nicht unter den Hallstätter Kalken, sondern als heterope Einlagerung in denselben.

Die Reihenfolge der Hallstätter Cephalopoden-zonen wird — abgesehen von einigen Aenderungen im einzelnen — derart umgekehrt, dass die früher nach unten gestellten norischen Kalke (u. a. die grauen Kalke des Steinbergkogels mit *Pinacoceras Metternichi*) das Hangende, die früher nach oben gefügte Zone des *Trachyceras aonoides* (= Raibler Schichten) das Liegende bilden. Die Buchensteiner und Wengener Schichten von Südtirol, welche früher als Äquivalente der norischen Kalke (z. B. mit *Pinacoceras Metternichi*) galten, werden durch versteinungsleere Schichten im Liegenden der Aonoides-Zone vertreten. Die juvavische Meeres-Provinz, welche zur Erklärung der faunistischen Verschiedenheiten innerhalb der norischen Stufe errichtet war, wird aufgelassen und im Anschluss hieran eine veränderte Benennung der Hauptstufen der oberen Alpentrias in Vorschlag gebracht.

Um eine längere Auseinandersetzung zu vermeiden, stelle ich in tabellarischer Form die frühere und die jetzige Benennung von MOJSISOVIC'S, sowie die abweichenden Vorschläge BITTNER'S gegenüber:

| v. MOJSISOVIC'S
1893—1894 | v. MOJSISOVIC'S
1892 | BITTNER
1892 | Normale, unverändert
gebliebene Schichtenfolge |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|---|
| | ← Rhaet → | | Küssener Schichten |
| Karnische Stufe | obere. Juvavische St. | Norische St. | Hauptdolomit u. Dachsteinkalk |
| | untere. Karnische St. | Karnische St. | Cassianer und Raibler Schichten |
| Norische Stufe | Norische St. | Ladinische St. | Buchensteiner und Wengener Schichten der Südalpen |
| Alpiner Muschelkalk | | | |

Die kritischen Einwendungen A. BITTNER'S erscheinen z. Th. einleuchtend, seine positiven Gegenvorschläge sind als missglückt zu betrachten. Dass die Norische Stufe nicht grade im Gebiete des alten Noricum fehlen und in Südtirol ihre normale Entwicklung haben darf (MOJSISOVIC'S 1892), dürfte

kaum zu bestreiten sein. Wenn aber BITTNER auf Grund der älteren Benennung von MOJSISOVICS' die Norische Stufe im gesamten Gebiete der Alpen über die Karnische stellt, so wird allerdings der der verzwickten nomenclatorischen Entwicklung Unkundige (und das sind bei Weitem die meisten Geologen) einen vollkommenen „Zusammenbruch“ der früheren Ansichten anzunehmen berechtigt sein. In Wahrheit handelt es sich nur um eine für zwei vereinzelt Gegenden wichtige Aenderung; im Gesamtgebiete der Ostalpen bleibt die Anfeinanderfolge unverändert.

Der Standpunkt der historischen Priorität, welchen BITTNER für die Horizont-Bezeichnungen annimmt, ist formell klar und unzweideutig, führt aber in der Praxis, wo es sich um Veränderungen in der Bedeutung desselben Namens handelt, zu sehr erheblichen Unzuträglichkeiten.

Der genannte Forscher will im vorliegenden Falle die Hallstätter und Zlambachschieften, welche im Salzkammergut als norisch bezeichnet wurden und dort ihre stratigraphische Stellung gewechselt haben, auch fernerhin als norisch bezeichnen. Er berücksichtigt dabei nicht, dass die Aequivalente derselben, Hauptdolomit und Dachsteinkalk, welche nun ebenfalls als norisch bezeichnet werden müssen, in den übrigen Theilen der Alpen eine bei weitem bedeutendere Verbreitung als jene besitzen und von jeher als wichtige Vertreter der oberen Karnischen Stufe galten. Die Namen Norisch und Karnisch wurden allerdings schon 1869 von MOJSISOVICS aufgestellt, aber erst 1874 vollständiger begründet. Den Ausgangspunkt der Gliederung bildete in dem letzteren Jahre die „mediterrane“ Triasprovinz und in dieser wurden Hauptdolomit und Dachsteinkalk als Glieder der oberen Karnischen Stufe betrachtet. Es dürfte das Naheliegendste sein, diesen Namen auch jetzt vorläufig noch beizubehalten, die Bezeichnung Norisch aber angesichts der mit ihr zusammenhängenden Verwirrung ganz fallen zu lassen.

Die allein in Frage stehenden Buchensteiner und Wengener Schichten (Norische Stufe von MOJSISOVICS, Ladinische Stufe BITTNER) können eine zusammenfassende Bezeichnung um so mehr entbehren, als sie in den wichtigsten nordalpinen Entwicklungsgebieten palaeontologisch kaum ver-

treten sind. In der Partnach- und Reiflinger Facies sind dieselben ebenso wie die Cassianer Schichten nur durch versteinungsarme, wenig mächtige Mergel mit einer, von der süd-alpinen vielfach abweichenden Brachiopodenfauna¹⁾, im Hallstätter Gebiet durch versteinungsleere Kalke vertreten. Sogar in den vom Schlerndolomit oder Wettersteinkalk eingenommenen Gebieten bildet die *ci-devant* Norische Stufe zwar den unteren Theil der mächtigen Kalk-Dolomit-Massen, ist aber selbst in normalen Profilen kartographisch nur künstlich anzuseiden.

Es dürfte vorläufig am nächsten liegen, die Buchenstein-Wengener Schichten mit dieser Combination der beiden Namen oder nach Mojsisovics als Zonen des *Trachyceras Curionii* (Buchenstein) und *Archelaus* (Wengen) zu bezeichnen. Die etwas grössere Länge des Namens dürfte durch die Unzweideutigkeit reichlich aufgewogen werden, welche weder der Bezeichnung „Norisch“ noch „Ladinisch“ zukommt. Denn bei letzterem, recht unzweckmäßigen Namen denkt man unwillkürlich zunächst an St. Cassian.

Die Bezeichnung kann aus mehreren Gründen nur eine vorläufige sein; z. B. wäre die Frage wohl der Ueberlegung werth, ob die Eintheilung der zwischen Muschelkalk und Lias liegenden Schichten in 4 Hauptstufen den geologischen Verhältnissen entspricht. Das Rhaet verdankt seine Auscheidung als Hauptstufe dem transgressiven Auftreten in ausgedehnten Theilen Europas. Auch die Buchensteiner, Wengener und Cassianer Schichten besitzen in palacontologischer Hinsicht vieles Gemeinsame. Es wäre somit die Frage der Erwägung werth, ob man nicht die genannten drei Zonen als untere, die Aequivalente der Raibler Schichten sowie die des Hauptdolomites als mittlere und das Rhaet als obere Hauptstufe auffassen solle.

Jedoch dürfte es sich nicht empfehlen, jetzt schon bestimmte Vorschläge zu machen; vielmehr ist die Erledigung der Frage so lange zu vertagen, bis die Ergebnisse der in Vorbereitung befindlichen Monographien der triadischen Zweischaler, Gastropoden und der trachyostraken Cephalopoden vorliegen. Auch die Bearbeitung der Korallen ist noch nicht abgeschlossen.

¹⁾ A. BITTNER, Brachiopoden der alpinen Trias. S. 167.

Die frühere Eintheilung war bekanntlich von Mojsisovics ausschliesslich auf die Cephalopoden begründet worden. Es soll nicht bestritten werden, dass die Ammonoiten für die feinere Einzelgliederung (schon vom Oberdevon an) die besten Handhaben bieten. Aber für die Abgrenzung der Hauptgruppen, welche im vorliegenden Falle in der Umbildung begriffen ist, kann die in absehbarer Zeit mögliche Heranziehung der übrigen Thierklassen nur von Vortheil sein.

b) Ueber die geologische Entwicklung der Triaskorallen.

Die Erforschung der Korallenfaunen gestattet ganz bestimmte Folgerungen in Bezug auf die stratigraphische Gliederung. Zwar habe ich bisher nur die Bearbeitung der Hallstätter, Zlambach- und Rhaetkorallen zum Abschluss gebracht, aber die Cassianer Fauna immerhin hinreichend berücksichtigt, um die wichtigsten Unterschiede hervorheben zu können. Es bedarf keiner weiteren Ausführung, dass die geologischen Ergebnisse, wie sie in Palaeontographica Bd. 37 S. 112 zusammengefasst wurden, infolge der veränderten Stratigraphie der Hallstätter Schichtenfolge einer gründlichen Umgestaltung bedürfen. Jedenfalls entspricht die herichtigte Hallstätter Schichtenfolge den Beobachtungen über die Entwicklung der Korallenfaunen viel besser als die frühere Annahme, dass die Zlambachschichten unmittelbar über dem Muschelkalk lägen. Der innige Zusammenhang zwischen den Rhaet- und Zlambachkorallen musste damals ebenso auffallend erscheinen, wie die nahe Verwandtschaft der letzteren mit der Fauna des Hauptdolomites (bezw. Hoehgebirgskorallenkalkes). Jetzt erscheint dieser Zusammenhang ganz naturgemäss. Der korallenführende angebliche „Muschelkalk“ vom Rudolfsbrunnen bei Ischl, dessen stratigraphische Beziehungen keineswegs klar sind, dürfte auf Grund des Zlambachcharakters seiner Korallenfauna ebenfalls den Hallstätter Kalken zugerechnet werden.

Eine scharfe Grenzscheide in der Entwicklung der Korallenfaunen liegt über den Raibler Schichten. Die in diesem Horizont vorherrschende Mergelentwicklung war dem Gedeihen der Korallen wenig günstig. Die spärlichen

vorkommenden Formen schliessen sich der Cassianer Fauna an. Es sind bisher beobachtet: *Thamnastraea*, *Montlivaultia*, *Thecosmilia* und eine *Astrocoenia* (von Heiligenkrenz), welche durchgängig zu den wenigen Typen gehören, die in ähnlicher Ausbildung nach oben fortsetzen. Hingegen gehen die Gattungen *Coelocoenia* (= „*Phyllocoenia*“ *decipiens* Lbe), *Axosmilia* (hierher auch „*Rhabdophyllia*“ *recondita*), *Microsolena* (wahrscheinlich generisch von den jurassischen Arten verschieden) und das Tabulatengeschlecht *Aracopora* (nov. sp. auf der Seelandsalp.) nicht mehr bis in die Raibler Schichten hinein. In den Zlambachschichten und den Hallstätter Kalken erscheint eine vollkommen nenartige Korallenfauna, welche keine einzige Art und nur eine geringe Anzahl von Gattungen (*Montlivaultia*, *Thecosmilia*, *Isastraea*¹⁾, *Astrocoenia*, *Thamnastraea*) mit den älteren Karnischen Bildungen gemein hat. Auch bei den, gemeinsamen Gattungen angehörenden Arten ist nur bei wenigen Formen von *Montlivaultia*, *Thecosmilia* und *Isastraea* ein phylogenetischer Zusammenhang wahrscheinlich.

Die grosse Mehrzahl der in den Hallstätter und Zlambachschichten vorkommenden Gattungen ist neu und offenbar durch Einwanderung an ihren Fundort gelangt. Hierfür spricht besonders der Umstand, dass die altertümlichen, zu den palaeozoischen Pterocoralliern gehörenden Gattungen *Gigantostylis*, *Coccyphyllum* und *Pinacophyllum* in tieferen alpinen Bildungen fehlen. Ferner sind neu die Familien der Spongiomorphen, Gorgoniden, Heterastrididen, sowie die Unterfamilien Stylophyllinae und Astracomorphinae mit den Gattungen *Stylophyllum*, *Maeandrostylis*, *Stylophyllopsis*, *Stephanococulia*, *Phyllocoenia*, *Rhabdophyllia*, *Heptastylis*, *Heptastylopsis*, *Spongiomorpha*, *Stromatomorpha*, *Astracomorpha*, *Procycololites*, *Prographularia* und *Heterastridium*.

Die rhaetische Korallenfauna stellt, wie schon früher ausgeführt wurde, einen Ausläufer der oberkarnischen dar, während die liassische wieder mit der rhaetischen zusammenhängt.

Die vollkommene Erneuerung, welche die alpine Korallenfauna in der oberkarnischen Stufe (juvavischen Mojs., norischen

¹⁾ *Elysastraea* Lbe aus den Cassianer Schichten beruht auf einem pathologisch veränderten Exemplar von *Isastraea*.

BITTNER nec MOJS.) erfährt, wird durch die ununterbrochene Entwicklung der Korallen in den folgenden Formationen noch auffälliger. Derartige leicht wahrnehmbare Abschnitte in der Entwicklung einzelner Thierklassen sind massgebend für die stratigraphische Eintheilung. Auch manche Ammonoiten erscheinen in den Hallstätter Kalken in ähnlich unvermittelter Weise, so besonders die Tropitiden (*Tropites*, *Halorites*, *Juavrites*, *Sagenites* und *Distichites*).

Für die Herknunft der obertriadischen Korallen liegen bereits einige Anhaltspunkte vor. Die Korallen, welche TOULA aus dem östlichen Balkan als neocomische Arten beschrieben hat, wurden mir, da nachträglich Zweifel an der Richtigkeit der Deutung entstanden, vorgelegt und erwiesen sich als oberkarnisch. Ich erkannte vor allem die drebans bezeichnenden Gattungen *Astracomorpha* und *Stylophyllum*, ferner *Thamnastraea*, *Thecosmia* und *Phyllocoenia* in Arten, welche denen der Zlambachschichten sehr nahe stehen. *Heterastridium* war schon früher durch STEINMANN von dem gleichen Fundort bestimmt worden. Dieselbe Gattung kommt auch in der ostindischen Trias am Karakorum-Pass (Himalayn) vor. Somit dürfen wir mit ziemlicher Sicherheit einen östlichen Ursprung der Korallenfanna der Zlambach-Hallstätterschichten annehmen.

Im westlichen Kleinasien (Balia in Mysien) liegen triadische Bildungen, welche im Alter dem Rhaet und Hauptdolomit (BITTNER) entsprechen, discordant und transgredierend über dem Oberearbon (nach BUKOWSKI); es liegt nahe, die gleichzeitig erfolgende Einwanderung der Korallen in das ostalpine Triasmeer auf diese östliche Transgression zurückzuführen.

e) Vergleich der Hallstätter und Greifensteiner Faecesentwicklung.

Die Beschreibung, welche v. MOJSISOVICS neuerdings¹⁾ von dem Auftreten der Versteinerungen innerhalb der Hallstätter Kalke entworfen hat, erheischt eine kurze Besprechung, da dieselbe von allgemeinerer Bedeutung für das Auftreten von

¹⁾ Sitz-Ber. d. Kaiserl. Akademie. Wien. Bd. 101. I. Abth. S. 771.

Versteinerungen in reinen Kalkbildungen ist. In den eigentlichen (fossilfreien) Hallstätter Kalken treten locale linsenförmige Anhäufungen von Fossilien auf, die eine Dicke von 1 m selten übersteigen und eine Längsansdehnung von 10 bis 30 m erreichen. Neben den überall vorherrschenden Cephalopoden findet man fast in jeder Linse Schwärme von Halobien und verwandten dünnshaligen Mnscheln. Alle sonstigen Thierreste, Zweischaler, Gastropoden, Brachiopoden, Crinoiden und Heterastridien sind selten oder nur local häufiger. Innerhalb der Linsen treten die Fossilien nicht, wie es in normalen Sedimenten der Fall ist, in annähernd gleichmässiger Vertheilung auf, sondern von einigen wenigen ganz gemeinen Formen abgesehen, finden sich einzelne Arten oder selbst Formengruppen wieder nur nesterförmig, in kleineren oder grösseren Schwärmen. An derselben Fundstelle werden gewisse Arten oft Jahre hindurch nicht angetroffen, dann aber plötzlich wieder in mehreren Exemplaren gefunden.

Diese Beschreibung passt fast Wort für Wort auf die Greifensteiner (Hereyn-) Facies des Devon, deren Eigenlichkeiten oben (S. 274 und Zeitschr. d. deutschen geol. Gesellschaft 1889. S. 264) eingehender geschildert sind. Insbesondere konnten in den tieferen, ebenfalls rothgefärbten F₂-Schichten von Konieprus in Böhmen vollkommen übereinstimmende Beobachtungen gemacht werden. Z. B. ist das Vorkommen von *Bronteus thysanopeltis*, von *Protoecystites flurus* (zusammen mit *Phacops fecundus*), von *Anarcestes latespätus* und den mannigfachen Proëtnsarten bei Konieprus ein durchaus localisirtes.

Zum Vergleich mit den Angaben von Mojsisovics' über Hallstatt gebe ich die früheren (Zeitschrift d. deutschen geol. Ges. 1887. S. 387) über den Pic de Cabrières veröffentlichten Beobachtungen wieder. „Die Versteinerungen sind unregelmässig nesterweis durch den unteren Theil der Kalkmasse vertheilt. An den einzelnen Fundorten erscheinen immer nur bestimmte Arten in grösserer Häufigkeit, die an anderen Punkten fehlen. So liegen in einem schwach mergeligen Kalk *Spirifer indifferens* BARR. (sehr häufig) und *Orthis tenuissima* BARR. (etwas seltener), die sonst nirgends gefunden werden; anderwärts kommt *Phacops fecundus* var. *major* BARR. in ziemlicher Häufigkeit vor. Die

Mehrzahl der Trilobiten (*Proetus*) wurde zusammen mit zahlreichen kleinen Brachiopoden an einem dritten Orte gesammelt“ u. s. w.

Bei Konieprus und am Kollinkofel lässt sich ein unmittelbarer Zusammenhang von den die Versteinerungslinsen führenden Kalken mit Korallenkalken nachweisen, während die Hallstätter Kalke nur an wenigen Stellen durch eingreifende Korallenriff-Entwicklung unterbrochen werden. Das Vorkommen von Greifenstein selbst ist räumlich äusserst beschränkt. Trotzdem kann man auch hier nachweisen, dass bestimmte Arten nur an bestimmten Punkten vorgekommen sind.

Jedenfalls besteht zwischen Devon und Trias auch die Analogie, dass sowohl die Greifensteiner wie die Hallstätter Faciesentwicklung wegen des vollständig unregelmässigen Auftretens der Versteinerungen die schwierigsten und interessantesten Probleme bieten, deren Lösung in beiden Fällen trotz jahrelanger Arbeit noch nicht vollständig gelungen ist.

d) Kurze Uebersicht der alpinen Triasbildungen.

Trotz der im Vorstehenden berührten formellen Schwierigkeiten, die allerdings, wie ich aus charakteristischen Aeusserungen nichtösterreichischer Geologen entnehmen konnte, dem Uneingeweihten den Eindruck grösster Verworrenheit machen, ist die normale Gliederung der alpinen Trias eine äusserst einfache¹⁾; allerdings werden durch häufigen Facieswechsel mannigfache Aenderungen bedingt. Die geographischen Unterschiede bestehen wesentlich darin, dass bestimmte Faciesbildungen, so die Hallstätter Entwicklung, die Südtiroler Tuffmergel oder die Salzburger Hochgebirgskorallenkalke und die Küssener Schichten (Nordalpen, Lombardei) auf bestimmte Gebiete beschränkt sind.

Die Abgrenzung der mächtigen Kalk- und Dolomitmassen wird durch drei, im Allgemeinen beständige Mergelhorizonte ermöglicht, von denen allerdings nur der untere niemals in rein kalkiger Facies erscheint. Es sind die Werfener (I, vergl.

¹⁾ Es ist dies selbstredend keine neue Wahrheit; u. a. hat A. BITTNER in letzter Zeit häufig auf die Einfachheit der Normalgliederung hingewiesen (Jahrb. G. R. A. 1892. S. 393.)

oben), die Raibler (III) und die Küssener Schichten (V, Rhaet); wir erhalten somit eine Reihe von fünf, allerdings paläontologisch ungleichwerthigen Gebirgsgliedern, deren Aufzählung hier nur didaktischen Zwecken dient:

I. Die Werfener Schichten (Seisser Schichten unten; Camptiler und Myophorienschichten LEPSIUS non ROTHPLETZ oben; Haselgebirge von Berchtesgaden und Hallstatt mit Salz und Gyps), bilden das fast niemals fehlende Anfangsglied der Alpentrias und bestehen aus harten Sandsteinen, Schiefen und Kalkmergeln mit massenhaften Zweischalern. Reine Kalke sind selten.

IIa. Im Hangenden der Werfener Schichten (I) ist der Muschelkalk (IIa) (Gutensteiner Kalk, Reichenhaller Kalk, Myophorienschichten ROTHPLETZ non! LEPSIUS¹⁾, Virgloriakalk im unteren Theile, Reiflinger Kalk z. Th. und Prezzokalk im oberen Horizont) meist deutlich unterscheidbar.

IIb. Dann folgt im Hangenden der Sehledolomit (Wettersteinkalk der nördlichen Kalkalpen, Esinokalk der Lombardei, erzführender Kalk von Raibl, Bleiberg und Unterpetzen).

Zuweilen beginnt schon im oberen Muschelkalk (Mendola-

¹⁾ Die Bezeichnung Myophorienschichten wurde, wie BITTNER auseinandergesetzt hat, zuerst von LEPSIUS für eine Ausbildungsform des Südtiroler Buntsandsteins vorgeschlagen; für die nach BITTNER dem alpinen Muschelkalk angehörigen Myophorienschichten von ROTHPLETZ war schon früher der Name Reichenhaller Kalk (versteinerungsreiche Facies des Gutensteiner Kalkes) in Anwendung. Mir will es scheinen, als ob die stratigraphische Begrenzung der Myophorienschichten von ROTHPLETZ (Zeitschr. d. D.-Oest. Alpenvereins. 1888. S. 413) nicht hinreichend scharf sei, um eine Vergleichung desselben mit anderen Horizonten zu ermöglichen. Dieselben werden im Karwendel zwar vom Muschelkalk gleichförmig überlagert; hingegen sind die Lagerungsverhältnisse „an den beiden Orten, wo Werfener Schichten mit den Myophorienkalken zusammen auftreten, so gestört, dass man nicht sowohl von einer regelmässigen Ueberlagerung, als vielmehr nur von einer allseitigen Begrenzung der ersteren durch die letzteren sprechen kann.“ Die Rauhwaeken, welche die Myophorienschichten kennzeichnen und auch in den Südalpen an der Grenze von Werfener Schichten und Muschelkalk auftreten, werden von mir zu den ersteren gerechnet (vgl. unten). Jedoch ist, ganz abgesehen von dem Fehlen der Versteinerungen im Süden, die Mächtigkeit derselben nirgends bedeutend genug, um die Ausscheidung eines besonderen Gebirgsgliedes zu rechtfertigen.

dolomit, Spizekalk) oder unmittelbar über den Werfener Schichten die Dolomitentwicklung (Mürzgebiet, Ennsthaler Kalkhoehalpen, Kosehntta in den Karawanken). Man bezeichnet dann diese bis zu den Raibler Schichten reichende Dolomitmasse als Unteren Dolomit¹⁾. In den Südalpen liegen als heterope Äquivalente des wesentlich durch Korallenthätigkeit angebauten Dolomites zwischen Muschelkalk und Raibler Schichten die durch Cephalopoden und (an der oberen Grenze) durch Korallen wohl gekennzeichneten Buchensteiner, Wengener und Cassianer Schichten. Die geologische Verbreitung der beiden tieferen Zonen in der Mergelfacies ist in den Südalpen weitaus bedeutender als die der höheren. Gleichzeitig fanden im Süden vom Muschelkalk an bedeutende vulkanische Ausbrüche statt, deren Material meist in der Form submariner, meist fossilreicher Tuffe zwischen den Dolomitriffen abgelagert wurde. In den Nordalpen liegen local mergelige fossilarme Bildungen (Partnachschichten

¹⁾ A. BITTNER bezeichnet die untere Kalkmasse als „Muschelkalk im weitesten Sinne“ und folgt hierin dem Vorgehen anderer, welche Wettersteinkalk und ausseralpinen oberen Muschelkalk mit einander verglichen haben. Ueber diese Parallelisirung lässt sich wenig pro oder contra sagen, so lange wir über die Fauna des Wettersteinkalkes so ungenügend unterrichtet sind wie bisher. Diejenigen alpinen Faunen, welche nach dem neueren Umschwung der Ansichten mit dem mitteldeutschen Muschelkalk verglichen werden können, sind die der Buchensteiner und Wengener Schichten, und hier sind — selbst bei weitgehender Berücksichtigung facielier und geographischer Verschiedenheiten — die Unterschiede so gross wie möglich. Es sei nur daran erinnert, dass *Ceratites*, das bezeichnende Cephalopodengeschlecht des oberen Muschelkalkes, in den fraglichen Horizonten der Alpen ebenso vollkommen fehlt, wie *Trachyceras* in Deutschland. Auch E. FRAAS lässt (Scenerie der Alpen) den „Alpinen Muschelkalk“ bis zu den Cassianer Schichten einporreichen. Allerdings wird trotz der sachgemässen und klaren Uebersicht der Trias (S. 115 ff.) die Tabelle (S. 146) der Darstellung der verwickelten äquivalenten Faciesbildungen graphisch nicht gerecht. Vor allem veranlasst das wenig aussichtsvolle Bestreben einer Parallelisirung der alpinen und deutschen Trias manche Irrtümer; so wird der mittlere deutsche Muschelkalk mit den überaus versteinungsreichen Cassianer und Wengener Schichten verglichen. Derselbe ist eine locale, durch zeitweisen Rückzug des Meeres bedingte, wenig mächtige Schichtgruppe, die entsprechend der Art der Entstehung sehr arm an organischen Resten ist und auch nicht eine einzige eigentümliche oder neu auftretende Art enthält.

vergl. unten) zwischen Muschelkalk und Carditaschichten. Auch im Hallstätter und Reiflinger Gebiet finden sich an Stelle der drei Südtiroler Horizonte fossilreichere, wenig mächtige Kalke, ohne dass eine Unterbrechung des Absatzes nachweisbar wäre.

III. Die Raibler oder Carditaschichten (obere Abtheilung: Torer und Opponitzer Kalke; untere Abtheilung: Schlernplateauschichten von Südtirol, Bleiberger Schichten in Kärnten, Carditaschichten s. str. nach v. WÖHRMANN, Länzer Schichten in Vorarlberg; Reingrabener Schiefer, Länzer Sandstein in Oesterreich)¹⁾ sind in ihrem unteren Theile von der Cassianer Stufe schwer zu trennen, wenn beide in Zweischalerafacies entwickelt sind. Der untere Theil der nordalpinen Carditaschichten entspricht dem Cassianer Horizont. Nur selten, so im Comelico und bei Recoaro, sind die Raibler Schichten kalkig entwickelt; auch in der Trias der Centralalpen, am Ortler, Reschensehedeck („Ortlerkalk“) und Tribnlann (Brenner) konnten die Raibler Schichten nicht ausgeschieden werden. Eine Gliederung der mächtigen Kalk- oder Dolomitmassen ist in solchen Fällen kaum möglich.

IV. Die mächtige obere Kalk-Dolomit-Masse besteht aus drei äquivalenten Faciesgebilden, die in den Nordalpen zuweilen eine regelmäßige zonenförmige Anordnung erkennen lassen, dem versteinungsleeren Hauptdolomit, dem an *Megalodon* reichen Dachsteinkalk (= Plattenkalk SUSS vergl. unten) und dem Salzburger Hochgebirgskorallenkalk; derselbe ist u. a. auf der Südseite des Dachstein-, des Tannen- und Hagengebirges verbreitet und stellt eine unzweifelhafte Riffbildung dar. Der Hallstätter Kalk (vergl. oben) mit seinen Cephalopoden reichen Kalklinsen entspricht, abgesehen von dem in gleicher Facies ausgebildeten Muschelkalk der Schreyer Alp, ebenfalls den Raibler Schichten (Zone des *Trachyceras aonooides* und *Tr. austriacum*) sowie dem Hauptdolomit. Die korallenreichen Zlambachschichten nehmen als Einlagerung ein hohes Niveau in dem Hallstätter Kalk ein. Die Gebiete des Hallstätter Kalkes sind stets durch Gebirgsbrüche von denen des Dachsteinkalkes getrennt und zeigen eine erheblich

¹⁾ Schichten von Gorno und Dossena in der Lombardei.

geringere Mächtigkeit der Schichten als dieser (200 m gegen 1500—2000 m).

V. Die Erscheinung des Rhaet wird ebenfalls durch Faciesverschiedenheiten wesentlich beeinflusst. Die rein kalkige Entwicklung der Hoehgebirgskorallenkalke oder des geschichteten Dachsteinkalkes mit *Megulodon* geht stellenweise (die letztere vor allem in Südtirol) durch die Karnische und Rhaetische Stufe hindureh. Zuweilen finden sich Korallenbänke (Lithodendronkalk; *Lithodendron*=*Thecosmilin*) eingelagert in anderen Faciesgebilden. In der mergeligen Entwicklungsform beobachtet man eine Zweischalerafacies (die schwäbische), zwei Brachiopodenfacies (die Karpathische und die Küssener, letztere mit *Spirigera oxycolpos*) und eine Cephalopodenfacies (die Salzburger mit *Choristoceras Marshi* und *Psiloceras planorboides*). In einem mittleren Striche der Nordkalkalpen erscheinen diese Facies in der genannten Reihenfolge übereinander¹⁾.

2. Die Werfener Schichten.

Die Werfener Schichten sind der (in Bezug auf Faciesentwicklung und Versteinerungsführung) beständigste Horizont der gesamten ostalpinen Trias und scheinen sogar in den Westalpen (Quartenschiefer) vertreten zu sein. Das verbreitetste Gestein sind rothe, sandige, glimmerreiche Schiefer, deren Schichtflächen meist vollständig mit Steinkernen von Zweischalern („*Myacites*“, *Pseudomonotis*) bedeckt ist. Der Fossilreichtum ist zugleich das beste Unterscheidungsmerkmal von den rothen Grödner Schichten, die zuweilen in ganz ähnlicher Schieferentwicklung auftreten und dann in stark disloedirten Gebieten, wie in der Gegend von Tarvis, verwechselt werden können. Vielfach gestattet das Vorkommen von groben rothen Sandsteinen, Dolomitknollen und Conglomeraten in dem tieferen Niveau auch eine petrographische Unterscheidung. Eine Verwechslung mit den Conglomeraten der Grödener

¹⁾ Vergl. v. Mojsisovics, Dolomitriffe S. 74—75.

Schichten ist um so weniger möglich, als derartige Bildungen im Werfener Horizont überall so gut wie gänzlich fehlen.

Die Werfener Schiefer liegen in ganz Südtirol, Venetien und Kärnten zwischen heteropon kalkigen Bildungen und sind sowohl mit den hangenden Muschelkalken wie mit den liegenden Bellerophonkalken durch Wechsellagerung verknüpft.

I. Die liegende Abtheilung der Werfener Schichten besteht aus grauen, gelben oder röthlichen Mergelkalken, die z. B. im Schwefelgraben bei Lussnitz *Pseudomonotis Clarai* führen und auch bei Pontafel (Bahnhof) gut entwickelt sind.

II. Die mittlere, aus rothen glimmerigen Schiefnern, Sandsteinen und Mergeln bestehende Abtheilung enthält in dem Lussnitzer Aufschluss (nach STACHE) *Myacites fassaensis* WISSM., *Pecten venetianus* HAU. sp. (*Aricula* bei HAUER, vergl. unten), *Turbo* cf. *rectocostatus* und *Dinarites* sp. Vereinzelte Arten sind auch auf der Kühweger Alp am Fusse des Gartnerkofels gefunden, so (nach E. SUESS) *Myacites fassaensis* und *Pseudomonotis*. Eine reichere Fauna enthalten die rothen sandigen Werfener Schichten vom Achomitzer Berg; ich bestimmte aus der von TOULA gesammelten und in der k. k. technischen Hochschule zu Wien befindlichen Suite:

Tirolites cassianus QU. sp.

Naticia costata MSTR. sp.¹⁾ („*Naticella*“ auct.)

„ *aff. costatae*, eine grössere Form.

Myophoria costata ZENK.

Myacites fassaensis WISSM.

Pecten cf. *discites* BR.

Pecten venetianus v. HAU. sp.²⁾

¹⁾ Die Ableitung der triadischen Schnecke von den paläozoischen Naticen hat E. KÖKEN ausführlich nachgewiesen. (Ueber die Entwicklung der Gastropoden Bellageband VI des N. J., S. 475.) Die Angabe l. c., dass *Naticella costata* aus den Wengener Schichten stammt, ist wohl nur ein lapsus calami oder ein Druckfehler.

²⁾ Wie die Untersuchung der in der geologischen Reichsanstalt befindlichen HAUER'schen Originale bewies, ist *Aricula venetiana* v. HAUER (Denkschriften der Wiener Akademie I. S. 110. t. 18. f. 1—3) ein *Pecten* und mit *Pecten Fuchsii* (id. ibid. S. 112. t. 18. f. 8a, b) zu identificiren. Die Verschiedenheit der beiden Formen beruht vor allem auf der abweichenden

Pecten sp. (gestreifte Art)

Gereillia aff. *polyodontae* CREDN.

Pseudomonotis angulosa LEPSIUS sp. die grossen auffallenden, von BITTNER (Verhandlungen der geolog. Reichsanstalt 1886. S. 389) besprochenen Formen.

Auch am Aehomitzer Berg fehlt die für die tieferen Schichten bezeichnende *Pseudomonotis Clarai* EMMU. Hingegen stimmt die Fauna der ebenfalls aus dem höheren Werfener Schiefer von Südtirol, Südsteiermark und Eisenerz bekannten kalkigen Myophorienhänke im Wesentlichen mit der vorstehenden überein. Bemerkenswerth ist an der von BITTNER¹⁾ gegebenen Zusammenstellung der Eisenerzer Fauna die Häufigkeit glatter Myophorien (*M. orata* BR. und *M. rotunda* v. ALB?)

III. Die Rauchwacken, Zellendolomite und Kalke, welche in Val Sugana, bei Recoaro und im Westen der Etsch die obere Grenze der Werfener Schichten kennzeichnen, finden sich auch in unserem Gebiet, vor allem im Pontebanathal bei Pontafel wieder. Die bezeichnenden aus Tirol beschriebenen rothen Gastropoden-Oolithe sind in schöner Entwicklung in den tieferen Schichten des Aehomitzer Berges sowie am Waltischer-Iflof bei Arnoldstein gefunden worden. Hingegen sind weder reichere Cephalopodenfundorte noch die Sandsteine mit *Lingula* aus unserem Gebiete bekannt.

Sandsteine mit Wellenfurchen sind an der Mündung des Bombaschgrabens bei Pontafel angeschlossen und erinnern an die gleichartigen Bildungen im rheinischen Spiriferensandstein. Ueberhaupt erscheint die Aehnlichkeit mancher Flaehseebildungen des Devon mit den Werfener Schichten bemerkenswerth; vor allem ist die Uebereinstimmung der „Dolabrandsteine“ der höheren belgischen und norddevonischen Schichten mit den Myacitenbänken unverkennbar.

Bemerkenswerth ist die Gleichartigkeit der Gliederung

Art der Erhaltung; *Avicula venetiana* liegt in grauem, kalkigem Sandstein und besitzt eine gut erhaltene Oberfläche, *Pecten Fuchsii* ist ein Stelkern aus rothem, glimmerigen Sandstein.

¹⁾ Verhandlungen der geologischen Reichsanstalt 1886 S. 389. Vergleiche ferner noch für die Werfener Schichten MOJSISOVIC'S Dolomittriflo p. 42, BITTNER, Recoaro, Jahrb. d. K. K. geol. Reichsanstalt 1883, S. 552, T. HARADA, Comelico, ibid. S. 155.

der Werfener Schichten auch im östlichen Südtirol. Hier unterscheidet man nach LEPSIUS und BITTNER¹⁾ von unten nach oben

I. 1. Untere Röthplatten, in den oberen Bänken mit *Pseudomonotis Clarai*,

II. 2. Gastropoden-Oolithe voll von *Holopella gracilior*,

3. Obere Röthplatten mit *Tirolites Cassianus*, *Natiria costata* und *Myophoria costata*; im oberen Theile dieser Schichten zeichnet sich eine Myophorienbank aus,

III. 4. Zellendolomit mit Rauchwacke und Gyps als obere Grenzbildung.

Da die Gastropoden-Oolithe mit den echten Werfener Schieferplatten wechsellagern und somit keine eigentliche stratigraphische Selbstständigkeit beanspruchen können, ergibt sich eine sehr bemerkenswerthe stratigraphische und facielle Uebereinstimmung zwischen Osten und Westen. Die untere Abtheilung (I) entspricht den Seisser, die obere (II) den Campiler Schichten von RICHTHOFFEN'S; die versteinungsleeren Rauchwacken sind wohl vielfach — mit gleichem Recht — zum Muschelkalk gestellt worden.

3. Der Muschelkalk.

Der durch seine Gesteine im Allgemeinen wohl charakterisirte Muschelkalk ist für den Aufbau des östlichen Theiles der Karnischen Hauptkette nicht unwichtig, zeichnet sich aber überall durch eine ungewöhnliche Armuth an Versteinerungen aus. Cephalopoden wurden bisher überhaupt nicht gefunden; die bezeichnenden Brachiopoden des Wellenkalkes sind nur an einigen Fundorten in dem nördlichen Gailthaler Gebirge vorgekommen.

Bei der Versteinerungsarmuth der in Frage kommenden Bildungen und der Häufigkeit der Dislocationen konnte eine stratigraphische Scheidung in unteren und oberen Muschelkalk,

¹⁾ Ueber die geologischen Aufnahmen in Giudicarien und Val Sabbia, Jahrb. der geol. R.-A. 1881, S. 222 ff.

die Zonen des *Ceratites binodosus* und *trinodosus*, nicht durchgeführt werden. Die dunkelen z. Th. mergeligen Plattenkalke der Guttensteiner Facies mit ihren hellen Kalkspathadern und Hornsteinanscheidungen und der braungelben Verwitterungsrinde sind jedoch ebensowenig zu verkennen wie die blutrothen glimmerigen Schiefer und die bunten Kalkeonglomerate des unteren Südtiroler Muschelkalkes. Sehr häufig ist in den angrenzenden Südtiroler und Venetianer Gebieten der obere Muschelkalk durch weissen Dolomit oder Kalk von den auflagernden Bildungen getrennt (Mendola-Dolomit, Kalk des Monte Spitze bei Recoaro), und dieser kann von dem hangenden Schlierndolomit nur in sehr deutlichen Profilen ohne Hilfe von Versteinerungen unterschieden werden. In unserem versteinerungsleeren, arg dislocirten Gebiet musste auf eine Abgrenzung dieses Dolomites von den gleichartigen Bildungen der Karnischen Stufe verzichtet werden. Jedoch beweisen einige Braehiopoden, welche Herr Professor STUSS im obersten Garnitzengraben nicht weit vom Schulterköferle sammelte, dass auch in der Karnischen Hauptkette ein Theil der Kalk-Dolomitmassen wohl noch zum alpinen Muschelkalk zu rechnen ist. Herr Dr. A. BITTNER bestimmte die nicht sonderlich wohl erhaltenen Reste als *Spiriferina Mentzeli* DUNK., *Sp. cf. fragilis* SCHL., *Terebratula cf. vulgaris* SCHL.

Vielfach dürfte auch der obere Muschelkalk durch die dunkelen Plattenkalke vertreten sein, so in dem Profile des Bombaschgrabens, wo ein allmäliger Uebergang in die jüngeren Dolomite und Kalke zu beobachten ist.

In dem Profile bei Kaltwasser in den Julischen Alpen wird der obere Muschelkalk mitsammt den Buchensteinen Schichten durch die „Doleritischen Tuffe von Kaltwasser“ vertreten. Dieselbe eruptive Facies findet sich auch am Massessnik nördlich von Malborget und Uggowitz sowie am Gartnerkofel und wurde durch eine besondere Farbe (roth) ausgezeichnet. An der Thörlhöhe und dem Gartnerkofel beobachtet man über den Werfener Schiefen eine mannigfaltig entwickelte Schichtfolge (Abb. 16 u. 17, S. 44, Abb. 84, S. 343):

1. Grauen wohlgeschichteten Plattenkalk.

2. Rothen Glimmersandstein und Schiefer.
3. Buntes Kalkeonglomerat mit untergeordnetem rothen Kalk und Knollenkalk.
4. Grünen Porphyrtuff (Pietra verde), bald ansteilend; darin Kalkgeschiebe von Quarzporphyr umflossen.
5. Schlerndolomit, die Masse des Gartnerkofels bildend; im untersten Theile grauen, wohlgeschichteten Kalk, den Buchensteiner Schichten entsprechend.

Die Bildung der grünlichen Tuffe steht am Gartnerkofel wie bei Raibl in unmittelbarem Zusammenhang mit der der rothen „Raibler Quarzporphyre“. Da die Auffassung des Raibler Profils auch für die dislocirten, aber petrographisch gleichartigen Gesteine der Karnischen Alpen massgebend ist, so muss ich ausdrücklich hervorheben, dass eine aufmerksame Begehung der Strasse Raibl-Kaltwasser die Angaben DIENERS¹⁾ durchans bestätigt hat, was hier entgegen der von STUR²⁾ veröffentlichten Kritik der DIENER'schen Arbeit ausdrücklich hervorzuheben ist.

Die „beiden Muschelkalke bei Kaltwasser“ (l. c. S. 16) hat Herr D. STUR „nicht gefunden,“ was auch in Anbetracht der Vertretung des oberen Muschelkalkes durch die Tuffe (DIENER l. c. S. 664) nicht wohl zu erwarten war. Die harten Conglomerate bezieht derselbe Forscher auf die „permischen Uggo-witzer Conglomerate,“ eine Anschauung, die auf die oben widerlegte Auffassung STACHES zurückzuführen ist.

Aehnlich wie der erzführende Kalk von Bleiberg und Raibl (Ib der obigen Uebersicht) enthält auch der Muschelkalk lagenförmig eingesprengten Bleiglanz. Das Vorkommen bei Arnoldstein in den Westkarawanken wurde oben S. 37 (Abb. 12) beschrieben.

Die Versteinerungsfunde im Muschelkalke der Karnischen Hauptkette beschränken sich, abgesehen von den oben erwähnten Brachiopoden, auf Crinoidenreste und die eigentümliche, einer *Retzia* ähnliche *Spiriferina Peuerkei* BRITNER, welche in den hornsteinreichen Plattenkalcken des Malborgeter

¹⁾ Jahrbuch der geol. Reichsanstalt 1884, S. 663.

²⁾ Verhandlungen d. geol. Reichsanstalt 1887 (Jahresbericht) S. 17.

und Filza Grabens vorgekommen sind. Obwohl es sich in beiden Fällen um Aufquetschungen im Gebiete des Seblern-dolomites handelt, lässt die petrographische Beschaffenheit der Gattensteiner Kalke keinen Zweifel über die Alterstellung.

Eine kleine Anzahl von Versteinerungen, welche aus dem Kofflergraben (Kreuzengraben) bei Feistritz an der Drau stammen, erwähnt K. A. PENECKE (Verhandl. G. R.-A. 1884, S. 382). Ueber Grödener Sandstein und kalkigen Werfener Schichten, die den Nordfuss des Bleiberger Erzberges bilden, erscheint ein dunkeler Kalk, der vollkommen an die dunkle Terebratelbank des Kaltenleutgebener Grabens erinnert. Derselbe enthält *Terebratula vulgaris* SCHULT. in grosser Menge; seltener sind *Rhyacionella decurtata* DKK., *Retzia trigonella* SCHULT., *Spiriferina Meutzeli* DKK. und *Lima* sp. Aus einem sehr tiefen Horizont des Muschelkalkes giebt auch E. SUSS in dem oben S. 150 beschriebenen Durchschnitt Lind (Drauthal)—Weissensee *Retzia trigonella* und *Spiriferina fragilis* an.

Ueber der Brachiopodenfaeies des unteren Muschelkalkes (Zone des *Ceratites binodosus*) folgt — wie am Weissensee — ein dunkeler, splittiger, bankig abgesonderter Kalk mit zahlreichen Hornsteinausscheidungen, dessen unterer Theil dem oberen Muschelkalk (Zone des *Ceratites trinodosus*) entsprechen dürfte, während der höhere Theil den Buchensteiner Schichten (Zone des *Trachyceras Reitzi*) zu vergleichen ist. In den unteren Theilen des Kalkes sammelte K. A. PENECKE ebenfalls noch *Terebratula vulgaris* sowie Gastropoden (? *Cheuritzia* und ? *Trochus*).

Aehnliche schwarze Kalke mit Brachiopoden und Gerwillien erwähnt TELLER aus der Umgegend von Vellach in den Karawanken (Verhandl. G. R.-A. 1887, S. 263).

Das unserem Gebiet zunächst liegende Vorkommen der Cephalopodenfaeies des unteren Muschelkalkes befindet sich in Val Talagona bei Pieve di Cadore; die Versteinerungen wurden meist durch v. MOJSISOVICs bestimmt (HARADA, Jahrbuch der K. K. geol. Reichsanstalt 1883, S. 156) und gehören dem tieferen Muschelkalk an:

Balatouites brugsensis LORETZ

Ptychites sp.

Arcestes sp.

Gymnites aff. *Humboldti* MOJS.

? *Balatonites* cf. *Ottonis* v. B.

Ceratites binodosus v. HAU.

Pecten discites SCHLOTTH.

Die Cephalopodenfacies der höheren Zone des *Ceratites trinodosus* ist bisher weder aus dem Karnischen Gebiet noch aus dem angrenzenden Südtirol bekannt geworden. Die Hauptfundorte derselben liegen in Judicarien, der Lombardei und im Salzkammergut (Schreyer Alp). Die manigfachste Faciesentwicklung zeigt der Muschelkalk bei Recoaro¹⁾, wo

a) zu unterst Zweischalerkalke mit *Enerinus gracilis*,

b) dann Brachiopodenkalke mit *Enerinus uliformis* und den schon oben (von Feistritz) angeführten Brachiopoden des deutschen Wellenkalkes und eingelagerten Landpflanzen-schiefern vorkommen. Diese beiden Facies entsprechen der Zone des *Ceratites trinodosus*. Darüber liegen

c) rothe sandige Mergel von wechselnder Mächtigkeit,

d) graue Kalke mit *Gyroporella triassina*, *Thamnastracerasen*, Zweischalern (*Aricula*, *Pecten*, *Myophoria* cf. *vulgaris*) und Gastropoden; das hangendste Glied bilden die

e) weissen Kalke des Monte Spitze.

„Die obersten Lagen des Spitzekalkes gehen in rothbunte, grellgelbe, stellenweise auch breccienartig gefleckte Gesteine über, welche hier und da Hornsteinausscheidungen, sowie unregelmässige tuffige Einschlüsse zeigen“ (BITTNER). Diese Entwicklung erinnert an die Beschaffenheit der an der oberen Muschelkalkgrenze liegenden Kalke des Gartnerkofels; leider fehlen an letzterem Orte die Brachiopoden, Zweischaler und Cephalopoden, welche diese Lager des Spitzekalkes erfüllen.

In Judicarien unterscheidet BITTNER:

- | | | |
|----|---|---|
| I. | { | a. Unteren Muschelkalk = Horizont des <i>Dudocrinus gracilis</i> von Recoaro, bildet die Masse des Muschelkalkes in einer Mächtigkeit bis zu 300 m und entspricht in Bezug auf Versteinerungsarmuth |
|----|---|---|

¹⁾ Eingehende Angaben bei BITTNER, Jahrbuch der K. K. geol. Reichsanstalt 1853, S. 584—594.

²⁾ Jahrbuch der Geol. R.-A. 1881, S. 229.

- I. {

 sowie petrographischen Charakter den Guttensteiner Kalken oder den Plattenkalken des Karnischen Gebietes.
 b. Brachiopodenkalk (Niveau vom Ponte de Cimego) Hauptlager des *Ceratites binodosus* und *Ptychites Studeri*.
- II. Oberen Muschelkalk (Niveau vom Prezzo und Dosso Alto), Zone des *Ceratites trinodosus*, *Balatonites curyonphalus* und *Ptychites gibbus*.

Die ausführlichsten Angaben über die Fauna des alpinen Muschelkalkes finden sich bei BRITNER (l. c. S. 569 ff.) und bei MOJISOVIC'S Dolomitriffe (S. 46 ff.).

4. Ueber die pelagischen Aequivalente der unteren Trias und die rothen Perm-Trilasschichten.

Die grosse, zwischen der palaeozoischen und mesozoischen Thierwelt klaffende Lücke wird vor allem durch die Versteinerungsarmuth bzw. das Fehlen mariner Thierreste im Rothliegenden und Buntsandstein bedingt; die verarmte „sarmatische“ Thierwelt des Zechsteins, welche nur unter den Zweischalern vereinzelte nenartige Typen (*Hinnites*, *Bakewellia*) enthält, ist nicht als vermittelndes Glied aufzufassen. Jedoch giebt es pelagische Ansbildungsformen der Dyas in verhältnissmässig geringer Zahl, die wir wenigstens in ihren Hauptvertretern kennen gelernt haben.

Auch die an der Basis der Trias vorhandene Lücke, welche in einer fast noch fühlbareren Weise die fortlaufende Entwicklung des thierischen Lebens zu unterbrechen schien, wird durch neuere Forschungen mehr und mehr ausgefüllt. In den Karnischen Alpen werden Altertum und Mittelalter der Erde durch eine ununterbrochene Reihe mariner Schichten verbunden. Da dieselben jedoch in den entscheidenden Horizonten versteinerungsarm oder versteinerungsleer sind, so erscheint ein kurzer Hinweis auf die anderwärts beobachteten Fannen gerechtfertigt.

Eine wie es scheint ununterbrochene palaeontologische Entwicklung lässt die von AUCHEN entdeckte und beschriebene

Schichtenfolge der Araxesenge bei Djulfa (Armenien) erkennen. Nach den Deutungen von MOJSISOVIC¹⁾ enthält dieselbe folgende Horizonte:

| | |
|-------|--|
| Oben | |
| Trias | a. <i>Rhizocorallium</i> führende Platten des unteren Muschelkalkes. |
| ? | b. Schiefri-g-kalkige Bänke mit <i>Pseudomonotis</i> cf. <i>Clarai</i> und ? <i>Tirolites</i> = Werfener Schichten. |
| Ob. | c. Dunkelgraue, feste, plattenförmige Kalke im Wechsel mit bituminösen, Alaunschiefer ähnlichen, gypsreichen Bänken = ? Bellerophonkalk. |
| Pern | d. Bänke festen spröden Kalkes mit thonig-steinigem Mergeln wechselnd. |

In den Mergelbänken finden sich Brachiopoden, besonders Productiden. An der Basis des Horizontes c liegt die von AMICI ausgehobene Fundstelle von Ammoniten (*Otoceras*, *Hungarites*) und Goniatiten (*Gastrioceras*). Die Ähnlichkeit des höheren Theiles der Schichtfolge mit alpinen Horizonten ist augenfällig, wenngleich für eine eingehendere Parallellisirung die Anhaltspunkte noch spärlich sind. Der oberste Pernhorizont könnte etwa dem Bellerophonkalk entsprechen; allerdings ist eine pelagische Ammoneenfauna, welche jünger ist als der obere indische Productuskalk²⁾ und die Schichten des Sosio auf Sicilien, in den Alpen nicht vorhanden.

Die älteste triadische, dem unteren Bundsandstein homotaxe Ammonitenfauna kommt nach MOJSISOVIC³⁾ im Himalaya (Spiti) vor. Es sind die von GRIESBACH entdeckten *Otoceras*-beds, welche hauptsächlich *Xenodiscus*, seltener *Otoceras*, *Meckoceras* und *Prospiringites* enthalten. Sowohl die Unterlagerung durch Productuskalke wie die Entwicklungsstufe der Ammoneen weisen auf die tiefste Trias an. Goniatitische Formen fehlen — abweichend von Djulfa — vollständig und die armenischen *Otoceras*-Formen stehen auf einer tieferen Entwicklungsstufe als die indischen Arten.

¹⁾ Verhandlungen der K. K. geol. Reichsanstalt 1879, S. 173.

²⁾ KARPINSKY, Ammonoen der Artinskstufe S. 92.

³⁾ Sitzungsberichte d. K. K. Akademie d. Wissenschaften Wien, Bd. 101, Abth. I (1892) S. 377.

Auch in der indischen Salzkette überlagert die untere Trias in reicher Entwicklung der Faunen den Productuskalk ohne deutliche Discordanz, enthält aber eine durchaus abweichende Thierwelt. Bemerkenswerth ist der Umstand, dass in den 7 verschiedenen Ammonoitenfaunen, von denen WAAGEN die 5 nteren mit dem Buntsandstein, die 2 oberen mit dem Muschelkalk vergleicht, nur ceratitenähnliche Formen vorhanden sind; Formen mit ammonitenähnlicher Lobenentwicklung, welche bereits im oberen Productuskalk vorhanden waren, fehlen vollkommen. Die Reihenfolge der Faunen ist nach WAAGEN¹⁾ von unten nach oben:

1. Unterer Ceratitenkalk: *Gyronites* (verw. mit *Meekoceras*, früher als *Xenodiscus* bezeichnet), *Dinarites*.
2. Ceratitenmergel: *Proptychites*, *Meekoceras*, *Gyronites* (selten), *Dinarites*.
3. Unterer Ceratitensandstein: *Meekoceras*, *Dinarites*, *Ceratites*, *Celtites*.
4. Mittl. Ceratitensandstein: *Flemingites*, *Meekoceras*, *Dinarites*, *Celtites*, *Stachella*.
5. Oberer Ceratitensandstein: Flemingitesschichten, *Flemingites*, *Acrochordiceras* und sämtliche in den tieferen Schichten vorkommenden Gattungen. *Proptychites* hat hier seinen letzten Vertreter.

WAAGEN hebt (n. a. O. S. 381) als wahrscheinlich hervor, dass „der grössere Theil dieser fünf Cephalopodenfaunen im Alter den Werfener Schichten vorangehe.“ Diese Annahme ist durchaus zutreffend, sowie man an Stelle der Worte „Werfener Schichten“ „Cephalopodenfauna der Werfener Schichten“ (Zone des *Tivolites cassianus*) einsetzt. Die Ammonoiten kommen nur im mittleren bzw. (— wenn man von den höheren versteinungsleeren Rauehwaeken absieht —) im oberen Theile der Werfener Schichten vor. Die nteren Werfener (Seisser) Schichten sind zwar nicht, wie WAAGEN bemerkt fossilleer, aber allerdings nur mit einer wenig bezeichnenden Bivalvenfauna erfüllt; die Veränderungen der letzteren sind im Vergleiche mit der Umprägung der Cephalopodenfaunen kaum bemerkbar.

¹⁾ Jahrb. der geol. R.-A. 1892 (Bd. 42) S. 379 ff.

Auf Grund der früheren unvollkommenen Kenntnisse konnte von MOJISOVICS im Jahre 1879¹⁾ auf die Möglichkeit hinweisen, dass der Bellerophonkalk mit seiner permischen Fauna dem deutschen Haupt- (oder nteren) Buntsandstein homotax sei, und dass demgemäss eine Revision der Grenzen von Mesozoium und Palaeozoium stattzufinden habe. Jetzt hat derselbe Forscher hervorgehoben, dass im Himalaya über den tieftriadischen *Otoeeras*-beds ein mächtiger Schichtencomplex vorkäme, der den Ceratitenschichten der Salzkette ungefähr entspräche.

Wie die Vergleichung im Einzelnen ausfallen wird, kann erst nach dem Abschluss der von WAAGEN und DIENER begonnenen Bearbeitung der Faunen entschieden werden. Jedenfalls wird man aber so viel sagen dürfen, dass dem versteinierungsarmen¹⁾, durch seine Bivalven nur ungenügend gekennzeichneten unteren Buntsandstein eine pelagische Ceratitenfauna von rein triadischem Gepräge entspricht. Für die Richtigkeit der bisherigen Altersdeutung des unteren Buntsandsteins spricht ferner das Vorkommen von *Gervilleia Murchisoni*, die man nenerdings in weiterer Verbreitung kennen gelernt hat. Denn die Gattung *Gervilleia* ist permischen Schichten fremd; *Gervilleia ceratophaga* gehört zu dem Genus *Bakewellia*.

Während die der Basis der Trias entsprechende Ammonitenfauna nur aus Indien bekannt ist, finden sich cephalopodenreiche Schichten vom Alter des oberen Buntsandsteins ausser in den Alpen noch im südöstlichen Russland (Bogdo) und im nordöstlichen Sibirien an der Olenekmündung ins Eismeer. Das Vorkommen von Ammoniten des Werfener Horizontes am Bogdo in der Astrachanischen Steppe ist besonders für die Altersbestimmung der fast versteinungsleeren „bunten Mergel“ von Bedeutung, welche den Norden und Osten des europäischen Russland grossen Theils bedecken. Dieselben werden von der marinen Artinskischen Stufe unterlagert und stellen somit eine Uebergangsbildung zwischen Palaeozoium und Mesozoium dar, die dem höheren Zechstein und dem tieferen Buntsandstein equivalent ist.²⁾ Der ameri-

¹⁾ Dolomitriffe S. 37.

²⁾ Man vergleiche besonders das Referat im N. J. 1887, I, S. 84, welches NIKITIN über AMALIZKY'S Arbeit „das Alter der Stufe der bunten Mergel im Bassin der Wolga und Oka“ veröffentlicht hat.

kanische Südwesten (Texas, Arizona), dessen geologische Entwicklung während des letzten Theiles der palaeozoischen Aera so viele Analogien mit Russland zeigt, weist auch derartige bunte Mergel in gleicher stratigraphischer Stellung auf. Die überaus spärlichen Funde von Zweischalern, welche von der Wolga wie aus Texas vorliegen, gestatten keine zuverlässige Altersbestimmung. Rothe Sandsteine und Mergel liegen auch in den Nord- und Centralalpen (Ortler) d. h. dort wo der Bellerophonkalk fehlt, an der Grenze von mesozoischen und palaeozoischen Schichten. Auch im vorliegenden Falle ist die Unterscheidung von Gröden- und Werfener Schichten schwierig oder unmöglich. In den Alpen wurden die rothen Schichten in einem flachen auf altem Festlande vordringenden Meere, in Westamerika und Russland in einem langsam austrocknenden Binnensee abgelagert. Im grössten Theile des letztgenannten Gebietes verschwand derselbe während der Triaszeit; nur im Südosten trat am Ende der Buntsandstein-epoche eine vorübergehende Transgression des hohen Meeres ein (Werfener Schichten des Bogdo in der Astrachanischen Steppe.)

In Amerika beschränkt sich die negative Bewegung des triadischen Meeres auf den Südwesten (Texas, New-Mexico, Colorado, Arizona). Nördlich davon liegt im Herzen des Felsengebirges (von 112° und 117° westl. L.) in Utah und Nevada ein weites Gebiet, in dem mesozoische Ablagerungen gänzlich fehlen. Weiter nördlich greifen jedoch die Bildungen des arktisch-pacifischen Triasmeeres bis auf den Ostabhang des hentigen Gebirges hinüber. Man kennt durch WHITE und PEALE aus Idaho und dem westlichen Wyoming Kalke mit *Meekoceras* und *Xenodiscus*, welche etwa dem oberen Buntsandstein entsprechen.¹⁾

Die eigentümlichen geographischen Beziehungen der einzelnen altriadischen Cephalopodenfaunen, das Hinabreichen sibirischer Typen (*Sibirites*, *Dinarites glacialis*, *Ceratites subrobustus* und *glacialis*?) bis in die Salzkette kann hier

¹⁾ MOJSISOVICS, Verhandl. d. geol. R.-A. 1886, Nr. 7.

²⁾ In der sechsten Cephalopodenzone, den oberen Ceratitenkalcken WAAGEN l. c. S. 351. Dieselben enthalten leiostrake Ammoniten aus der

nur angedeutet werden. Andererseits schliesst sich die Fauna des Himalaya durch die dort vorkommenden Ptychiten und Ceratiten (*Dinarites*) und *Merkoceras* mehr an alpine Bildungen an. Doch fehlen die für die europäische untere Trias bezeichnenden Tiroliten und Balatoniten sowohl in Sibirien wie in Indien. Die Bearbeitung der interessanten indischen Fauna wird hoffentlich weitere Aufschlüsse bringen.

5. Der Schlerndolomit und seine Aequivalente.

In den Triasmassen der Ostalpen sind scharfe Unterscheidungen von Kalk und Dolomit schwer zu machen; nur die Endpunkte der Reihe kennzeichnen sich allerdings sowohl in der chemischen Analyse, wie in der Natur durch die sandige Verwitterungsoberfläche und die klüftige Beschaffenheit des Dolomites. Für die meisten hierher gehörigen Gesteine gilt jedoch der Ausspruch eines der Veteranen der Alpengeologie ¹⁾, „dass man bei der Bezeichnung Kalk und Dolomit eine scharfe Unterscheidung nicht machen kann, man müsste denn jede einzelne Schicht chemisch analysiren: sehr häufig erweisen sich körnige, dolomitisch aussehende Gesteine als zum Kalk gehörig, wie andererseits dichte kalkähnliche Gesteine eine dolomitische Zusammensetzung besitzen.“ Die äussere mikroskopische Betrachtung lehrt im vorliegenden Falle, dass ein ungeschichteter schneeweisser, sehr klüftiger Dolomit im Osten der Karnischen Hauptkette weitaus vorwiegt. Die oben wiedergegebenen Bilder des Gartnerkofels und das nebenstehende Lichtbild des Schinuz bei Malborget veranschaulichen die landschaftliche Form dieses Gesteins. Zerklüftung im Kleinen und senkrechte Absonderung im Grossen bilden fast überall den hervorstechendsten Charakter. Ue deutliche horizontale Schichtung beobachtet man z. B. am Fusse des Schinuz; seltener, so an der nah gelegenen Kathreiner

Verwandtschaft von *D. glacialis*, *Sibirites* (10 Arten), *Acrochordiceras* (mit einer nah verwandten neuen Gattung), *Celtites*, *Ceratites* mit zahlreichen Gruppen, sowie eine verwandte Gattung; das Vorkommen von *Balatonites* wird als zweifelhaft bezeichnet.

¹⁾ v. GÜMBEL, über die Thermen von Bormio und das Ortlergebirge, Sitz-Ber. d. phys. math. K. bay. Akad. d. Wiss. 1891, Bd. 21, S. 101.



Phot. vom Verf.

Der Bohinus.

Abänderungsformata des Schlierensolinites. Vom kleinen Alpeispitze bei Malborget.

Abb. 84.

NO.

SW.

Sägemühle finden sich deutlicher ausgeprägte Bänke (Fallen 50° SW).

Am Rosskofel (Taf. II), an der westlichen Kirche von Saifnitz, sowie am Dobratsch bildet geschichteter Kalk das weitaus vorherrschende Gestein. Röthliche Färbung wurde besonders am Trogkofel, Alpenkofel und Dobratsch beobachtet.

Die Versteinerungen, welche bisher aus dem Sehlerndolomit der Karnischen Hauptkette bekannt geworden sind, zeichnen sich zwar weder durch zahlreiches Vorkommen noch durch gute Erhaltung aus, genügen jedoch vollkommen um das triadische Alter des Gebirgsgebietes über jeden Zweifel zu erheben. STACHE hat bekanntlich früher den Sehlerndolomit ebenso wie die Uggowitzer Breccie für permisch erklärt. Kalkalgen (*Diplopora*) besitzen die grösste Verbreitung; dieselben liegen vor vom Südabhang des Gartnerkofels (E. SUSS und eigene Beob.), vom Wege Pontafel zur Alp „Im Loch“, vom Kapin bei Tarvis und endlich vom Fusse des Mulei (Gruppe der *Diplopora annulata* ¹⁾) nach TOULA). Derselbe Forscher fand zwischen Mulei und Achomitzer Berg *Encrinurus* cf. *granulosus* MSTR. Während Kalkalgen eine gewisse Verbreitung besitzen, habe ich Korallen nur einmal zusammen mit einem unbestimmbaren *Megalodon* im Kalke des Rosskofels gefunden. Dieselben gehören zu der verbreiteten und bezeichnenden Triasgattung *Thecosmilium* und sind mit *Thecosmilium confluentis* MSTR. von St. Cassian nahe verwandt. Von besonderer stratigraphischer Wichtigkeit ist ein von E. SUSS am Gartnerkofel gesammelter durch v. MOJSEVICS als *Daonella* cf. *Taramellii* MOJS. bestimmter Zweischaler.

Für den Kalk des Dobratsch sind die grossen turmförmigen Schnecken des nordalpinen Wettersteinkalkes bezeichnend. Die vorliegenden Durchschnitte erinnern an *Pseudomelania Rothornii* M. HOEK. In dem Bleiglanz führenden Kalk von Dentsch Bleiberg, der dem gleichen Horizonte angehört, ist vor allem bemerkenswerth das Vorkommen von *Megalodon triquetus* WULFEN (s. str.; von den Arten des Dachsteinkalkes verschieden). Das Auftreten von Bleiglanz ist auch in Raibl an den tieferen Kalkhorizont gebunden.

¹⁾ Verhandl. d. geol. R.-A. 1887, S. 296.

Das Bleiglanzlager der Windischen Höhe und das des Jaukens wurde von mir nicht näher untersucht. (Ueberhaupt sei darauf hingewiesen, dass die Aufnahme des nördlichen Gailthaler Gebirges, abgesehen von der Grenzregion gegen das alte Gebirge, nicht vollkommen zum Abschluss gelangt ist.)

Mergelige Zwischenlagen sind sehr selten; im Westen, in der Gegend von Pontafel fehlen selbige ganz, im Osten ist die Unterscheidung von den im gleichen Gebiete vorkommenden Aufwetschungen schwierig. Ein kleines fossilerees Mergelvorkommen im obersten Theile des Malborgeter Grabens ist wahrscheinlich eine Einlagerung; wie die Mergel der Kalisehnikwiese am Südbhange des Mulei (mit *Posidonia wengensis* WISSM.) zu deuten sind, konnte wegen der Mangelhaftigkeit der Aufschlüsse nicht festgestellt werden.

Im Gebiete der Karnischen Hauptkette ist also fast ausschliesslich reines Kalk- und Dolomitsediment zum Absatz gelangt; die von den Quarzporphyrausbrüchen des obersten Muschelkalkes herrührenden grünen Tuffe, welche auf der Grenze von Muschelkalk und Buehensteiner Schichten stehen, besitzen nur ganz beschränkte Ausdehnung. Wie die fast überall beobachtete Schichtungslosigkeit des Dolomites beweist, handelt es sich um Riffe, an deren Aufbau jedoch die Diploporen den Hauptantheil gehabt haben dürften. Oblitterirte Reste dieser Kalkalgen scheinen in den Karnischen Alpen häufiger zu sein als die oben erwähnten deutlicheren Vorkommen; Korallen wurden, wie erwähnt, nur ein einziges Mal nachgewiesen. In den Dolomiten der centralalpinen Triaszone sind ebenso wie in vielen Gebieten des nordalpinen Wettersteinkalkes nur Diploporen (mit Ausschluss der Korallen) als Gesteinsbildner bekannt geworden: man wird somit nicht fehlgehen, wenn man diesen gegen chemische Umwandlung wenig widerstandsfähigen Resten einen Hauptantheil am Aufbau der geschichteten und ungeschichteten Kalk-Dolomitmassen zuschreibt. Die Ansicht von MOJSEWICZ, der die Diploporen nur als Bewohner der Lagunen und Rifffkanäle ansehen will,¹⁾ dürfte somit kaum haltbar sein.

In eingehenderer Weise hat J. WALTHER in einer „die

¹⁾ Dolomitriffe S. 502.

Kalkalgen des Golfes von Neapel¹⁾ betitelten Studie die orogenetische Wichtigkeit der kalkbildenden Algen betont. Der Verfasser geht von der im Dachsteinkalk gemachten Beobachtung aus, dass Bänke, die er als detritogen, psammogen und koralligen bezeichnet, mit einander wechseln; des weiteren finden sich Kalke ohne organische Structur („structurlos“ bei WALTHER). Auch in dem tieferen Kalkhorizonte der Trias (Wettersteinkalk und Schlierndolomit) herrschen ungefähr die gleichen Verhältnisse; nur wiegen hier die „structurlosen“ Kalke und Dolomite bei Weitem vor.

J. WALTHER hat nun in Italien an recenten und jungtertiären Kalken beobachtet, dass die den detritogenen Lagern eingeschalteten Lithothamnienbänke anorganische Structur annehmen und folgert daraus, dass auch die „dichten Bänke des Dachsteinkalkes aus Lithothamnien ähnlichen Kalkalgen entstanden seien.“ Nun sind aber triadische Lithothamnien zur Zeit der Abfassung von WALTHER'S Arbeit überhaupt unbekannt gewesen und auch seitdem nur in ganz vereinzelt Funden bekannt geworden, deren Richtigkeit z. Th. noch näherer Prüfung bedarf. Man könnte nun an Stelle der Lithothamnien ähnlichen Kalkalgen die Diploporen einsetzen. (Diese Verschiedenheit ist keineswegs unerheblich, da die einen zur Ordnung der Florideen, die anderen zu der der Siphoneen gehören und etwa ebenso grosse Verschiedenheiten der Structur aufweisen, wie Korallen und Hydraetinen.)

Aber selbst wenn wir den Diploporendolomit der östlichen Karnischen Alpen und den koralligen Schlierndolomit einerseits, den „structurlosen“ Dachsteinkalk und Hochgebirgskorallenkalk andererseits als analog gebildete Gebirgsglieder verschiedener Alterstellung auffassen wollten, so würden dem erhebliche, besonders von A. BITTNER²⁾ hervorgehobene Einwände entgegenstehen. Noch weniger gelingt es auf diesem Wege, eine Vorstellung von der Bildungsart des Hauptdolomits zu bekommen. Denn während der Karnische Dolomit und der Wettersteinkalk durch selteneres oder häufigeres Vorkommen

¹⁾ Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft 1885, S. 229 bis 257.

²⁾ Verhandl. d. geol. R.-A. 1885, S. 286 ff.

von Diploporen einen Hinweis auf die Entstehung geben, ist der Hauptdolomit in dem vorliegenden Gebiete (Comelico, Reisskofel, nördl. Gitschthaler Berge) wie auch sonst im Allgemeinen fast fossilleer. Die Abwesenheit klastischer Bestandtheile macht die Theilnahme von Organismen an der Gesteinsbildung wahrscheinlich; geht doch nach STEINMANN die Entstehung strueturloser Kalke im Meere dureh Vermittelung von Eiweissverbindungen und schwefelsaurem Kalk unangesezt vor sich. Jedoch sind wir betrefis der Beschaffenheit der Organismen, welche bei der Entstehung des Hauptdolomits mitgewirkt haben, im Wesentlichen auf Vermuthungen angewiesen.

Um so mehr muss angesichts mancher (allerdings meist mündlich geänsserter) Zweifel über die Entstehung von Schlerndolomit und Hoehgebirgskorallenkalk darauf hingewiesen werden, dass der Uebergang von organisch struirtem Kalk zu krystallinem Gestein nicht nur wahrscheinlich, sondern in allen einzelnen Stadien nachweisbar ist. Bekanntlich erhält sich die innere Structur fossiler Korallen am besten in Mergelschichten, deren Wasserdurchlässigkeit einer chemischen Umsetzung weniger günstig ist, als der von Klüften durehzogene und an und für sich im Wasser lösliche Kalk.

Die besten bekannten Fundorte fossiler Korallen, Gotland, die Eifler Devonschichten, die Gosau und das Vicentiner Tertiär liegen sämmtlich in derartigen Bildungen; die Erhaltung ist im Allgemeinen um so besser, je kalkärmer und thonreicher das Gestein ist.

Für die Beobachtung des Ueberganges von organischer Structur zu krystallinem Kalk sind die Riffsteine (Cipitkalke) am meisten geeignet, welche die am Fusse des Riffes angehäuft und ganz oder theilweise in Mergel eingehüllten Gerölle darstellen. An einem der berühmtesten, häufig beschriebenen Vorkommen, dem Riehthofen-Riff zwischen St. Cassian und Cortina d'Ampeza konnte ich auf der Forella di Set Sass, also auf der oberen der beiden in das Riff eingreifenden Mergelzungen die nachfolgenden Beobachtungen machen: Die vollkommen in den versteinungsreichen Mergel eingebetteten Bruchstücke einer häufigen *Thecosmilia* zeigen im Dünnschliffe auch bei starker Vergrößerung alle Einzel-

heiten der inneren Structur in vorzüglichster Weise. In einigen grösseren, mehr in der Nähe des Set Sass-Riffes gesammelten Stücken, ist die organische Structur theilweise obliterirt; doch kann an den hie und da erhaltenen Septen der Speciescharakter noch deutlich festgestellt werden. Bei einer weiteren Gruppe von Stücken ist die äussere Form der Koralle deutlich erkennbar, die Structur des Skeletts jedoch vollkommen verwischt und endlich beobachtete ich theils im unmittelbaren Zusammenhang mit den letzteren Gebilden, theils in der Wand des Set Sass die bekannten verzweigten Systeme von cylindrischen Hohlräumen, welche auch am Schlern die letzte Andeutung des fortgeführten Korallengestütes darstellen. Die Höhlungen sind hier wie überall mit kleinen Dolomitspathkrystallen bedeckt. Wenn man sich vorstellt, dass die Löcher endlich ganz mit Dolomitsubstanz ausgefüllt werden, so haben wir das am häufigsten auftretende Endproduct des ganzen Vorganges¹⁾, den massigen Schlerndolomit. Es bedarf keines besonderen Hinweises, dass in den triadischen wie in den recenten Riffen der die Lücken ausfüllende Korallensand in umkrystallisirtem Zustande von den ungeänderten Korallenstücken nicht zu unterscheiden ist.

Selbstverständlich erfolgt die Umwandlung der Korallenstructur in fossilen Riffen nicht immer in gleicher Weise. Für die Trias wie für die älteren Formationen scheint der Satz allgemeine Gültigkeit zu besitzen, dass im Dolomit die chemische Umsetzung viel gründlicher vor sich geht als im Kalk. Es ist mir z. B. niemals gelungen, aus den Eifeler Stringocephalus-Dolomiten ein Stück mit bestimmbarer Korallenstructur zu gewinnen, während in dem oberdevonischen Riffkalke des Iberges ziemlich erfolgreiche Untersuchungen von Dünnschliffen ausgeführt werden konnten.

In analoger Weise enthält auch der dem höheren Kalkhorizont (IV vgl. oben) angehörende Salzburger Hochgebirgskorallenkalk an zahlreichen Punkten Korallenreste von einigermassen bestimmbarer Form, während im eigentlichen Schlerndolomit kaum noch Spuren erhalten sind. So lassen

¹⁾ Die einzelnen Umwandlungsproducte gedenke ich in anderem Zusammenhange abbilden zu lassen.

sich am Hohen Göll (Berehtesgaden) und am Grossen Donnerkogel (Gosan) überall Reste von Korallen erkennen und eine Anzahl von Arten konnte mit grösserer oder geringerer Sicherheit bestimmt werden.¹⁾

a. Die Buehensteiner Schichten.

Die mergelig-tuffigen Aequivalente des Schlern-dolomites fehlen im Gebiete der Karnischen Hauptkette so gut wie ganz und besitzen im Norden eine höchst geringfügige, im Süden eine grössere Verbreitung. Die einzigen hierher gehörigen Bildungen der Hauptkette sind ausser den zweifelhaften mergeligen Bildungen die grünen mit dem Quarzporphyr in Zusammenhang stehenden Tuffe des Massessnik bei Malborget und der Thörlscharte am Gartnerkofel.

Am Massessnik oberhalb von Malborget bilden die Tuffe eine von Schlerndolomit allseitig umgebene Aufwulstung; man beobachtet von SW nach NO die folgenden Gesteine:

1. Weissen Schlerndolomit.
2. Grünen Porphyrtuff mit Geröllen von rothem Raibler Quarzporphyr.
3. In Wechsellagerung mit dem Tuff erscheint glimmerhaltiger, bröcklicher Sandstein, meist roth, seltener grünlich oder dunkel gefärbt.
4. Grünen Porphyrtuff in massigen Bänken.
5. Schwarzer Plattenkalk (Guttensteiner Kalk).
6. Schlerndolomit, von Porphyrgeröll überschottet; auf ersterem steht das Massessnikhaus (1415 m).

Dem Buehensteiner Horizont dürften ferner die grauen wohlgeschichteten Kalke entsprechen, welche am Nordabhang des Gartnerkofels zwischen dem bunten Kalkeonglomerat und dem weissen Diploporendolomit liegen.

Im südlichen Gebirge sind die licht- bis dunkelgrauen kieselreichen Buehensteiner Kalke mit Hornsteinen und den eingelagerten Bänken des grünen Tuffes (Pictra Verde) besonders bei Bladen verbreitet. Der Weg, welcher von diesem Orte am Zützbach (Torrente Sesis) zum Bladener Joeh emporführt,

¹⁾ Vgl. Palaeontogr. Bd. 37, S. 109; der Hoehgebirgskorallenkalk ist hier weniger zutreffend als Hauptdolomit bezeichnet.

bleibt lange in diesem Horizonte. Bei Bladen finden sich nach HARADA Daonellen (wahrscheinlich *Daonella Taramelli* MOSS.). In der Schichtenfolge, welche man an der Strasse Raibl—Tarvis beobachtet, entsprechen die bekannten „Doleritischen Tuffe von Kaltwasser,“ d. h. ein Complex von Schiefen, Sandsteinen, Tuffen und Conglomeraten dem oberen Mnschelkalk und dem Buchensteiner Horizont. Der oberen Abtheilung der Tuffe ist ein Lager von rothem Quarzporphyr eingeschaltet. Die Aehnlichkeit mit dem Vorkommen der Thörlscharte (vgl. oben) ist bemerkenswerth.

Weiter im Osten, in den Karawanken ist der Buchensteiner Horizont fast nur durch Dolomit und Kalk vertreten. Doch erwähnt F. TELLER,¹⁾ dass in den Saunthaler Alpen südlich vom Oistrizza im Liegenden der versteinerungsreichen Wengener Schichten ein Wechsel von plattigen bituminösen Hornsteinkalken, schieferig-mergeligen Gesteinslagen und Pietra-Verde-Bänken zu beobachten sei. Versteinerungen fehlen; jedoch ist die petrographische Uebereinstimmung dieses im Osten sonst nicht wieder gefundenen Gesteines mit den Buchensteiner Schichten bemerkenswerth.

b. Die Wengener Schichten.

Die Wengener Schichten besitzen eine ähnliche Verbreitung wie die Buchensteiner. Doch sind die kalkig-mergeligen und thonig-sandigen Glieder der Schichtfolge noch weit im Osten nachgewiesen. Das Verhältniss dieser das Riff umgebenden Schichten zu den dolomitisch-kalkigen Korallenbildungen ist am besten am Monte Clapsavon in Tirol zu beobachten;²⁾ hier umgeben rothe Kalke mit Cephalopoden sowie Sandsteine und Schiefer mit *Daonella Lomeli* ein altes Riff auf drei Seiten, und in den zum Tagliamentothal hinabtanchenden Gebirgslehnen sind Korallen- und Cidaritenkalke als Ausläufer des Rifles eingeschaltet. Die hier vorkommenden, zu *Trachyceras*, *Arcestes*, *Procladiscites*, *Megaphyllites*, *Monophyllites*, *Meekoceras* und *Gymnites* gehörenden Ammoniten sind von MOJŠISOVIČS beschrieben worden.

¹⁾ Verhandl. d. geol. R.-A. 1885, S. 357.

²⁾ Ibid. 1880, S. 221.

In den Julischen Alpen ist der Wengener Horizont nur in der Dolomitfacies vertreten; die früher hierher gerechneten Raibler Fischschiefer gehören der Cassianer Zone an.

Ans dem Osten, ans der Gegend von Cilli in Südsteiermark erwähnt jedoch TELLER ¹⁾ in den „Pseudogailthaler Schiefer“ das Vorkommen von typischen Wengener Versteinerungen wie *Daonella Louucli* WISSM. sp. und *Trachyceras Julium* MOJS. Erst darüber folgen die kalkig-dolomitischen Bildungen. Auch in den Sannthaler Alpen besitzen nach demselben Forscher ²⁾ die stark bituminösen, bräunlich-schwarzen Kalkbänke des Wengener Horizontes bedeutende Verhretung. Dieselben trennen hier — ähnlich wie anderwärts die Carditaschichten — eine obere von einer nütteren Kalk-Dolomitmasse. Die letztere entspricht dem Muschelkalk und z. Th. den Buchensteinerschichten, die obere der Cassianer Stufe. Der Versteinerungsfundort, welcher die palaeontologischen Grundlagen für die Altersdentung lieferte, liegt zwischen Oistrizza und Versiè und enthält

Trachyceras Archelaus LBE.

Monoophyllites wengensis (KLIPST.) MOJS.

Lobites n. sp.

Cheunitzia cf. *longissima* MSTR.

Daonella Louucli WISSM. sp.

Posidonia wengensis WISSM.

Perna (*Odontoperna*) *Bouéi* v. HAU.

Voltzia Fötterlei STUR.

Cassianer Schichten in mergeliger Facies fehlen in der Karnischen Hauptkette sowie im Osten derselben. Im Norden dürfte der schwarze „Raibler Fischschiefer“ (vgl. oben S. 149, 150 und das Profil) am Weissensee wohl als ungefähres Aequivalent der Cassianer Schichten angesehen werden können. Auf der Karte ist derselbe irrtümlich als zu den Buchensteinerschichten gehörig angegehen worden. Diese Angabe konnte leider nicht mehr berichtigt werden.

In den Nordalpen bilden die Partnachschichten das in der Mergelfacies entwickelte Aequivalent der drei soeben besprochenen südalpiner Horizonte.

¹⁾ Verhandl. d. geol. R.-A. 1885, S. 319.

²⁾ Ibid. 1885, S. 356 ff.

Als Partnachschichten sind ursprünglich von GÜMBEL bekanntlich alle in der Partnachschlucht vorhandenen, vom oberen Muschelkalk (s. str.) bis zum Hauptdolomit (excl.) hinauf reichenden Bildungen bezeichnet worden. Den obersten Theil derselben bilden also die Aequivalente der Carditaschichten. In den Partnachschichten der typischen Localität wies STUR schon 1865 die pflanzenführende Facies des Raibler Horizontes, den Lanzer Sandstein nach; auch nach der neueren Arbeit von SKUPHOS liegen die pflanzenführenden Sandsteine nur in dem jüngeren Niveau.

Es ergab sich somit die Nothwendigkeit, den Begriff der Partnachschichten, wenn derselbe überhaupt erhalten bleiben sollte, enger zu fassen. ROTHPLETZ bezeichnete diesen unteren Complex als Cassianer Schichten, E. FRAAS (im Wendelsteingebiete) als Cassianer oder Partnachschichten, während SKUPHOS den Namen Partnachschichten annimmt, der also nur dem unteren Theile der früheren Partnachschichten GÜMBELS entspricht.¹⁾ Die Bezeichnung Partnachschichten ist dem Namen „Cassianer Schichten der Bayerischen Alpen“ schon deshalb vorzuziehen, weil dieselben ja, abgesehen von dem letztgenannten Südtiroler Horizonte, auch noch den Buchensteiner und Wengener Schichten aequivalent sein müssen. Der im Liegenden der Partnach- und Buchensteiner Schichten folgende Horizont des oberen Muschelkalkes mit *Ceratites trinodosus* ist in den nördlichen und südlichen Kalkalpen gleichmässig entwickelt. Ein den Partnachschichten des Wendelstein analoges Brachiopodenniveau mit *Koninckina Leonhardi* WISSM. sp., *triadica* BITTNER., *Spiriferina Fruasi* BITTNER. u. a. hat BITTNER neuerdings im Ennsthale nachgewiesen.²⁾ Die Fauna der nordalpinen Partnach- („Cassian-“) Schichten besteht wesentlich aus Brachiopoden, unter denen sich einige bekannte Cassianer Arten wie *Koninckina Leonhardi* und *Spirigera indistincta* neben ganz eigenthümlichen Formen befanden; gerade der beste Kenner der Triasbrachiopoden weist in dem grossen diesen

¹⁾ Vergl. A. BITTNER, Verhandl. d. geol. R.-A. 1892, S. 307 (Referat über SKUPHOS, die stratigraphische Stellung der Partnachschichten etc. Geognostische Jahreshefte d. Kgl. bayer. Oberbergamtes IV. 1891).

²⁾ Verhandl. 1892. S. 302.

Gegenstand behandelnden Werke darauf hin,¹⁾ dass die fraglichen Schichten ein tieferes Niveau einnähmen als die Cassianer.

6. Die Raibler Schichten.

Für die Vertheilung der Organismen innerhalb der Raibler Schichten bildet die Karnische Hauptkette eine wichtige Grenze. Jedoch kann ein Eingehen auf diese palaeogeographischen Verhältnisse nur auf Grund einer eingehenderen Kenntniss der Zonengliederung des in Frage kommenden Horizontes erfolgen.

Durch die Untersuchungen v. WÖHRMANN's ist nachgewiesen, dass in den Nordalpen der untere Theil (1), des bis dahin als Carditaschichten bezeichneten Gebirgsgliedes nur Cassianer Versteinerungen enthält (u. a. *Macrodon strigillatus*, *Opis Hoeninghausi*, zahlreiche Cidariten) und somit diesem Horizonte (Zone des *Trachyceras Aon. Mojs.*) entspricht.

2a. Darüber folgen ziemlich mächtige versteinungsleere Kalke und dann

2b. die eigentlichen Carditaschichten²⁾ mit *Carnites floridus* und einer Fanna, welche viele Aehnlichkeit mit den facieell etwas abweichenden Schichten des Schlernplateaus besitzt.

3. Noch höhere Bänke mit *Ostrea montis Caprilis* und *Pecten filiosus* (ohne *Cardita Gümbeli*) sind dem Horizonte

¹⁾ A. BITTKER, Brachiopoden der alpinen Trias S. 152 u. 157.

²⁾ v. WÖHRMANN benennt die drei von ihm unterschiedenen Horizonte 1. Carditaschichten mit Cassianer Fauna, 2. Carditaschichten mit Schlernfauna, 3. Torerschichten. Da sich gegen die Deutung von 1. wenig einwenden lässt, halte ich auch die Bezeichnung Cassianer Schichten für nothwendig, da anderenfalls das Vorhandensein von zweierlei Carditaschichten stets Verwirrung anrichten würde. Man würde in letzterem Falle zu sehr an die „oberen“ und „unteren“ Carditaschichten PICHLER's erinnert werden, deren endgiltige Beseitigung doch gerade ein Hauptverdienst der Arbeit v. WÖHRMANN's ist. Auch lassen sich gegen die Bezeichnung „Carditaschichten mit Schlernfauna“ sachliche Bedenken geltend machen. Fehlt doch *Carnites floridus*, das hezeichnende Leitfossil der in Rede stehenden Nordtiroler Schichten am Schlern, während hezeichnende Schlernformen, *Myophoria Kiefersteini*, *Trigonodus*, *Pachycardia*, *Pecten Deeckei* und die zahlreichen Schnecken, vor allem *Pustularia alpina* EICHW. („*Chemnitzia*“) in den Nordalpen nicht vorkommen.

des Torer Sattels (= Opponitzer Kalk in Niederösterreich) gleichzustellen. In Raibl selbst entspricht der grössere Theil der mächtigen Schichtenfolge von Dolomiten, Fischschiefeln und Mergeln, welche man beim Anstieg vom Kunzengraben zum Torer Sattel übersteigt, den Cassianer (Fischschiefer) und dem tieferen Theile der Raibler Schichten (1 und 2). Eine scharfe Scheidung der einzelnen Zweischalerbänke in Zonen, welche an Kenntlichkeit etwa mit den Ammonitenzonen wett-eifern könnten, ist, wie schon oft hervorgehoben ist, nicht möglich. Die Faciesentwicklung bedingt grössere Aehnlichkeit als die Altersunterschiede¹⁾.

Die Dreitheilung der bisher im Norden unter dem gemeinsamen Namen „Carditasehichten“ zusammengefassten Gebilde stimmt auf das beste überein mit der schon vor Jahren von E. SUSS bei Raibl selbst aufgestellten Gliederung. Derselbe unterscheidet²⁾ (die Zahlen sind dieselben wie oben):

1. Untere Gruppe: Fischführende Schiefer bis zu den tanben Schiefeln; dazwischen Korallenbänke (Cassianer Schichten, Zone des *Trachyceras Aon*).

2. Mittlere Gruppe: Raibler Schichten im engeren Sinne, Schichten mit *Myophoria Keferstrini* und *Solen caudatus*. Darüber Lage mit *Joannites Joannis Austriae*, *Pinna* und *Spiriferina Lipoldi*, zu oberst Bänke mit *Megalodon carinatus* (= Bleiberger Schichten und Sehlernplateausehichten = Carditasehichten (2) s. str.).

3. Obere Gruppe: Torer Schichten. Hauptlager von *Astartopsis* („*Corbula*“) *Rosthorni*, *Myophoria Whateleyae*, *Odontoperno Bonci*, *Ostrea montis caprilis*, *Pecten filus* (= Opponitzer Kalke).

Da v. WÖHRMANN die Schichtenfolge bei Raibl nicht aus eigener Anschauung kennt, so ist die Uebereinstimmung um so erfreulicher. Die Darstellung DIENER's, welcher mehr den

¹⁾ Die vereinzelt Ammoniten, welche sich in den Torer Schichten gefunden haben, *Arcetes Gaytani* und *Joannites cymbiformis* sind ebenfalls nicht absolut bezeichnend, da dieselben schon in den echten Cassianer Schichten (1. oben) vorkommen und somit die letzteren mit den höheren Horizonten verbinden. BITTNER, Verh. d. geol. R.-A. 1885, S. 65.

²⁾ Jahrb. d. geol. R.-A. 1867, S. 579. Vgl. auch A. BITTNER, Verh. d. geol. R.-A. 1885, S. 59.

mannigfachen Facieswechsel zwischen Fischschiefer, Zweischalerbänken und Korallenriffdolomit betont, widerspricht dieser Vergleichung nicht, da derselbe auf die Vertheilung der einzelnen Arten wenig Rücksicht nimmt. Doch ist jedenfalls soviel sicher, dass angesichts der wechsellvollen heteropen Erscheinungen die Feststellung der Zonengrenzen und die obigen Vergleichungen der einzelnen Horizonte nur im Allgemeinen zutreffend sein können.

Die Raibler Schichten des nördlichen Gailthaler Gebirges sind wenig mächtig, meist versteinungsarm und entsprechen wohl zweifellos den nordalpinen Carditasechichten s. str. (2), den „Carditasechichten mit Schlernfauna“ bei v. WÖHRMANN. Abgesehen von den altbekannten schwarzen Schiefen mit *Carnites floridus*, welche das Hangende des Bleiberger erzführenden Kalkes bilden, finden wir grünliche oder rüthliche Glimmersandsteine, wohlgeschichtete Mergel und oolithe Kalkmergel mit Zweischalern und Brachiopoden. E. SUSS führt *Cardita* aus der Gegend des Weissensees, E. TOULA Linnachellen mit *Corbis Mellinji* v. HAU. und *Myophoria Whateleyae* v. B. von einem Fundorte zwischen Mittenwalde und Bleiberg an. Das Dellaacher Vorkommen von *Terebratula* und *Spiriferina Lipoldi* BITT. (= *gregaria* auct.), einer Leitform der nordalpinen Carditasechichten wurde schon oben (S. 145) erwähnt.

Der Gegensatz von nordalpiner und südalpiner Entwicklung der Raibler Schichten setzt weiter nach Osten fort. Wie F. TELLER¹⁾ anführt, sind in dem nördlichen der beiden Aeste des an der Nordabdachung des Loibl sich spaltenden Triasgebietes der Karawanken, im Gerloutz, Setièe, Obir und Petzen, die Raibler Schichten nur in der nordalpinen Entwicklung der Carditasechichten bekannt.

Wie in dem nördlichen Gailthaler Gebirge treten auch hier dunkle Mergelthonschiefer mit *Halobia rugosa* und *Carnites floridus*, Kalke und Oolithe mit *Cardita Gumbeli*, *Corbis Mellinji* und *Spiriferina Lipoldi* auf. Im südlichen Aeste, am Ostabhang der Kosehntta findet sich der gleiche Horizont in der bei Raibl selbst vorherrschenden Mergel-

¹⁾ Verhandl. d. geol. R.-A. 1887, Nr. 14.

schieferentwicklung. An keinem anderen Punkte der Alpen sind die beiden petrographisch und faunistisch verschiedenen Facies des in Rede stehenden Horizontes so nahe gerückt, wie hier. Zwischen dem südlichsten Vorkommen des Schiefers mit *Halobia rugosa* am Hochobir und den Raibler Mergeln am Potok (Kosehutta) liegt, in der Richtung des Meridians gemessen, ein Abstand von nur 3,5 km.

Auch in den tieferen Triashorizonten bereiten gewisse Faciesverschiedenheiten die Herausbildung grösserer Unterschiede vor. Der mit den Carditasehichten eng verknüpften Facies des erzführenden Kalkes mit seiner reichen Gastropodenfauna (Fladung, Unterpetzen) steht im Süden, in der Kosehutta eine einförmige Dolomitentwicklung (Schlerndolomit) gegenüber. Auch TELLER sieht somit die Annahme getrennter Bildungsräume für die Ablagerungen des nördlichen und südlichen Zuges der Karawanken als wahrscheinlich an. „Die Annahme, dass der heute an parallelen Längsbrüchen tief eingesunkene Streifen altkrystalliner Schiefer- und Massengesteine einstmals als Inselgebirge emporragte, liegt nicht ausserhalb des Bereiches zulässiger geologischer Hypothesen“.

Eine fast vollständige Uebersicht der Fauna des Raibler Horizontes im Norden und Süden ist durch die vor Kurzem erschienenen Monographien von v. WÖHRMANN, KOKEN und PARONA ermöglicht. Die geologische Vergleichung lehrt, dass abgesehen von den eigenartigen, durch reiche Entwicklung der Gastropoden und vollkommenes Fehlen der Brachiopoden ausgezeichneten Schlernplatean mergeln die facielle Entwicklung der Schichten im Norden und Süden die gleiche ist. Die vorherrschenden Zweischalermergel werden hier wie dort durch Bänke mit Landpflanzen (Lunzer Sandstein, Voltzia-Schiefer bei Raibl) und reine versteinungsleere Kalke unterbrochen. Die wesentlichen Verschiedenheiten, welche die Gattungen und die vorherrschenden Arten aufweisen, sind also durch geographische Trennung der Meere zu erklären. Für die nördlichen Carditasehichten sind bezeichnend in erster Reihe die Leitformen *Cardita Giombeli*, *Cardites floridus*, *Halobia rugosa* sowie ferner *Dinnyodon intusstriatus* und *Sageceras*. Reicher an eigentümlichen Formen sind die südlichen Raibler Schichten infolge der mannig-

faltigeren Faciesentwicklung. Von eigentümlichen Leitformen sind zu nennen *Myophoria Kefersteini* und *Pachycardia Haueri*, sowie ferner die Gattungen *Trigonodus*, *Modiola*, *Myoconcha*, *Pustularia* (die riesige „*Chemnitzia*“ *alpina* ERCHW. vom Schlern), *Pseudofossarus*, *Neritaria*, *Hologyra*, *Platyhelina*, *Angularia*, *Undularia*, *Hypsipleura*, *Zygopleura*, *Katosira*. Von einer eingehenderen Vergleichung der Fischfauna kann abgesehen werden, da die Unterschiede auf physikalische Verhältnisse zurückzuführen sind. Die Fische des Raibler Schiefers gehören zu rein marinen Gattungen, während die aus den Nordalpen beschriebene Gattung *Ceratodus* wohl schon damals auf süsse oder brackische Gewässer beschränkt war.

Weniger einfach ist die Frage nach der Lage und Erstreckung des trennenden Inselgebirges zu beantworten. Dass die alte palaeozoisch-krystalline Kette der Karnischen Alpen und Karawanken in erster Linie in Frage kommt, wurde schon oben erwähnt. Eine Fortsetzung dieser Insel nach Westen bis etwa zur Judicarienlinie ist aus tektonischen Gründen wahrscheinlich (vergl. den folgenden Theil). Doch kann anderseits diese Insel der obercarbonischen Zeit nicht als Denudationsrest des carbonischen Hochgebirges aufgefasst werden. Die Transgression der Grüdener Schichten, welche nicht in der offenen See sondern in einem Binnenmeere abgelagert wurden, überflutete bereits die alte Karnische Kette. Dann fand allerdings der locale von Süden her erfolgende Einbruch eines oberpermischen Meeres (Bellerophon-schichten) hier sein Ende. Doch ist dies ein Ereigniss von localer Bedeutung, da der Bellerophonkalk nicht nur im Norden sondern auch im Osten, in den Karawanken zu fehlen scheint.

Während der Bildung des alpinen Buntsandsteins und Muschelkalkes sind einzelne Faciesbildungen, wie die bunten Kalkeonglomerate (Süd) oder die rothen Ammonitenkalke (Nord, z. B. Schreyeralp), auf bestimmte Gegenden beschränkt; aber die Verbreitung der vorherrschenden Gattungen und Arten ist eine allgemeine. Man darf also weder an ein Fortbestehen der Karnischen Hauptkette noch — im Sinne älterer Anschauungen — an ein centralalpines Inselgebirge denken. Im Engadin und im Ortlergebiet sind Werfener Schichten und Gnttensteiner Kalke vorhanden; weiter im Osten, von den Oetzthaler Alpen

an, sind dieselben zwar nicht mehr mit Sicherheit nachgewiesen; jedoch sprechen keiuerelei thiergeographische Erwägungen für eine Trennung der alten Meere.

Während der Bildungszeit der Buchensteiner, Wengener und Cassianer Schichten entwickelten sich die Ablagerungen im heutigen Südtirol infolge der gleichzeitigen Bildung von Korallenriffen und submarinen Eruptivlagern so eigentümlich, dass ein Vergleich mit den einförmigen Mergeln und Wettersteinkalken der Nordalpen nur annähernd möglich ist. Erwägt man jedoch die Schwierigkeiten, welche die Vergleichung der vor Kurzem entdeckten Brachiopodenfauna der Partnachschichten (sog. „Cassianerschichten“) mit den wohlbekannten südalpinen Horizonten macht, so erscheint die Annahme einer, den Norden und Süden trennenden Schranke nicht fernliegend. Das vereinzelte Vorkommen von *Daonella Lomeli* (nach v. WÖHRMANN) und die ärmliche Fauna der „Carditaschichten mit Cassianer Versteinerungen“ sprechen jedenfalls nicht für eine ungehinderte Verbindung.

Während des Absatzes der Raibler Schichten bestand jedenfalls eine deutliche Schranke, ein Inselgebirge, das sich in der Richtung der alten carbonischen Alpen wohl durch „posthume Faltung“ neu aufgewölbt hatte. Dass diese Aufwölbung schon zur Zeit der Buchensteiner und Wengener Schichten begann, ist nach dem Vorhergehenden nicht undenkbar.

7. Der Hauptdolomit und das Rhact.

a. Die nördliche Entwicklung.

Im Hangenden der Raibler Schichten folgt die obere Karnische Stufe der älteren Nomenclatur, die Juvavische (v. MOJS, 1892) oder Norische (BITTNER, non MOJŠIČOVICS) der neueren. Die Faiesbildung des Hauptdolomites ist in den Nord- und Südalpen am meisten verbreitet und eignet sich demnach am besten zur vorläufigen Benennung des polyglotten Horizontes.

Der meist ungeschichtete Hauptdolomit besitzt im nördlichen Gailthaler Gebirge, also im Norden des Gitschthales, im Zuge des Reisskofels (hier in mehr kalkiger Ausbildung), ferner am

Schatzbühel und Eckenkofel grosse Verbreitung und würde auch kartographisch von den wie es scheint äquivalenten dunklen und hellen wohlgeschichteten Kalken nicht allzu schwierig zu trennen sein. Doch ist, wie erwähnt, die Untersuchung des nördlichen Gebietes nicht zum Abschluss gekommen.

Noch verbreiteter ist im nördlichen Gailthaler Gebirge ein schwarzer, mergeliger, z. Th. bituminöser, Hornstein führender Plattenkalk, der am normalsten am Gailbergsattel entwickelt ist und auf den älteren Karten als Guttensteiner Kalk figurirt. Bei dem Mangel an Versteinerungen war für diese Altersdeutung das unmittelbare Angrenzen an den Grödener Sandstein (prius Buntsandstein) massgebend. Die Feststellung der Bruchgrenze einerseits und der Carditaschichten andererseits bedingen eine abweichende Auffassung, welche durch das Vorkommen einiger Versteinerungen im Osten und Westen bestätigt wird. Aus dem Lienzer Gebirge citirt EMERICH DöNGER *industrialis*; ferner findet sich daselbst *Thecosmilia Omboni* STORP., eine Art des Lombardischen Rhaet. Am Fusse des Golz bei Hermagor sammelte ich *Megalodus Damesi* HOERN. (Materialien zu einer Monographie d. Gattung *Megalodon*: Denkschr. d. K. K. Akademie Wien. Bd. 42. T. V f. 3; die auffallend kleinen Exemplare stimmen im Umriss vollkommen mit der citirten Abbildung überein).

Die Plattenkalke mit ihren Einlagerungen von mergeligen oder sandigen Gesteinen und Rauchwacken nehmen, wie die beiden Profile des Gitschthaler Gebirges (oben S. 149 und 150) beweisen, eine etwas höhere Stellung als der Hauptdolomit ein und entsprechen der rhaetischen Stufe. Die Grenze beider ist keineswegs scharf, sondern wird z. B. am Müschacher Wipfel durch hellen wohlgeschichteten Kalk und Dolomit vermittelt. Die ungleiche Mächtigkeit, welche der Dolomit und der dunkle Plattenkalk im Zuge des Gebirges zwischen Gitschthal und Gailberg aufweisen, dürfte dadurch zu erklären sein, dass die über den Carditaschichten beginnende Dolomitentwicklung in dem einen Gebiete weiter hinaufreicht als in dem andern.

In der weiteren östlichen Fortsetzung der Karnischen Hauptkette, in den Ostkarawanken finden sich nach

TELLER¹⁾ am Fusse des Kleinen Obir und am Jögartkogel n. weit des Vellachdurchbruches Kalkschiefer und dunkle Mergelkalke mit bituminösen Zwischenlagen, welche mit den Gesteinen des Gailthaler Gebirges übereinstimmen und die Versteinerungen der Kössener Schichten an verschiedenen Fundpunkten enthalten. Von der Urtitsch-Hube (Kl. Obir) werden *Terebratula gregaria* SUESS, *Cardita austriaca* v. H., *Megalodus* sp. n. a. angeführt. An der Urieihmühle finden sich *Aricula contorta* PORTL., *Dimyodon intusstriatus* EMMER. sp., *Megalodus* sp. und *Terebratula gregaria*, am Jögartkogel *Modiola minuta* GF., *Anomia alpina* WINKL. und *Lithophagus faba* WINKL.

Die Bezeichnung Plattenkalk wurde im Vorstehenden in rein petrographischem Sinne für plattige, bituminöse, dunkle Kalke mit thonigen Zwischenlagen gebraucht, die Rhaetisches oder Oberkarnisches (Juvavisches v. MOJS.) Alter besitzen. E. SUESS bezeichnet bekanntlich den weissen, thonfreien Dachsteinkalk in toto als Plattenkalk, was nicht im Einklange mit der sonst üblichen Namensgebung steht und daher auch keine weitere Nachahmung gefunden hat.

Hingegen dürfte unsere Bezeichnung sich vollkommen oder fast vollkommen mit dem decken, was man in den bayerischen Alpen nach v. GÜMEL'S Vorgang als Plattenkalk bezeichnet. So schreibt v. AMMON:²⁾ „Die Plattenkalke in den westlichen und mittleren Theilen der bayerischen Alpen bestehen aus einem Complex von bituminösen, meist grauen Kalkbänken, welche nach unten in directem Zusammenhange mit dem Hauptdolomit stehen und von demselben in ihrer Hauptmasse nicht getrennt werden dürfen; die oberen, allerdings noch im Allgemeinen die gleiche petrographische Beschaffenheit zeigenden Lagen schliessen dagegen Versteinerungen ein, welche diese Region schon dem Rhaet einzuverleiben nöthigen.“ Den Hauptdolomit selbst trennt der genannte Forscher auf Grund der Untersuchung der Gastropoden vom Rhaet, womit die Ergebnisse der Korallenuntersuchung (Zlambachschichten — Kothalpschichten) gut übereinstimmen. Die Eigentümlichkeiten des Plattenkalkes der Gailthaler Alpen dürften darin bestehen,

¹⁾ Verhandl. d. geol. R.-A. 1858, Nr. 4.

²⁾ Die Gastropoden des Hauptdolomits und Plattenkalks der Alpen.

dass derselbe meist viel bedeutendere Mächtigkeit besitzt und sicher noch höhere, möglicherweise auch tiefere Horizonte umfasst als das gleichnamige Gebilde der bayerischen Alpen.

b. Die südliche Entwicklung.

Der Hauptunterschied, welchen die südliche Entwicklung der obersten Triashorizonte in Südtirol, in den Venetianer und Julischen Alpen sowie in Südsteiermark (Oberburg) aufweist, besteht in dem vollkommenen Fehlen der dunklen Plattenkalke und der Küssener Schichten. Die letzteren stellen sich erst weiter westlich in den lombardischen Alpen wieder ein, wo die Schichten von Azzarola eine mit den Mergeln der Kothalp am Wendelstein und den Voralpen bei Altenmarkt (Enns) vollkommen übereinstimmende Korallenfauna enthalten. Das Fehlen der rhaetischen Mergel ist kein scheinbares; denn überall erscheint in den vorstehend genannten Gebieten im Hangenden der wohlgeschichteten reinen Dachsteinkalke unmittelbar der Lias.

Wie in den Oesterreichischen Alpen ist auch im Süden ungeschichteter Riffdolomit (oder -Kalk) mit wohlgeschichteten Megalodonkalken eng verbunden.

Eigenartige Verhältnisse finden sich im Sextener Gebirge, im Comelico und in einzelnen Theilen der Julischen Alpen (Martulikgraben), wo die Raibler Schichten dolomitisch-kalkig ausgebildet sind und wo dann die Kalk-Dolomitentwicklung vom Schlerndolomit (Buchensteiner Horizont) durch die Karuische Stufe bis in das Rhaet hinaufreicht. So überlagert am Colle di Mezzo Giorno und am Monte Coruon südlich von Comelico inferiore der Hauptdolomit mit *Turbo solitarius* BEN. und *Megalodus Gumbeli* STOPP. unmittelbar ohne mergelige Zwischenlage den Schlerndolomit; ¹⁾ übereinstimmende Betrachtungen machte R. HOERNES am Zwölferkofel und Monte Giralba. Der Dachsteinkalk des Ampezzaner und Sextener Gebietes besteht an der Basis aus schwach dolomitischen Kalken, in seiner grössten Mächtigkeit aus ziemlich reinem rüthlichem Kalkstein und nur in seinen

¹⁾ HARADA, Jahrb. d. geol. R.-A. 1883, S. 172.

obersten Lagen unmittelbar unter den grauen Liaskalken aus stärker dolomitischem Gestein.¹⁾ In der Gegend des Antelao, im Val Oten, kommt in dem Dachsteinkalke ausser den vorherrschenden Megalodonten eine reiche Gastropodenfauna vor.²⁾

Die Faciesentwicklung der obersten Trias in den Julischen Alpen bildet in mancher Hinsicht ein Analogon zu der des Bereithesgadener und Hallstätter Gebietes. Neben den vorherrschenden wohlgeschichteten Massen des Karnischen und Rhätischen Dachsteinkalkes (vergl. die Abbildung S. 170 und 172) finden sich ungeschichtete korallogene Riffdolomite. Am Triglav³⁾ ist die Grenze des geschichteten Kalkes und des von Korallen erfüllten Riffdolomites besonders scharf. Im Hintergrunde des Martulikgrabens⁴⁾ zeigen die Korallenriffdolomite am Ferdame Palica und Spik deutliche Uebergangsschichtung und ziehen weiter bis zur Wochein und Assling an der Save. Die Karte von DIENER lässt das Gebiet des geschichteten und ungeschichteten Kalkes deutlich hervortreten.

Ob die geographische Trennung der nördlichen und südlichen Meere, welche zur Zeit der Raibler Schichten bestand, noch während der jüngsten Triaszeit angedanert hat, dürfte schwer zu entscheiden sein. Die Versteinerungsarmuth der meisten hierher gehörigen Bildungen gestattet keine endgiltige Lösung der Frage. Denn das Fehlen von Hallstätter Kalken im Süden kann ebenso wie die ungleiche Vertheilung der Küssener Schichten auf Faciesunterschiede zurückgeführt werden.

¹⁾ v. MOJŠISOVIČ, Dolomitriffe S. 284.

²⁾ L. c. S. 307.

³⁾ DIENER, Centralstock der Julischen Alpen, Jahrb. d. geol. R.-A. 1884, S. 691.

⁴⁾ *ibid.* S. 679.

C.

Der Gebirgsbau der Karnischen Alpen in seiner Bedeutung für die Tektonik.

Die Einzelheiten des geologischen Aufbaues der Karnischen Alpen sind im ersten Haupt-Abschnitte dargelegt worden. Im Folgenden soll der Versuch gemacht werden, die Grundzüge des tektonischen Aufbaues in grossen Zügen zu schildern und die einzelnen Phasen der Gebirgsbildung zu verfolgen. Die mannigfachen Thatsachen, welche die Untersuchung unseres verwickelten Gebietes enthüllt hat, bedingen ein weiteres Eingehen auf tektonische Fragen. Da die Alpen das bei weitem am besten gekannte Hochgebirge der Erde darstellen, so beanspruchen neue hier gemachte Erfahrungen stets allgemeinere Bedeutung.

I. (Kap. XIII) Die Erörterung einiger tektonischer Einzelfragen allgemeinen Inhalts (Klippen, Aufquetschungen, Grabenspalten u. s. w.) bildet den Inhalt des ersten Abschnittes. Es handelt sich gleichzeitig um Einführung einiger neuer Kunstdrücke¹⁾ zur Bezeichnung von Erscheinungen, deren Eigentümlichkeiten bisher noch nicht in genügender Weise klargelegt worden sind.

II. (Kap. XIV) In einem zweiten Abschnitte soll der Versuch gemacht werden, die verschiedenen Phasen der Gebirgsbildung in den Karnischen Alpen im Zusammenhang mit der Orogenie des gesammten Gebirges ein-

¹⁾ Vergleiche HEIM und MARGERIE, die Dislocationen der Erdrinde. Zürich 1888. WURSTER u. Comp.

heitlich darzustellen. Dieser Gegenstand ist kürzlich von DIENER im Anschluss an die Abhandlung über den Bau der Westalpen eingehend erörtert worden; jedoch machen neu gewonnene Erfahrungen hie und da Aenderungen und Erweiterungen notwendig.

III. (Kap. XV) Eine Darstellung der tektonischen Leitlinien der südlichen Ostalpen bildet den Inhalt des dritten Hauptabschnittes. Schon der Umstand, dass drei der wichtigsten Tiroler Bruchlinien, die Judicarien-, Villnösser- und Sngana-Linie in das Gebiet der Karnisehen Hauptkette fortsetzen, lassen ein Hinausgreifen über die Grenzen des engeren Untersuchungsgebietes gerechtfertigt erscheinen.

IV. Auf Grund der im Vorstehenden gewonnenen Anhaltspunkte soll der Versuch einer Erörterung der vielumstrittenen Frage gemacht werden, ob den „Senkungen“ oder den „Hebungen“ der Hauptantheil an den Dislocationen der Erdrinde gebühre. Nach der neueren von SUSS vertretene Anschauung ist die Wichtigkeit der ersteren Dislocationsform, nach der älteren, neuerdings von LAPPARENT verfochtene Theorie die der letzteren bei weitem überwiegend. Es dürfte der Nachweis möglich sein, dass auf beiden Seiten die Wichtigkeit des einen, allein zur Erklärung benutzten Factors überschätzt worden ist.

XIII. KAPITEL.

Tektonische Einzelfragen.

Trotz der merkwürdigen Verwickelungen, welche der Gebirgsbau der Karnischen Alpen zeigt, ist die Zahl der bisher noch nicht beschriebenen oder genauer begrenzten tektonischen Erscheinungen nicht sonderlich bedeutend. Dieselben sollen in der Reihenfolge des Buches von HEIM und de MARGERIE besprochen werden.

I. Grabenspalten.

(Man vergleiche HEIM und de MARGERIE, Dislocationen S. 36.)

Am Lanzenboden und an der Kleinen Kordinalp (S. 56 n. 57, Tafel III und Profil III S. 58) finden sich inmitten des von Brüchen durchsetzten Oberearbon versenkte schmale Streifen von Grödener Sandstein nebst untergeordneten Resten von Bellerophonkalk. Dieselben stellen eine eigenartige Ausbildungsform von tektonischen Gräben dar. Eine besondere Bezeichnung und Unterscheidung dürfte jedoch gerechtfertigt sein, weil die versenkten Schichten nicht, wie in einem normalen Graben flach liegen, sondern zusammengefaltet und zerquetscht sind (Tafel III, S. 56 links). Ferner sind diese schmalen Versenkungen in ganz bestimmter Weise unmittelbar von den grossen Längs- und Querbrüchen abhängig, welche das Gebirge durchsetzen. Die etwas breitere Scholle der Kleinen Kordinalp liegt an dem Hochwipfelbruch, ist also recht eigentlich in die Spalte zwischen Untersilur und Oberearbon eingebrochen. Die im Lanzenenthal von der Maldatschen Hütte bis zur Alp Pittstall ziehende, mit Grödener Sandstein angefüllte Graben-

spalte ist die geradlinige Fortsetzung des Rosskofellbruches, der seinerseits dem Lanzenbaebe folgt und nach zweimaligem („bajonettförmigen“) Umbiegen sich wieder mit der Grabenspalte vereinigt. Als eine Grabenspalte von einfacherer Zusammensetzung ist der schmale Streifen von Triaskalken anzusehen, der bei Laas und Kötsebach in den Grödener Sandstein bzw. in den letzteren und den Quarzphyllit eingebrochen ist. (Man vergleiche unten den Abschnitt 5d „Interferenzerscheinungen“.)

Als Grabenspalte ist auch die schmale aus Bellerophonkalk und untergeordnetem Grödener Sandstein bestehende Scholle an der Bordaglia-Alp zu bezeichnen (Abb. 45 u. 46 S. 105 u. 106). Dieselbe ist im Sinne der alten carbonischen Faltungsrichtung und anderseits in der Richtung des Villnösser Bruches eingebrochen und erscheint in sehr eigentümlicher Weise jederseits mit schmalen „Aufquetschungen“ von Untersilurschiefer combinirt. Dieser von Untersilur flankirte Einbruch permischen Gesteins in devonischen Riffkalk ist wohl die eigenartigste der „pathologischen“ Deformationen, welche das Karnische Gebirge erlitten hat.

2. Die „Aufpressungen“ von älteren plastischen Gesteinen in starren jüngeren Massen.

(Man vergleiche HEIM und de MARGERIE S. 66 „abgequetschter Gewölbkern“ und „Grabenhorst“ ex parte bei BITTNER.)

Während „Grabenspalten“ zu den seltenen tektonischen Erscheinungen gehören, sind die in der Ueberschrift bezeichneten Aufpressungen im Gebiete der Alpen häufig und u. a. von A. BITTNER und C. DIENER¹⁾ verschiedentlich erwähnt und richtig gedeutet worden. Jedoch hat die jedenfalls eigenartige Erscheinung, welche morphologisch gewissermassen eine

¹⁾ Jahrb. d. geol. R.-A. 1884, S. 692 sagt C. DIENER bei der Beschreibung eines Vorkommens von „gequältem“ Werfener Schiefer im Dachsteinkalk der Tose-Alp: „Die ganze Erscheinung macht vollständig den Eindruck, als sei durch das Absinken des Gebirges die weiche Unterlage der Werfener Schiefer an dem Bruchrande zwischen dem stehen gebliebenen und dem abgesunkenen Flügel emporgepresst und gequetscht worden, analog dem Haselgebirge in manchen Salzlagernstätten der Nordalpen“.

umgekehrte Grabenspalte darstellt, bei HEIM und MARGERIE keine Erwähnung und auch sonst wenig Beachtung gefunden. Der zunächst vergleichbare, l. e. S. 66 erwähnte „abgequetschte Gewölhekern“ von Gneiss im Jurakalk des Gstellihornes ist eine untergeordnete Nebenerscheinung, welche auftritt, wenn unter hochgesteigertem Gebirgsdruck zwei Gesteine von ähnlicher Härte mit einander verquetscht werden. Als Aufpressung bezeichne ich hingegen das in den Ostalpen nicht seltene Auftreten eines verhältnissmäßig schmalen Streifens von weichem Werfener Schiefer inmitten einer starren Masse von jüngerem Triaskalk.

Die Erscheinung wurde oben (S. 27—36 Taf. I und Abb. 11) als Einquetschung in Spalten des jüngeren auflagernden Gesteins gedeutet und kann der Natur der Sache nach sowohl in gebrochenem wie in gefaltetem Gebirge (Julische und Karnische Alpen) auftreten. Wie ausführlich dargelegt wurde, bilden die Aufpressungen auf dem Südabhange der östlichen Karnischen Hauptkette den hervorstechendsten tektonischen Charakterzug. Wo immer ein spaltenreiches starres Gestein von einer plastischen Masse unterlagert wird, hat die letztere sowohl bei faltenden aufwärts gerichteten, wie bei senkenden abwärts gerichteten Gebirgsbewegungen das Bestreben, intrusiv in die Spalten einzudringen.

Bei der Beschreibung und Abbildung des Profils im Torrennerthal (das ich auch aus eigener Anschauung kenne) schlägt BITTNER die Bezeichnungen „Grabenhorst“ bzw., „wenn man annehmen will, dass der Torrennerthalzug zwischen den fix verbliebenen beiderseitigen Gebirgsmassen gehoben worden sei“, „positiven oder gehobenen Graben“ vor.

Die langansgedehnten Aufbrüche von Werfener Schiefer inmitten von Dachsteinkalk oder Hauptdolomit, welche A. BITTNER¹⁾ wiederholt aus den Nordalpen beschrieben hat, liegen in gefaltetem Gebirge und sind den beobachteten kleinen Aufpressungen vergleichbar, zeigen aber andererseits nicht unwesentliche Verschiedenheiten. Wie BITTNER hervor-

¹⁾ Verhandl. d. geol. R.-A. 1884, S. 78. Jahrb. d. geol. R.-A. 1887, S. 415, 416. Verhandl. d. geol. R.-A. 1887, S. 97.

hebt ¹⁾ herrscht in den aussen gelegenen Theilen der nördlichen Kalkalpenzone ein sehr constantes Einfallen nach Süden resp. gegen die Centralzone hin; man nimmt somit als den wesentlichsten diesen Bau bedingenden Factor das Vorhandensein gesprengter liegender Falten, sowie Bildung von Uebersehiebungsf lächen an. Erst im innern Drittel des Gesamtprofils der Kalkalpenzone pflegt sich eine umgekehrte nördliche Einfallrichtung allgemein einzustellen. Die Scheidelinie der beiden Einfallrichtungen ist in der Störungsregion zu suchen, welche als Anbruchslinie Bueberg—Mariazell—Windischgarsten bezeichnet wird. In dieser Störungszone treten Werfener Schichten derart zu Tage, dass die von beiden Seiten nach Süden bzw. Norden einfallenden Trias- und Juraschichten unter die bei weitem älteren Bildungen einzufallen scheinen. Es ist diese Linie also kein einfacher Aufbruch, von dem die jüngeren Schichten allseitig abfallen müssten, sondern eine complicirte Zone grösster Störungen inmitten der Kalkalpen oder geradezu eine Zone der grössten Zertrümmerung des Kalkgebirges.

Abgesehen von der Grossartigkeit der Erscheinungen unterscheiden sich also die „Aufbrüche“ in den gefalteten Kalkalpen von den Aufpressungen im gebroehenen Gebirge durch das Einfallen der jüngeren Formation nach der Störungszone.

Ansser diesen grossartigen Aufbrüchen finden sich auch in dem gefalteten Gebirge der nördlichen Kalkalpen Aufpressungen älterer Gesteine, welche in Folge ihrer geringeren Grössenverhältnisse mit den aus den Südalpen beschriebenen Erscheinungen vollkommen übereinstimmen. So beschreibt BITTNER aus der Gegend von Guttenstein in Niederösterreich einen, in zahlreiche Querschollen zertheilten Streifen Guttensteiner Kalke, der rings von Hauptdolomit umgeben ist; die begrenzende Verschiebungsf läche erscheint bedeckt mit vertikalen Gleitspuren. In tektonischer Hinsicht erinnert unmittelbar an die Karnischen Alpen ein Zug von Lunzer Sandstein und Opponitzer Kalk (mit Versteinerungen der Carditasehichten), welcher ebenfalls in-

¹⁾ Verhandl. d. geol. R.-A. 1887, S. 97.

²⁾ Verhandl. d. geol. R.-A. 1892, S. 402.

mitten des Hauptdolomites gelegen und gelegentlich durch Querverwerfungen ans einander gerissen ist.

Auch an der Bordaglia-Alp ist, wie oben (S. 105) angedeutet wurde, der Gang der tektonischen Ereignisse wohl der gewesen, dass bei der carbonischen Faltung ein schmaler Streifen silurischen Schiefers in den devonischen Riffkalk angepresst wurde; bei der jüngeren Gebirgsbildung brach auf dieser nachgiebigen Unterlage der Bellerophonkalk ein.

Hingegen wird man am Südfalle der Karnischen Kette, in Bezug auf den zwischen Hoehwipfelbruch und Fella-Savebruch gelegenen Graben (S. 35) nicht von eigentlicher Faltung als der Hauptursache reden können. Allerdings sind an dem Hoehwipfelbrüche, der Silur und Trias trennt, die älteren Schichten emporgewölbt worden; jedoch fanden spätere Nachbrüche statt (vergl. unten 5a), und die südlichere Störungslinie, längs deren Werfener Schichten und Schlerndolomit aneinander grenzen, ist mit grösster Wahrscheinlichkeit als Senkungsbruch anzusehen. Die Deutung als Längsgraben wird im vorliegenden Falle auch durch den Umstand unterstützt, dass weiter westlich, von Lussnitz und Leopoldskirchen an, wo der Fellabruuch sich in eine Antiklinale verwandelt, die Anpressungen gänzlich fehlen.

Die Anpressungen bestehen aus Kohlenschiefer mit Fusnienkalk und haben dadurch Anlass zu der irrthümlichen Vorstellung gegeben, der Schlerndolomit sei palaeozoisch. Man findet ferner Grödener Sandstein, Werfener Schichten, Muschelkalkeonglomerat, Raibler Quarzporphyr und Tuff, vor allem jedoch die weichen plastischen Mergel-Plattenkalke des Muschelkalkes, welche in dem schönen Profil des Guggberges (Taf. III, S. 28) aufgeschlossen sind. Die härteren Gesteine wie Porphyr und Conglomerat sind nur in wenig angedehnten Fetzen beobachtet worden.

3. Tektonische Klippen.

Durch ULLIG ist in neuerer Zeit der Nachweis geführt worden, dass die von NEUMAYR versuchte Deutung der Karpathischen Juraklippen nicht den thatsächlichen Verhältnissen entspricht. Die Klippen sind nicht, wie NEUMAYR meint,

bei der Faltung als unachgiebige starre Massen durch die weichen Hüllschichten hindurch gestossen worden, sie stellen vielmehr die Ueberreste eines alten eretaceischen Gebirgsbogens dar, der von den Wogen des Flyschmeeres in einzelne Inseln und Klippen zerrissen wurde. Die heutige Form der Karpathenklippen ist also nicht auf tektonische sondern auf erosive Kräfte zurückzuführen. Für die Klippen von Hoch-Savoien hat D. HOLLANDE in neuerer Zeit den gleichen Nachweis erbracht.¹⁾

Trotzdem erscheint die Annahme, dass Schichten von wesentlich verschiedener Härte und Plasticität sich der Faltung gegenüber verschieden verhalten, so naheliegend, dass man fast a priori erwarten sollte, Klippen von der durch NEUMAYR geschilderten Zusammensetzung irgendwo zu finden. Diese tektonischen Klippen würden demnach auf dieselbe Grundursache zurück zu führen sein, wie die Aufpressungen. In dem einen Falle wird hartes unterlagerndes Gestein in weiche auflagernde Massen hineingetrieben, in dem anderen werden weiche, tiefliegende Schichten in die Spalten einer darüberliegenden starren Felsart angepresst.

In der That ist das oberdevonische Korallenriff des Iberges bei Grund (Harz), das rings von steil auferichteten Culmschichten umgeben ist, von jeher als starre, durch die auflagernden plastischen Schichten durchgestossene Masse angesehen worden. Der Umstand, dass die Culmschichten in der Nähe des Iberger Kalkriffes die normale Beschaffenheit zeigen und nicht, wie in den Karpathen, als Geröllmantel entwickelt sind, die Thatsache, dass kleine Fetzen von Culmschiefer sich in offenbar stark dislocirter Stellung auf der Oberfläche des Riffes finden, erheben die vorgeschlagene Deutung des Iberger Kalkes als „tektonische Klippe“ (im Sinne NEUMAYR'S) fast zur Gewissheit. Als wichtig ist auch der Umstand hervorzuheben, dass der ganze Iberger Kalkstock von zahlreichen Verwerfungen, Harnischen, Erzgängen und -Nestern durchsetzt ist.

Es sei endlich daran erinnert, dass BALTZER und HEIM die Lehre von dem ungleichen Verhalten verschiedenartiger

¹⁾ Bull. soc. géol. de France [3]. Bd. 17, S. 690—718. Vergl. N. J. 1892, I. S. 129.

Gesteine gegenüber dem Gebirgsdruck besonders entwickelt und Profile veröffentlicht haben, die bei fortschreitender Denudation Anlass zur Entstehung tektonischer Klippenformen geben könnten.

In unserem engeren Gebiete finden sich am Tischlwanger Kofel und Promoser Jüehl, im Val Grande und an der Croda Bianca isolirte Massen von Devonkalk inmitten des Culmschiefers, welche nur als tektonische Klippen gedeutet werden können. Die beiden aus Clymenienkalk bestehenden Klippen am Promoser Jüehl sind, wie die Abbildung 31 (S. 82) deutlich erkennen lässt, die Fortsetzung der Antiklinale des Tischlwanger Kofels und nur durch die in ungleichem Material verschiedenartig wirkende Faltung von diesem und unter sich getrennt. Noch deutlicher tritt der Zusammenhang mit einer Antiklinale in den beiden kleinen, in der Tiefe des Val Grande liegenden Kalkkeilen hervor (vgl. Abb. 32 und S. 84). Eine etwas abweichende tektonische Beschaffenheit besitzen hingegen die an der Croda Bianca vom Culmschiefer umschlossenen Klippen von devonischem Kalk, welche die Ueberreste einer auseinander gesprengten liegenden Falte darstellen (vergl. S. 108 u. 109 mit fünf Abbildungen).

An die tektonische Erscheinung von Harnischen, Reibungsbreccien, Erzvorkommen, welche die Grenze der Klippen kennzeichnen und in dem topographischen Theile eingehender beschrieben worden sind, sei hier nur kurz erinnert. Im Folgenden werden noch einmal übersichtlich die Unterschiede zusammengestellt, welche zwischen Klippen tektonischen und erosiven Ursprungs bestehen:

1. Der geologische Altersunterschied zwischen den Kalken der Klippe und den Hüllschiefern ist bei Gebilden erosiven Ursprungs meist bedeutend. Die savoischen und karpathischen Klippen gehören dem mittleren und oberen Jura, die Hüllschiefer der obersten Kreide oder dem Eocen an. Der Iberg bei Grund dagegen besteht aus unterem Oberdevon, der Hüllschiefer ist untercarbonisch. An den Klippen des Promoser Jüehl (Clymenienkalk—Culm) ist überhaupt kein Altersunterschied wahrnehmbar. Im Val Grande bestehen die Klippen aus oberem oder mittlerem Devon; an der Croda Bianca wird

das wahrscheinlich höhere Alter des Devonkalkes durch die horizontale Faltung erklärt.

2. Die Gesteinsgrenze ist bei Erosionsklippen durch einen Geröllmantel, bei tektonischen Klippen durch Reibungsbreccien, Harnische und Erzführung gekennzeichnet; letztere ist selbst dort vorhanden, wo keine stratigraphische Lücke zwischen den in Frage kommenden Formationen besteht (Promoser Jöchel). Der Erzbergbau hat am Iberg bei Grund wie bei Tischlwang in früheren Zeiten grosse Bedeutung besessen; auch auf der Nordseite des Tischlwanger Kofels finden sich an der Grenze von Clymenienkalk und Culm Spuren von Malachit und Kupferlasnr. die zu einem Versuchsstolln Anlass gegeben haben.

In der äusseren Erscheinung ähneln den tektonischen Klippen, die besonders im Westen der Hauptkette vorkommenden Kalkriffe der Königswand, Liköflwand und Porze. Jedoch ist der tektonische Vorgang genau umgekehrt. Während am Promosjöchel die härteren Kalke durch die weicheren Schiefer hindurch gestossen wurden, sind hier die ersteren in ihre Unterlage tief eingefaltet und später durch die Wirkung der Denudation wieder „herauspräparirt“ worden (vergl. oben S. 118—130 bes. Abb. 62. 63 u. Taf. XII).

4. Blattverschiebung.

(HEIM und de MARGERIE S. 75, Schiebungsflexur v. RICHTHOFEN, Führer für Forschungsreisende S. 608.)

Auf dem Nordabhange des Hohen Trich wurde in zwei saiger stehenden, von Schiefer eingeschlossenen Kalklagern eine bruchlose zweimalige Umknickung beobachtet. Die rothe Farbe und die Verwitterungsform des von schwarzem Schiefer umgebenen südlichen (breiteren) Kalkzuges lassen über die Richtigkeit der kartographischen Abgrenzung um so weniger einen Zweifel aufkommen, als gerade die wichtigsten Punkte waldfrei und nur von spärlichem Graswuchs bedeckt sind (vergl. oben S. 71 und die Karte). Ein weniger ausgeprägtes Vorkommen von stumpfwinkliger Umbiegung findet sich in der südöstlichen Fortsetzung des einen Kalkzuges an der Alp Peceol di Chial.

Dieser jedenfalls selten vorkommende Fall von bruchloser Umbiegung ist, wie mir scheint, in der Natur noch nicht beobachtet aber schon auf theoretischem Wege als wahrscheinlich angenommen und mit Namen belegt worden. v. RICHTHOFEN¹⁾ bezeichnet ihn als *Schiebungsflexur*, HEIM und MARGERIE als *Flexurblatt*. Bei dem Namen *Flexur* denkt man zunächst an die Tektonik der Plateaux des amerikanischen Westens, während wir in unserem Falle ein typisches Faltengebirge vor uns haben. Es würde daher diese irreführende Bezeichnung zu vermeiden und lieber der Name *Blattverschiebung* anzuwenden sein. Eine horizontale Dislocation, die durch einen Bruch ausgelöst wird, würde mit SUSS als *Blatt s. str.*, scharfes Blatt HEIM und MARGERIE (Wildkirehli, Wiener Neustadt) oder im Gegensatz zur Blattverschiebung als *Blattverwerfung* zu bezeichnen sein. Der von HEIM und MARGERIE vorgeschlagene Kunstausdruck „*Bruchblatt*“ (S. 74) klingt hart und undeutsch; ausserdem ist bei allen auf -blatt endenden Zusammensetzungen die Verwechslung mit anderen Blättern naheliegend.

5. Complicirte Faltungs- und Interferenzerscheinungen.

Obwohl der ganze topographische Theil des vorliegenden Buches mit den in der Ueberschrift erwähnten Erscheinungen zu thun hat, mögen hier noch einige besonders verwickelte und seltene Fälle von geologischen „*Fraeturen und Luxationen*“ kurz besprochen werden. Zum Theil (a und b) handelt es sich um Erscheinungen, die mit einfachen Faltungen oder Verwerfungen zusammenhängen; viel verwickelter sind die Vorgänge, welche auf verschiedene, in denselben Gebirgstheile nacheinander wirkende Kräfte (Faltung und Bruch) zurückgeführt werden müssen.

a. Auswulzung an Brüchen (Hoehwipfelbruch).

Die anfangs vielfach bezweifelte und bestrittene „*Auswulzung*“ ist jetzt fast allgemein als ein wichtiger Factor in der Gebirgsbildung erkannt worden. Allerdings ist der

¹⁾ Führer S. 608.

Hochwipfelbruch im Osten der Karnischen Hauptkette, der überaus mannigfache Erscheinungen dieser Art geliefert hat, in erster Linie durch die erneute Aufwölbung des alten palaeozoischen Kernes gebildet worden. Hierauf deutet schon die erhebliche Höhe hin, bis zu welcher die leicht verwitternden Silurschiefer emporragen. Die Höhe des Hochwipfels selbst bleibt nun noch nicht 100 m hinter der des aus Triaskalk bestehenden Rosskofels zurück (2189 m — 2271 m). Da man nun — allgemein gesprochen — hier wie anderwärts in den Alpen unmöglich annehmen kann, dass die heutigen Höhen des Gebirges durch Absenkung der umliegenden Länder entstanden sind, muss man die ersteren auf „Hebungen“ oder besser gesagt Aufwölbungen zurückführen.

Andererseits ist jedoch der Bruchcharakter an dem Hochwipfelbruch oft ungemein deutlich ausgeprägt. Besonders überzeugend wirkt in dieser Hinsicht die durch staffelförmige Brüche und sekundäre Gräben gekennzeichnete Grenze von Trias und Silur in den Westkarawanken (S. 36). Der scheinbar widerspruchsvolle Charakter des Hochwipfelbruches könnte am einfachsten dadurch erklärt werden, dass zuerst eine Aufwölbung der nördlichen, palaeozoischen Zone stattgefunden hat. Die südlicher gelegenen Massen des Schlerndolomites wurden zunächst mit emporgezerrt, brachen dann aber wieder nach und zwar erfolgte der Abbruch an den verschiedenen Abschnitten des über 30 km langen Bruches bis zu verschiedener Tiefe.

Der Bruch bildet in seinem westlichen Theile, wo er abgesehen von einer kleinen Spaltenverwerfung Obercarbon und Untersilur trennt, einen sehr stumpfen, nach Norden offenen Winkel; vom Gartnerkofel an wird die vorherrschende Richtung SSO. Ueberall, wo diese Richtung rein ausgeprägt ist, oder wo der Bruch etwas nach N. vorspringt, grenzt jüngerer Triaskalk unmittelbar an Untersilur; die älteren Glieder der permo-triadischen Schichtenfolge sind hier durch die wiederholten, entgegengesetzt wirkenden Gebirgsbewegungen ausgequetscht oder angewälzt worden. Nur an den haken- oder bajonettförmigen Ausbiegungen des Bruches konnten diese älteren meist ziemlich plastischen Gesteine sich erhalten. So würde das un-

regelmässige, rasch auskeilende Vorkommen älterer Schichten südlich von Thörl (S. 36) und am Achomitzer Berg zu erklären sein (vergl. Abb. 7, 8, S. 24 und Profil-Tafel I, S. 15).

Allerdings sind an der bedeutendsten hakenförmigen Ausbuchtung, am Kok, ältere Schichten (Grüden Sandstein) nur in geringer Erstreckung hekannt. Jedoch ist hier die ältere Schichtenfolge durch eine ungewöhnlich mächtige Einlagerung von Orthocerenkalk gebildet, und es ist einleuchtend, dass zwischen diesem harten Gestein und dem Schlierndolomit die weniger mächtigen bzw. plastischen Schichtglieder der permo-triadischen Serie ausgewalzt werden mussten.

b. Beeinflussung des Streichens der Schiefersehichten durch Kalkmassen.

Die alten Schichten der Karnischen Hauptkette zeigen ein im Allgemeinen ausserordentlich regelmässiges Streichen in der Richtung WNW—OSO. Es ist daher von Wichtigkeit, die wenig zahlreichen Abweichungen festzustellen und den Gründen derselben nachzuforschen. Man beobachtet nun, dass dort, wo umfangreiche devonische Kalkriffe klotzartig und unregelmässig in plastischen Schiefer eingefaltet sind, das Streichen des letzteren sich der Richtung des ersteren anschmiegt. Am Süd-West-Abhänge der Paralpa konnte das NNW-SSO Streichen, welches an diesem Berge und der angrenzenden Hartkarspitz zu beobachten ist, auf 3 km Entfernung bis zum Rio d'Antola beobachtet werden. Allerdings darf man, wie die genauen Angaben S. 116 heweisen, hier eher von einer allgemeinen Verworrenheit der Schichtstellung als von einer bestimmten Streiehrichtung reden. Doch scheint der altsilurische Kalkphyllitzng dem NNW-Streichen zu folgen. Vollkommen regellos wird das Streichen dort, wo mehrere Kalkmassen allseitig eine Schieferpartie umgehen. Während unmittelbar am Ostabhänge des Mooskofels der Schiefer sich dem Kalke vollkommen anschmiegt (oben S. 97), sind in der Tiefe des Valentinthals zwischen dem genannten Berge, dem Pollinigg und dem Cellonkofel die Schiefersehichten wie zwischen Schraubstücken in der unregelmässigsten Weise verquetscht, verdreht und verschoben.

c. Nachbrechen eingefalteter Kalkmassen bei erneuter Gebirgshildung.

Im Durchschnitt des Valentinbaches deutet das Zusammenfallen des Plückener Querbruches mit der Querwerfung des Gailberges und der Obervellacher Erdbebenlinie (S. 144) darauf hin, dass die eingefalteten devonischen Kalkmassen während der Kreide- und Tertiärzeit bei dem Wiederaufleben der gebirgsbildenden Kräfte weiter in die weichen Schiefer eingebrochen sind. Noch deutlicher sind derartige Vorgänge auf dem Nordabhange des Kok zu beobachten. Wie der schematische Längsschnitt 5 auf Seite 20 zeigt, liegen im Sinne der Längsrichtung des Gebirges in derselben Zone: Silurschiefer (Untersilnr), Orthocerenkalk (Obersilnr), Silurschiefer, Mitteldevon, Silurschiefer, Orthocerenkalk, Schlerndolomit. Ursprünglich waren Devon und Orthocerenkalk in den weicheeren Schiefer eingefaltet, wobei das erstere infolge der massigen Structur der Riffe an älteren Querbrüchen tiefer einsank. Der Umstand, dass auch der Schlerndolomit am Schönwipfel in derselben Senkungszone liegt, beweist, dass bei einer jüngeren Gebirgshildung (Kreide oder Tertiär) die alte Störungsrichtung wieder auflebte.

d. Interferenzerscheinungen von verschiedenen Bruchrichtungen.

Dort wo ein Hauptbruch eine andere Richtung annimmt oder wo Querbrüche das Gebirge durehsetzen, beobachtet man eigenartige „Interferenzerscheinungen“, wie man diese gegenseitige Beeinflussung von Spannungsrichtungen in übertragenem Sinne zu bezeichnen pflegt. Bestimmte Anzeichen, welche für „Schichtenverdrehung“ oder Torsion sprächen, habe ich nicht wahrnehmen können. Man beobachtet nur, dass der Hauptbruch durch ein in der Richtung der schwächeren Spannung verlaufendes Sprungbündel compliziert wird.

In der Gegend des Kok biegt der Hochwipfelbruch aus OSO genau nach O um; aber in der ursprünglichen Richtung splittern zwei kleinere Sprünge in den Schlerndolomit ab und schliessen eine keilförmig begrenzte Scholle

von Muschelkalkeonglomerat (Uggowitzer Breccie) ein. Der südliche Abschluss des letzteren wird wieder von einer genau O—W streichenden Verwerfung gebildet (oben S. 25 bis 27). Man würde im Laboratorium die gegenseitige Beeinflussung von zwei sich durchkreuzenden Spannungsrichtungen kaum besser zur Darstellung bringen können, als es hier in der Natur geschehen ist.

Ein ganz ähnliches, infolge der grösseren Zahl der betroffenen Formationen complicierteres Bündel von kreuzenden Sprüngen lehrte die kartographische Aufnahme am Nordabfalle des Gartnerkofels kennen: Hier biegt der Hochwipfelbruch aus ONO nach OSO um und die Brüche liegen somit theils in den beiden Hauptrichtungen theils genau in O—W.

Dort wo Querspalten das Gebirge durchsetzen, erweisen dieselben sich meist als die kräftigeren und lenken somit die Längsstörungen um Kilometer ab. Dann beobachtet man jedoch, dass eine schmale, mit jüngerem Gestein angefüllte Grabenspalte im Sinne der ursprünglichen Längsrichtung fortsetzt und sich schliesslich mit dem Hauptbruche wieder vereinigt. Es entsteht auf diese Weise eine Scholle, die ungefähr die Gestalt eines rechtwinkligen Dreiecks mit sehr ungleichen Katheten besitzt. Die Länge der Hypotenuse beträgt auf dem Lauzenboden (Rosskofelbruch) 4 km, am Gailberg (Gailbruch) 9 km.

Als „Interferenzerscheinung“ ist auch die rechtwinklige Umbiegung der eingefalteten Devonkalke des Niedergailthales zu deuten (vergl. die Karte und Abb. 42, 43, S. 103). Das durch den Plöckener Querbruch (Abschnitt e) nach ONO umgekehrte Streichen wendet hier in scharfem Winkel nach WNW zurück.

e. Blattverwerfung mit Ablenkung des Streichens.

Die Gegend des Plöckenpasses ist, wie im topographischen Theile eingehend dargelegt wurde, durch eine Reihe tektonischer Merkwürdigkeiten ausgezeichnet. In N (bis NNO)-Richtung durchschneidet der Plöckener Querbruch das Gebirge;

östlich von demselben liegen (am Pal) die Devonkalke 1000 m niedriger als im Westen. Auf der letztgenannten Seite (zwischen dem unteren Theil des Valentin- und Wolayer-Thales) ist ausserdem das Schichtstreichien aus der normalen WNW-Richtung nach ONO umgedreht. Wenn das Unterdevon des Pollinigg dem Unterdevon des Cellon, das Mitteldevon des Pal der Mitteldevonzunge des Casa Monuments entspricht, so ist die westliche Scholle an einer Blattverwerfung in südlicher Richtung etwas herausgedrängt und ausserdem in ihrer gesammten Streichrichtung beeinflusst worden; gleichzeitig oder bei einer späteren Gebirgsbildung ist die östliche Scholle abgesunken. Wenn irgendwo, so wird in dieser „zone of diverse displacement“ die Chronologie der einzelnen tektonischen Bewegungen unangeklärt bleiben müssen. Treffen doch in einem durch carbonische Faltung und Ueberschiebung arg dislocirten Gebiet einerseits die Ausläufer des Villnösser Bruches, andererseits die vom Gailberg her kommende „Obervellacher Erdbebenlinie“ zusammen. Sogar das Auge des Laien beobachtet an der verzerrten Lagerung der Schichten und an der phantastischen Form der Kalkzacken, dass hiev gebirgsbildende Kräfte in ungewöhnlicher Weise ihr Spiel getrieben haben.

XIV. KAPITEL.

Die Phasen der Gebirgsbildung in den Karnischen Alpen.

1. Die palaeozoische Faltung.

a. Die mittelearbonische Faltung in den Ostalpen.

Die Annahme einer wiederholten Gebirgsbildung, welche das Gebiet der Karnischen Alpen betroffen hat, beruht nicht allein auf der grossen Zahl und Complication der Störungen sowie auf dem Nebeneinander von gefalteten und ungefalteten Schollen: Vielmehr lässt sich der bestimmte Nachweis führen, dass die permische Transgression ältere Bruchlinien (die von St. Georgen) überdeckt und dass die Erscheinungen der Faltung und Anfrichtung mit verschwindenden Ausnahmen auf die altpalaeozoischen Gesteine vom Culm abwärts beschränkt sind.

Die Annahme mehrfacher Gebirgsbildung, die ohne den bestimmten Nachweis einer Transgression nur auf der Complication der tektonischen Erscheinungen beruht, trägt stets einen hypothetischen Charakter. Im Karwändelgebirge hat ROTHPLETZ den Nachweis zu führen gesucht, dass auf eine mittelecretacäische, durch Brüche gekennzeichnete Periode eine jüngere, tertiäre Faltungsphase gefolgt sei. Da jedoch nirgends in dem fraglichen Gebiete obere Kreide in transgredirender Lagerung bekannt ist, so könnte die Faltung ebenso gut ohne wesentliche Unterbrechung auf die Bruchperiode gefolgt sein.¹⁾ In einem anderen Falle erscheint eine wesentliche Aenderung

¹⁾ Nur weil weiter östlich die soeben gekennzeichnete Form der Lagerung bekannt ist, wird auch für das Karwändelgebirge die Annahme einer mittelecretacäischen Faltung über das Niveau einer unbewiesenen Hypothese erhoben.

der gebirgsbildenden Kraft innerhalb einer einheitlichen orogenetischen Periode zum mindesten höchst wahrscheinlich: Das alte Harzgebirge ist nach **LOSSEN** durch eine doppelte Faltung gebildet, die das eine Mal in nordöstlicher, das andere Mal in nordwestlicher Richtung wirksam war. Jedoch kann es keinem Zweifel unterliegen, dass die ganze Faltung in mitteleuropäischer Zeit erfolgt ist: Denn während die altcarbonischen Culmschichten überall aufgerichtet sind, ist das obere, häufig rothgefärbte Carbon ungefaltet und fast ungestört dem Südrand der alten Masse über- und angelagert.

In den Karnischen Alpen ist, abgesehen von der unzweideutigen Ueberlagerung einer älteren Bruchlinie, der Gegensatz in der Schichtenstellung zwischen den bis zum Unter-carbon einschliesslich reichenden Formationen und den jüngeren Bildungen scharf ausgeprägt. Steile Anfrichtung und Faltung ist für die ersten die Regel (z. B. Profil-Tafel IV S. 76); jedoch wurden die gewaltigen Devonischen Kalkmassen von der Faltung nur theilweise bewältigt und zeigen daher oft flache Lagerung. Ausgedehnte Ueberschiebungen erscheinen ebenfalls auf die altpalaeozoischen Schichten beschränkt. Andererseits sind die jüngeren Formationen vom Obercarbon aufwärts nicht gefaltet; flache Lagerung herrscht bei weitem vor (Profil-Tafel III S. 58, Tafel III S. 56). Kleinere Falten finden sich nur in unmittelbarer Nähe der Hauptbrüche (Abb. 23, S. 52, Abb. 19, S. 47) oder dort, wo schmale Fetzen weicheren Gesteins in Spalten des Dolomites aufgequetscht (Abb. 11, S. 31) oder eingesunken sind (Profil-Tafel III, S. 58).

Auch die randliche Aufbiegung, welche Perm und Trias in der Sextener Gegend zeigen, ist nicht als Faltung zu bezeichnen.

Der auffällige Gegensatz der Lagerung hat sogar bei der Kartirung praktische Dienste für die Unterscheidung indifferenten Schiefer geleistet.

Dass die Verschiedenheit der Lagerung nur in der Karnischen Hauptkette und dem südlichen Gebirgsland wahrnehmbar ist, sei hier noch einmal hervorgehoben. Das nördliche Gailthaler Gebirge ist in Bezug auf Faciesentwicklung und Gebirgsbau ein Theil der Nordalpen.

Auch in der östlichen Fortsetzung, in den Karawanken

ist wegen der geringen Intensität der älteren Faltung die Verschiedenheit der tektonischen Beschaffenheit wenig ausgeprägt.

Wie aus der Tektonik des Gebirges und dem gänzlichen Fehlen des unteren Oberearbon (Ostrau-Waldenburger Schichten = Moskauer Stufe) hervorgeht, fällt die hauptsächlichste Aufwölbung des Karnischen Alpengebirges in die Mitte der Carbonzeit¹⁾. Doch ist dieser ganze Abschnitt der Erdgeschichte im Gegensatz zu der nur selten durch vulkanische Ereignisse unterbrochenen marinen Entwicklung der älteren palaeozoischen Perioden auch in unserem engeren Gebiete durch häufige Verschiebungen des Meeresniveaus, vulkanische Ausströme und Dislocationen gekennzeichnet.

Zur jüngeren Devonzeit war fast ganz Europa noch von einem offenen, ziemlich tiefen Meere bedeckt, dessen Hochseefauna vom Ural bis Südfrankreich und von Devonshire bis Steiermark keine Unterschiede aufweist. Die massenhafte Anhäufung unterearbonischer klastischer Sedimente (Cnlm), welche in dem weiten Gebiete zwischen Russland und Portugal, zwischen dem Balkan und England den Kohlenkalk begleitet, weist auf eine wesentliche Aenderung der physikalischen Verhältnisse des Meeres hin. Ein allgemeiner Rückzug bzw. ein Flacherwerden der europaischen Meere kann, wie oben (S. 352—356) ausführlich dargelegt wurde, allein diese bemerkenswerthe Aenderung erklären. Das Gebiet der Ostalpen, in dem sogar die rein-marine Kohlenkalkfauna bei Nötsch und im Veitschthal von klastischem Materiale umschlossen wird, zeigt diese Erscheinung in besonders ausgesprochenem Maasse. Halten wir uns gegenwärtig, dass die Mitte der Carbonzeit durch gewaltige faltende Bewegungen ausgezeichnet ist, so liegt der Gedanke nicht fern, das Flacherwerden der unterearbonischen Meere durch den Beginn der Gebirgsfaltung zu erklären. In unserem engeren Gebiete würde hierfür der Umstand sprechen, dass der unterearbonische Cnlm mit rein terrestrischer Flora auf den Süden beschränkt ist; die Zone der grössten Faltungsintensität der mittelearbonischen Gebirgsbildung, die Ueberschiebungen an

¹⁾ Nicht, wie ich früher auf Grund weniger ausgedehnter Untersuchungen annehmen musste, in das oberste Carbon oder Perm.

dem Südabhange des Kollinkofelzuges und der Croda Bianca grenzt unmittelbar an das Gebiet terrestrischer Entwicklung.

Immerhin ist es im Gebiete der Karnischen Alpen während der Unterearbonzeit kaum zu einer eigentlichen Gebirgs- oder Inselbildung gekommen. Auch die vulcanischen Eruptionen, die gewaltigsten, welche wir aus diesem Gebiete überhaupt kennen, erfolgten submarin.

Die Richtung der carbonischen Faltung war eine südliche. Hierfür ist vor allem die Tendenz der Überschiebungen beweisend, weniger der Umstand, dass den nördlich liegenden älteren Schichten südwärts jüngere folgen. Das allseitig isolirte Silur, welches am Grubenspitze (Profil IV, S. 76, Abb. 40, S. 99) das Devon überschiebt, ist wegen der tiefgreifenden Denudation und allseitigen Isolirung für diese Auffassung nicht beweisend, ohne derselben andererseits zu widersprechen. Hingegen zeigen die Ansichten des Südgehanges des Kollinkofels (S. 92), des Wolayergebirges (S. 107) und vor allem die zahlreichen besonders zu diesem Zwecke gemachten Aufnahmen der Croda Bianca (S. 108), dass die Kalkschollen im Norden mit der Masse des Devon zusammenhängen und dass nach Süden zu eine Auflockerung des Zusammenhanges und ein allmähliges Auskeilen stattfindet. In südlicher Richtung ist ferner die Blattverwerfung des Plöckenpasses erfolgt.

Suess hatte geglaubt, in der nordwärts gerichteten Convexität der drei Gebirgsbögen von Europa eine stetig nordwärts gerichtete Tendenz der Faltung erkennen zu können. Ich habe neuerdings¹⁾ die Annahme wahrscheinlich zu machen gesucht, dass innerhalb der plastischen Zonen der Erdrinde die Richtung der Faltung nicht durch eine einseitig wirkende Kraft bestimmt ist, sondern dass die Vertheilung älterer starrer Kerne eine asymmetrische Entwicklung der Faltenzonen bedingt. Ein convexer Faltungsbogen kann entweder dadurch entstehen, dass ein umfangreicherer älterer Kern von jüngeren Faltungen umwallt wird (Karpathen und Südtirol), oder dass eine Reihe solcher Kerne als stauende Hindernisse fungiren (Schwarzwald bis Böhmen).

¹⁾ Die Tribulaungsgruppe am Brenner.

Sehr verwickelt wird der Verlauf der jüngeren Gebirge, wenn eine Anzahl älterer Kerne die in den Zwischenräumen entstehenden Faltenzüge beeinflussen (westliches Mittelmeer).

Wenn auch wenig über die präcarbonischen Faltungen Europas bekannt ist, so steht doch fest, dass der hayerisch-böhmische Wald ein uraltes Gebirgsmassiv darstellt. Der nach N convexe Bogen der carbonischen Hochgebirge des mittleren und östlichen Deutschland umgibt nun diesen alten Kern wenigstens theilweise (Sudeten — Thüringer Wald). Der nach N concave Bogen der carbonischen Alpen könnte als Umwallung der anderen Seite angesehen werden. In ähnlicher Weise umgeben der Apennin und die sicilischen nach Nordafrika fortsetzenden Ketten das uralte Faltengebiet von Sardinien.

Allerdings mahnen die Verschiedenheiten der Faltungsrichtung, welche in scheinbar einheitlich gebauten Faltengebieten beobachtet werden, zur grössten Vorsicht bei der Reconstruction älterer Gebirge. So ist nach BRITNER in der nördlichen Zone der nordöstlichen Kalkalpen die Faltung und die Richtung der Ueberschiebungen südwärts gerichtet, nur in der Nähe der centralen Kette tritt eine nördlich orientirte Faltungstendenz auf. In den die Brennerfurche begrenzenden Gehirgen beobachtet man, dass von einer Mittellinie aus die Ueberschiebungen im Norden nordwärts, im Süden südwärts gerichtet sind u. s. w.

Ueber die Ausdehnung des ostalpinen carbonischen Hochgebirges kann man nur auf indirectem Wege eine Vorstellung erhalten. Das gesammte Gebiet der Ostalpen war zur Zeit des Devon und Unterearbon vom Meere bedeckt. Die nahe Uebereinstimmung der betreffenden marinen Bildnugen mit den deutschen Vorkommen lassen diesen Schlusss notwendig erscheinen.

Allerdings war das durch abweichende Fauna und eigentartige Sedimente ausgezeichnete Grazer Gebiet zur Mitteldevonzeit durch eine Inselbarriere gegen Westen abgeschlossen, wurde aber zur Oberdevonzeit wieder von der normalen Clymenienfauna bevölkert. Auch kann mit Sicherheit angenommen werden, dass zur Zeit des Mitteldevon das mittelböhmisches Meer gegen West und Süd abgeschlossen wurde. Das Gebiet

der heutigen Central- und Nordalpen war vollständig vom Meere bedeckt. Wenn in der sonst sachgemäss beschriebenen Uebersicht von FRAAS¹⁾ zur Zeit des oberen Devon und Carbon eine den heutigen Centralalpen entsprechende Insel figurirt, so beweist dies nur, wie schwer bei palaeo-geographischen Erwägungen die Abstraction von den heutigen Oberflächenformen ist. Schon die vollkommen gleichmässige Vertheilung der devonischen und altcarbonischen Meeres-Fauna musste diese Annahme einer langgestreckten Insel hinfällig erscheinen lassen. Dass Korallenriffe keinen Rückschluss auf „Landzungen“ oder „Untiefen“ gestatten, beweisen die Vorkommen im heutigen Pacific.

Ganz abgesehen von diesen theoretischen Erwägungen haben die glücklichen Funde von KOCH²⁾ und TOULA³⁾ das Vorkommen von marinem Untercarbon und Mitteldevon in den Nordalpen bezw. in den Niedern Tauern unmittelbar erwiesen.

Erst in der Mitte des Carbon wurde die centrale und nördliche Hauptkette des heutigen Alpengebirges durch Faltung zu Gebirgszügen von wahrscheinlich mittlerer Höhe aufgewölbt; gleichzeitig wurde eine landfeste Verbindung mit den Hochgebirgen von Mitteleuropa angebildet. Die Sandsteine, Conglomerate und Kohlen des Oberearbon enthalten in der Centalkette der Alpen nirgends einen Hinweis auf marinen Ursprung. Das untercarbonische Meer hat sich also jedenfalls zurückerzogen. Wie schon oben S. 363 nachgewiesen wurde, erinnert die petrographische Beschaffenheit der centralalpinen Carbonvorkommen an die „structure torrentielle“ der Kohlenbecken des französischen Centralplateaus. Der Absatz erfolgte also in Gebirgsseen und Thalniederungen. Die Zone stärkster Faltung und grösster Erhebung entsprach der heutigen Karnischen Hauptkette. Aus dem Gebiete der centralen und nördlichen Ostalpen ist kaum eine Andeutung⁴⁾ palaeozoischer

¹⁾ Scenerie der Alpen. S. 71—87.

²⁾ S. o. S. 375 und Zeitschrift d. deutschen geol. Ges. 1893.

³⁾ N. J. für Mineralogie etc. 1893. II. S. 169.

⁴⁾ Am Schneeberg, zwischen Passeier und Ridaunthal, ist die Richtung der eingefalteten Triasdolomite und der an Dislocationen gebundenen Erzgänge verschieden von dem Streichen der alten Glimmerschiefer; man könnte hieraus den Schluss auf eine palaeozoische (vortriadische) Faltung der letzteren ziehen.

Falten bekannt. Die mächtige Einwirkung einer jüngeren Gebirgsbildung hat hier jede Erinnerung an die alte Zeit verwischt. Es ist das kein Wunder, wenn man bedenkt, dass z. B. am Brenner Glimmerschiefer, Phyllit, Oberearbon und höhere Trias zu flachen Falten zusammengelegt sind, in denen jede Andeutung von Discordanz zwischen diesen altersverschiedenen Bildungen durch tektonische Kraft vernichtet wurde.

Gleichzeitig mit der Erhebung des carbonischen Hochgebirges begann die Einebnung desselben, an der die Brandungswelle des von Südosten vordringenden Meeres und die denndirenden Kräfte des Festlandes gleichzeitig arbeiteten. Zur Oberearbonzeit ragte das Gebirge noch hoch empor; hingegen scheint die etwa in die Mitte des deutschen Rothliegenden fallende Transgression des Grödeners Sandsteines die Einebnung im Wesentlichen vollendet zu haben. Doch reichte die südliche Transgression noch nicht weit, da bekanntlich der Bellerophonkalk im Centrum und Norden der Alpen fehlt. Als letzter Ueberrest der carbonischen Hochgebirge ist vielleicht die Landbarriere anzusehen, welche zur Triaszeit das deutsche Binnenmeer von der Hohen See im Süden trennte.

Die tektonische Entwicklung der im Osten die Hauptkette fortsetzenden Karawanken ist eine durchaus übereinstimmende; nur die Intensität der alten Faltung scheint allmählig abgenommen zu haben. Die älteren palaeozoischen Schichten bis zum Oberdevon einschliesslich (Unterearbon fehlt) sind stark gefaltet. Die eigentümliche tektonische Entwicklung der jüngeren Carbonbildungen wird dadurch erwiesen, dass die räumliche Trennung der Verbreitungsbezirke ebenso deutlich ausgeprägt ist, wie in der Karnischen Hauptkette. Der Umstand, dass die Fusulinenkalken und Oberearbon-schiefer hier mitgefaltet sind, ist z. Th. auf die geringere Breite der Vorkommen zurückzuführen (Eisenkappel). Im Allgemeinen kann man ferner annehmen, dass das Gebiet, welches von der älteren Faltung nur in untergeordnetem Masse betroffen wurde, während der jüngeren cretaceischen und tertiären Gebirgsbildung um so erheblicher dislocirt werden konnte.

Die auf bestimmte Zonen beschränkte Verbreitung des Oberearbon ist besonders deutlich an den östlichsten Vor-

kommen von Weitenstein und Wotschdorf bei Rohitsch (Steiermark, oben S. 333), wo ältere palaeozoische Schichten überhaupt fehlen. Die zerquetschte und zusammengedrückte Struktur der obercarbonischen Aufbruchswellen, die am meisten an die oben beschriebenen „Aufpressungen“ erinnert, ist selbstverständlich das Werk einer jüngeren Gebirgsbildung. Die demnächst zu erwartende ausführliche Darstellung TELLER's wird Näheres über den verwickelten Bau der Ostkarawanken bringen.

b. Die carbonisch-permische Faltung im westlichen Theile der Alpen.

Solange man nach den früher vorliegenden, unvollständigen Beobachtungen die Faltung in den Ostalpen als unterpermisch oder spätcarbonisch ansehen musste, deuteten die aus dem Westen vorliegenden Beobachtungen auf eine Gleichzeitigkeit der alten Gebirgsbildung im Gesamtgebiete der Alpen hin. Nach neueren Untersuchungen ist es zweifellos, dass die Faltung der östlichen Alpen mit der Aufrichtung der carbonischen Hochgebirge in Mitteldeutschland, Frankreich und Südengland zusammenfällt. (Varistische und armorikanische Gebirge bei SUSS.) Was westlich von Lugano und dem Ortlergebirge im Gebiet der Alpen an palaeozoischen Faltungen bekannt geworden ist, deutet auf ein sehr spätes carbonisches oder unterpermisches Alter.

An den meisten Punkten ist allerdings eine genaue geologische Bestimmung der alten Gebirgsbildung ausgeschlossen, da vom Unterengadin bis zur Zone des Mont Blanc meist Trias oder Lias discordant den gefalteten älteren Schiefergesteinen aufruht. Auch an den Punkten, wo „Verrucano“ die angerichteten Gneiss- und Glimmerschiefer bedeckt (wie im Aarmassiv nach BALTZER), erscheint eine genaue Datirung der Gebirgsbildung ausgeschlossen, selbst wenn man den westalpinen Verrucano dem Gröden Conglomerat der Ostalpen (= mittleres Rothliegendes oben S. 339) gleichstellen wollte.

In der Litteratur sind bisher nur zwei Angaben vorhanden, welche eine sichere Altersbestimmung der Faltung in dem westlichen Theile der Alpen gestatten:

Am Bifertengrätli an der Ostseite des Tüdi faud

ROTHPLETZ¹⁾ zwischen Gneiss und Verrucano eingefaltet und discordant von letzterem überdeckt Sandsteine, Conglomerate und Thonschiefer mit Anthraciterschmitzen. Die Flora weist auf Oberearbon und zwar (nach freundlicher mündlicher Mitteilung von Herrn Professor von FRITSCH) auf untere Ottweiler Schichten hin (vergl. oben S. 335 und Tabelle S. 377).

Im Wesentlichen übereinstimmend ist das Vorkommen von Manno am Luganer See. Hier lagert nach SCHMIDT und STEINMANN ein von Conglomerat und Sandstein (= Grödener Schichten) bedeckter Porphyrostrom über dem gefalteten Grundgebirge. Tektonisch zu dem letzteren gehören carbonische Conglomerate, welche ungefähr das gleiche Alter wie die Steinkohlenformation des Tödi zu besitzen scheinen.

Hiernach trat die alte Faltung in den Westalpen etwas später als im übrigen Mitteleuropa ein; sie fällt an die Wende von Carbon und Perm. in die Zeit der oberen Ottweiler und der Kuseler Schichten. Die gewaltigen Porphyreergüsse der dyadischen Zeit waren überall jünger als die Faltung.

Die Faltungsgebiete der carbonischen Ost- und Westalpen scheinen durch eine ungestört verbliebene Zone getrennt worden zu sein. Wie GÜMBEL in der Beschreibung des Ortlergebirges²⁾ mehrfach hervorhebt, lagert der triadische Ortlerkalk concordant auf den alten Quarzphylliten, von diesen nur durch wenig mächtige Vertreter der Grödener und Werfener Schichten getrennt. Allerdings hat v. GÜMBEL, (wie er ausdrücklich hervorhebt) nur einen Theil des Gebirges untersucht, und es wäre somit nicht ausgeschlossen, dass die Concordanz, ähnlich wie in manchen Anfschlüssen der Brennergegend, durch tektonische Einflüsse bedingt ist. Dem würde jedoch der „im Ganzen sehr ruhige Aufbau“ des Ortlerstockes widersprechen. Eine gründliche kartographische Aufnahme des Gebirges, welche dreihans fehlt, könnte allein diese Fragen entscheiden.

Die Anzeichen permischer Faltung in den westlichen

¹⁾ Abhandl. d. Schweizer palaeontolog. Gesellschaft. 1879. Bd. VI. — Vergl. auch FRAAS: Scenerie d. Alpen. S. 51.

²⁾ Sitzungsberichte d. math.-physik. Klasse der K. bayerischen Akademie d. Wissenschaften. München. Bd. XXI. Heft 1. 1891. besonders S. 96 und S. 114.

Alpen sind von DIEXER¹⁾ in mustergiltiger Weise zusammengestellt worden. Es sei daher nur erwähnt, dass diese Faltung im Unterengadin, im Aarmassiv, im Glarner Gebiet (wahrscheinlich), in den Luganer Alpen und in der Zone des Mont Blanc nachgewiesen ist. In den südlich und nördlich an letztere angrenzenden Zonen des Monte Rosa und des Briançonnais, sowie in den Ligurischen Alpen lagern hingegen mesozoische und ältere Formationen concordant.

KILIAN hat nicht ganz ohne Grund darauf hingewiesen, dass die Annahme älterer palaeozoischer Gebirgsbewegungen im Gebiete der Westalpen wahrscheinlich sei. Eine Discordanz ist allerdings nur einmal, im Massiv von Pormenaz (Hoeh-Savoien) von Michel Lévy beobachtet worden.²⁾ Aber das gänzliche Fehlen palaeozoischer Meeresbildungen in den Westalpen, sowie die mit der ostalpinen übereinstimmende detritogene Beschaffenheit des Oberearbon lassen die Annahme von einigen, wenn auch nicht sonderlich hohen Gebirgszügen als nicht gerade fernliegend erscheinen. Allerdings würde ein erheblicher Rückzug des Meeres ebensowohl hinreichen, um die vorliegenden Thatsachen zu erklären.

2. Die jüngeren (cretaceischen und tertiären) Faltungen.

a. Cretaceische Gebirgsbildung.

Ansser der bedeutenden Faltung, welche in der Mitte des Carbon erfolgte (oben S. 301) hat möglicherweise eine Aufwölbung der alten Karnischen Kette vor oder zur Zeit der Raibler Schichten stattgefunden. Doch könnte die Entstehung eines Inselgebirges in der Mitte der oberen Trias auch durch den Rückzug des Meeres von einer älteren U-tiefe veranlasst sein; in keinem Falle war das Ausmass der aus palaeontologischen Beobachtungen gefolgerten posthunen Faltung (oben S. 418 ff.) gross genug, um wahrnehmbare tektonische Spuren in dem stark dislocirten Gebirge zu hinterlassen. Die Fetzen von Grödener Sandstein, welche auf dem Südabhang der Karnischen Hauptkette (M. Dimon, Comelico) eingefaltet

¹⁾ Der Gebirgsbau der Westalpen. Wien 1891. S. 190 - 195.

²⁾ KILIAN, Bull. soc. géologique de France. [3] Bd. XIX. S. 650.

sind, könnten ebenso gut während der Tertiärzeit ihre heutige Lagerungsform angenommen haben.

Das Vorhandensein einer mitteleretaceischen Gebirgsbildung wird in den Ostalpen durch mannigfache Thatsachen bewiesen, während im Westen nur local eine Unterbrechung der marinen Absätze stattfand. Nur in den westlichen an den Jura angrenzenden Teilen der Schweiz sowie in einzelnen Bezirken des mittleren Schweizer Kreidegebirges fand am Ende der Neocomzeit ein Rückzug des Meeres statt. Dasselbe kehrte erst in der Eocänenperiode wieder, so dass in dieser Gegend der Flysch discordant auf erodirten Neocomgesteinen lagert.¹⁾

Auch für die französischen Alpen hebt KILIAN das Vorhandensein einer noch wenig studirten orogenetischen Phase zur Zeit von Jura und Kreide, sowie einer liassischen und cenomanen Transgression hervor:

Bei Castellet überlagert nach ZACCAGNA und PORTIS das Tithon discordant den Lias und in den Hochregionen der Cottischen und See-Alpen findet sich der Malm in breeienartiger (Gnillestre) und korallogener Entwicklung (Barcelonnette).²⁾

In den Ostalpen besteht im Gegensatz zum Westen fast überall ein durchgreifender Unterschied in der Ausbildung und Lagerung der unteren und oberen Kreide. Nach der übersichtlichen Zusammenstellung von C. DIENER³⁾ hat schon PETERS 1852 auf die eigenthümlichen Lagerungsverhältnisse der Gosauschichten in den nordöstlichen Alpen hingewiesen und betont, dass dem Absätze derselben eine Erhebung und Schichtenstörung der älteren Formationsglieder vorangegangen sein müsse. Es hat ferner MOJSEVICS darauf aufmerksam gemacht, dass die grossen Staunungsbrüche der nordöstlichen Kalkalpen, die den Conturen der Südspitze der böhmischen Massen folgen, von der zwischen dem Rande der letzteren und den Kalkalpen durchstreichenden Flyschzone abgeschnitten werden, mithin älter als die Faltung der Flyschzone seien. Seither hat BITNER gezeigt, dass der wichtigste

¹⁾ Vergl. FRAAS, Scenerie der Alpen. S. 249.

²⁾ Bull. soc. géologique de France. [3] Bd. XIX. S. 651.

³⁾ Der Gebirgsbau der Westalpen. S. 209.

jener Stauungsbrüche, die Aufbruchslinie Buchberg-Mariazell-Windischgarsten, an der die Anpressung und Zertrennung des Kalkgebirges ihren Höhepunkt erreichte, schon während der oberen Kreidezeit in annähernd gleicher Gestalt bestanden haben müsse; denn alle ausgedehnteren Vorkommen der Gosanschieften sind mit geringer Ausnahme an dieselbe gebunden und lagern innerhalb dieser Störungszone zumeist wieder direct dem Werfener Schiefer auf. Ebenso konnte MOJŠISOVICs im Salzkammergut in Bezug auf das Auftreten der Gosankreide feststellen, dass die Längenausdehnung der Gosanbecken sehr häufig mit bedeutenden alten Bruchlinien zusammenfällt, deren Ränder durch die Ablagerungen der Gosankreide überbrückt werden. Es verdient hervorgehoben zu werden, dass diese Bruchlinien, deren Bildung sonach in die Zeit zwischen dem Neocom und der Gosankreide fällt, zu den wichtigsten, die Tektonik des ganzen Gebietes beherrschenden Gebirgsbrüchen gehören.

Für die südlichen Ostalpen ist eine cretaceische Gebirgsbildung wahrscheinlich, aber ebensowenig wie für das Karwandelgebirge und die angrenzenden Gebiete auf dem Wege unmittelbarer Beobachtung zu erschliessen. Der von MOJŠISOVICs hervorgehobene Gegensatz zwischen dem Schollengebiete von Südtirol und dem jenseits der Belluneser Linie folgenden Faltingsland deutet auf ein ungleiches Alter beider Gebirgstheile hin; allerdings könnte die grössere Starrheit des gebrochenen Schollenlandes ebensowohl auf eine palaeozoische wie auf eine cretaceische Gebirgsbildung zurückgeführt werden.

Jüngere Kreide und Eocän sind fast ganz auf die südliche, jenseits der Belluneser Bruchlinie und der *frattura periadriatica* liegende Faltingszone beschränkt. Immerhin giebt MOJŠISOVICs von zwei Punkten des Berglandes zwischen Enneberg und Ampezzo, von Antruilles und vom Col Beehei das Vorkommen von Conglomeraten an, die aus Trias und Juraerollen sowie aus selteneren Quarzgeschieben bestehen und mit grösster Wahrscheinlichkeit der oberen Kreide angehören.¹⁾

¹⁾ Dolomitriffe S. 288. K. FUTTERER (Die oberen Kreidebildungen der Umgebung des Lago di Sta. Croce, S. 72) hat diese Angabe nicht beachtet und gelangt, indem er das vollkommene Fehlen von oberer Kreide in den nördlicheren Gebieten annimmt, zu ungenauen Schlussfolgerungen.

Da Neocomschichten an den grossen Brüchen des Südtiroler Hochlandes häufiger erhalten sind, Gaultbildungen aber fehlen, würde die Combination dieser Thatsachen auf indirectem Wege die Annahme einer mitteleretaceischen Gebirgsbildung im Süden wahrscheinlich machen.

Zu immerhin ähnlichen Schlüssen führen die Beobachtungen, die TELLER in der Gegend von Cilli (Südsteiermark) machte. Derselbe hebt hervor, dass ostwestlich streichende Dislocationen schon ursprünglich den Rahmen bestimmt haben, der für die Verbreitung der Tertiärgebilde massgebend war.¹⁾ Da die obere Kreide fehlt, so ist eine genauere Altersbestimmung unthunlich.

Das Vorkommen der Gerölle von permischem Quarzporphyr und Sandstein, welche nach MOJSISOVIC²⁾ wiederholt in den oberjurassischen Ammonitenkalken von Trient gefunden sind, scheint anzudeuten, dass die Trockenlegung des Hochlandes stellenweise schon am Ende der Jurazeit begann. Zu ganz übereinstimmenden Schlüssen berechtigen die Beobachtungen, welche K. FUTTERER neuerdings in der Friauler Kreide gemacht hat: Die untere Kreide fehlt hier allerdings gänzlich;³⁾ doch sind auf diesen Umstand keine weiter gehenden Folgerungen zu begründen, da möglicherweise Versteinerungsarmut oder geringe Mächtigkeit der Schichten ihre Erkennung erschweren. Die zur mittleren Kreide gerechneten Schieferkalken sind bituminös und enthalten Landpflanzen, was jedenfalls auf die Nähe der Küste deutet. Die in dem südlichen Theile von Friaul vorhandene Discordanz zwischen Kreide und Eocänen fehlt im Westen und deutet darauf hin, dass auch während der sonst ruhigen Perioden vereinzelte Störungen im Gebiete der Alpen vorkamen.

Nach alledem scheint es, dass theils im Laufe, theils gegen Ende der Kreidezeit das Gebiet der südlichen Ostalpen trocken gelegt wurde; von der erneuten Transgression des eocänen Nummulitenmeeres wurde nur der südliche Rand des Gebirges betroffen.

¹⁾ Verhandl. d. geol. R.-A. 1889. Nr. 12. Sonderabdruck S. 6.

²⁾ Dolomitriffe S. 528.

³⁾ Die Gliederung der oberen Kreide in Friaul. Sitz.-Ber. d. Kgl. preuss. Ak. d. Wissenschaften. 1893. S. 573.

b. Tertiäre Gebirgsbildung.

Während zur palaeozoischen und mesozoischen Zeit die Entwicklung der Gebirge und Meere im Osten und Westen des heutigen Alpengebietes die grössten Verschiedenheiten aufweist, wurden während der Tertiärzeit die Alpen zu ihrer heutigen Form aufgewölbt; die verschiedenen Phasen der Faltung stimmen somit im Osten und Westen überein.

Während eine eretacische Gebirgsbildung in den südlichen Ostalpen nur auf indirectem Wege nachweisbar ist, haben die tertiären Gebirgsbewegungen in der östlichen Fortsetzung der Karnischen Hauptkette deutliche Spuren hinterlassen.

Die Verbreitung altoligocäner Nummulitenkalke ist unabhängig von der oberoligocänen Sotzka-schichten und durch mitteloligocäne Störungen bedingt.¹⁾ Andererseits haben die Faltungsprozesse, welche die vorherrschenden Längsverwerfungen und die untergeordneten Querbrüche der Karawanken bedingt haben, auch noch nach Ablagerung der aquitanischen Sotzka-schichten andauert.²⁾ Denn nur unter dieser Voraussetzung sind die Einfaltungen und Ueberschiebungen zu erklären, welche einzelne Theile der in weitem Umfange über das ältere Gebirge transgredirenden Sotzka-schichten erfahren haben. Eine mitteloligocäne (bzw. oligocäne) und eine mioocäne Faltungsphase lassen sich auch in den Westalpen mit hinlänglicher Deutlichkeit von einander scheiden; die hauptsächlichste Energie der Gebirgsbildung wurde während der mioocänen Zeit entfaltet.

Dass die seismischen Kräfte in posthumer Entwicklung noch in der Gegenwart an den grossen Längslinien thätig sind, heweist das Erdbeben des Dobratsch.

Nach dem Vorstehenden haben in verschiedenen geologischen Perioden tektonische Bewegungen und Verschiebungen der Strandlinie im Gebiete der Karnischen Alpen stattgefunden. Zu der tabellarischen Uebersicht ist Folgendes zu bemerken: Ein bestimmter Nachweis kann nicht erbracht werden, dass Gebirgsbewegungen sowohl in mittelcretacischer wie

¹⁾ TELLER, Verhandl. d. geol. R.-A. 1889, Nr. 12, Sonderabdruck S. 7.

²⁾ Id. ibid. 1889, Nr. 16, 17, Sonderabdruck S. 10.

in mitteloligoaener (prae-aqnitanischer) Zeit stattgefunden haben. Als gesichert kann nur die Annahme betrachtet werden, dass in einer nicht genaueren bestimmaren Zeit am Ende des Mesozoicum oder am Beginn des Tertiär gewaltige Längsbrüche ausgebildet wurden. Sehr wahrscheinlich ist ferner die Vermuthung, dass die mioaene Faltung, welche das aus verschiedenartigen Bestandtheilen zusammengesetzte Gebiet der hentigen Alpen zu einem einheitlichen Kettengebirge zusammenschweisste, im Gebiete der Karnischen Hauptkette nur geringe Veränderungen hervorbrachte. Vielleicht sind die Querbrüche, deren jugendlicheres Alter aus dem Zusammenfallen von Erdbebenlinien mit dem Zirkelbruch und dem Gailbergbruch hervorgeht, theilweise erst in dieser jüngeren tektonischen Periode entstanden.

Uebersicht der tektonischen Geschichte der Karnischen Alpen.

Meeresschwankungen ohne wesentliche tektonische Veränderungen.

Perioden der Gebirgsbildung.

1. Mittelcarbonische Faltung, vorher submarine Eruption von Diabasdecken, nachher obercarbonische partielle Transgression (ausschliesslich der hentigen Centralzone).

2. Vollständige Einebnung des Gebirges und Transgression der permotriadischen Schichten, beginnend mit dem Erguss des Bozener Quarzporphyrs und der Ablagerung des Grödener Sandsteins.

3. Trockenlegung der Hauptkette und der Karawanken zur Zeit der Karnischen Stufe (besonders der Raibler Schichten).

Meeresschwankungen ohne wesentliche tektonische Veränderungen.

Die Rhaetische Transgression überdeckt wahrscheinlich die Karnische Insel.

6. Eocaene und oligocaene Meeresbedeckung der Südzone der Ostalpen. Eine Ausdehnung derselben auf die palaeozoischen und triadischen Gebiete der Ostalpen ist unwahrscheinlich.

Perioden der Gebirgsbildung.

4. Durch eine sehr schwache mittelcretaceische Gebirgsbildung wird wahrscheinlich der grösste Theil der südlichen Ostalpen trocken gelegt. Ein späterer Rückzug des Meeres wird durch die Liburnische Stufe des istro-dalmatischen Küstenlandes angedeutet.

5. Längsbrüche im Sinne der alten Faltung werden in der Mitte des Tertiär (mitteloligoaen) gebildet. Genauere Zeitbestimmung unmöglich.

7. Mioaene (postoligoaene) Faltung, für die Karnischen Alpen wahrscheinlich von untergeordneter Wichtigkeit,

8. in seismischen Bewegungen bis zur Gegenwart fortgesetzt (Erdbeben des Dobratsch an dem Gailbruch. Tagliamento-Linie, Obervellacher Linie).

Die vorstehende Uebersicht dürfte — abgesehen von geringen localen Aenderungen — die Gebirgsentwicklung der ganzen südlichen Ostalpen zur Anschauung bringen. Nachzutragen wären nur für das Vicentinische die grossartigen Eruptionen der mittleren Tertiärzeit. Ausserdem ist hervorzuheben, dass in demselben Gebiete eine sehr ausgesprochene Discordanz zwischen dem Miocaen und den älteren Bildungen bemerkbar ist. Ferner weisen die jüngeren miocaenen Schichten am Südrande der Alpen noch namhafte Störungen auf.

Auch die Entwicklung der centralen und nördlichen Ostalpen zeigt nur wenige Abweichungen. Der Hauptunterschied besteht darin, dass die Zone der stärksten Gebirgsbildung zur mittleren Carbonzeit im Süden, zur mittleren Kreidezeit im Norden lag; nach Norden bzw. nach Süden nahm die Intensität der tektonischen Kraft jeweilig ab. Wir hatten gesehen, dass die carbonische Faltung in der Centralzone nnerheblich war, während in den nördlichen Kalkalpen Anschlüsse älterer Schichten so gut wie ganz fehlen. Andererseits erreicht die cretaeeische Gebirgsbildung gerade in den früher wenig oder gar nicht dislocirten Nordalpen ihren höchsten Grad; in der Centralzone sind keine Ablagerungen aus dieser Zeit bekannt und in dem schon gefalteten Südgebiet vermochte eine posthume cretaeeische Aufwölbung keine erheblichen Spuren zu hinterlassen.

Am Nordraude ¹⁾ der Flyschzone der Ostalpen sind östlich von der Salzach jungmiocaene Schichtstörungen nicht zu beobachten. Am Südrande der Ostalpen nehmen jüngere Schichten an der Aufrichtung des Gebirges theil, als es im Nordosten der Fall ist.

Die zeitliche Parallelität der Gebirgsentwicklung, welche zwischen den Ostalpen und dem mittelenropaeischen Bergland besteht, setzt sich bis in die Tertiärzeit fort. Die alte Faltung des mittleren Carbon erfolgte in beiden Gebieten gleichzeitig und die Bruchperiode, welche die mittelenropaeischen Horste entstehen liess, fällt mit dem Höhepunet der Alpenfaltung zur Zeit des Miocaen zusammen.

¹⁾ Vergl. DIENER, Westalpen S. 223.

Übersicht der tektonischen Entwicklung der Westalpen.

Zur Veranschaulichung der oben gemachten Angabe, dass die tektonische Geschichte der westlichen Alpen erst von der Mitte der Tertiärzeit an mit der ostalpinen zusammenfällt, möge eine tabellarische Übersicht der hauptsächlichsten Thatsachen hier gegeben werden. Dieselbe beruht im Wesentlichen auf den Zusammenstellungen von DIENER und KILIAN:¹⁾

1. Trockenlegung des westalpinen Gebietes am Beginn der palaeozoischen Zeit (eine palaeozoische Meeresbildung ist nicht bekannt); eine schwache Faltung erscheint nicht ausgeschlossen.
2. Faltung zur Zeit des obersten Carbon oder unteren Perm. Transgression des Verrucano (= Grödeners Schichten).
3. Wenig oder gar nicht unterbrochene Meeresbedeckung zur Zeit des Mesozoicum. Anzeichen von ertaeoischer Faltung fehlen. Hingegen verweisen einige Beobachtungen auf unbedeutende Verschiebungen des Meeresniveaus zur Trias- und Jurazeit. Die Centralmassive waren höchst wahrscheinlich vom Meere bedeckt.²⁾
4. Rückzug des Meeres am Ende der Kreidezeit und Transgression des Nummuliten führenden Eocæn. (Der Meeresrückzug am Ende der Kreidezeit ist ein Ereigniss, dessen Spuren in der ganzen Nordhemisphäre bemerkbar sind; die Transgression des Eocæn beschränkt sich auf die Gegend des „centralen Mittelmeeres“, d. h. auf die eurasiatische Faltungszone.)
5. Faltungen der mittleren Tertiärzeit, welche die einheitliche Ausbildung des heutigen Gebirges bedingen. Gleichzeitigkeit der Faltungsphasen im

¹⁾ DIENER, Gebirgsbau der Westalpen S. 218 ff., KILIAN, Bull. soc. géologique de France [3] Bd. 19, S. 650–657.

²⁾ Die E. FRAAS'sche Karte (Seenerie der Alpen S. 223): Verbreitung der Jura-Meere in den Alpen, beweist, dass der Verfasser die von NEUMAYR für derartige Reconstruction aufgestellten Grundsätze ansser Acht gelassen hat. Die Unmöglichkeit das „centralalpine Gebiet als Insel“ anzusehen, wird sowohl durch den Hochseecharakter der zunächst liegenden nordalpinen Sedimente wie durch das verschiedentlich beobachtete Vorkommen von centralalpinen, in Tiefseefacies entwickeltem Lias erwiesen.

Westen und Osten; gleichzeitig mit der miocaenen Faltung werden die wichtigsten Brüche in Mitteleuropa ausgebildet.

- a. mittel- (oder ober-) oligocaene Falten und Brüche (Nummulitensehichten und untere oligocaene Meeresmolasse sind dislocirt. Die Absätze der mittelmiocaenen, helvetischen Meeresmolasse deuten auf das Vorhandensein einer scharf ausgeprägten praehelvetischen Gebirgsküste.)
 - b. Stärkste Faltungsphase in nachhelvetischer (jungmiocaener) Zeit. Die Faltung dislocirt die mittelmiocaenen helvetischen Schichten, ist aber jünger als die obermiocaenen Conglomerate (*Les Mées*). Das Meer ist auf das Rhonethal beschränkt.
7. Schwache jungpliocaene Faltungen sind nur in den randlichen Gebieten nachweisbar, und setzen sich durch die Quartärperiode bis in die Jetztzeit fort. (Moderne Erdbeben.)

XV. KAPITEL.

Die Karnischen Alpen in ihrer Bedeutung für den Bau des Gebirges.

Die ungemaine Complication des tektonischen Baues, welcher die Karnische Hauptkette auszeichnet, ist in erster Linie auf die Wirkungen einer mehrfach wiederholten Gebirgsbildung zurückzuführen. Indirect hängt hiermit die Thatsache zusammen, dass die Karnische Hauptkette die Grenze zweier Gebiete bildet, in welchem wesentlich verschiedene Typen des Gebirgsbaues zur Ansbildung gelangt sind. Das nördliche Gailthaler Gebirge ist durch die Entwicklung der Formationen und der Tektonik ein nach Süden vorgeschobener Posten der Nordalpen. Die Grundanlage des Gebirges bilden Syn- und Antikinalen; auch die grossen Längsstörungen, in Sonderheit die der Drau und Gail im Norden und Süden sind echte Faltungsbrüche: die Schenkel der grossen Triassynklinale — denn als solche ist das Lienzer Gebirge in toto aufzufassen — sind in Folge des Uebermasses der Spannung abgequetscht oder mit anderen Worten in Brüche übergegangen.

Im Süden grenzt an die Karnische Hauptkette das Bruch- und Schollengebiet der südalpiner Trias. Abgesehen von den den Bau des Gebirges beherrschenden Senkungsbrüchen bilden die antiklinalen Aufwölbungen

1) Gegenüber einer Annahme, welche in dem Gailbruch nur einen stellen Synklinalflügel sehen möchte, sei hervorgehoben, dass das vorkommene Fehlen der im Norden und Süden wohl entwickelten Werfener Schichten auf einen echten Bruch deutet; die Sprunghöhe des letzteren war allerdings stellenweise nicht bedeutend.

älterer Formationen (Cima d'Asta, Recoaro, Lorenzago) einen wichtigen Charakterzug dieses Gebietes; die bedeutendste derselben ist die Karnische Hauptkette selbst.

Der zweite Grund der ausserordentlichen Zersplitterung, welche besonders das centrale Gebiet der devonischen Kalkriffe auszeichnet, ist darin zu suchen, dass die drei wichtigsten Bruchsysteme der südlichen Ostalpen sich hier wie in einem Brennpunkte vereinigen. Der Drau- und Gailbruch, welche die östlichen Ansläufer der Judicarienlinie darstellen, bilden den Nordrand des Gebirges. Mit dem östlichen Theil des Karnischen Südrandes verbindet sich die Sganalinie, die Fortsetzung der emporgewölbten Cima d'Asta. Zwischen beiden trifft die wichtigste Verwerfung des nördlichen Südtirol, die Villnösser Linie, welche sich kurz vorher mit zwei weniger bedeutenden Dislocationen, dem Falzarego- und Antelao-Bruch vereinigt hat, auf die Hochregion der Kellerwand und des Plöcken-Passes.

Die gewaltige Zertrümmerung, welche theilweise eine genauere Verfolgung der Dislocationstendenz unmöglich macht, beruht also auf historischen und localen Ursachen.

1. Das Bruchnetz der Karnischen Alpen in seinem Zusammenhang mit den tektonischen Linien der Ostalpen.

Bei einer summarischen Uebersicht des Verlaufes der Hauptbrüche sind die auf die mittelearbonische Faltung zurückführbaren Dislocationen zu scheiden von den jüngeren, mittelcretaceischen¹⁾ oder tertiären Brüchen (vergl. das vorhergehende Kapitel). An manchen Punkten, besonders zwischen Osternigg und Poladnigg ist der unmittelbare Nachweis möglich, dass die letzteren der Richtung der ersteren folgen. Auf der beiliegenden Karte wurde in diesem Falle die Signatur der jüngeren Brüche gewählt. Die Lage der tieferen Scholle ist durch das Zeichen des Pfeiles ausgedrückt. Auf der Kartenlegende ist dies Zeichen durch das Wort „Absenkungsrichtung“ bezeichnet. Doch handelt es sich nur zum

¹⁾ Eine abweichende graphische Bezeichnung von Faltungs- und Tafellandbrüchen würde die Uebersichtlichkeit beeinträchtigen.

Theil um nuzweifelhafte „Tafellandrücke“; andererseits kommen „Faltungsbrüche“ (Gail und Dran) sowie am Hochwipfel „Hebungsbrüche“ (s. u.) in Frage. Alsenkungsbrüche begrenzen vor allem die Scholle, welche zwischen dem Sugana-Savebruch und dem östlichen Theile des Hochwipfelbruches (von Uggowitz nach Ost) gelegen ist und einen echten „Graben“ bildet. Hingegen fand auf dem westlichen Theile der Hochwipfelinie zwischen Osternigg und Hochwipfel eine Anfwölbung des nördlichen Silurzuges statt. Noch jetzt nimmt das Silur am Hochwipfel selbst eine orographisch höhere Stellung ein, als der gegen Verwitterung widerstandsfähigere Fusulinendolomit. An anderen Stellen ist die grössere Höhe der jüngeren Gebilde durch den Umstand zu erklären, dass die Nähe der breiten Gailthalfurehe eine raschere Abtragung des Nordabhanges bedingt hat.

Der Beginn des Draubruches im Osten des kartographisch dargestellten Gebietes ist nicht genauer nachweisbar, da die alten geologischen Aufnahmen unzureichend und die neueren noch nicht zur Veröffentlichung gelangt sind. Der Drabruch geht wahrscheinlich östlich von Greifenburg in eine einfache Falte über. Wie das SUSS'sche Profil von Lind (S. 150) zeigt, überlagern hier der steil nach Süd fallende Grödener Sandstein und die Trias den Quarzphyllit, sind also im Verhältniss zu letzterem als synklinale Einfaltung anzusehen. Ein unmittelbarer Zusammenhang von Gail- und Gitschbruch in der Gegend der Franzeshöhe ist unwahrscheinlich. Hingegen giebt MOJISOVIC an, dass „nahezn parallel mit dem Drauthal“ aus der Gegend von Villach in nordwestlicher Richtung bis Paternion eine Bruchlinie verläuft; möglicherweise ist diese östliche Verwerfung die Fortsetzung des bei Greifenburg aufgehörenden Draubruches.

Auch der Anfang des Gailbruches östlich von Villach dürfte schwer nachzuweisen sein, da das Klagenfurter Becken in ausgedehntem Maasse mit Glacialbildungen, jüngeren Alluvium und Seen bedeckt ist. Weiterhin fällt die Verwerfung mit dem Südrande des Dobratsch zusammen, um dann nach einem kurzen nordwestlich gerichteten Umbiegen weiter nach W zu streichen. Auch die Gegend des Bleiberger Erzberges ist von zahlreichen Längs- und Querstörungen durchsetzt, über

deren Verlauf leider keine genaueren Nachrichten vorliegen.¹⁾ Die kleinen Abweichungen und Unregelmäßigkeiten, welche der Gailbruch in seinem weiteren WNW bis W gerichteten Verlaufe zeigt, die Querbrüche des Gailberges u. s. w. sind im V Kapitel (S. 134 ff.) ausführlich geschildert worden. Es sei hier nur hervorgehoben, dass das Vorhandensein eines Bruches auch im Westen durch die ungleichmässige, zuweilen bis zum vollkommenen Verschwinden gesteigerte Breite der Grödener Schichten, sowie durch das gänzliche Fehlen des Werfener Horizontes sichergestellt erscheint. Im Osten wird durch Versteinerungsfunde das geringe Alter der nördlichen Triaskalke erwiesen.

Während der Gailbruch durchaus auf die Nordseite des Thales beschränkt ist, zeigt die Lage des Draubruches mannigfache Abwechslung (vergl. die Uebersichtskarte). Die Sprunghöhe des letzteren ist viel bedeutender als bei dem ersteren; fehlen doch die Grödener Sandsteine mit Ausnahme des kleinen Gebietes am Tristacher See überall. Nachdem Gail- und Draubruuch bei Ahfalterbach ihre Vereinigung vollzogen haben, verschwindet die Störung scheinbar vollständig und lebt erst ca. 10 km weiter westlich bei Wimhach nneuert Sillian wieder auf. Die weitere Verfolgung derselben nach Westen lehrt, dass der Gailbruch zu demselben System gehört wie die Judicarienlinie, und somit die grossartigste Dislocation im gesammten Gebiete der Alpen darstellt.

Von Wimhach bis Bruneck durchsetzt ein 33 km langer, aus Triasgesteinen und Liaskalken bestehender Zug jüngerer Bildungen das Villgrattener Gebirge; eine zweite parallel verlaufende Kalkfalte ist weniger bedeutend. Von Bruneck an bildet — ebenfalls nach TELLER'S Untersuchungen — der eruptive Granitzug Franzensfeste — Meran die

¹⁾ In der älteren Arbeit von PETERS (Jahrb. d. geol. R.-A. 1856, S. 67 - 90) wird der dem Wettersteinkalk zu vergleichende „erzführende Kalk“ zum Theil in den Horizont des Dachsteinkalkes gestellt; eine richtige Auffassung der verwickelten Lagerungsverhältnisse ist somit ausgeschlossen. Die neueren Angaben von MOJŠIČOVICS (Verhandl. d. geol. R.-A. 1872, S. 352) sind sehr kurz gehalten, da auch diesem Forscher nicht die für wirkliche „Detailaufnahmen“ notwendige Zeit zur Verfügung stand.

Fortsetzung der tektonischen Linie. Derselbe lagert wie ein Gewölbe unter den angrenzenden Gesteinszonen und erreicht im Eisackthal seine grösste Breite. Am Penser Joeh, zwischen Eisack und Passeier treten im Norden des Granites noch einmal eingefaltete Triaskalke in nordalpiner Entwicklung auf. Dieselben fallen nördlich, sind also in südlicher Richtung überschoben.

Anf der Südflanke des Granitzuges ist in der Gegend von Meran bereits der Bruchcharakter ausgeprägt und verstärkt sich immer mehr, nachdem die Dislocation die Etsch überschritten und jenseits derselben in die eigentliche NNO—SSW-Richtung der Judicarienlinie (im engeren Sinne) umgebogen ist. Der Verlauf der letzteren ist aus verschiedenen Darstellungen bekannt.

Eine kurze Uebersicht der Länge der einzelnen Strecken beweist die Richtigkeit der oben geäusserten Behauptung, dass die 330 km lange Gail-Judicarienlinie die gewaltigste Störung im Gebiete der Alpen ist: Vom Idrosee bis Weissenbach im Penserthal misst die Länge des eigentlichen im Norden durch Granit gekennzeichneten Judicarienbruches 128 km; von hier bis zum Eisackthal verfolgen wir die eingefaltete Trias 14 km weit. Von Stilfes im Eisackthal bis Bruneck beträgt die Länge des Granitzuges ca. 35 km, die der Villgrattener Triasfalten vom Dolomittrif bei Bruneck bis Wimbach bei Sillian 33 km. Nach einer wenig über 10 km langen Unterbrechung setzen bei Ahfalterbach Drau- und Gailbruch wieder ein; der letztere und vielleicht auch der erstere lässt sich bis Villach auf eine 110 km lange Strecke nachweisen, erreicht aber sein Ende wohl erst viel weiter im Osten.

Die Gebirgsfaltung ist die ursprüngliche Ursache der tektonischen Gail-Judicarienlinie. In dem Mittelstück lässt sich ein eigentlicher Bruch überhaupt nicht nachweisen; die Wichtigkeit der Faltung geht ferner aus der Thatsache hervor, dass das Streichen der centralen krystallinischen Schiefer in der Gegend der Umbiegung des Judicarienbruches (Meran—Schneeberg) genau den verschiedenen Richtungen der tektonischen Linie parallel ist. Für das Gailgebiet ergibt sich die Richtigkeit dieser Auffassung aus der vorhergehenden

Darstellung, für die Gegend von Giudicarien aus den gründlichen Untersuchungen von VACEK und BITTNER.

Die genannten Forscher beweisen ferner, dass nicht nur im Norden sondern auch im Westen, in der Brentagruppe und am Gardasee die randlichen Gebiete des ostalpinen Schollen- und Bruchlandes durch regelmässige Faltnngszonen gekennzeichnet sind.

Während die randlichen Faltnngsbrüche den Nordrand der Karnischen Hauptkette bilden, treffen wir die Fortsetzungen der grossen Tafellandbrüche von Südtirol, die Villnösser- und Snganalinie im Centrum und am Südrande unseres Gebirges. An der Villnösser Linie ist ferner ein Zusammenfallen mit den älteren carbonischen Dislocationen nachweisbar.

Die Einfaltung devonischer Kalkmassen in den westlichen Karnischen Alpen (Königswand, Heret, Porze, Val Visdende) gehören anschliesslich der älteren, carbonischen Faltnngsperiode an. Allerdings verläuft von dem am oberen Cordevole zersplitternden Villnösser Bruch ein Sprung in nordwestlicher Richtung zum Sasso Langerin und legt sich hier durch unregelmässiges Umbiegen nach W parallel zur Längsrichtung der Porze (Karte I und Profil-Tafel VI, S. 132, Mitte der oberen Abbildung).

Die Unterbrechung der tektonischen Störungen im oberen Val Visdende ist vielleicht nur seheinbar, da die indifferente Beschaffenheit der altsilurischen Schiefer genauere Beobachtungen ausschliesst. An der Hartkarspitz und dem Hochweisstein setzen die carbonischen Faltnngsbrüche wieder ein, und bald wird hier wieder am Abhange des Monte Vas und auf der Bordaglia-Alm ein in normaler NO-Richtung streibender Ansläufer des Villnösser Bruches sichtbar. Der letztere ist die wichtigste Störungslinie des nördlichen Theiles von Südtirol und vereinigt sich westlich von dem kartographisch dargestellten Gebiete in der Gegend von Cortina d'Ampezzo mit zwei tektonischen Linien von geringerer Bedeutung, der Falzarego- und Antelao-Linie. Mannigfache Unregelmässigkeiten, vor allem auch locale Unterbrechungen kennzeichnen die Villnösser Linie in Tirol wie in Kärnten.

Oestlich von Monte Vas bildet ein Faltungsbruch von geringer Sprunghöhe den Südrand des Kalkgebirges Kellerwand — Kollinkofel sowie des Zuges Pal — Tischiwanger Kofel. Die in nordöstlicher Richtung fortsetzenden, mehrfach unterbrochenen und zersplitterten Villnösser Sprünge sind andererseits (so an der Bordaglia-Alp) in Zusammenhang mit den carbonischen Störungen getreten.¹⁾

Der Nordostrichtung folgt nun die kurze Dislocation zwischen Bordaglia-Alm und Heuriesenweg sowie der westliche Theil des Plöckener Längsbruchs; ganz unregelmässig verläuft die Bruchgrenze der Devonkalke an der Plenge und um dem Mooskofel, welche Berge durch das Auftreten silurischer Ueberschiebungen ausgezeichnet sind. Der Plöckener Längsbruch biegt bald darauf nach SO um und entsendet einen zweiten Sprung direct nach O. Diese südöstlichen Dislocationen werden von dem Plöckener Querbruch abgeschnitten, der seinerseits bald in die Ostrichtung umbiegt. Auch der nördliche Zweig des Plöckener Längsbruchs dreht an dem Elferspitz in die Südostrichtung um und lässt überall auf das deutlichste seinen Zusammenhang mit der carbonischen Faltung erkennen; die eigenthümlichen Blattverwerfungen finden sich anschliesslich hier.

In der nördlich von Paularo gelegenen Region der Querbrüche und Grabenspalten treten jüngere Längsbrüche wieder im unmittelbaren Zusammenhang mit der östlichen Endigung des palaeozoischen Plöckener Bruches auf. Man könnte also diese jüngeren Störungen, den Hochwipfelbruch und den kürzeren Rosskofelbruch noch zu dem System der Villnösser Linie rechnen. Jedoch ist die Verworrenheit der palaeozoischen Faltungsbrüche zwischen Forni Avoltri und dem Kollen Diaul so gross, dass eine Verfolgung der jüngeren Dislocationen durch diese Spalten gewiss aussichtslos erscheint.

¹⁾ Auf der Karte (I) wurden dieselben sämmtlich mit der Signatur der älteren Dislocationen versehen, da eine unzweideutige Trennung schon aus sachlichen Gründen unmöglich erscheint und wegen des kleinen Maassstabes der Karte auch graphisch und nachführbar wäre. Ein Nachbrechen der alten Dislocationen in späterer Zeit lässt sich mit voller Sicherheit nur für die Bordaglia-Alm, mit grosser Wahrscheinlichkeit für den Plöckener Längs- und Querbruch annehmen.

Der Rosskofelbruch ist mit dem östlichen Theile des Hochwipfelbruches durch zwei Dislocationen verbunden, welche quer zur Längsrichtung des Gebirges verlaufen (Zirkelbruch); sie schliessen somit das Pontafeler Oberearbon allseitig ein. Diese carbonische Scholle stellt — selbst wenn man von der eingebrochenen Triasmasse des Trogkofels absieht — keinen einheitlichen Längsgraben dar. Vielmehr könnte der westliche und nördliche Theil des Oberearbon (im Verhältniss zu dem angrenzenden Silur) als Graben, der östliche und südöstliche als Horst bezeichnet werden. (Man vergleiche die Richtung der Pfeile auf Karte I.) Es ergibt sich somit auch aus dieser Erwägung, dass während der jüngeren Gebirgsbildung das Silur an dem Hochwipfelbruche „gehoben wurde“; die südlich angrenzenden Schollen erfuhren wahrscheinlich eine unregelmässige „Emporzerrung“, um dann später wieder nachzubrechen.

Südlich vom Rosskofelbruch findet sich — ebenfalls durch einen Querbruch verbunden — eine dritte, die Trias des Monte Piznl abschneidende Längsstörung; in geringer Entfernung von dieser verlaufen die zu dem südlichen Sugana-Save-System gehörenden Dislocationen der Gegend von Pontafel.

Der östliche Verlauf des Hochwipfelbruches, der von nun an das alte, im Wesentlichen silurische Gebirge des Nordens von der Trias im Süden trennt, wird zunächst durch eine ältere eingefaltete Scholle complicirt. Die Devonzüge des Osternigg-Poludnigg und Starhand sind zwar ähnlich wie die übereinstimmend gebauten Kalke der Königswand und Porze zur Carbonzeit eingefaltet, aber später weiter nachgebrochen (vergl. S. 431). Es splittern daher von dem im Süden vorbeiziehenden, nach OSO streichenden Hauptbruch verschiedentlich Sprünge in rein östlicher Richtung ab.

Nachdem auch der Hauptbruch wieder in die Ostrichtung umgebogen ist, folgt (zwischen Malborget und Weissenfels) die S. 27 ff. und 421 ff. besprochene Region der Anpressungen; dieselbe wird südlich vom Savebruch begrenzt und ist als ein durch nachträgliche Senkung entstandener Längsgraben zu deuten. Nach der eigentümlichen bajonettförmigen Umknickung von Maglern setzt der durch staffelförmige Absenkungen complicirten Hochwipfelbruch in die Westkarawanken hinüber.

Der weitere östliche Verlauf ist hier noch nicht näher erforscht; nur soviel steht fest, dass die Störung auf der Südseite des weithin sichtbaren Mittagsskofels (Abb. 1) weiter streicht.

Auch die im Vorstehenden schon mehrfach erwähnte Sugana-Savelinie beginnt weit vor der Grenze unserer Karte und folgt zunächst mit fast genau westlichem Streichen dem Oberlauf der Save. Die N—S verlaufenden Querbrüche, deren bedeutendste bei Lengfeld und Weissenfels auf den Savebruch treffen, haben die Tendenz, das Gebirge nach Osten (Laibach) zu senken. Diese Querbrüche werden durch transversale Störungen verbunden. Ein Zusammenhang mit den „periadriatischen Brüchen“ dürfte kaum nachweisbar sein. Aus dem Thale der Wurzenener Save setzt der Bruch in das obere Gailitz- und das Fellathal hinüber und folgt demselben bis in die Gegend von Pontafel. Ueberall bilden Werfener- oder ältere Triassschichten die Basis der Julischen Alpen im Süden, während im Norden Schlerndolomit die Karnische Hauptkette zusammensetzt.

Kurz vor Pontafel, bei Leopoldskirchen erscheint für eine kurze Strecke eine Antiklinale ausgebildet, deren Nordflügel überkippt ist. Ein wenig westlich von Pontafel lebt der (im Norden von parallelen Störungen, im Süden von steilen Falten begleitete) Bruch wieder auf, erreicht aber östlich von Panlaro ein vorläufiges Ende. Nach einer längeren Unterbrechung findet sich in der gradlinigen Fortsetzung der Savelinie, innerhalb der Senke von Ravaseletto, eine kleine Störung auf der Grenze der älteren und der permotriadischen Schichtenfolge. Schärfer ausgeprägt ist der Suganabruch, die Fortsetzung der Savelinie im Gebirge zwischen Bladen (Sappada) und Zahre (Sanris); hier trennt derselbe die Dolomitmassen des Nordens von den Werfener Schichten im Süden.

Im weiteren nach SW gerichteten Verlaufe des Suganabruches ist zunächst eine mannigfache Zersplitterung desselben wahrzunehmen. Gleichzeitig beobachtet man an demselben Aufwölbungen älterer gefalteter Quarzphyllite, die als verkleinerte Abbilder der Karnischen Hauptkette anzusehen sind. Aus der Gegend von Lorenzago am Piave hat HARADA mehrere derartige von Grödener Schichten umgebene Vorkommen beschrieben. Am Ende des nach WSW und W nm-

biegenden Bruches liegt das von Granit durchsetzte Phyllitgebirge der Cima d' Asta. E. STRESS hat dasselbe als Horst gedeutet, v. MOJŠIŠOVICS hingegen auf Grund umfassenderer Untersuchungen angenommen, dass dasselbe „wie ein älterer Aufbruch unter dem jüngeren Deckengebirge empортаuche“. Die Cima d' Asta liegt an dem Sugana-Savebruch d. h. an derselben Dislocationslinie wie die Karnischen Alpen, und ist somit auch deshalb in Bezug auf die Art der Entstehung mit diesen zu vergleichen.

Die genannten drei grossen Bruchsysteme der südlichen Ostalpen stehen, wie die Kartenskizze II zeigt (und bereits früher¹⁾ von mir dargelegt wurde) mit einander in bestimmter Verbindung und haben vor allem das Gemeinsame, dass an ihnen ältere gefaltete Bildungen inmitten der triadischen Deckschichten aufgewölbt sind. Es liegt nahe, den weit gespannten Bogen der Gail-Judicarienlinie und den die Sehne bildenden Sugana-Savebruch durch das Vorhandensein eines von jüngeren Brüchen durchsetzten und von jüngeren Faltungen umwallten carbonischen Gebirgskernes erklären. Die erste Anlage dieser Brüche dürfte in die cretaceische oder oligocäne Zeit fallen.

Die im Süden folgende „frattura periadriatica“, die Bellunenser Linie und der im Osten anschliessende Isonzobruch verwirft hingegen das Triasgebirge gegen die jüngeren Kreide und Tertiärschichten; dieselbe gehört zeitlich sowie tektonisch einer späteren, wahrscheinlich miocänen Bildungsperiode an.

Parallel zu dem periadriatischen Bruche und somit diesem vergleichbar verläuft der weiter südlich folgende Randbruch (K. FUTTERER²⁾), welcher die Tertiärschichten des Südrandes von der oberitalienischen Ebene scheidet.

Ueber den Zusammenhang der Karnischen Alpen mit den Gebirgen der Balkaninsel lässt sich leider wenig sagen. Allerdings wissen wir aus der geologischen Beschrei-

¹⁾ Die Tribulaungruppe am Brenner. Riechthofen-Festschrift. Berlin D. REIMER 1893.

²⁾ Dieser auf beiden Seiten des Tagliamento parallel zu der nördlichen „periadriatischen“ Störung verlaufende Bruch konnte auf dem fertigen Cliché nicht mehr nachgetragen werden.

bnng von Bosnien, dass die dortige Schichtenfolge die grösste Aehnlichkeit mit der der Ostalpen besitzt (v. MOJSISOVICs und BITTNER): Ueber palaeozoischen Gesteinen, in denen wenigstens an einer Stelle Carbonfossilien mit Sicherheit nachgewiesen sind, liegt die permotriadische Serie mit Grödener Conglomeraten, Sandstein, Bellerophonkalk und Werfener Schichten beginnend, ganz wie in den südöstlichen Alpen. Eine Discordanz zwischen älteren palaeozoischen und Grödener Schichten wird zwar nur aus Serbien (Zujovics) angegeben, könnte aber aus dem transgressiven Charakter, welchen das basale Conglomerat¹⁾ auch in Bosnien besitzt, gefolgert werden. In diesem letzteren Falle würde das „orientalische Festland“, das von MOJSISOVICs für die jüngere palaeozoische und ältere mesozoische Zeit angenommen, von TIETZE bestritten wurde, auch in orogenetischer Hinsicht wohl begründet erscheinen.

Vorläufig kann aus dem NW-Streichen, welches sowohl in den alten palaeozoischen, wie in den jüngeren Theilen der bosnischen Gebirge zu beobachten ist, eine Folgerung mit Sicherheit gezogen werden: Ein directer Uebergang der Karnischen Kette und der weiter östlich genau O—W streichenden Karawanken in die Dinarischen Faltenzüge findet nicht statt. Jedenfalls spricht die vollkommene Unabhängigkeit des Streichens, welche in den genau südlich von den Karawanken gelegenen Bosnischen Gebirgen zu beobachten ist, gegen die Annahme von SUESS, der die Dinarischen Ketten ebenfalls als integrierenden Theil der fächerartig ausstrahlenden Alpen ansieht. Ein selbständiges Inselgebirge der jüngeren palaeozoischen Zeit im Sinne von MOJSISOVICs würde dieser Anschauung viel besser entsprechen. Wenn E. TIETZE²⁾ hieraus einen Widerspruch der genannten Forscher herausconstruirt (weil MOJSISOVICs l. c. S. 18 sich dem Vergleich von SUESS im Allgemeinen angeschlossen hat) so erledigt sich dieser Einwurf damit, dass dasselbe Gebiet während der ver-

¹⁾ Sowohl MOJSISOVICs wie BITTNER betonen ausdrücklich, dass der untere Theil des „Werfener“ Complexes von Bosnien in Bezug auf stratigraphische und petrographische Beschaffenheit den Verucanocongomeraten und Grödener Sandsteinen der Ostalpen entspricht. Jahrb. d. geol. R.-A. 1881 S. 192, 358, 365.

²⁾ Z. d. geol. Gesellschaft 1881. S. 287.

schiedenen Phasen der Gebirgsbildung eine verschiedene Rolle gespielt haben kann.

Die von E. TIETZE in dem angeführten Aufsätze hervor gehobene Schwierigkeit, dass das alte „orientalische Festland“, welches nur bis zur Liaszeit über dem Meere lag, auch später während der tertiären Gebirgsbildung noch als „stauendes Hinderniss“ für die Entwicklung der Dinarischen Ketten gewirkt hätte, würde unter der folgenden Voraussetzung verschwinden: Wenn man aus der stratigraphischen Uebereinstimmung mit den südlichen Ostalpen auch den Hinweis auf eine gleichartige tektonische Vorgeschichte entnehmen wollte, so hätten wir die Auffaltung eines jungpalaeozoischen Inselgebirges anzunehmen, das erst während der Liaszeit vom Meere bedeckt wurde. Wenngleich dies Festland also nicht mehr über den Meeresspiegel hervorragte, so verblieb doch hier zweifellos ein abradirter alter Gebirgskern. Dass ein solcher, selbst wenn seine Lage in der Litoralzone des Meeres zu suchen ist, die weitere tektonische Entwicklung seiner Umgebung zu beeinflussen vermag, ist einleuchtend.¹⁾ Nur die Bezeichnung „Festland“ ist bei einem überflutheten alten Gebirgskern unglücklich gewählt.

Leider verhindert die unvollkommene Kenntniss, welche wir von den älteren Formationen Bosniens besitzen, eine sichere Begründung der obigen Vermuthungen.

Immerhin ist soviel klar: Wenn man annehmen will²⁾, dass auch im Nordwesten der Balkaninsel zur Carbonzeit eine Faltung erfolgte, so stand das hierdurch entstandene „orientalische“ Inselgebirge mit der weit nach Ost fortsetzenden alten Karnischen Kette in keinem unmittelbaren Zusammenhang. Aber ähnlich wie die ursprünglich abweichend gebanten östlichen und westlichen Alpen durch jüngere tektonische Bewegungen zu einem Gebirge zusammengeschweisst wurden, lässt

¹⁾ In welcher Weise derartige versenkte alte Kerne den Gebirgsbau zu beeinflussen vermögen, das zeigen u. a. die schönen Profile, welche H. SCHARDT aus der Umgegend von Montreux veröffentlicht hat. (Eelogeae geologicae Helvetiae IV Taf. 3.)

²⁾ Ein bestimmter Beweis kann, wie aus dem vorhergehenden ersichtlich ist, wegen Mangels an bestimmten Beobachtungen nicht geführt werden.

sich auch im SO, wenigstens in den der Adria zugekehrten Gebirgsfalten ein übereinstimmender Bau beobachten. Verschiedene Beobachter, welche zu verschiedenen Zeiten und völlig unabhängig von einander die äussere Zone der Gebirge vom Comer See und der Etschbucht bis zur Peloponnes untersucht haben, sind zu völlig übereinstimmenden Ergebnissen gelangt. Ueberall haben wir schiefe knieförmige Falten mit nach aussen gerichtetem Scheitel, in deren weiterer Entwicklung Brüche und Ueberschiebung der gebirgseinwärts liegenden Schollen über die äusseren Zonen einzutreten pflegen.¹⁾ Die eingehende von BITTNER gelieferte Zusammenstellung der Litteratur weist diesen Gebirgsbau nach am Comer See, im Hochveronesischen, Vicentinischen und Bellunesischen Gebiet, in Friaul, im Isouzothal, in Istrien, Dalmatien, Bosnien und der Heregovina; nach den neueren Beobachtungen von Philippson ist im westlichen Griechenland und in der Peloponnes derselbe Grundzug des tektonischen Aufbaues zu erkennen.

Der letzte, tertiäre Act des grossen erdgeschichtlichen Dramas, „die Entstehung des Alpensystems“, zeigt, wie wir auch hier sehen, eine einheitliche Entwicklung in den entlegensten Gebieten des Mittelmeergebietes; der Anfang besteht aus einer Anzahl von Scenen, die zusammenhangslos oft in unmittelbar benachbarten Gebieten (Westalpen, Ostalpen, Bosnien) neben und nach einander gespielt haben.

2. Einfluss der Brüche auf die Thalbildung.

In der zweiten Hälfte den Miocänzeit erreichten die gebirgsbildenden Vorgänge im Alpengebiete im Wesentlichen ihr Ende; Verwitterung und Erosion des fliessenden Wassers, deren Thätigkeit gleichzeitig mit der Emporwölbung begann, kennzeichnen den Abschluss der Tertiärperiode. Die Bedeutsamkeit dieser tertiären Denudation erhellt aus theoretischen Betrachtungen ebensowohl, wie aus der bekannten Thatsache, dass das gesamte Abflusssystem der Alpen vor dem Eintritt der

¹⁾ BITTNER, Jahrb. d. geol. R.-A. 1881. S. 366 und 367.

Eiszeit in einer von der heutigen wenig abweichenden Form fertig gebildet vorlag. Die Denudationsprodukte der Neogenzeit sind allerdings durch die diluvialen Gletscher fast vollständig ausgeputzt worden; nur für sehr vereinzelt inneralpine Bildungen, wie das Mühlsteineconglomerat der Berchtesgadener Ramsau ist ein präglacialer, tertiärer Ursprung nicht ausgeschlossen.

Gegentüber der älteren „Kataklysmen-Auffassung“, welche in den Thälern klaffende Risse und Spalten der Erdrinde sah, ist in neuerer Zeit eine naturgemässere Anschauung getreten, die der Erosion des fließenden Wassers den wesentlichsten Einfluss auf die Entstehung der Gebirgsthäler zuerkennt. Jedoch hat sich diese Betrachtungsweise von Uebertreibungen nicht freigehalten und den Einfluss von Gebirgsstörungen auf die Thalbildung gänzlich gelehnet. Es giebt allerdings viele Alpenthäler, welche die verschiedenartigsten Schichten und Gebirgsstörungen quer durchschneiden und somit reine Erosionsgebilde sind. Bei anderen Thalformen ist der Einfluss der tektonischen und petrographischen Verhältnisse um so deutlicher erkennbar. Allerdings hat auch hier das fließende Wasser die aktive Ansräumungsarbeit im Wesentlichen vollbracht; aber ebensowenig lässt sich verkennen, dass die Richtung, in der das Wasser seine ausnagende Thätigkeit entfaltet, durch den Gebirgsbau vorgezeichnet war.

Klassische Beispiele für derartige tektonische Hauptthäler bilden die Flussläufe der Gail, Drau, Fella und der oberen Save. (Man vergleiche die beiliegende Karte.)

In anderen Fällen hat das Zusammenfallen von Brüchen mit wesentlichen petrographischen Verschiedenheiten wenigstens zur Bildung von längs gerichteten Nebenthälern Veranlassung gegeben, so am Egger-See, der Pontebbana, dem Winkler-Bach (bei Pontafel; vergl. unten), und auf der Linie Lorenzago—Prato Carnico—Paluzza. Ein gemeinsames Merkmal dieser tektonischen Längsthäler ist ihre Zugehörigkeit zu verschiedenen Flusssystemen. So wechselt die Abflussrichtung des Wassers auf der zuletzt erwähnten Längsbruchlinie viermal. Dieselbe lehrt uns ferner, dass nicht das Vorhandensein eines Bruches, sondern nur das geradlinige Aneinandergrenzen von verschiedenen Gesteinen den Anlass zur Herausbildung von

Depressionen giebt. Zwischen Paluzza und Panlaro überlagern die weichen permischen Gesteine (Sandstein, Gyps und Ranehwerke) die älteren Sebiefer in einer geraden Linie, während weiter westlich Brüche von verschiedener Sprunghöhe die Grenze der verschiedenen harten Gesteine kennzeichnen. Trotzdem ist die Oberflächeform der Depression überall die gleiche.

Die Vorbedingungen zur Bildung eines grossen tektonischen Längsthalcs waren auch hier theilweise gegeben; doch liegt die Frianler Carnia schon zu nahe an der Südhachung des Gebirges. Daber treten hier die rein erosiven Querthäler als hauptsächlichliche Abflussrinnen hervor, während die tektonischen Längsthäler in zweiter Linie stehen. Das nördlicher gelegene Gailthal zeigt das umgekehrte Verhältniss.

Ein Blick auf die gegebene Karte lässt erkennen, wo ein Bruch von Wichtigkeit für die Thalbildung war und wo nicht. Die paläozoischen Brüche sind wegen ihrer Kürze und Unregelmässigkeit für die Thalbildung bedeutungslos, nmsmehr als sie häufig von den (mit ganzen Linien bezeichneten) jüngeren Brüchen durchschnitten werden. Zum Teil folgen allerdings die letzteren der Richtung der ersteren.

Im Gailthal wird die Abhängigkeit der Thalbildung von einem Bruche erst bei näherer Untersuchung dentlich; beide Thalgehänge bestehen von Tilliaeb bis Nötsch aus Thonsebiefern und Thonglimmersebiefer, welche der erodirenden Kraft des Wassers gegentüber das gleiche Verhalten zeigen und in ihrem Streichen von dem Flusse in sehr spitzem Winkel geschnitten werden.

Jedoch ermöglicht die geologische Untersuchung des Nordgebanges eine leichte Lösung dieser auf den ersten Blick rätselhaften Thalbildung. Von Ahfalterbach bei Sillian bis kurz vor Deutsch-Bleiberg zieht, kaum durch irgendwelehe Unregelmässigkeit unterbrochen der Gailbruch parallel zu der Furehe des Gailflusses. (Vergl. die tektonischen Linien der Karte.) Nördlich des Bruches erheben sich die Triasberge der Gailthaler Alpen, südlich davon bilden die grünen, gerundeten Phyllithöhen die Vorlage gegen die hentige Thal-furehe. In den Bruch eingeklemmt ist ein Streifen von vertikalgestellten, roten Grödener Sandsteinen und Conglomeraten.

Die leicht verwitternden Grödener Sandsteine boten nun

dem Wasser den ersten Angriffspunkt, und die Ausbildung einer vollkommen regelmässigen Thalfurche wurde durch die parallel zu dem Bruche verlaufende Gesamtneigung des Gebirges begünstigt. Später glitt das Flussbett naturgemäss tiefer und tiefer in die weiche Schiefer hinab, und gleichzeitig wurden dieselben von der Verwitterung stärker angegriffen als die härteren Gesteine der Trias. Die Parallelität von Thalfurche und Bruch erklärt sich aus der gleichförmigen Gesteinsbeschaffenheit und Lagerung der Phyllite und Thonschiefer. Bedeutungsvoll für die Beschaffenheit der Täler werden Verwerfungen also nur dort, wo verschiedenartige Gesteine, etwa Kalk mit Schiefer oder Sandstein zusammenstossen. Wo hingegen Kalk an Kalk oder Dolomit stösst, wie am Poldnigg (Devon-Trias), da bleiben oft die bedeutendsten Störungen ohne jeden Einfluss auf die Oberflächenform. Eine Unregelmässigkeit im Verlaufe der tektonischen Linie des Gailthales und -Bruches findet sich dort, wo der Bruch aus seiner zwischen O und OSO schwankenden Richtung etwas nach NO abgelenkt wird. Entsprechend der allgemeinen nach Osten gerichteten Abdachung des Gebirges hat sich auch hier die Hauptfurche in ihrer bisherigen Richtung fortgesetzt und verläuft also ausnahmsweise nicht mehr parallel zu dem nach NO abspringenden Bruche. Das im Norden des Hauptthales liegende Phyllitgebirge, der Zug der Hohenmauth wird also hier ungewöhnlich breit, und infolge dessen hat sich auf der Bruchgrenze von Phyllit und Triaskalk¹⁾ noch eine zweite spitzwinklig zum Gailthal verlaufende Furche, die des Gitschthales, eingesenkt. Aus dem geringeren Alter des Gitschthales erklärt sich die Thatsache, dass die Thalfurche hier weniger weit in den Phyllit abgeglitten ist, als im Gailthal.

Das Thal der Gail ist überaus scharf in einen oberen und einen unteren Abschnitt gegliedert, eine oroplastische Scheidung, welcher auch die volkstümlichen Bezeichnungen Lessachthal (für die obere Terrasse) und Gailthal (für den Unterlauf) Rechnung tragen. Die Sohle des ersteren liegt 250—300 m über der des letzteren, wenn man unter der Thalsole die Terrasse versteht, auf welcher die Ortschaften des

1) Der Grödner Sandstein scheint hier vollkommen zu fehlen

Lessachthales liegen; der Höhenunterschied zwischen den beiden nur 6 km von einander entfernten Orten Köttschach und St. Jacob beträgt 240 m. Allerdings hat sich die Gail in die alte Thalsohle ein tiefes Bett mit steilen Rändern in postglacialer Zeit eingegraben und die Höheverschiedenheit wird noch dadurch vergrößert, dass auf der alten Sohle des Lessachthals Glacial-schotter in nicht unerheblicher Mächtigkeit lagert. Aber die erwähnte Stufe von 240 m besteht nur zum kleinsten Theile aus losen Massen, zum grösseren aus anstehendem Gestein. Es kann somit keinem Zweifel unterliegen, dass dieselbe schon in präglacialer Zeit vorhanden war.

Für das Verständniss der bezeichnenden aus anstehendem Gestein bestehenden Querstufe des Lessachthals ist die Thatsache von Bedeutung, dass auch das Gailthal auf seinem Nord- und Südgehänge eine schmale, vielfach durch jüngere Erosion zerrissene Längsterrasse aufweist. Dieselbe ist ebenfalls in das anstehende Gestein eingeschnitten, nach ihrer Höhenlage die unmittelbare Fortsetzung des Lessachthales und entsprechend den Gefällsverhältnissen des heutigen Thales nach Osten zu allmählig gesenkt. Vielfach liegen Einzelhöfe auf dieser Stufe, so im Süden Dölling (916 m, ca. 200 m über Manthen), Krieghof, Kronhof, Ober- und Unter-Buchach (884 m), sowie Burgstall (790 m) bei Watschig (595 m). Denselben entsprechen auf dem anderen Thalgehänge Dobra, Lanz, Stollwitz, ferner die uralte Ansiedelung Gurina bei Dellach, sowie weiterhin Wiesenberg. Auch dort, wo Höfe oder Felder fehlen, hebt sich die Längsterrasse als ein wohl gekennzeichnetes Element der Landschaft ab und liegt, wie die obigen Höhenangaben beweisen, überall ca. 200 m über der heutigen Thalsohle. Der Unterschied entspricht also ungefähr demjenigen von Köttschach und St. Jacob (240 m). Die letztere Zahl wird einmal durch die räumliche Entfernung der beiden Orte (6 km) und ferner durch die Mächtigkeit der Glacial-schotter des Lessachthales vergrößert. Im nunteren Gailthal sind die Hochflächen von Egg, St. Stefan, Hohenthurm und Selttschach als Fortsetzungen der Längsterrassen zu betrachten und wie die breiteren Flächen des Lessachthales mit Glacialgebilden bedeckt. Die um ca. 100 m geringere Höhe von Egg und Hohenthurm erklärt sich aus der Lage dieser Hochflächen, welche all-

seitig freiliegen und somit einer stärkeren Abtragung angesetzt waren.

Die Querstufe des Lessachthals und die Längsstufen, welche das Gailthal begleiten, stellen also diejenige Form kombinierter Terrassen dar, welche v. RICHTHOFEN (Führer für Forschungsreisende S. 199) als Strombreenstufen bezeichnet hat und entsprechen ohne Zweifel einem älteren Thalhoden der Tertiärzeit. Die Annahme, dass auf der 47 km langen Strecke zwischen Köttschach und Feistritz (im unteren Gailthal) eine ea. 200 m mächtige und fast 2 km breite Gesteinsmasse durch die diluvialen Gletscher ausgeräumt wurde, dürfte selbst extremen Anhängern der Glacialerosion etwas weitgehend erscheinen.

Es bleibt also nur die auch aus anderen Gründen (vergl. unten) wahrscheinlichere Annahme übrig, dass die fragliche Erosionsarbeit durch fließendes Wasser während der jüngeren Tertiärzeit geleitet wurde. — Aber wo kamen die Wassermengen her, welche die Thalsohle des Lessachthals unberührt liessen und nur von Köttschach an abwärts eine so tief eingreifende Thätigkeit entfalteten?

Die Erklärung wird durch die Thatsache nahe gelegt, dass unmittelbar nördlich von Köttschach eine über 1000 m tiefe Einschartung den Zug der Gailthaler Alpen unterbricht. Der Gailbergsattel liegt nur 970 m über dem Meere, während ea. 4 km westlich der Schatzhübel 2095 m und im Osten der 3 km entfernte Jnekbübel 1891 m Höhe erreichen. Nun finden sich zwar im Süden des Passes einige tektonische Störungen, welche den ersten Anlass für die Ausbildung einer Scharte gegeben haben, aber im Norden streichen die widerstandsfähigen Rhättschichten ungestört über die Einsattelung fort und die Entstehung derselben ist somit vor allem auf erodierende Kräfte zurückzuführen.

Kombiniert man nun mit dieser Thatsache das auffällige Absetzen der Lessachthaler Stufe unmittelbar oberhalb Köttschach, so erscheint die Hypothese keineswegs zu gewagt, dass in einem mittleren Abschnitte der Tertiärzeit das obere Stromgebiet der Dran nicht durch das heutige Bett, sondern über den Gailberg und durch das Gailthal entwässert wurde. Besonderer Wert ist auf den Umstand zu legen, dass

der Gailbergsattel (970 m) ungefähr dieselbe Höhe besitzt wie die Lessachterrasse bei St. Jacob (948 m). Die etwas bedeutendere Höhe des Gailbergs erklärt sich aus den Massen von recentem Gehängeschutt, welcher die Passhöhe überkleidet. Im Sinne dieser Hypothese würden also in der Thalgeschichte des Gailgebiets während der Neogenzeit drei Phasen zu unterscheiden sein:

1. Ausbildung des alten durch die Strombeckenstufen gekennzeichneten gleichmässig von W nach O gesenkten Gailbettes 200 m über der heutigen Thalsohle.

2. Ablenkung der Drau; dieselbe fliesst über den Gailbergsattel, der infolge tektonischer Unregelmässigkeiten auf der Südseite als Einsenkung vorgebildet war, in das Gailgebiet und erodirt durch die bedeutendere Wassermenge das heutige Gailthal. Die Ablenkung der Drau erfolgte wahrscheinlich durch die ?miocaenen Brüche und Einsenkungen, welche noch jetzt die tiefe Einschaltung des Gailbergsattels kennzeichnen und hier eine rückwärts vorschreitende Erosion bedingten. Ein jüngeres Alten der Querbrüche ist auch aus geologischen Gründen nicht unwahrscheinlich.

3. Durch die Erosion wird während des letzten Abschnittes des Tertiärzeit das untere Draubett tiefer gelegt und der Fluss somit durch die abermalige Wirkung der rückschreitenden Erosion in sein altes Bett zurückgeleitet. Bereits vor Eintritt der Eiszeit war das heutige Abflusssystem fertig vorgebildet, wie die Verteilung der Glacialschotter und Moränen beweist. Die letzteren haben nur im Verlauf der Nebenbäche untergeordnete Veränderungen der Abflussrichtung bewirkt.

Einen Gegensatz zu der regelmässigen Gestaltung des Thales im mittleren und oberen Laufe der Gail bilden die unregelmässigen Oberflächenformen, welche die Gegend zwischen St. Stephan und Villach anzeichnen. Aus dem Ost-West streichenden Zuge des Gailthaler Gebirges springt das lang gestreckte Kalkplateau des Dobratsch nach Süden vor. Im Norden wird derselbe von dem auf untergeordnete Störungen zurückzuführenden Längsthal von Deutsch-Bleiberg, auf den drei anderen Seiten durch weit ausgedehnte Niederungen begrenzt. Die Form des Berges steht in unmittelbarster Ab-

hängigkeit von den geologischen Störungslinien. Von Hermagor bis Ober-Kreuth bei Bleiberg verläuft der Gailbruch genau in ost-westlicher Richtung, biegt dann in rechtem Winkel nach Süden um, lenkt aber westlich von Nötsch wieder in die alte Richtung zurück. Das westlich vom Dobratsch liegende Gebiet besteht aus leicht denudierten Gesteinen der Steinkohlenformation und aus Thonglimmerschiefer; dasselbe wurde durch die geschützte Lage in dem Winkel des Kalkgebirges vor völliger Abtragung geschützt und bildet jetzt das sogenannte Mittelgebirge. Der südliche Absturz des Dobratsch, dessen heutige Form durch den gewaltigen Bergsturz von 1348 verursacht ist, entspricht also ungefähr der Bruchlinie. Auch der geologische Bau der stark abgedachten östlichen Hälfte des Berges kann nicht unmittelbar untersucht werden, da Glacialbildungen ziemlich weit emporreichen und das an den Triaskalk angrenzende Gestein vollkommen verdecken. Doch ist hier das Hervorbreehen von warmen Quellen (bei Bad Villach) als Anzeichen geologischer Störungen aufzufassen.

Als tektonische Längsbruchthäler sind, wie erwähnt, auch die Linien Pontebana-Fella-Gailitz-Save und das Drauthal aufzufassen. Jedoch folgt in beiden Fällen die heutige Erosionsrinne viel genauer der alten Störungsrichtung, als es bei dem Gailthal der Fall ist. Bei der südlichen Längsbruchlinie ist der Grund naheliegend. Hier ist durch die Verwerfung der Schlerndolomit mit den weichen Werfener Sandsteinen sowie dem leicht zerstörbaren Bellerophonkalk in dieselbe Höhenlage gebracht. Da die beiden letzteren nun normal von härterem Muschelkalk und Schlerndolomit abgelagert werden, erscheint es selbstverständlich, dass der Wasserabfluss dauernd in der schmalen Zone weicheren Gesteines erfolgt.

Auch das Drauthal zeigt kaum Abweichungen von der Dislocationslinie (E. SUSS), trotzdem die Gesteine die gleichen sind wie im Gailthal (Triaskalk und Thonglimmerschiefer). Allerdings zeigt der Bruch zwei deutliche Umbiegungen bei Lienz und bei Oberdrauburg; dieser gebrochene Verlauf dürfte wohl das Abgleiten des Flusses nach der Seite des weicheren Gesteins verhindert haben.

Bei Oberdrauburg, bei Dellach (im Drauthal) und an einer

Stelle zwischen den genannten Orten liegen noch auf dem Nordgehänge schmale, stark dislocierte Fetzen von Trias. Die letztere ist hier die weichere, aus Mergeln und Rauchwacken bestehende Formation; der Thonglimmersehiefer ist quarzreich und ziemlich hart. Ein Abgleiten des Flusslaufes in nördlicher Richtung war somit gegeben. Bei Lienz bedingt das spitzwinklige Ausbiegen der Dran nach Norden, dass die Bruchlinie für eine kurze Strecke inmitten des südlichen Gehänges verläuft. Diese Abweichung ist jedoch nur durch die Einmündung der Isel bei Lienz bedingt, welche die Dran an Bedeutung übertrifft und somit an ihrer Ausmündung eine bedeutendere Erosionsarbeit geleistet hat.¹⁾

3. Zur Tektonik der Ostalpen.

Es bestand ursprünglich die Absicht, einen kurzen Abriss der geologischen Leitlinien der Ostalpen im Anschluss an die Darstellung der Karnischen Kette zu geben, in ähnlicher Weise wie C. DIENER dies für die Westalpen unternommen hat. Jedoch ergab sich aus dem Studium der Litteratur ebenso wie aus Besprechungen mit befreundeten Forschern, dass ein solcher Versuch zur Zeit undurchführbar ist. Wenn schon im Süden der Alpen empfindliche Lücken in der tektonischen Kenntnis²⁾ des Gebirges verschiedentlich vorhanden sind, so überwiegen in der Centalkette und den nördlichen Kalkalpen die unvollkommen bekannten Gebiete die genauer durchforschten bei weitem. In den nördlichen Alpen wechseln wohl durchforschte und nicht genügend beschriebene Gebiete ungefähr mosaikartig mit einander ab, so dass eine ungefähre Uebersicht mit Hilfe eines gewissen Grades von Combinationsgabe erreichbar scheint. In den Centralalpen sind es aber fast nur die den süd-

¹⁾ Eine zusammenhängende Darstellung der Oberflächengeologie, welche ursprünglich für das vorliegende Werk bestimmt war, musste mit Rücksicht auf die Kosten in der Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde in Berlin (1892) untergebracht werden. Nur der vorstehende Abschnitt konnte in der zusammenhängenden Darstellung des Gebirgsbaues nicht übergangen werden.

²⁾ Ich erinnere nur an die nördlichen Gailthaler Berge, den westlichen Theil der Julischen Alpen, die östliche Karnia, das Ortlergebiet u. s. w.

liehen Theil der Oetzthaler und Zillerthaler Gruppe betreffenden ausgezeichneten Aufnahmen TELLER's, welche über die älteren „Übersichtsaufnahmen“ hinausgehen. Wie wenig diese letzteren den auf ein Verständniß des Gebirgsbaues gerichteten Ansprüchen genügen, beweist am besten die im Sommer 1892 und 93 in Angriff genommene Kartirung des Brennergebietes. Wenngleich hier die stratigraphische Deutung der älteren Aufnahme im Wesentlichen (abweichend von den Karnischen Alpen) Bestätigung fand, blieb andererseits von dem — allerdings überraschend einfachen — Gebäude der früheren Profile kaum „ein Stein auf dem anderen“. ¹⁾ Soweit die wenigen sicheren, die Centralkette betreffenden Anhaltspunkte Rückschlüsse gestatten, sind dieselben bereits in dem vorstehenden Abschnitt verwerthet worden.

Die einzige Erwägung von allgemeinerer Tragweite, welche auf Grund der bisherigen Anhaltspunkte möglich ist, betrifft die Vergleichung von nördlichen und südlichen Kalkalpen, oder mit anderen Worten die Frage, ob bzw. in wie weit die Alpen ein „symmetrisches“ Gebirge darstellen. ²⁾

Die Frage der symmetrischen oder asymmetrischen Entwicklung der Kettengebirge, insbesondere der Alpen ist in theoretischer Weise nach dem Erscheinen der beiden Hauptwerke von SUESS verschiedentlich erörtert worden. Die ältere bis zum Jahre 1875 herrschende Lehrmeinung nahm bekanntlich an, dass die Centralzone durch eine vertikal wirkende „Hehnung“, oder Auffaltung entstanden sei. Der Faltenwurf der nördlichen und südlichen Nebenkette wurde bedingt durch den seitlich nach Norden und Süden wirkenden Druck. In scharfem Gegensatze hierzu wird der einseitige, tangential von Norden nach Süden wirkende Druck von SUESS 1875 für die „Entstehung der Alpen“ ³⁾ ausschliesslich als

¹⁾ Es soll dies selbstverständlich kein Vorwurf gegen die Pfadfinder der alpinen Geologie sein. Vielmehr beanspruchen die Leistungen derselben zu einer Zeit, wo weder genauere Karten in grossem Maasstabe, noch Gasthäuser und Unterkunftshütten und geübte Führer im hiefigen Sinne vorhanden waren, unbedingte Anerkennung.

²⁾ Man vergleiche auch meine allerdings sehr kurz gehaltenen Auseinandersetzungen in „Die Tribulansgruppe am Brenner“, RICHTHOFEN-Festschrift, Sonderabdruck S. 28—30.

³⁾ In dem gleichnamigen Werke.

tektonische Ursache angenommen. Die zusammengeschobenen Ketten des Alpensystems stauen sich an der Zone der alten Gebirgsrümpfe Mitteleuropas und treten in der ungarischen Ebene, wo der ständige Einfluss aufhört, fächerförmig nach Norden und Süden aneinander.

Die fortschreitende Aufnahme des Gebirges, die im Osten der Etsch vor allem durch MOJISOVICS und seine Mitarbeiter, im Westen durch BITTNER, TELLER, VACEK und LEPSIUS gefördert wurde, liess erkennen, dass eine so einfache Grundformel nicht die complicirten Verhältnisse des Gebirgsbanes auszudrücken vermöge.

SUËSS zögerte nicht den veränderten Voraussetzungen¹⁾ gerecht zu werden. Er hob die Wichtigkeit des Einbruches der Adria hervor, dessen Eiuwirkungen er bis in die Centralzone der Alpen verfolgen zu können glaubt; er wies ferner

¹⁾ Antlitz der Erde I, 1885. Wenn mehrfach (und nicht mit Unrecht) z. B. Verhandl. d. geol. R.-A. 1885, S. 24 ff.; 1886, S. 374 auf die Umgestaltung hingewiesen worden ist, welche die modernen Ansichten über Gehirgshildung durchgemacht haben, so kann im Sinne der Entwicklungsgeschichte hierin nur ein Vorzug gesehen werden. Während die Theorie von E. de BEAUMONT in starrer dogmatischer Form immer mehr verknöcherte und schliesslich allseitig verlassen wurde, liegt der Lehre von SUËSS eine Tendenz zu Grunde, die zu einer stetigen Entwicklung und Vervollkommnung führt. A. BITTNER wundert sich allerdings darüber, dass „der Urheber einer Idee“ selbst dann nicht aus seiner Reserve austritt, wenn die ursprüngliche Ansicht von den eigenen Nachfolgern und Anhängern „nach und nach total umgestaltet wird“. Wie BITTNER war auch ich in der Lage, auf Grund eigener Beobachtungen die SUËSS'sehen Ansichten umzugestalten, glaube aber, dass das von BITTNER hervorgehobene „Auffallende und Merkwürdige“ in sehr einfacher Weise erklärt werden kann. Wenn es sich um stratigraphische oder palaeontologische Beobachtungen handelte, so wäre allerdings der Urheber derselben verpflichtet, im Falle einer Controverse seine Wahrnehmungen unmittelbar zu verteidigen. So weit ist man aber auf dem Gebiete der Tektonik noch lange nicht. Wenn beispielsweise eine Discordanz von dem einen hochgeschätzten Geologen als Product unglehmässiger Faltung, von dem anderen als Transgressionserscheinung gedeutet wird (Karpathische Klippen, Glarner Alpen), so wird unmittelbar klar, dass in der Deutung tektonischer Beobachtungen der subjectiven Auffassung vorläufig noch ein grösserer Spielraum gelassen ist, als auf anderen Gebieten der Geologie. Theorien werden wohl stets, besonders aber auf dem schwierigen Gebiete der tektonischen Geologie, der Umgestaltung unterliegen; im vorliegenden Falle ist dieselbe Hand in Hand mit einer Erweiterung der positiven Kennt-

darauf hin, dass die südwärts gerichteten Faltungen des Südrandes aus dem Bestreben hervorgegangen seien, „die Senkung zu überschieben“ („Rückfaltung“). Infolge dieser von SUESS selbst eingeführten Aenderung wurde nun von einigen Kritikern angenommen (vgl. die Anm. S. 481), auch SUESS sei thatsächlich zu der Lehre von dem symmetrischen Aufbau der Alpen zurückgekehrt; nur die Convexität bezw. Concavität des „Aussen- und Innenrandes“ sei von der „einseitigen Ausbildung“ des Gebirges übrig geblieben. Da auch meine neuerdings veröffentlichten und durch die Aufnahmen des Sommers 1893 allseitig bestätigten Beobachtungen über die nord- und südwärts gerichteten Ueberschiebungen am Brenner dieser Auffassung günstig zu sein scheinen, erscheint eine neuerliche Besprechung der Frage angezeigt.

Keht doch in den Auseinandersetzungen BITTNER's der Gedanke immer wieder, dass nachdem SUESS selbst das Vorhandensein südwärts gerichteter Falten in den Südalpen gegeben hat, ein wesentlicher tektonischer Unterschied gegenüber den Nordalpen kaum mehr vorhanden sei:¹⁾ „Wenn SUESS selbst zugiebt, dass die tektonischen Elemente im Norden und Süden der Centrakette dieselben sind, dass in den Nordalpen lange Brüche mit gegen vorne gesenkten Ketten vorkommen, und dass hier senkende Bewegungen nicht angeschlossen sind, während in den Südalpen Flexuren (oder schiefe Falten) ebenso auftreten wie in den Nordalpen, wo bleibt da der grosse Unterschied zwischen den beiden Gebieten, der nur durch einseitigen Sehn des ganzen Gebirges zu erklären sein soll? Obwohl ich keineswegs ein Anhänger des ausschliesslich einseitig wirkenden Gebirgssehnes bin, und die von BITTNER hervorgehobene Uebereinstimmung theilweise²⁾ als richtig anerkenne,

nisse gegangen. Da nun ferner die Anregung zur Erweiterung des Beobachtungsmaterials in vielen Fällen (z. B. bei C. DIENER und dem Verfasser) unmittelbar oder mittelbar auf SUESS selbst zurückgeht, lag für diesen um so weniger Veranlassung vor, sich gegen etwaige hieraus hervorgehende theoretische Abweichungen zu wenden.

¹⁾ Jahrb. der geol. R.-A. 1887, S. 409.

²⁾ Die „tektonischen Elemente im Norden und Süden der Centralzone“ sind nicht „dieselben“. Gebilde, welche der Cima d'Asta und den Karnischen Alpen vergleichbar, fehlen im Norden überhaupt, mag man dieselben als „Horste“ oder als Aufwölbungen auffassen.

halte ich dennoch die Annahme der tektonischen Gleichartigkeit von Nord- und Südalpen für gänzlich verfehlt.

Wie im XIV. Kapitel nachgewiesen wurde, ist die tektonische Vorgeschichte beider Gebiete in vielen Beziehungen abweichend: die südlichen Ostalpen haben in der Mitte der Carbonzeit, die nördlichen in der Mitte der Kreidezeit eine Gehirgshildung erfahren, deren Spuren jedesmal in der gegenüberliegenden Zone gar nicht vorhanden oder zweifelhaft sind.

Ans dieser verschiedenartigen Vorgeschichte erklären sich die zahlreichen Unterschiede, welche den Ban der nördlichen und südlichen Ostalpen kennzeichnen:

1. Eruptivgesteine, die im Norden so gut wie gänzlich¹⁾ fehlen, sind im Süden seit der Dyas in fast allen geologischen Perioden in ausgedehnter Masse zum Ausbruch gelangt. Nach den local beschränkten Diabasausbrüchen der älteren Carbonzeit haben wir die altdyadischen Quarzporphyre von Bozen, die ausgedehnten Quarz- und Angitporphyrlaven der mittleren und oberen Trias, endlich die Granite von Meran—Franzensfeste und dem Adamello, welchen letzteren mit Rücksicht auf die Contactveränderungen triadischer Kalke ein spät- oder nachtriadisches Alter zukommt. Während die Kreidezeit im Allgemeinen frei von Eruptionen geblieben zu sein scheint, ist in dem südlichsten Gebiete das Tertiär wieder durch massenhafte und ausgedehnte Ausbrüche gekennzeichnet. Warum die Südzone im Gegensatz zum Norden und dem Centrum durch diese Lehftigkeit vulcanischer Eruptionen gekennzeichnet ist, wissen wir nicht. Jedenfalls muss diese bedeutende Anhäufung massiger Gesteine schon aus rein mechanischen Gründen den Gehirgshan beeinflussen. So weist VACEK nach, dass die Dislocationen der Trientiner Gegend von den Granitmassen der Cima d'Asta und des Adamello in ihrem Verlaufe beeinflusst werden. Ebenso reichen die südwärts gerichteten Überschiebungen des Gebietes zwischen Eisack und Etsch nicht über den Granitwall von Franzensfeste hinaus.

¹⁾ Die kleinen Diabasvorkommen des Algäu bilden die einzige Ausnahme.

Ferner ist soviel klar, dass die Eruptionen der Südalpen nicht in Zusammenhang mit der „Inneuseite“ des heutigen Gebirges stehen. Der heutige Gebirgsbogen ist junger Entstehung, Eruptionen fanden aber hier schon zur Carbon- und Dyaszeit statt, als die Anordnung der damaligen Kettengebirge eine gänzlich abweichende war; es erscheint nach dem Vorstehenden sogar nicht ausgeschlossen, dass die heutige Innenseite damals die Aussenseite war.

2. Obwohl die tektonischen Elemente im Süden und Norden zum Theil die gleichen sind,¹⁾ ist die Vertheilung derselben im Norden und Süden gänzlich verschieden. Sieht man von den überall auftretenden Querbrüchen ab, so verlaufen im Norden die langgedehnten Brüche und Falten der Centrakette parallel; im Süden wird der Verlauf beider durch den langgedehnten gegen die Centrakette convexen Bogen der Judicarien-Gail-Linie bedingt; die Villnösser- und Sugana-Save-Linie bilden die Sehne des Bogens, stehen also auch in keiner wahrnehmbaren Abhängigkeit von der Centrakette.

3. In einem fast überall wahrnehmbaren Zusammenhang mit diesem selbstständigen System von Dislocationen stehen die Aufbrüche älterer gefalteter Gesteine bei Recoaro, an der Cima d'Asta, bei Loreuzago, in der Karnischen Hauptkette und den Karawanken. Die eigentümliche Vertheilung der Brüche und der alten Kerne dürfte auf die weite Verbreitung eines carbonischen Faltungskernes zurückzuführen sein.

4. Die Vertheilung des gefalteten und gebrochenen Gebietes ist im Norden und Süden gänzlich verschieden. Während im Norden der Schollen- und Plateau-Charakter auf das verhältnissmässig kleine Gebiet zwischen den Berchtesgadener Kalkhochflächen und dem Todten Gebirge²⁾ beschränkt

¹⁾ An den langen geraden Dislocationslinien erscheinen im Norden (Buchberg—Mariazell—Windischgarsten) wie im Süden (Sugana-Save-Linie) zuweilen dieselben Aufbrüche von Werfener Schiefer inmitten der jüngeren Triaskalke.

²⁾ Watzmann, Untersberg, Gail, Steinernes Meer und Uebergangene Alm, Tennen- und Hagengebirge, Dachstein und Todtes Gebirge. Auch in der Rofangruppe am Achensee herrscht, wie n. a. die schöne photographische Aufnahme der liassischen Riffe von F. WÄHNER zeigt, der

ist, bildet dasselbe im Süden die Masse des Ganzen von den Julischen Alpen im Osten bis in das westliche Südtirol. Im Osten schliesst sich der nordalpinen Schollenregion das gefaltete Gebiet von Niederösterreich an, in dem das vorwiegende Fallen der Schichten nördlich von der Windischgartener Aufbruchlinie südwärts, südlich von derselben nordwärts gerichtet ist. „Grossartige, südwärts gerichtete Ueberschiebungen“ nimmt MOJSISOVICS vor allem für das Mürzgebiet an. Im Westen folgen den Berchtesgadener Gebirgen die langgezogenen Ketten der Nordtiroler und Bayerischen Kalkalpen, in denen Faltungen, Faltungsbrüche und Ueberschiebungen den Gebirgsbau beherrschen, wie sogar die in kleinerem Maasstabe ausgeführten geologischen Karten erkennen lassen. Die Faltungen sind hingegen im Süden auf die peripherischen Zonen beschränkt: sie begleiten, wie oben dargelegt wurde, die Gail-Judicarienlinie in ihrer ganzen Erstreckung und beherrschen ebenso — zusammen mit O—W streichenden Faltungsbrüchen — den Gebirgsbau der Karawanken.¹⁾ Ferner wird die südlichste Grenzzone vom Comer See bis Dalmatien durch südwärts geschobene Falten gekennzeichnet. Der zum Theil nachgewiesene, zum Theil angenommene carbonische Gebirgskern erscheint allseitig von Falten umwallt; eine Ausbildung dieser Dislocationsform über bzw. in der Kernmasse wird durch die Starrheit derselben verhindert.

Während die Nordtiroler Kalkalpen gefaltet und zusammengeschoben, bildeten sich in dem Hauptgebiete der Südalpen

Plateancharakter vor. Im Allgemeinen ist in dem genannten Gebiet die flache Lagerung nur durch Brüche unterbrochen; Faltungen gehören zu den Ausnahmen (GEYER l. c. S. 250). Die einzige übersichtliche Darstellung findet sich bei G. GEYER, Ueber die Lagerung der Herlitzschichten in der südlichen Zone der Nordalpen zwischen Pass Pyhrn und dem Achensee. Jahrb. d. geol. R.-A. 1886, bes. S. 245 ff.

¹⁾ TELLER beschreibt (Verhandl. d. geol. R.-A. 1886, S. 105) das Vorkommen silurischer Gesteine am Seeberg in den Karawanken als antiklinale Aufbruch, der von Längsstörungen begrenzt wird. „Das Gebirge ist buchstäblich in einzelne schmale Bänder und Streifen von Gesteinszonen verschiedenen Alters zerschnitten“. Diese Häufung paralleler, meist sehr tief greifender Längsstörungen muss geradezu als das „hervorstechendste Moment im Gebirgsbau des östlichen Theiles der Karawanken bezeichnet werden“.

Sprünge, längs welchen das Gebirge stufenweise gegen Norden emporgezerrt wurde (v. MOJSISOVIC), und an der Grenze der beiden verschiedenartigen tektonischen Regionen fand die höchste Emporwölbung des Gebirges statt.

E. SUESS hat bekanntlich den Versuch gemacht, die Bruchlinien der südlichen Ostalpen und vor allem auch die Entstehung der peripherischen südlichen Faltnngszone mit dem Einbruch der Adria in ursächliche Beziehung zu setzen. Die Falten seien bestimmt, die Senkung zu überschieben.

Nach den neuesten Angaben STACHE'S über die tektonische Geschichte des dalmatinischen Küstenlandes ¹⁾ soll nun allerdings die neogene Faltung der dinarischen Ketten dem Einbruch des alten adriatischen Festlandes vorangegangen sein; die beiden tektonischen Phasen wären sogar durch „die lange neogenquartäre Periode eines ausgedehnten, verhältnismässig stabilen Festlandbestandes“ von einander getrennt. Wenn sich diese vorläufigen Angaben bestätigen sollten, würde ein Zusammenhang zwischen den älteren Dislocationen der Ostalpen und dem quartären Einbruch der Adria nicht angenommen werden können. Dass die Gail-Judicarien- und die Sngana-Save-Linie nichts mit dem adriatischen Einbruche zu thun haben, wurde schon früher nachgewiesen.²⁾

4. Kommen an Bruchlinien „Hebungen“ vor?

Im Vorstehenden ist bereits mehrfach darauf hingewiesen worden, dass die Karnischen Alpen und Karawanken, trotzdem Brüche die beherrschende Rolle im Gebirgsbau spielen, eine Emporwölbung, nicht einen Horst darstellen. Das nördliche Gailthaler Gebirge wurde in toto als eine Synklinale aufgefasst, und somit konnte die südlich liegende Karnische Hauptkette nur als antiklinale Aufwölbung gedeutet werden. Der Gailbruch ist der gebrochene Schenkel der Falte. Die südliche Begrenzung des alpalaeozoischen Anbruches berechtigt zu demselben Schlusse. Wenn die Trias im Osten der

¹⁾ Verhandl. d. geol. R.-A. 1888, S. 52 und Uebersicht der geologischen Verhältnisse der Küstenländer, 1889, S.-A. S. 88.

²⁾ Die Tribulanzgruppe am Brenner, S. 31, 32.

Hauptkette nur durch Absenkung in ihre heutige Lage gekommen wäre, würde die Höhe, zu welcher die silurischen Schiefer am Hochwipfel emporragen, schlechtweg unerklärlich sein. (Die Höhe der unmittelbar benachbarten Schiefer- und Dolomitberge ist fast gleich, trotzdem die Widerstandsfähigkeit des ersteren Gesteins gegen denndirende Einflüsse viel geringer ist.)

Aehnliche, die verticale Bewegung betreffende Annahmen sind für die durch Hochwipfel-, Zirkel- und Roskofelbrüche umgebene Carbonscholle notwendig. Auch diese aus weichem Gesteine bestehende Masse hat einst, wie die eigentümliche Anordnung der Thäler beweist, die Dolomitmassen überragt. Abgesehen von einzelnen späteren Nachbrüchen¹⁾ hat also im Allgemeinen eine Aufwärtsbewegung an den Dislocationen stattgefunden.

Auch hier werden wir also zu derselben Anschauung geführt, die MOJSEWITSCH schon längst für die Brüche von Südtirol angesprochen hat: An den grossen Längsstörungen des Gebirges fand eine ungleichmässige Hebung oder besser gesagt Emporzerrung der Schollen statt.

Es ist ohne weiteres klar, dass die Auffassung in unmittelbarem Widerspruch zu der SUSS'schen Lehre steht: Es giebt keine aufsteigende Bewegung im Festen ausser derjenigen, welche etwa mittelbar aus der Faltung resultirt. Eine vermittelnde Anschauung in dem Sinne, dass anfangs eine Hebung, später ein Nachbruch stattgefunden hätte, ist nur für einzelne Fälle,¹⁾ nicht aber für die grossen Hochgebirge der Erde möglich.

Die Untersuchung der Structur des einzelnen Bruches er giebt keine unmittelbaren Anhaltspunkte für die Tendenz der Bewegung; Schleppungen und Abquetschungen der Schichten werden in genau derselben Weise erfolgen, mag nun die eine Scholle gehoben, oder die andere gesenkt sein. Wir werden also die geologischen und die Höhenverhältnisse in jedem einzelnen Falle in Betracht zu ziehen und dann aus den sicher

¹⁾ Die Längsscholle des Fellthales, die vom Hochwipfel- und Savebruch begrenzt wird, dürfte theilweise auf einen derartigen Nachbruch zurückzuführen sein.

festgestellten Beispielen allgemeine Schlüsse über die Tendenz der Erdkrustenbewegungen abzuleiten haben.

Für die Alpen liegt nach dem Vorstehenden die Frage ziemlich klar: Die Einzelbeobachtungen beweisen für eine grosse Zahl von Brüchen Emporzerrung oder Hebung; für die bedeutendsten Dislocationen der Südalpen, die Gail-Judicarien- sowie die Sugana-Save-Linie ist ein unmittelbarer Zusammenhang mit der Faltung nachgewiesen, und bei den anderen Dislocationen des Tiroler Schollengebietes wird der Bruchcharakter wahrscheinlich nur durch die Starrheit der Unterlage bedingt. Der grossartige und sicher festgestellte Einbruch der Adria fällt aber wahrscheinlich in eine junge geologische Zeit, in der die Aufrichtung des Gebirges schon ihren Abschluss gefunden hatte.

Ein zweites für die Erörterung dieser Fragen mit Vorliebe herangezogenes Gebiet ist der amerikanische Westen, insbesondere die Schollenregion des Great Basin. Auch hier nimmt bekanntlich SUESS gewaltige Senkungen an, um das Vorhandensein von Brüchen zu erklären, während die amerikanischen Geologen an dem Vorhandensein von Hebungen festhalten: „Die grossen Ketten und Plateaux der Felsengebirge sind durch vertical wirkende Kräfte gehoben worden. Horizontale Compression fehlt ganz, oder wo sie spureweise vorhanden ist, resultirt sie aus der Aufwärtsbewegung des plastischen Kernes, im geraden Gegensatz zu der meist verbreiteten Meinung über Gebirgsbildung, welche die Aufwärtsbewegung zur Resultirenden einer unwiderstehlich wirkenden horizontalen Zusammenschiebung macht. Die Berge des Westens sind also nicht durch horizontalen Druck gebildet, sondern durch die Wirkung unbekannter Kräfte unter ihnen gehoben worden.“¹⁾

So kurz der Aufenthalt war, der den europäischen Geologen der „great western excursion“ im Jahre 1891 an den einzelnen hochinteressanten Punkten gegönnt war, so war es doch, dank der ungewöhnlichen Klarheit der Aufschlüsse, möglich, ein Bild von dem Bau des Gebirges zu erhalten. Von besonderem Interesse waren für die vorliegenden Fragen be-

¹⁾ DUTTON, VI Annal. Rep. 1884—85, S. 197. Vergl. BITTNER, Jahrb. d. geol. R.-A. 1887, S. 416.

sonders die Umgehungen der Basin Ranges (Utah) und der Rand des Hochgebirges der Front Range im Staate Colorado. Die grosse Randspalte des Gebirges, welche hier die Kreidebildungen der grossen Ebenen in ziemlich nahe¹⁾ Berührung mit den Graniten des Pikes Peak und den archaischen Gesteinen der Royal Gorge bringt, trägt ganz und gar nicht den Charakter eines Senkungsbruches. Statt der peripherischen Staffelbrüche und der Radialspalten, welche eine grosse Senkung begleiten, ist die Grenze durch einige Falten und schräge Verschiebungen und Ueberschiebungen²⁾ gekennzeichnet. Besonders bemerkenswerth ist die ruhige, ungestörte Lagerung, die „mesa structure“ der Kreide- und Tertiärbildungen in der grossen Ebene. Eine derartige Abwesenheit aller Brüche wäre für wirkliche Senkungsfelder unerhört.

Ebenso wenig wie der Rand des Hochgebirges ist die Struktur des „Basin ranges“, der merkwürdigen aus Monoklinalen oder durchgerissenen Antiklinalen bestehenden Gebirge von Utah durch Senkung des umliegenden Landes erklärbar. Auch im Great Basin umfasst die Vorgeschichte des Gebirges eine Reihe von mannigfachen Phasen. Abgesehen von einer grossartigen postarchaischen Transgression der Algonkischen und palaeozoischen Schichten sowie von kleineren Meeresschwankungen der älteren und mittleren Aera, fand die hauptsächlichliche Faltung z. B. in den Wahsatch- und Uintabergen am Ende der Kreidzeit statt. Das Eocæn transgredirt mit Conglomeraten über die älteren aufgerichteten Bildungen. Aber wie in den Alpen dauerten die Hebungen („uplift“) hier in verminderter Energie während der älteren und mittleren Tertiär-Tertiärzeit fort. Die Erscheinungsweise der heutigen

1) Die zwischenlagernden palaeozoischen Gesteine, besonders Silur und Carbon, sowie die rothe Trias-Jura Serie ist durch die Dislocation stark reducirt und besitzt im Allgemeinen eine im Vergleich zu den sedimentären Vorketten anderer Hochgebirge gar nicht in Betracht kommende Breite.

2) Durch eine derartige Bewegung ist der devonische fischreiche Old-Red sandstone in das Untersilur von Canyon city gerathen. Das regelmässige, von WALCOTT publicirte Profil entspricht den natürlichen Verhältnissen nicht.

Basin-Ranges mit ihren durchgerissenen Synklinalen (Wasatch), ist auf dies „uplifting“, dem eine energisch wirkende Denudation folgte, zurückzuführen. Die am meisten hervortretenden Brüche des Hochplateaux von Utah¹⁾ stehen in derselben Abhängigkeit von der Längsrichtung des Gebirges wie etwa die zweifellosen Faltungsbrüche der Nordalpen. Völlig verschieden ist die Anordnung der Einbruchspalten in echten Senkungsgebieten, wie sie etwa das Liparische oder Aegaeische Meer oder die Senkungen am Ostende der Alpen darstellen.

Die soeben gekennzeichnete Verschiedenheit ist dem Scharfblicke von SUSS nicht entgangen: „Die Vorstellungen, welche sich auf den engen umgrenzten Gebieten des mittleren Europas bilden, sind aber zum größten Theile nicht übertragbar auf jene weiten Regionen anderer Welttheile, in welchen horizontal geschichtete Platten auf außerordentliche Strecken hin durchschnitten sind von grossen Störungslinien, in welchen der Begriff von peripherischen Linien selten, jener von radialen Linien noch seltener Geltung erlangen kann“.

Auf eine Consequenz der Auffassung, die in zahlreichen Hochgebirgen oder Hochgebirgstheilen „Horste“ sieht, wurde schon hingewiesen. Man müsste nicht nur die Ozeane, deren tektonischer Bau im Wesentlichen unbekannt ist, sondern auch die grossen Ebenen der Erde, wie die russische oder nordamerikanische Tafel als Senkungsgebiete auffassen. Ein solches Senkungsgebiet müsste aber von Brüchen umgeben sein. Hingegen war am Rande der Rocky Mountains der Nachweis möglich, dass die vorliegenden Dislocationen nicht dem Typus der Senkungsbrüche entsprechen und an den Rändern der Russischen Tafel fehlen derartige tektonische Erscheinungen überhaupt.

Das Bild, welches wir uns von dem Bau der Erdrinde zu machen haben, wird durch Berücksichtigung neuerer Forschungen immer verwickelter. Während bei den älteren Geologen²⁾,

1) Wiedergabe bei SUSS, Antlitz der Erde I, S. 163.

2) Und bei LAPPARENT, der, indem er einige Auswüchse der neueren Richtung mit Glück bekämpft, auch die wesentlichen und wichtigen Fortschritte derselben zu verkennen geneigt ist. (Vergl. FRECH, Zeitschrift d. Gesellschaft f. Erdkunde. Berlin 1887. S. 151 ff. u. 155 ff.)

vor allem bei ELIE DE BEAUMONT die selbständige Hebung womöglich jeder einzelnen Falte angenommen wurde, gliederte SUSS in grossartiger Uebersichtlichkeit die Dislocationen in tangentiale und verticale (senkende). Bei der einen Grundform sind Faltung und mittelbar aus derselben resultirend Hebung, bei der anderen Bruch und Absenkung die Aeusserungen der tektonischen Kraft.

Im Vorstehenden ist der Nachweis versucht worden, dass nicht nur gelegentlich, sondern als weit verbreitete Dislocationsform Hebungen an Bruchlinien vorkommen. In zwei Gebieten, deren eines seit Jahrzehnten ein Lieblingsgegenstand geologischer Forschung war, während das andere in unbeschreiblich klaren und grossartigen Aufschlüssen seinen inneren Bau enthüllt, konnte dieselbe Thatsache durch das Zeugnis verschiedener Beobachter nachgewiesen werden.

Wenn ein schon einmal gefalteter starrer Gebirgsrumpf einer neuerlichen Gebirgsbildung (Anfwölbung) unterliegt, so erfolgt nicht eine zweite Faltung oder Emporwölbung, sondern eine Aufwärtsbewegung der Gebirgsmassen an grossen, einheitlichen, der Längsrichtung des Gebirges folgenden Brüchen.

Ich habe im Vorstehenden den Versuch gemacht, das Wenige, was über den tektonischen Charakter und die Bildungsgeschichte der Ostalpen sicher bekannt ist, in möglichst gedrängter Form zusammenzufassen. Möge man nachsichtig über die Mängel hinwegsehen, welche jedem derartigen Versuche anhaften, der bei dem Widerstreit der Meinungen jetzt doppelt schwierig ist.

Für unsere Kenntniss des alpinen Gebirgsbaues gilt noch immer das Wort, mit dem vor 16 Jahren v. MOJSISOVICS seine Dolomittrife abschloss: „Wir stehen am Beginne des Erkennens und Begreifens, ein weiter Weg liegt noch vor uns!“

Orts- und Sach-Register.¹⁾

A

- Aarmassiv 449
 Abfalterbach 137, 462, 463
 Abflusssystem der Alpen 471
Acanthospongia 253
 Achomitz 15, 211
 — (Profil zum Achomitzer Berg) 16
 Achomitzer Berg 436
Acidaspis gibbosa MSTR. sp. 241
Acrochordiceras 401
Actinostroma 255
 — *clathratum* NICHOLS. 259
 — *intertextum* NICHOLS. 233
 — *verrucosum* GF. sp. 259
 Adamello 453
 Adamellogebiet 196
 Adneter Knollenkalke 230.
 Adneter Schichten 134
 Adria (Einbruch) 486
 Aegaeisches Meer 490
 Agordo 168
 Alpelspitz, 1304 m, 25
 Alpelweg 28
 Altligoecener Nummulitenkalke 453
 Altwasser 305
Alveolites Labechei M. EDW. et H. 233
 — nov. sp. (aff. *reticulato* STEIN)
 264
 — *suborbicularis* LAM. 262, 263, 264
- Amariana, Monte 170
Amblysiphonella sp. 315
 Ampezzo 6
 Amphibol siehe Hornblende
Amphicoelia 294
 — *europaea* nov. sp. inser. 252
Amplexus 287
 — *coronae* FRECH mscr. 315, 328
 — *hercynicus* A. ROEM. 263
Anarcotes (Böhmen F₁, Wolayer
 Thörl) 248
 — *lateceptatus* BEYR. 220
 Angerthal 80
 Angerthaler Culm 85
Angularia 418
Annularia sphenophylloides ZENK.
 sp. 313
 — *stellata* SCHLOTH. sp. 313
Anomia alpina WINKL. 421
 Antelao 423
 Antelao-Linie 464
 Antholzer Gruppe 196
 Antliraclitfötzchen 311
 Autolobach 115
 Antrilles 451
 Apennin 444
Aphyllites 91
 — (Böhmen F₂ Wolayer Thörl) 248
 — *zorgensis* A. ROEM. sp. (= *Gonia-*
tites cecrus KAYS. 298

¹⁾ Die Namen der Autoren sind nicht aufgenommen.

Araxesenge bei Dzulfa 400
Arceutes 372
 — *Gaytani* 415
Arcthusina Haueri FRECH 231, 234
Argonauta 353
Archaeocalanites 93
 — *radiatus* 87, 305
Archaeopora uexilis DE KON. 306
 Arizona 359
 Arnoldstein 211
 — (Kalkzug von) 13, 14
 Arta, Schwefelbad 170
Athyris ambigua SOW. 306
 — *Campomanesi* Arch. Verh. (Wolayer Thörl) 253, 295
 — *concentrica* v. R.? 262
 — *Ezquerria* VERN. 295
 — *globosa* A. ROEM. 206
 — *globosa* var. nov. *elongata* FRECH 92, 266
 — *janiceps* 342
 — *mucronata* OEHL. 259
 — *obolina* BARR. sp. 249
 — *pertinifera* SOW. 373
 — *planosulcata* PHILL. 306
 — *subcompressa* FRECH 253
 — *subcompressa* mut. *progona* FRECH 249
Aspasmophyllum ligeriense BARROIS sp. (= *Zaphrentis ligeriensis* BARROIS 255
Astartella Reussiana DE KON. 307
Astartopsis (Corbula) Rosthorni 415
Astrocoenia decipiens LBE. 354
 Asturien 534, 565
 Asymmetrische Entwicklung der Kettengebirge 480 ff.
Atrypa aspera BRONN. 267
 — *comata* BARR. 253, 259
 — *desquamata* SOW. 262
 — *marginalis* DALM. 249
 — *reticularis* L. 233, 259, 367
 — *seniorbis* BARR. (F.) 259
 Auernigg 49
 Auerniggprofil 317 ff., 326
 Aufbruchslinie Buchberg-Mariazell-Windischgarsten 429

Aufpressungen älterer Gesteine im Schlerndokomit von Malborget 27
 Aufpressungen von älteren plastischen Gesteinen in starren Jüng. 427
 Augit helllederbraun in dynamometamorphem Diabas 184
 — grünlich, verbunden mit Uralit in dynamometamorphem Diabas 183
 Augitporphyrlaven der mittleren und oberen Trias 483
Aulopora minor GOLDF. 264
 — *repens minor* GF. 259
 Auswäzlung 434
 Avanza 103, 109
Avicula palliata BARR. E₂ W. 252
 — *scala* BARR. mut. 252
Aviculopecten antilineatus DE KON. 307
 — *arenosus* PHILL. 307
 — *Barrandianus* DE KON. 307
 — *concentricostriatus* M'COY. 307
 — *deornatus* PHILL. 307
 — *Fitzingerianus* DE KON. 307.
 — *Haidingerianus* DE KON. 307
 — *Hoernesianus* DE KON. 307
 — *intortus* DE KON. 307
 — *Partschanus* DE KON. 307
 — *subfimbriatus* DE KON. 307
Axonmilia 354
 Azzarola (Lombardei) 139

B

Balatonites 404
 — *bragnensis* LORTZ 397
 Bänderkalke, grade des Pollinigg 77
 Bärenbadhauereck 2:5
Baevia digitata HEER 340
Bakewellia 399
 — *ceratophaga* 374
 Barcelonnette 420
 Basin Ranges (Utah) 489
Bellerophon (Stachella) 55
 — *pelos* HALL var. *expansa* BARR. W. 250
 — *tenuifascia* SOW. 305
 — (*Euphemus*) *decussatus* FLEM. 305
 — (*Euphemus*) *Uvii* FLEM. 305

Bellerophon (Tropidocyclus) telescopus nov. sp. 251
 Bellerophonkalk 336, 341, 426
Beloceras nov. sp. 227
 — (Wolayer Thörl) 245
 Berehtesgadener Gebirge 455
 Beyrießen (Kalk) 236
 Bifertengrütli an der Ostseite des Tödi 447
 Blotit in Qnetschzonen der Hornblende-Gesteine des Nütsehgrabens 177, 178
 — in dynamometamorphen Diabasen 183, 184
 — in Quarzphyllit 185
 Bladen (Sappada) 467
 Bladener Joehkofel 110
 Bladener Jüchl, halbkristalline Bänderkalke 245
 Blattverschiebung 72, 433
 Blattverwerfung mit Ablenkung des Streichens 435
 Bleiberg 2, 152
 Bleiberger Erzberg 461
 Blutjaspis 173
 Bodernalm 130
 Bombaschgraben 28, 45, 318
 Bordaglia Alp 167, 427, 430, 461, 465
 Bordaglia di sotto 105
 Bosnien 469
Bothrophyllon 366
 Bozener Quarzporphyre 133
 Brachioidenkalke 281
 Brachiopodenkalk des unteren Oberdevon 266
 Brachiopodenmergel und -Schiefer (Facies) 253
Brancoeras 355
 Braunstein 23
 Brda 172
 Breitenstein (2100 m) 140
 Brennergebiet 480
 Brenner (Uebersehiebungen) 182, 414
 Brentagruppe 464
 Brest 247
 Briançonnais 449
 Brixener Granitwall 196

Bronteus thysanopeltis 275, 386
 — *palifer* 275
 — *transversus* BARR. 256
 Bruehblatt 434
 Bruchnetz der Karnischen Alpen in seinem Zusammenhang mit den tektonischen Linien d. Ostalpen 460
 Bruchsysteme (3) der südlichen Ostalpen 465
 Brueck 137, 463
 Buchach (884 m), 475
 Buchacher Alp 65
 Bueberg-Mariszell-Windischgarsten (Aufbruchlinie) 451
 Buchensteiner Schichten 167, 381, 410
 Büdesheim 334
 Butowitz (F₁), schwarze Plattenkalke von 298

C

Cabrières in Languedoc 239, 273, 287, 305
Calamites approxinatus BRUT. 361
 — *ramosus* ARTIS 335
 — *Suckowi* BOT. 335
 Visé Calesaire de 305
 Calceolamergel in der Eifel und bei Torquay 283
 Calceolashiefer des Oberharzes 283
Calceola sandalina 265
 Calciferous sandstone (Schottland) 331
Calymene reperta OEHL. 250.
Callipteris conferta STERNB. sp. (?) 325
Callonema (? *Macrocheilus*) *Kayseri* OEHL. 251,
Cameroocrinus HALL. (= *Lobolithus*) BARR. 222, 225
Cameroophoria sp. 269
 — *alpina* SCHELLWIEN 313
 — *latissima* SCHELLWIEN 332
 — *Purdoni* DAV. 373
 — *Sancti Spiritus* SCHELLWIEN 332
 Canal di Gorto 93
 Canyon city 459
 Caradoeschiefer des Uggwathales 219

- Carbon 302 ff.
 Carbon in den Ostalpen, Verbreitung
 desselben 332
 Carbonische Gebirgsbildung 111
 Carbon, karnisches, Altersverhältnis
 des 377
 Carbon und Perm, die Stellung des
 Karnischen in der allgemeinen
 Schichtenfolge 349
Cardiola 285
 — *cornu copiae* GOLDF. (= *C. inter-*
rupta SOW. et anet.) E₂ 226, 235,
 238, 242
 — *retrostriata* 269, 287
 — *spuria* MSTR. sp. (= *Cardiola per-*
signata BARR. 242
Cardiomorpha? *tenera* DE KON. 307
 — *concentrica* DE KON. 307
Cardita austriaca v. H.
 — *Guembeli* 163, 416, 417
 Carditasechichten 145
 Valle di Carnia 115
Carpolithus Klockeanus GEIN. sp. 341
 — *Eiselianus* GEIN. sp. 341
 — *foveolatus* HR. 341
 — *Geinitzi* HR. 341.
 — *hunnicus* HR. 341
 — *liboceloides* HR. 341
 Carnia, östliche 165
 — westliche 165
Carnites floridus 153, 160, 415, 417
 Caroj-Thal 61
 Casa Culet 62
 Casa Dimon 62
 Casa Monuments 439
 Casarotta 59
 Castellet 450
 Cathervielle 285
 Caunopora-Form. 259
Celaeceras praematurum (G₂) 245
 Cellonkofel 89, 84
 — Mächtigkeit der Kalke am 86
 Centralplateau, französisches 213
Centronella 295
 Cephalopoden-Schiefer und -Mergel
 287
 Cephalopodenkalke, bunte 287
Ceratites subrobustus 463
Ceratodus (Lunzer Sandstein) 415
 Cerevesa-Alp 61 309
 Cercivento 169
 Chassegrin (Sarthe) 297
Chemnitzia Rosthorni HOERN. (*Pseu-*
domelania) 160
Cheirurus gibbus BEYL. W. 250
 — *insignis* BEYL. (*Cheirurus* s. str.
 bei F. SCHMIDT) Gruppe des *Ch.*
insignis 241
 — *intermedius* 96
 — *propinquus* MSTR. mut. *deronica*
 nov. nom. 249
 — *propinquus* MSTR. (= *Quenstedti*
 BARR.). (E₂) 225, 231, 234, 240
 — *Quenstedti* BARRANDE (siehe *Ch.*
propinquus) 241
 — *Sternbergi* BARR. (F₂, G₁) 224,
 258
 Chemung group 283
 Chiarso-Cañon 62, 64, 247
 Chiusaforte 171, 174
 Chiorit in spilitischen Mandelsteinen
 181, 182
 — in Mandelräumen von Spiliten
 182
 — in dynamometamorphen Diabasen
 183, 184
 — in Porphyriten 185, 186
 — in Quarzphyllit 187, 188
Chonetes Buchianus DE KON. 306
 — *hardrensis* 352
 — *Laguessianus* DE KON. 306
 — *latusinatus* SCHELLWIEN 318
 — *Koninckianus* SEMENOW? 306
Chonetes-Schiefer 283
Choristoceras Marshi 391
 Cladenis, Monte 110
 Cibinberg 37
 Cilli (Sildsteiermark) 412, 452
 Cima d'Asta 62, 462, 468
Cladochonus 287
 — *Michelini* M. EDW. et HAIME
 376
Cladograptus 221
 Clapsavon (Tirol) Monte 411.

- Clathrodictyon philoclymena* FRECH 269
Climacograptus 221
 Clymenienkalk 267 ff.
Clymenia (Cyrtoclymenia) binodosa MSTR. 265
 — (*Cyrtoclymenia*) nov. sp. aff. *binodosa* 268
 — (*Cyrtoclymenia*) *cingulata* MSTR. 265
 — (*Cyrtoclymenia*) *Dunkeri* MSTR. 265
 — (*Cyrtoclymenia*) *laccigata* MSTR. 268
 — (*Gonioclymenia*) *speciosa* MSTR. 265
 — (*Oxyclymenia*) *strata* MSTR. 265
 Coalbrook Dale 353
 Coblenzquarzit 283
Coccolophyllum 384
Coelocoenia (= *Pylocoenia*) 384
 Coglians (Monte) 91
 Col Beechel 451
 Colle di Mezzo Glorno 422
 Collinetta-Alp 89
 — Synklinale der 85
 — Clymenienkalke an der 92
 — Ausläufer der Synklinale 88
 Colorado 359
Columnaria ? sp. 264
 Comeglians 164
 Comelico 163, 165
 — Inferiore 131
 Comer See 485
 Complicirte Faltungs- u. Interferenzerschelungen 434
 Confingraben 59
 Conglomerat, breccienartig, hauptsächlich von Horablendereichen Gesteinen gebildet Nötschgraben, nördlicher Eruptivzug 179—181
 Conocardienschieht 315
Conocardium abruptum BARR. 252
 — *artifex* BARR. 252
 — *nucella* BARR. 252
 — *primum* BARR. (F₂) 252
Conocardium uralicum VERN. 315, 321
Corbis Mellingeri 169
Cordaites borassifolius STBG. 362
 — *principalis* GERM. sp. 325
 Rivo Cordila 57
 Cornon, Monte 422
 Costa Splua 124
 — Zucco 121
 Cresta Verde 75
 Cretaceische Gebirgsbildung 449
 Crinoidenschleht von Gerolstein 283
 Croda Bianca 93, 104, 107, 432, 443
 Crostis, Monte 94
Cryptonella 295
 Utenocrinusbänke 283
 Cucco, Monte 169
 Callar, Monte 48, 171
 Culm, auf der Südseite d. Karnisehen Alpen 308
 Culmschiefer 7
Cyprinostrinus abbreviatus 265
Cyathocrinus nov. sp. 255
Cyathophyllum angustum LONSDALE 233
 — *arctinum* FISCH. 324, 328
 — *bothycalex* FRECH 262
 — *caespitosum* GF. 98, 262, 263, 264
 — *expansum* M. EDW. et H. sp. (*Py-chophyllum expansum*) 249
 — *helianthoides* GF. 264
 — *heterophyllum* M. F. et H. 98
 — *heterophylloides* FRECH 266
 — *hexagonum* GF. 264
 — *Lindströmi* FRECH 263
 — *vernicularis* GF. var. *procursor* 17, 264
 — *vezatum* BARRANDE mser. 249, 255
Cyclolobus 572
Cycloclymenia 269
Cyphaspidis 275
 Cypridinschiefer des Oberdevon 287
Cyrtoceras miles, Zone des 227
 — *miles* BARR. (E₂) 247
 — *patulum* BARR. 235
Cystiphyllum 255

D

- Dadocrinus gracilis* 395
Dadozylon acadicum 357, 362
 S. Danle bei Palnzza 309
Daonella 46
 — *Lommeli* WISSM. 411
 — *Taramelli* MOJS. 411
Dayia (Atrypa) navicula BARR. 236
 Dellach bei Egg (Gailthal) 17
 — (im Drauthal) 475
 Dellacher Alp 144, 146
 Deltaansfüllung alter Seen 364
 Denmlerhöhe (2373 m) 141
Dendrograptus 221
Derybia Waageni SCHELLWIEN 313, 323
 Deutsch-Bleiberg 477
 Devon, das 244 ff. Vergleiche 272 ff.
 Devonische Faciesbildungen, Uebersicht derselben 281
 Devon, Grazer f. 290
 — discordante Lagerung des 15
 Devonischer Riffkalk 7
 Diabas, dynamometamorph, Ufer des Torrente Chiarso bei Paularo 183, 184
 — Paularo, aus dem Cnlm nahe der Grenze gegen den Groedener Sandstein 184
 — Stangalp (Stelermark) zw. Turbacher Höhe u. Reichenau 184, 185
 — geschiefert im Nütschgraben und am Hürmsberg bei Bleiberg 177—179
 — Analyse 179
Dielasma elongatum SCHL. 373
 — *carinthiacum* SCHELLWIEN 321
 — *Toulai* SCHELLWIEN 321
 Dientener Obersilur (Profil) 237, 238
 Dignasthal 122
 Dimon, Monte 39, 309
 — Monte, altcarbonisches Eruptivgebiet des 60
Dimyodon intusstriatus EMMR. 139, 417, 421
 Dinarische Faltenzüge 469
 Frech, Die Karnischen Alpen.
- Dinarites* sp. 392
 — *glacialis* 405
 Diorit 13
Dipteropora regularis DE KON. 316
Diplograptus folium 19
 — *acuminatus* NICHOLS 19
Discoclymenia 269
Distichites 355
 Dionha hora 239
 Dobratsch 16, 477
 — palaeozoische Scholle am 134
 Dölling (916 m) 475
Dolabra (?) Hardingi 285
 Doleritische Tuffe von Kaltwasser 32
 Donnerkogel (Gosau) grosser 410
 Dorfer Thal 210
 Dossena, Schichten von 390
 Draschitz 14
 Draubrucl 462
 — der Beginn des, im Osten 461
 Dreischneidenspitze 71
 Dürrer Wipfel 26
 Dwykaconglomerate 372
 Dyasformation 119
- E**
- Eckengraben 139
 Eckenkofel 140, 420
Edmondia Haidingeriana DE KON. 305, 307
 — *sulcata* PHILL. 307
 Egg 475
 Egger Alp 41
 Egger-See 472
 Eichenkofel 166
 Einklemmungen älterer Schichten zwischen dem Silur und der abgesunkenen Triasscholle 23
 Einseitige Ausbildung der Alpen 452
 Einteilung der Karnischen Alpen 6
 Eisackthal 463
 Eisenerz in Stelermark 236
 Eisenkalk von Wetzmann 75
 Eisenkappel 332, 446
 Eisenoolith, brauner, feinkörniger, mit Quarzkörnern 225
 Eisenreich (2664 m) 130

Elskar an der Kellerwand 86
 Elba (Obersilur) 243
 Elbersreuth im Fichtelgebirge (Orthocerenkalk Obersilur) 240
 Elbingerode 281
 Elferspitz 61, 282
Encrinurus Novaki FRECH 234
Encrinurus liliiformis 298
Enteles 302, 366
 — *Kayseri* WAAG. 313
 — *Suessi* SCHELLW. 323
 Eocæn 457
 Eocæne und obliocæne Meeresbedeckung der Südzone der Ostalpen 455
 Epidot im Conglomerat des Nütsehgrabens 180
 — in dynamometamorphem Diabas 183
 — im Saussurit eines diorit-porphyrischen Ganggesteins 190
 — in Feldspathen porphyritischer Gesteine 185
 Erbray (Loire Inférieure) 275
 Erdbach-Breitscheid 356
 Erdbeben des Dobratsch 453
 Erosionsformen bei Pontafel 51
 Erosionsklippen 435
 Ersebaumer Thal 127, 216
 Eruptionen der Südalpen 494
 Eruptivgesteine der südlichen Ostalpen 483
 — geologische Vertheilung der Karnischen und dioritischen Ganggestein von Reissach 194
 Etroengt, Kalk von 351
 Etschbaucht 471
Eucalyptocrinus cf. *rosaceus* GF. 259
Euomphalus 42
 — *carnicus* NOV. SP. 251
 — *catillus* MART. 305, 308
 — (*Phymatifer*) *pernodus* MEEK. 315, 321, 324, 370
 Eureka in Nevada 350
Eurypterus 287
 Eustatische Bewegungen der Strandlinie 329

F

Faaker See 11
 Faden 144
 Fallbach 174
 Faltungsbrüche der Drau und Gall 457
 Falzarego-Linie 464
Favosites sp. 17
 — *Goldfussi* M. EDW. et H. 263, 264
 — *polymorphus* GF. 262
 — *reticulatus* GF. 263, 264
 Feistritz 476 (Gallthal) 14
 Feistritzfluss, Durchschnit des, in den Karawanken 346, 347
 Feldkogel 67
 Fella 27, 174, 487
Fenestella plebeia M'COY. 306
 Fichtelgebirge 305
Filicites orcopteridius SCHLOTHEIM 312
 Filone de Costa Splina 167
 Filza-Graben 397
 Flizmoos 287
 Findenigkofel 6, 232
 — Riffforallen des Obersilur 60, 70
 — Kalkbank mit verkleinerten Riffforallen 233
 Finkenstein 11
 Fladung 417
 Flemingitsschichten 401
 Flexuren (schleife Falten) 174, 482
 Förolach 153
 Fontana fredda 62, 309
 Forn Avoltri 164, 308, 465
 Franzenshöhe 461
 Frassenetto 109
 Frattura peri-adriatica 451, 468
 Friauler Kreide 452
 Frohnthal 197
 Front Range (im Staate Colorado) 489
Fusulina cylindrica FISCH. 322
 — *longissima* MOELL. 373
 Fusulinenkalk, rüthleher 310

G

- Gahart, Sandsteine von 297
 Gailberg (Gailbruch) 438
 Gailbergsattel, Dislocation am 81, 420, 476
 Gailbruch 134, 462, 486
 — (Interferenz eines Querbruchs) 143
 Gailitz (Cañon) 14
 Gail-Judicarienlinie 463, 485
 Gailthaler Schichten 2
 Gaisrücken (Dolomit) 19
 Gamskofel 77, 94
 Ganggestein, dioritporphyritisch, im Phyllit von Forst zwischen Reisach und Kirchbach 188—190
 — körnige, porphyrische 194
 Gannister beds 331, 353
 Gardasee 464
 Garulzengraben 7
 Gartnerkofel (Gruppe des) 6, 7, 39, 435
 Gartnerkofel, Obercarbon mit Fusulinenkalken am 39
Gastrioceras 372
 Gastropoden, Kalk (im Unterdevon des Wolayer Thürl) 245
 Gastropodenoollithe 43
 Gatterspitz 130
 Gebirgsrumpfe Mitteleuropas 481
 Gemskofel (2114 m) 193
 Gemeinberg 141
Gephyroceras 269
 Gernula Monte 39, 45
Gervilleia ceratophaga 402
Gigantostylis 354
 Giralba 422
 Gitschbruch 135
 Gitschthal 474
 Glacialerosion 476
 Glaciälschotter 477
 Glarner Gebiet 449
Glossia obovata SOW. bei BARR. 226, 243
 Glazat Monte 171
Glyphioceras 372
 — *sphaericum* 355
 Gneissalpen 119
 Goçman (lies Goçman) 18
 Gürlach 15
 Gürbacher Alp 18, 23
 Güssering 136
 Goggauer Tunnel 34
Goniatites inexpectatus FRECH 90
Gomphoceras sp. 262
 Goritschacher Bach 11
 Gorno, Schichten von 320
 Gosaukreide im Salzkammergut 451
 Gosauschichten in den nordöstlichen Alpen 450
 Gosseletiensandstein (*Goss. deronica* HARROIS Astarlen) 283
 Grabenhorst 428
 Grabenspalten 426
 Grafendorf 151
 Grajsca (1559 m) 11
 Granat in Quarzphyllit 188
 Granatphyllite 192
 Granitzag Franzensfeste — Meran 462, 483
 Graptolithengestein 242
 Graptolithenschiefer des Harzes 287
 Grazer Gebiet (Mitte-devon) 414
 Great Basin, Schollenregion 485
 Greifenburg 135 461
 Greifensteiner Facies 273 ff., 287
 Grestener Schichten 289
 Greuth 11
 Grenther Holzschleiferei, Reibungs-breccie an der 37
 Grüdener Sandstein (und Mergel) 23, 24, 43, 141, 336, 425
 — Sandstein und der sogenannte Verrucano 336
 Grubenspitz 443
 Grüne Gesteine (Schiefer u. Quarzite u. die Eruptivgesteine) 212
 Grünschiefer 193
 Grüne Schneid 86
 Grund, oberdevonische Rifkalken von 279
 Grundgebirge, altkrystallines, Eintheilung des 202
 Gshella 366

Gabelstufe 369
 Gastellhorn 428
 Günterod 273
 Guggberg (1482 m) 27, 430
 Gullestre 450
 Gurina bei Dellach 475
 Guttenstein in Niederösterreich 429
 Guttensteiner Schichten 47
 Gyps, als Leitfossil des Bellerophonkalkes 342
 Gyroporellen 46

H

Hainichen, Flütze von 361
Hallia aff. *callosae* LUDW. sp. 264
Halobia rugosa 416, 417
 Hamilton group 283
Harpes franconicus GEMR. 241
 — *venulosus* COED. W. 250
 — *vittatus* BARR. E₂ 241
 Hartkarsspitze 111, 113, 274, 436, 464
 — (*Strialopora* sp.) 256
 Harzgebirge 441
 Harzgerode 300
 Harzgeröder Ziegelflitte 285
 Hasegebirge 427
 Hauptdolomit 419
 Heiligengeist 152
 Helderberg group 283
Heliolites Barrandei 261, 264, 291, 292
 — *decipiens* M'COY 233
 — *vesiculosus* PENECKE 17, 264
Helminthochiton sp. 315
 Helmspitze (2430 m) 130
Heptastylis 384
Heptastylopsis 384
 Hereyn 273
Hercynella 285
 Heret (Herat) (2430 m) 122
 Hermagor 77, 151, 152, 478
 Herrenstiege 101
Heterastridium 384
 Heterope Mergelzungen am Scheibenkofel 167
 Heuriesenweg 102, 106, 465
Hexacrinus Rosthorni nov. sp. mser. 255, 257, 259
 Hierlatzkalke 290
 Himmelberger Alp 79
 Hinnites 599
 Hoehalpspitz 112
 Hochfläche von Egg 151
 Hochgebirgsland der Devonischen Riffe 75
 Hochlantsch 291
 Hochobir 417
 Hochschwabgruppe 36
 Hochspitz (2592 m) 214
 Hochweisstein (Paralba) 108, 109, 113
 Hochweisstein (Paralba) (Gruppe des) 7, 464
 Hochwipfel 6, 461, 457
 Hochwipfelbruch 10, 41, 435, 436, 465
 — hajonettförmige Umbiegung 14
 —, östlicher Verlauf des 466
 —, Westende des 65
 Hoher Güll (Berechtesgaden) 410
 Hohenmauth 474
 Hohenthurm 15, 475
 Hohenwarth 151, 232
 Hohe Trieb 61, 433
 Hollbrucker Thal 180, 195
Hologyra 418
Holopea tumidula OEHL. 251
Holopella 43
 — *piligera* SANEB. 262
Homalonotus 283
 Homotaxie der marinen artinskischen Stufe 370
 Hornblende (gemeine) blaugrün in roh geschieferten Diabasen des Nötschgrabens, südlicher Eruptivzug 176, 177
 — (gemeine) in roh geschieferten Diabasen des Hörsberg bei Bleiberg 178
 — (gemeine) blaugrüne in Conglomeraten des Nötschgrabens, nördlicher Eruptivzug 179, 180
 — (uraltische) in metamorphen Diabasen 183, 184
 — braun, in einem dioritporphyritischen Ganggestein 189

Hornblende, hellgrün, in einem dioritporphyritischen Ganggestein 189
 Horton series in Neu-Schottland 355
 Hülschiefer der Klippe 432
 Hunsrücktschiefer 285
Hypsipleura 418

I und J

Jauken (2252 m) 144, 337
 Iberg bei Grund (Harz) als tektonische Klippe 431, 432
 Idaho 359
 Idrosee (Weissenbach) 463
 Illtsch 11
 Imenit in spilltischen Mandelsteinen 182
 — in grossen Tafeln in dynamometamorphem Diabasen 184
 — in einem diorit-porphyrithischen Ganggestein 189
 Incarajo-Thal, Graptolithenschiefer des 722
 — Querverwerfungen des 65
 Innichen 1
 Inselgebirge der Karnischen Alpen zur Zeit der Raibler Schichten 418
 Interferenzerscheinungen von verschiedenen Bruchrichtungen 437
 Interrupta-Kalk 242
 Intrusivo Hineinpressung von Eruptivgestein am Stabet 32
 Joachimskopf bei Zorge, Kalke von 298
Joannites cymbiformis 415
 — *Joannis Austriae* 415
 Jögartkogel 421
 Isonzobrunn 175, 468
 Istro-dalmatisches Küstenland 455
 Jnekbühel (1891 m) 144, 476
 Judenburg 293
 — Grünlschiefer von 214
 Judicarien 464
 Judicarienlinie 463
 Julische Alpen 163 ff., 485
 — Mesozoische Tafel der 173

Julische Alpen, Centralstock der (östl. Theil) 173
 Jungplioceane Faltungen (Westalpen) 454
 Juvavische Stufe 419

K

Kalischnikwiese 32
 Kalkeinlagerungen der Manthener Schichten 67
 Kalkphyllit von Reissach 195
 Kaltwasser 45
 Kapin 32
 Karawanken 8, 257, 441, 442, 484, 485
 —, tektonische Entwicklung 446
 — (Obersilur) 246
 Karnische Alpen, Gebirgsbau der, in seiner Bedeutung für die Tektonik 424 ff.
 — in ihrer Bedeutung für den Bau des Gebirges 458 ff.
 Karpathenklippen 431
Karpinkia TSCHERNYSCH 294
 — *occidentalis* nov. sp. 253
 Karrenfeld, altes, des Mooskofel 96
 Karwändelgebirge 440
 Kathrein, St. 28
Katosira 418
 Kellor 91
 Kellerwand 6, 84
 — flache Schichtenstellung der 88
 — dreieckige Terrasse vor der 89
 Kernlinie 174
 Kernitzelgraben 218
 Kerschdorf 159
 Kersnitz 10
 Kesselkofel 213
 Kesselwald 18
 Kingat (2510 m) 126
 Kirhdach am Brenner 199
Kirkbya permiana 374
 Kitzbühel 232
 Klamm bei Payerbach 335
 Kleine Studena 41
 Klippen, tektonische 430
 — der Karpathen und von Hoch-Savolen 431

Knollenkalke des tiefsten Unterde-
von 245
Köderhöhe (2251 m) 71
Kofflergraben 397
Kolmwald 36
Königsberg 172
Königswand 115, 244, 245, 433
— (Gruppe der) 6
Kütschach 141, 192, 337, 427, 475
Kok 10, 436, 437
— geologische Verhältnisse 21
— Orthocerenkalke des 234
Kollen Dianl 465
Kollinkofel 251, 303, 443
— grosser und kleiner 91
Koninckina Leonhardi WISSM. sp. 413
Konioprus 279
— (*F.*) Fauna von 90
Kopagraben 35
Kopainig 11
Korallenkalke (ungeschichtete) 251
— geschichtete 251
Korallenmergel (im Mitteledeon bei
Gerolstein 253
Kordinalp 56
— Kleine 426
Koschutta, Abhang der 416
Kossower Granwacke 220
Krainburg 14, 211
Krainegg 13
Kramenzelkalk (Obersillur) 227
— mit Orthoceren (Cellon) 231
— (Sillurisch am Osternigg) 15
— Nierenkalke 61, 267
Kreide (Ostalpen) 450
Kressbach 77
Kreuzbach (Schlucht) 41
Kreuzbergsenke 120
Kreuzberg bei Sexten 310
Kreuzen (2152 m) 192
Kreuz-Tratten 144
Krieghof 475
Kronalp (Obercarbon) 40
Kronau 174
Krone 45, 49
Kronenprofil 311, 312, 326
Kronhof 475

Kronhofgraben 70
Kühweger Aip 42—43

L

Laas 143, 427
Längsbruchthäler, tektonische 479
Lahngraben 99
Langenanbach, Nassau 281
Lanzenboden 53, 438
Lanzenthal 426
Latschacher Aip 17
Lauscheck 76
Leitenthal 215
Leiterhof 131
Leitersteg 96
Leña in Asturien 330
Lengenfeld 467
Leopoldskirchen 164, 430
Lepidodendron cf. *Goepperti* PRESL.
335
— *Veltheimianum* STBG. 361
— *Volkmannianum* STBG. 361
Leptaena aff. *sericea* SOW 220
Leptynoconcha bohémica BARR. sp.
= *Tenka* BARR. 236
— *triangula* MSTR. = *Tenka* BARR.
242
Lerchriegel 31
Lessachterrasse 477
Lessachthal 120, 474
Ljubarische Stufe 455
Lienz 478
Lienzer Gebirge 458
Liesing 141, 192
Ligosullo 65
Liköflwand 125, 245
Limatulina intersecta DE KON. 307
Linnische Steinkohlenegebiete 332
Lind 149
Lingula 340
Liparisches Meer 490
Lipnitz 172
Lithodendron 139
Lithophagus faba WINKL. 421
Lochalpe 324
Lomsattel 17, 264
Lonsawipfel 47

Londothal 122
Lonsdaleia floriformis 156, 321, 328
 — *rugosa* M'COY 305, 306
Lophophyllum proliferum M'CHESNEY sp. 321
 Lorenzago 168, 460, 484
 Lorenzen, St. 137
Loronema constrictum MART. 308
 — *enantiomorphum* nov. sp. mscr. 259
 — *ingens* nov. sp. mscr. 251
 — *simile* DE KON. 308
 — *subtilistriatum* OEHL.? W. 251
 Luganer See 447
 Luggauer Thal 120
 Lumachellen mit *Corbis Melingi* v. HAU. 415
Lunulicardium sp. (verwandt mit *L. subdeccusatum* MSTR) 269, 285
 Lunzer Sandstein 417
 Lussnitz 170, 430
 — Schwefelgraben bei 342

M

Macrocheilos arculatum 91, 262, 266
 — *fusiforme* GF. 251
 — *subcostatum* 266
 — aff. *subulitoides* GEM. 321
Macrodon? antirugatus DE KON. 307
 — *plicatus* DE KON. 307
 — *strigillatus* 414
Macandrostylis 384
Maenecerus (Cabrères) 248
 Maderkopfpal 97
 Madritscheng 54
 Madritschen Schober 54
 Magnetit in Quarzphyllit 188
 Malborgeter Graben 29
 — Sperrfort 29
 Maggiore, Rivo 63
 Maglern 14
 Maldatschen Hütte 426
 Malüwka-Murajewnia, Kalk von, in Russland 351
 Malurch 48
 Mandelausfüllung durch Carbonat, Chlorit, Chalcedon in splitischen Mandelsteinen 182

Mandelsteine, splitisch vom Monte Dimon, Torrente Chiarso, Monte Paularo, Monte Pizzul 181—183
 — als Geröll im Schalsteineonglomerat vom westlichen Kamm des Monte Dimon 182, 183
 Manebach (Thüringen) 364
 Mangart (2678 m) 172
 Manno am Lugauer See 448
Manticoceras Stuckenbergi 246
 Marbre Griotte 354
Marginifera pusilla SCHELLWIEN 311, 313, 324
 Maria Luggau 192
Martinia carinthiaca SCHELLW. 315
 Martullkgraben 425
 Massessnik 410
 Matterhorn 126
 Mauranthal 63
 Mauthener Schichten 65
 — unteräurische 208 ff.
 — petrographische Beschaffenheit der 209
 Mauthen, Schichtenfolge bei 45
Medlicottia 372
Meckella 366
Megalodon 55, 379
 — *carinthiacus* 415
 — *Damesi* HOERN 420
 — *Gümbeli* 422
 — *Tofanae* HOERN 150
 — *triqueter* WULFEN 153, 405
Meganteris 295
 Meledisalp 229
 Mellweg 17
 Mendola Dolomit 395
 Meran, Südfanke des Grauitzuges von 463
Merista herculea BARR. (F₂—G₁) 259
 — *passer* BARR. F₂ 253, 273
 — *securis* BARR. 242
Meristella Circe BARR. W. 253, 259
 — *tumida* BARR. BOB DALM. 226
 — *ypsilon* BARR. 236
 Mezzo, di 62
 Michael, St., ab Leoben 335
Microdon discoides BARR. 253

- Miell bei Rigolato 94, 309
Mimoceras (Böhmen F.) 248
 Mioocene Faltungsphase 453, 454
 Mirnflkbruch 174
 Miröschauer Schichten 363
 Missoria 77
 Mittagkofel (2091 m) 172
 Mittagkogel (2144 m) 10, 11, 172, 467
 Mittelcarbonische Faltungen 440, 455, 460
 Mittelcretacäische Gebirgs-Bildung 450, 455
 — Brüche 460
 Mitteleuropäische Horste 456
 Mittelgebirge (H. STEPHAN) 478
 Mitteljogocaene Faltung 453
 Mjatschkowa, Kalk von 369
 Moenkgraben 136
Modiola minuta Gr. 421
Modiolopsis Fallasi 374
 Möderndorfer Alp 25 40
 Müschacher Wipfel (1899 m) 150
Monograptus 19
 — *lobiferus* 221
 — *priodon* 221
 — *colonus* 221
 — *testis* 221
Monophyllites wengensis MJS. 412
 Moutaseh 172
 Mont Blanc, Zone des 447, 449
Monticulipora petropolitana EICHW. 219, 233
 Monticullporiden, baumförmige 19
 Mooskofel 96, 465
 — (*Alveolites* sp., *Monticulipora* sp.) 256
 Moreretto, Casa 93
 Moscardo, Rivo 63
 Mürzgebiet 455
 Mule (Muschelkalk Conglomerate) 24
 Muran 204
Murchisonia attenuata LANDSTR. 231, 232, 235, 243
 — *Davyi* BARROIS 250
 — *Megaerae* nov. nom. 249
 Murgebiet 211
 Muschelkalk, rothe Conglomerate des 30
 Muscovit 200
 Musenalp 139
Myacites fassaensis WISSM. 43, 392
Myalina bilsteinensis 285
 — *crassisteta* 285
Myalinoptera alpina FRECH 252, 294
Myophoria costata 24
 — *Kefersteini* 163, 418
 — *Whateleyae* 415
- ## N
- Nachbrechen eingefalteter Kalkmassen bei erneuter Gebirgsbildung 437
 Nachhelvetische (jungmioocene) Zeit 458
 Nampolach 17
 Nassfeld bei Pontafel (Schwefelquelle) 51, 310
Naticopsis plicistria PHILL. 308
 — *Sturi* DE KON. 308
Natiria carintiaea STACHE sp. 285
 — *costata* MSTR. sp. 24, 392
Nautilus (Discites) subsulcatus PHILL. 308
 Nehden 354
 Nehdener Goniatitenschichten 287
 Nellenköpfehen bei Coblenz 285
 Neocomzeit (Rückzug des Meeres) 450
Neritaria 418
 Neumarkt 332
 Neu-Mexico 359
Neuropteris flexuosa 335
 — *gigantea* STBG. 385, 362
 Neustadt 434
 Niedere Tauern 201, 445
 Niedergallthal 402, 436
 Niederösterreich (Faltungen) 458
Niobe elongata DE KON. 307
 — *luciniiformis* DE KON. 307
 — *nuculoides* M'COY. 307
 Nüßlinger Graben 69
 — Kalkalpenzone 429

Nürsach 146
 Nürtsch 131, 152
 Nordalpen 482.
 Nordamerikanische Tafel 490
 Nord-Devonshire 351.
 Nordfrankreich u. Catalonien (Ober-
 silur) 243
 Nordtiroler Kalkalpen 485
 Norische Stufe (BITTNER, non MOJ-
 SISOVICIS) 419
Nucleospira inelegans BARR.? 231
 — *pisum* 249

O

Obercarbon der Karnischen Alpen
 309 ff.
 Obercarbonische Schichten, Bildungs-
 weise der 328
 Obercarbonisches Meer, Vorschreiten
 des 330
 Oberdrauburg 135, 146, 478
 Oberfeistritzer Alp 17
 Oberflächengeologie der Karnischen
 Alpen 3
 Oberhüter (bei Bleiberg) 306
 Oberjurassische Ammonitenkalko v.
 Trient 452
 Ober-Kreuth 152
 Oberndorfer Berg 41
 Obersilur (Allgemeines) 220 ff.
 — thüringisches 242
 — südfranzösisches 242
 Obertarvis 172
 Obertilllach 200
 Obervellacher Erdbebenlinie 61, 439
 Obir, Kleiner 421
 Obstoanser See 123, 126, 129, 193
Odontochile 300
Odontoperna Bouéi 415
Odontopteria alpina STERNB. 315
 — *Brardi* 335
 — *heterophylla* 335
 Ofenalp 50, 312
 Ofener-Joch 111, 112
 Ogdenquarzit in Utah 283
 Oharnachalp 50, 52, 229, 234
 Oistrizza 411
 Old Red Sandstone-Facies 285
 Oligocäne Falten und Brüche 458
Opis Hoeninghausi 414
 Oregione-Joch 110, 112
 Orientalisches Festland 469
 Oriskany (Lower Helderberg), Now
 York 273
 — Sandstein 283
Orthia Actoniae SOW. 19, 219
 — (*Platystrophia*) cf. *Burcani* BARR.
 254
 — *calligramma* 220
 — *Goeschens* FRECH 262
 — *palliat*a 275
 — *Pecosi* MARCOU 313
 — *resupinata* MART. 306, 376
 — cf. *solaris* 220
 — *striatula* SCHL. 92, 266
 — *subcarinata* HALL 259
 — *tenuissima* BARR. 356
Orthoceras 225
 — *alticola*, Zone des 22, 225, 240
 — *alticola* BARR. 96, 226, 231
 — *amoenum* BARR. 226
 — *Argus* BARR. 249
 — *dulce* BARR. 78, 232
 — *electum* BARR. var. 226
 — *firmum* BARR. 226
 — *Michelini* BARR. 226, 235
 — *originale* BARR. 235
 — *pectinatum* BARR. 96, 231
 — *pleurotomum* BARR. 226, 235
 — *potens* BARR. 22, 78, 225, 230, 232,
 235, 254
 — *Richteri* BARR. 231
 — *subannulare* MSTR. (Elbersruth,
 E₂) 240
 — *transiens* BARR. 78, 232
 — (*Jovellania*) *triangulare* 295
 — *truncatum* BARR. 225, 235
 — cf. *vespertilio* SOW. 219
 — *zonatum* var. *littoralis* BARR.
 (E₂) 225
 Orthocerenkalke des Cellonvorberges
 229
 — Eintheilung der 222

Orthocerenkalke des Krumpalbi-
Gebietes nordwestl. von Vordern-
berg 237
— obersilurische 229
Orthoetes crenistria PHILL. 306, 376
— *sempilanus* WAAG. 313, 318, 324
Ortlerkalk, triadisch 448
Oseltzengraben 324
Ostalpen, Tektonik der 479
Osternlgg 229, 263, 461
— - Polndnlgg 279
— - (Devonzug) 466
Osternlgg und Polndnlgg-Kernsitzen,
Kalkzug des 17
Ostracodenschiefer 253
Ostran-Waldenburger Schichten 442
Ostrea Montis Caprilis 414
Ottweiler Schichten 335
Oxydiscus Delanoui OEHL. 251

P

Pachycardia Haueri 418
— *rugosa* 163
Padola 133
Paffrath 281
Palaeozoische Faltung 440
Pal (grosser) 232
Palgebirge 79
Palgraben 84
Palumbina, Monte (Porze, Val Vis-
dende) 124, 216, 245
Palnzza 169
Paralba (2691 m) (s. Hochweisstein)
103, 436
Parggen 138
Parodoceras sulcatum MSTR. sp. 268
Partnach-Facies 382
Partnachschichten (sog. „Cassianer-
schichten“) 419
Pasterkfelsen (Vellach) 256
Patameranbach 21
Paternlon 154, 461
Paularo 164, 308, 465
— Monte 60, 309
Peccol di Chiall Alp 71, 238, 433
Pecopteris arborecens 358
— *arguta* BRGT. 353

Pecopteris lonchitica BRGT. 355
— *Milioni* ARTIS 322
— *oreopteridia* BRGT. 54, 312
— *pteroidea* BRGT. 333
Pecten (Pseudamussium) Bathus
D'ORB. 307
— *discites* SCHLOTH. 393
— *filosus* 414
— *Fuchsi* 393
— *venetianus* 24
Peloponnes 471
Penser Joch 199, 463
Pentamerus acutolobatus 275
— *globus* BRONN. 262
— *optatus* BARR. 254, 257, 275
— *procerulus* BARR. (F₂) 254, 259
— *Sieberi* v. BUCH var. *anomala*
BARR. (F₂) 259
Periadriatische Brüche 467
Perm (Dyas) (XI. Kapitel) 336 ff.
— selbe Abgrenzung vom Carbon 367
Permische Transgression 440, 454
Perna (Odontoperna) Bouéi v. HAU.
41
Petalaxis 366
Petraia 237
— *semistriata* 226, 236, 242
Petroleumgebiet von West-Virginia
359
Pfannspitz 125
Phacops Bronni 270
— *fecundus* 275, 299
— *Grimburgi* FRECH 78
— *Sternbergi* BARR. (G.) 258
— (*Trimeroccephalus*) *anopthalmus*
DOV. NOV. 268, 270
— — *carintiacus* nov. sp. mser. 270
— — *cryptopthalmus* EMMR. s. str.
269, 270
Philhedra epigonus nov. sp. mser. 252
Phillipsastraea 281
Phillipsia? sp. 308
— *scitula* MEFK. 313, 324, 332
Physophycus Succsi 316
Plave (Torrente) 115
— (Schichtenfolge an dems.) 115-117
Pieve di Cadore 168, 397

- Pikes Peak 489
 Pilton beds 351
 Pinacites (Böhmen F₂) 248
 Pinacoceras *Metternichi* 380
 Pinna 415
 Pit Rivo 65
 Piznl, Monte, bei Paularo 48, 58, 310
 Plagioklas in roh geschiefert Diabasen des Nüttschgrabens, südlicher Eruptivzug 176, 177
 — in roh geschiefert Diabasen, Hürmsberg bei Bleiberg 177
 — in Conglomeraten des Nüttschgrabens, nördlicher Eruptivzug 180
 — in spilitischen Mandelsteinen 181
 — in metamorphen Diabasen 183, 184, 185
 — in Porphyriten 185
 — in einem dlorit-porphyratischen Ganggestein, Forst zw. Reissach und Kirchbach 188
 Plattenkalk der bayerischen Alpen 421
Platycceras (Orthonychia) conoideum GF. sp. 262
 — *cornutum* TSCHERN. 252
 — *mons* BARR. 251
 — *Protei* OEHL. 256, 259
 — *Sileni* OEHL. 252
 — *uncinatum* KAYS. 259
Platycheilus (Trachydomia DE KON.) aff. *Whederi* SHUM. 315
 — (*Trachydomia* DE KON.) aff. *canaliculatus* GEM. 315
Platystoma naticoides 299
 — *naticopsis* 299
 — — OEHL. var. *gregaria* BARR. 256, 259
 Plenge 94 465
Pleurophorus intermedius DE KON. 307
Pleurotomaria acuta DE KON. 308
 — *debilis* DE KON. 308
 — *extensa* HEIDENHAIN 243
 — — — var. 231
 — *Grimburgi* nov. sp. 250
 — aff. *Mariani* GEM. 315
Pleurotomaria naticoides DE KON. 308
 Plückerener Querbruch 437, 438
 — und die im O. abgesunkene Scholle 79
 — carbonische Faltung am 81
 Plongastel 297
 Pocono sandstone 358
 Podlanegg 211
 Pökau 13
 Pollnigg 232, 279
 — -Bruch 72
 — Culm des 73
 — (Unterdevon) 244
 Poludnigg 17, 18, 263
Polytropis 275
 — *laeta* BARR. 251
 — *discors* SOW. sp. 235
 Pontafel 2
 — Obercarbon der Gegend von 48
 Pontebana 47, 472
Popanoceras 372
Porambonites 19
 — cf. *intercedens* var. *filosa* 219
Porcellia nov. sp. (verwandt mit *P. primordialis* SCHL.) 268
 Pormenaz (Hoch-Savoyen) 449
 Porphyrite, feldspatreich, quarzführend, vom Cerevesa-Joch, zwisch. Cerevesa-Joch u. Fontana fredda, im Culm-Conglomerat vom Monte Paularo, Costa Robbia 185, 186
 Porphyroidschiefer von Singhofen (Nassau) 285
 Porphyryzug östlich vom Stabet 31
 — seine Zusammensetzung 32
 Porze 118, 244, 453
 — Gruppe der 120, 121
 — -Königswand 279
Posidonia venusta MSTR. 268
 — — var. *carinthiaca* FRECH 269
 — *scengensis* WISSM. 33, 345
 Potok (Koschutta) 417
 Pottsville conglomerate 358, 362
 Povolaro 94
 Pradnina-Sattel 171
Præluccina resecta BARR. sp. (*Dalila* BARR.) 231

Praelucina (= *Dalila*) 255
 Prato Carnico 168
 Preswacker See 151
 Prezensjo 131
 Prihatbach 47
 Primiero 165
Primitia 253
 Prince-Edwards-Insel 357
Procycolites 354
Productella forojuliensis FRECH 92,
 266, 267
 — *Herminae* FRECH 92, 266
Productus aculeatus MART. 306 var.
 313
 — *boliriensis* D'ORB. 370
 — *cadoricus* 344
 — *cancriniformis* TSCHERN. 431
 — *fimbriatus* SOW. 306
 — *Flemingi* SOW. 306
 — *giganteus* 49, 303, 306
 — — (nach STACHE) 311
 — *gratiosus* WAAG. var. *occidentalis*
 SCHELLWIEN 313
 — *horridus* 344
 — *Howsei* KING. 344
 — *latissimus* SOW. 306
 — *lineatus* MART. 306, 311, 313, 315
 — *longispinus* SOW. 313, 324
 — *Medusa* DE KON. 306
 — *praelongus* 352
 — *punctatus* MART. 306, 324, 375
 — *pustulosus* PHILL. 306
 — *scabriculus* MART. 306, 375
 — *semireticulatus* MART. 306, 315,
 324
 — — MART. var. *bathycolpos* SCHELL-
 WIEN 311, 313
Proetus (*Phaetonellus*) *planicauda* 275
 — *eremita* BARR. 275
Prographularia 384
Prolecanites 355
Prolobites delphinus SDBG. sp. 265
 Promosalp 61, 305
 Promosjoch 7, 432
Proptychites 400
Proteocystites flavus 386
Pseudofossarus 415

Pseudomelania cf. *Rosthorni* HOERN.
 sp. 153, 405
Pseudomonotis 43, 45
 — *angulosa* LEIPSIUS sp. 393
 — *Clarai* 392
 — *speluncaria* 374
Psiloceras planorboides 391
 Pterinaeensandstein (von Ems) 243
Ptychites sp. 397
 — *gibbus* 399
 — *Studeri* 399
Puella (= *Panenka*) 255, 257, 295
 Pusterthal 196
Pustularia („*Chennitzia*“) *alpina*
 EICHW. vom Schlerer 415
 Pyrenäen (Obersilur) 243
 Pyrop 141

Q

Quarz in roh geschleiferten Diabasen
 d. Nütschgrabens, südlicher Erup-
 tivzug 177
 — als Spaltenausfüllung im Diabas
 d. Nütschgrabens, südlicher Erup-
 tivzug 175
 — in Conglomeraten des Nütsch-
 grabens, nördlicher Erupativzug 180
 — in Porphyriten 185
 — im Quarzphyllit 187, 188
 Quarztschiefer (Obergallthal) 193
 Quarzphyllit, Forst zw. Reissach u.
 Kirchbach 187, 188
 — — granat- und magnetitreich 188,
 191
 — Verbreitung des, in den Ostalpen
 und sein Verhältniss zu anderen
 krystallinen Gesteinen 195
 Querbrüche, Gebiet der, Gartnerkofel
 bis Promosjoch 39
 Querspalten 438
 Querthäler (Friaul) 473

R

Rabantberg 147
 Radnig 151
 Radstadt, Sericitphyllit bei 237
 Raibl 45

- Raibler Schichten 414 ff.
 — dolomitisches - kalkige Ausbildung
 422
 Ramunda-Alp 100
 Randbruch 468
 Rappoldriff, Riffbüschung und die
 Riffsteine am 246
Rastrites peregrinus BARR. 221
 — *triangulatus* 19
 Rattendorfer Riegel 56, 217
 Rauchkofel 98
 Randenspitz 103, 214
 Ravascello 93, 467
 — Senke von 169
 Recherche-Bay 361
 Recoaro 199, 484
Regina (Kralovna) 257
 Reichenberg bei Assling (Oberkrain)
 333
 Reihungshrecellen 84, 433
 Reiflinger-Facies 382
 Reissach 192
 Reisskofel 145
Retzia 20
 — *grandicosta* DAV. 373
 — *Haidingeri* BARR. 253
 — *longirostris* 265
 — *membranifera* BARR. sp. 253
 — *trigonella* 149, 397
Rhabdophyllia 384
 Rhaet 421
 Rhaetische Transgression 455
Rhipidocrinus nov. sp. 257
 — *praecursor* nov. sp. mscr. 255
 Rhizocorallien 37, 400
 Rhonethal 458
Rhynchonella acuminata MART. 92,
 267
 — *contraria* A. RÖM. sp. (Iberg) 92
 — — var. *obesa* FRECH 92, 267
 — *cuboides* SOW. 92, 267
 — *cuneata* 224
 — *emaciata* BARR. W. 253
 — *grandirostris* SCHELLWIEN 315,
 321
 — *Latona* BARR. 256
 — *Megaera* 90, 226
Rhynchonella Megaera BARR. sp. 249
 — *nympha* var. *paucodivonica* BARR.
 256, 259
 — *pentatoma* 333
 — *pleurodon* PHILL. 306
 — *princeps* BARR. 253, 257, 259, 275
 — — var. *surgens* BARR. 254
 — *Proserpina* BARR. (F.) 259
 — *pugnis* MART. 42, 267
 — *Sappho* BARR. 243
 — — var. *hircina* BARR. sp. 249
 — *Zelia* BARR. sp. 249
Rhytidodendron bez. *Bothrodendron*
 sp. 315
 Rindnangebiet 199
 Riegersdorf 11
 Riffbildner der palaeozoischen Aera
 272
 Riffdolomite der Julischen Alpen 423
 Ringmauer (2027 m) 56
 Rohbia, Costa 60, 63
 Rockford, goniatite limestone von 359
 Rümerstrasse (bei Mauthen) 95
 Rohitsch 310
 Rosa, Monte, Zone des 449
 Roskarspitz (2506 m) 115 ff.
 Rosskofelbruch 39, 49, 53, 427, 435,
 466
 Rossone Col 133
 Rotheisenstein, Vorkommen am Kok
 22
 Rothecke (2393 m) 133
 Rother Sandstein 31
 Royal Gorge 469
 Rudniker Sattel 46
 — Grabenhorst 55
 Rudolfsbrunnen bei Ischl 383
 Rückfaltung 482
 Rufuso, Torrente 310
 Russische Tafel 490

S

- Saalfelden 239
 Sägebach 125
Sageceras 372
Sagenites 385
 Sagrau, Kalkzug 18

- Sallinchetto, Monte 47, 48, 164
Sanguinolites parvulus DE KON. 307
 — *undatus* PORTL. 307
 Saanthalter Alpen (Steiner Alpen) 411
 Sardinien 444
 — (Obersilur) 242
 Sasso Lungerin 119, 166, 464
 Sattelnoek (2037 m) 148
Scaldia cardiiformis DE KON. 307
 Schätzen-Alp 145
 Schalstein 61
 Schatzbühel 420, 476
 Schelbenkofel 167
 Schiebungsflexur v. RICHTHOFEN 433
 Schiefer, nördliche Grenze der, gegen
 den Quarzphyllit 210
 Schieferzunge zwischen dem silurischen
 und devonischen Kalk zwischen
 Polling und Elferspitz 78
 Schinouz 6
Schizolepis permianensis HR. 341
Schizopteris (Fucoides) digitata
 BRONG. sp. (Baieria bei HEER) 340
 Schlerndolomit 27 ff., 404 ff.
 Schneeberg zwischen Passeler und
 Ridaunthal 445
 Schückelkalk 205
 Schönjoch 139
 Schönwipfel 19, 234
 — Schlerndolomit 437
 Schübelhammer 240
 Schulterküferle 46
 Schulterkofel 56, 536
 Schusterthal 130
Schwagerina, Schiefer, Conglomerate
 und Kalke mit 333
 Schwarzer Berg 32
 Schwarz-Leogangthal 239
 Schwarzwipfel 217
 Seebecken, ehemaliges im Viseden-
 thal 121
 Seebergsattel in den Karawanken
 (obersilur. Orthocerenkalke) 229
 Seekopf Thörl 104
 — (Taf. XV) 225
 Seisserathal 172
Sellaclymenia 269
 Seltschach 13
 Semriacher Schiefer 205
 Sericitphyllit 195
 Sericitischer Phyllit 115
 Swansea 363
 Sexten 165
 Sextener Gebirge 163
Sibirites 403
 Sierra Morena (Obersilur) 243
 Silur 208 ff.
 — mittelböhmisches 259
 Silurischer Thonschiefer 41
 Silvella (Paralba-Silvella Geb.) 119
 Silvellartieken 125
 Sittmooser Thal 46, 210
 Skalzer Kopf 53
Solen caudatus 415
 Somerset 355
 Sonnsteln 120
 Sonnwendgebirge 279
 Sotzkaschlechten 455
Sphenopteris distans STBG. 362
 — *nummularia* 335
 — *oxydata* GOEPP. 339
 — *Suessi* GEIN. 359
 Spilltische Mandelstene 60
Spirifer Beaujani BÉCLARD 296
 — *bisulcatus* SOW. 507
 — (*Martinia*) *carintiacus* SCHELL-
 WIEN 321
 — *carnicus* SCHELLWIEN 313
 — — var. *grandis* SCHELLW. 324
 — *Darvosti* 296
 — *Decheni* 296
 — *derelictus* BARR. (F₂) 259
 — *falco* BARR. (F₂) 253, 259
 — *fasciger* KEYSERL. 302, 315, 321,
 323, 373
 — (*Martinia*) *Frechi* SCHELLWIEN
 313, 318
 — *Fritschi* SCHELLWIEN 313 (vgl.
Sp. supramosquensis).
 — (*Martinia*) *glaber* MART. 306
 — *Hauerianus* DE KON. 307
 — *infirmus* BARR. 253
 — (*Reticularia*) *lineatus* MART. 306,
 313, 321, 325

- Spirifer megalotis* 342
 — *mosquensis* 330, 356
 — *Najadum* var. *Triton* BARR. 254
 — *Nerei* BARR. (F₂—G₁) 233, 254, 259
 — *octoplicatus* SOW. 378
 — *oralis* PHILL. 306
 — *paradoxus* 275
 — *pectinoides* DE KON. 307
 — *secans* BARR. 224, 257, 292
 — *semiplanus* MART. 313, 373
 — *simplex* 263
 — *superstes* BARR. (F₂—G₁) 253
 — *supramosquensis* NIK. (= *Spirifer Fritschii* SCHELL.) 323, 370
 — *tornacensis* 356
 — *trigonalis* MART. var. *lata* SCHELLWIEN 315, 321, 324
 — *U'rii* FLEMM. 92, 266
 — *viator* 224
 — *vultur* 342
 — *Zitteli* SCHELLWIEN 313
Spirifer Sandstein und -Schiefer 283
Spiriferina coronae SCHELLWIEN 313
 — *Fraasi* BITTN. 413
 — *fragilis* 149
 — *Lipoldi* BITTN. (= *gregaria* anct.) 416
 — *Mentzeli* 395
 — *ornata* WAAG. 373
 — *Penecke* BITTNER 26
Spirigera indistincta 413
 — *oxycolpos* 391
Spirophyton Suessi STUR 30, 54
Spirula 353
 Spitze, Monte 395
 Spitzenstein 140
Sporadoceras (Sp. Bronni) 269
 Sprakelsbach 298
 Stabet 27
 Stangalp 333
 — -Turrach-Fladnitzer Aip (oberes Oberearbon) 335
 Stazione per la Carnia 170
 St. Canzian 11, 216
 Steinacher Joch 333, 335
 Steiner Kammern 145
 Steinkarspitz (2318 m) 114, 215
 Steinwand (Monte Cresta Verde, 2514 m) 102, 213
Stigmaria ficoides 357
 — *inaequalis* GOEPP. 361
 St. Jacob 192, 475
 St. Lorenzen 192
 St. Maiò 297
 Storziè (Storsitsch) (bei Seeland-Vellach) 252
 Straningeralp 58
Streptorhynchus crenistria 352
Striatopora sp. 123
 — *vermicularis* M'COY. 264
Stringocephalus Burtini DEFR. 41, 262
Stromatopora concentrica GF. 259
 Stromatoporiden 281, 381
 Strombeekenstufen (Lessachthal) 476
Strophomena consobrina BARR. 254
 — (*Leptagonia depressa* WAHL) 254
 — *expansa* SOW. 220
 — *grandis* SOW. 219
 — *pacifica* BARR. 257
 — *Phillipsi* BARR. (F₂, G₁) 259
Strophostylus nov. sp. 220
 Structure torrentielle 363
 St. Stephan 153
 Stna di Raina 61
 Stuckensee 127
 Studena 171
 Suganabruch 467
 Suganalinie 464
 Sugana-Savelinie 467 ff.

T

- Tabulaten 281
 Tagliamentolinie 52
 Talagona, Val 397
 Tarentaise 335
 Tarvis 27, 32
 — Werfener Schichten am Bahnhof 53
Tellinomya M'Coynana DE KON. 307
 — *gibbosa* FLEM. 307
 — *rectangularis* M'COY. 307
 Tentaculitenschichten 285
Terebratula gregaria SUESS 421
 — (*Dielasma*) *sacculus* MART. 307

- Terebratula vulgaris* 46
 Tersadia, Monte 169
 Tertiäre Gebirgsbildung 453
 Terz, Monte di 94
 Texas (Obercarbon) 331
Thalassoceras 372
 Thälbildung, Einfluss der Brüche
 auf dieselbe 471
Thecia 255
Thecosmilia cf. confusus MÜNST. 55
 — *Omboni* 139, 420
 Thörl 10
 Thörlhübe, Reppwand 40
 — Profil der 343
 Thörscharte, Tuffe der 45
Tiaraconcha cf. decurtata BARR. sp.
 235
 Tiefenspitze 153, 213
 Tiefseekorallen 273
 Tiefseesedimente, Ausdehnung der
 354
 Tilliaeber Joeh 120
Tirolites cassianus 24
 Tischwang (Tüman) 63, 305
 Tischwanger Kofel 232, 432
 — klippenartige Kalkknuppen am 82
 Titanit in roh geschieferten Diabasen
 des Nötschgrabens, südlicher Erup-
 tivzug 177
 — in Porphyriten 192
 — in dynamometamorphem Diabas
 193
 Todtes Gebirge 484
 Tödi 335, 447
 Tolmezzo 170, 342
 Torer Graben 28
 — Schichten 163, 415
Tornoceras 269
 — (Kärnten, Cabrières) 245
 — *Escoti* FRECH 268
 — *falciferum* MSTR. 268
 — *inexpectatum* FRECH 247
 — *inexpectatum* (Zone des) 227
 — *planidorsatum* MSTR. sp. 268
 — *Stachei* FRECH 247
 Tournaï 305
 — Kalke von 356
Trachyceras Aon 415
 — *aonoides* 380
 — *Archelaus* LBE. 412
 — *Curionii* 382
 — *Julium* MOJS. 412
 Trebischagraben 38
Tremanotus 275
 — *fortis* BARR. W. F. 251
 — *insectus* nov. sp. msr. 251
 — *involutus* nov. sp. msr. 255
 Treppo Carnico 62, 63
 Trias 375
 — in der Tektonik der Westkara-
 wanken 36
 — -conglomerat 31
 — -gebirge im Süden der kärntner
 Hauptkette 35, 162
 Tribulaengruppe am Brenner 460
 Triglavlinie 174
Trigonodus 418
Trimerocephalus 287
Triphylopteris 358
Trochoceras pulchrum BARR. 231
Trochus (Palaeotrochus) Annae nov.
 sp. msr. 251
 Trübeisberg 145
 Trügelkopf 31
 Trügerhöhe 42
 Trüppelach 14, 15, 66
 Trogkofel 6, 39, 55
 Trompia, Val 339
 Truppe (Alphütte) 11
 Tuffbad 141
 Tuily limestone 357
Turbo solitarius BEN. 422
 Turmalin im Quarzphyllit 185
 Tyraner Alp 291

U

- Uggowitz 27, 461
 Uggowitzzer Breccie 438
 Uggwagebiet, unteres 25
 Uggwagraben 18, 21
 Untaberge 499
 Umknickung d. Kramenzelkalkzuges
 (Hoher Trieb) 71
Uncites gryphus SCHL. 262

Endularia 418
 Untercarbon und seine Verbreitung
 350, 442
 Unterdevon, das höhere 257
 — das mittlere 249
 Unterengadin 449
 Unterpetzen 417
 Untersteiermark 353
 Unter-Tilliach 131
 Uokahügel (Achomiti) 16
 Urbanikapelle 42
 Urtsch-Hube (Kl. Obir) 421
 Usez 172
 Utah 359

V

Vaginatenskalke, unterjurische, des
 Balticum 239
 Valentubach 79
 Valentinal, flexurähnliche Stauch-
 ung 89, 436
 Val Grande, Kalkkeil am 84, 432
 — di San Pietro 93
 Valle Visdende 7, 115, 121, 210
 Varleot, Casa 48
 Vas, Monte 166, 464, 465
 Vellacher Egel 151
 Venetianer Alpen 163ff.
 Vergleiche, stratigraphische 290
 Verruca 358
 Verrucano 336
 Verschiebungen der Pollnigg- und
 Tüschwangelkofel-Scholle 80
 Vicentinisches Gebirge 455
 Villach 1, 461, 466, 477
 Villgratener Gebirge 137, 463
 — Triasfalten 463
 Villnösser Bruchlinie 98, 439, 469, 484
 Vintl 196
 Vischberg (2669 m) 172
 Visé 305
 Vogelbachgraben 7, 324
Voltzia Bockhiana Hr. 341
 — *Fötterlei* STUR 412
Voltzia hungarica Hr. 340
Voltzia-Schiefer bei Raibl 417
 Vorberg 88

Vordernberg im Gailthal (Profil zum
 Osternigg) 15
 — (Steiermark) 236

W

Wahsatechberg 459
 Waidbruck 199
Walchia filiciformis SCHL. sp. 339
 — *piniformis* SCHL. sp. 3, 34, 335,
 340
Waldheimia Haidbornei DAY? 262
 Wallis 335
 Watschiger Alp 46
 Waulsort 305
 — Kalke von 356
 Waverley-Schieften 359
 Welssbrach 136
 Weissenfels 34, 467
 Weitenstein (Untersteier) 348, 445
 Weitensteiner Gebirge 310, 333
 Wengener Schichten 381, 411 ff.
 Werfener Schichten 24, 391—394
 Westalpen (Obercarbon) 335
 — tektonische Entwicklung der 457
 Westkarawanken 466
 — und die östlichen Karnischen Al-
 pen bis zum Garnitzengraben Gal-
 litzbach 9
 — (nördliche Silurscholle) 10
 — Grenze von Trias und Silur 435
 — landschaftliche Form des West-
 abhanges) 14
 Wettersteinkalk 153
 Widderschwin 130
 Wildkirchli 434
 Wildungen 354
 Wimbach 462, 463, 467
 Windischgartener Aufbruchlinie 485
 Windsor, Kalk von 357
 Winkler-Bach 472
 — Joch 7
 — Thal 193
 Wiskauer Schichten 363
 Wodner Hütte 196
 Woiwayer Gebirge 107, 443
 — See, Regelmässigkeit der Schich-
 tentolge am 59

- Wolayer Thal, Ortsgelänge des 100
 Wotschdorf bei Rohitsch (Steier-
 mark) 333, 447
 Würmlacher Alp 67, 76, 78, 212,
 232
Wulfenia carinthiaca 42
 Wurmitzbach 147
 Wurzentrassse 13
 Wurzergraben, geolog. Schilderung
 des 30
- Z**
- Zabre (Sauris) 467
Zaphrentis intermedia DE KON. 306
 Zemech-Schiechten 363
 Zillerthaler Gruppe 450
 Zinnober 159
- Zirkelspitzen 52
 Zlambachschiechten 421
 Zoisit in roh geschiefertem Diabas,
 Hürsberg bei Bleiberg 178
 — in Conglomeraten des Nötsch-
 grabens, südlicher Eruptivzug 180
 — im Saussurit eines diorit-porphyr-
 ritischen Ganggesteins 190
 Zone der Querbrüche 7
 Zopfplatten 158
 Zovello 169
 Zuglia 170
 Zweischalerfacies des Devon 283
 Zweispitz 172
 Zwischenschiechten, Problem der 367
 Zwölferkofel 422
Zygopleura 418
-

Addenda et Corrigenda.

— — —

- Seite 16 lies Grauwacken statt Grauwacken.
" 36 " Westkarawanken statt Ostkarawanken.
" 44 Abb. 16 Untersehrift, lies Knollenkalk statt Krollenkalk.
" 93 lies üblichen statt üblichen.
" 94 " Blattverwerfung statt Blattwerfung.
" 113 " Abb. 43 statt Aub. 43
" 226 *Encrinurus* nov. sp. ist, wie ein Vergleich mit dem Original lehrt, = *Calymene subvariolaris* MSTR. (Beitr. III. t. 5. f. 1.) Die Art ist demnach als *Encrinurus subvariolaris* MSTR. sp. (= *Cromus Muensteri* GUEMB. ex parte) zu bezeichnen und deshalb von stratigraphischer Bedeutung, weil sie die nahe Uebereinstimmung der Kalke von Elbersreuth (S. 240 ff.) mit der Zone des *Orthoceras alticola* beweist.
" 245 lies *Celaceras* statt *Celaccerus*.
" 250 " *Bellerophon (Bucanella) telescopus* statt *Bellerophon (Tropidocyclus) telescopus*.
" 250 Das Citat bei *Pleurotomaria* sp. gehört zu *Murchisonia Daryi* BARBOIS.
" 268 *Porcellia* nov. sp. ist (nach Untersuchung des in Breslau befindlichen Originalexemplars) identisch mit *Goniatites porcelliioides* TIETZE (von Ebersdorf) und wäre somit als *Porcellia porcelliioides* zu bezeichnen; der durch die Aenderungen der Gensbestimmung sinnwidrig gewordene Speciesname wäre besser in *Porcellia Tietzei* zu ändern.
" 291 lies *Burtini* statt *Bartini*.
" 333 " Längsbrüchen statt Längsrücken.
" 335 " Titlis und — zu streichen.
" 351 " Nord Devonshire statt Nord Devonshire.
" 398 " *Avicula* statt *Aricula*.
" 404 " *Gymnites* statt *Dinarites* und *Meekoceras*.
-

Druck von Eberhard Karras in Halle.





